第三核能發電廠及低放貯存場
附近海域之生態調查

契約編號：061090002101

期末報告

定稿本

本次報告執行期間：中華民國110年1月1日至111年12月31日

委託單位：台灣電力股份有限公司

執行單位：國立中山大學

中華民國112年3月

中文摘要（簡要版）

一、中文計畫名稱：第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查

二、英文計畫名稱：An ecological survey on the waters adjacent to the nuclear power plant in South Taiwan and the Lanyu Repository

三、契約編號：061090002101

四、契約期間：110 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

五、執行單位：國立中山大學

六、計畫主持人：陳鎮東教授

七、協同主持人：詹　森教授、陳孟仙教授、劉莉蓮教授、黃榮富教授、楊穎堅教授

八、本次報告書名稱：期末報告定稿本

九、本次報告執行期間：中華民國110年1月1日至111年12月31日

十、本次報告書完成日期：中華民國112年3月

十一、使用語言：中文

十二、中文摘要關鍵詞：核三廠、低放 (蘭嶼) 貯存場、海域生態

十三、英文摘要關鍵詞：The Third Nuclear Power Plant, The Radwaste Repository Site, Ecology of coastal area

十四、中文摘要：詳內文

印製年月：中華民國 112 年 3 月

致　謝

本項調查承台灣電力股份有限公司第三核能發電廠、低放(蘭嶼)貯存場於採樣時提供協助。

行政院原子能委員會、行政院環境保護署，台灣電力股份有限公司綜合研究所、公眾服務處、核能發電處、核能技術處、核能後端營運處、第一核能發電廠、第二核能發電廠、第三核能發電廠、龍門施工處、龍門核能發電廠 (原為第四核能發電廠)、放射試驗室、環境保護處 (原為工安環保處) 於歷年報告審查時，提供寶貴意見，使本報告書內容漸趨完整，特此致謝。

計畫分工一覽

計 畫 名 稱 ：第三核能發電廠及低放貯存場
附近海域之生態調查

計 畫 主 持 人 ：陳鎮東教授
國立中山大學海洋科學系

協同主持人：

(一) 海潮流： 詹 森教授
國立臺灣大學海洋研究所

(二) 水文水質： 陳鎮東教授
國立中山大學海洋科學系

(三) 植物性及 陳孟仙教授
動物性浮游 國立中山大學海洋科學系
生物調查：

(四) 底棲動物 劉莉蓮教授
調查： 國立中山大學海洋科學系

(五) 魚類調查： 黃榮富教授
國立高雄科技大學水產養殖系

(六) 資料庫建置 楊穎堅教授
及維護 國立臺灣大學海洋研究所

目　錄

表目錄---------- A-1
圖目錄---------- B-1
甲、工作背景
壹. 緣起---------- I
貳. 辦理內容及方式---------- I
參. 成效---------- II
各子計畫精簡研究結果---------- III
肆. 摘要---------- XVI
乙、工作報告
壹、海潮流
一、計畫目的與緣起---------- 1-1
二、文獻回顧 ---------- 1-2
三、研究方法與進度說明---------- 1-6
四、調查研究結果---------- 1-9
五、結論---------- 1-29
六、附表與附圖---------- 1-34
貳、水文水質
(貳-甲)、第三核能發電廠附近海域水文與水質化學
一、計畫目的與緣起---------- 2-1
二、文獻回顧---------- 2-4
三、研究方法與進度說明---------- 2-9
四、目前研究成果---------- 2-15
五、結論---------- 2-32
六、附表與附圖---------- 2-32
(貳-乙)、低放貯存場附近海域之水文及水質化學
一、計畫目的與緣起---------- 2-61
二、文獻回顧---------- 2-62
三、研究方法與進度說明---------- 2-62
四、目前研究結果---------- 2-63
五、結論---------- 2-70
六、附表與附圖---------- 2-70

參、植物性及動物性浮游生物調查

一、計畫目的與緣起---------- 3-1

二、文獻回顧---------- 3-1

三、研究方法與進度說明---------- 3-3

四、目前研究成果---------- 3-5

五、結論---------- 3-22

六、附表及附圖---------- 3-22

肆、底棲動物

一、計畫目的與緣起---------- 4-1

二、文獻回顧---------- 4-2

三、研究方法與進度說明---------- 4-4

四、目前研究成果---------- 4-6

五、討論---------- 4-25

六、附表與附圖---------- 4-31

伍、魚類調查

一、計畫目的與緣起---------- 5-1

二、文獻回顧---------- 5-1

三、研究方法與進度說明---------- 5-3

四、目前調查研究成果---------- 5-4

五、結論---------- 5-19

六、附表與附圖---------- 5-19

陸、資料庫建置及維護

一、計畫目的與緣起---------- 6-1

二、研究方法與進度說明---------- 6-1

三、目前研究成果---------- 6-2

四、結論---------- 6-21

五、附表與附圖---------- 6-23

柒、參考資料 ---------- 7-1

捌、其他相關規定事項---------- 8-1

玖、附錄

附錄 A：「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」記事　　附錄 A

附錄 B：期中、期末工作檢討會會議紀錄及審查意見回覆對照表

附錄 B-1：「核能電廠及蘭嶼附近海域之生態調查」
100 年期中工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
100 年期中工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表 ------- 光碟
會議日期：100 年 8 月 31 日

附錄 B-2：「核能電廠及蘭嶼附近海域之生態調查」
100 年期末工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
100 年期末工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表--------光碟
會議日期：101 年 3 月 2 日

附錄 B-3：「核能電廠及蘭嶼附近海域之生態調查」
101 年期中工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
101 年期中工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表--------光碟
會議日期：101 年 9 月 5 日

附錄 B-4：「核能電廠及蘭嶼附近海域之生態調查」
101 年期末工作檢討會暨 102 年度新委辦工作開案會議紀錄- 光碟
101 年期末工作檢討會暨 102 年度新委辦工作開案會議
紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：102 年 3 月 8 日

附錄 B-5：「核能電廠及蘭嶼附近海域之生態調查」
102 年期中工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
102 年期中工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表--------光碟
會議日期：102 年 9 月 10 日

附錄 B-6：「核能電廠及蘭嶼附近海域之生態調查」
102 年期末工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
102 年期末工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表------- 光碟
會議日期：103 年 3 月 14 日

附錄 B-7：「核能電廠及蘭嶼附近海域之生態調查」
103 年期中工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
103 年期中工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表------- 光碟
會議日期：103 年 9 月 10 日

附錄 B-8：「核能電廠及蘭嶼附近海域之生態調查」
103 年期末工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
103 年期末工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表------- 光碟
會議日期：104 年 3 月 12 日

附錄 B-9：「第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查」
104 年期中工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
104 年期中工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表--------光碟
會議日期：104 年 8 月 27 日

附錄 B-10：「第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查」
104 年期末工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
104 年期末工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表------- 光碟
會議日期：105 年 3 月 4 日

續捌、附錄

附錄 B-11：「第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查」
105 年期中工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
105 年期中工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表-------- 光碟
會議日期：105 年 9 月 20 日

附錄 B-12：「核能電廠及蘭嶼附近海域之生態調查」
105 年期末工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
105 年期末工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表-------- 光碟
會議日期：106 年 3 月 7 日

附錄 B-13：「第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查」(106-107 年)
106 年期中工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
106 年期中工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表-------- 光碟
會議日期：106 年 10 月 20 日

附錄 B-14：「第三核能發電廠及蘭嶼(低放)貯存場附近海域之生態調查」(106-107 年)
第二次期中工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
第二次期中工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：107 年 7 月 20 日

附錄 B-15：「第三核能發電廠及蘭嶼(低放)貯存場附近海域之生態調查」(106-107 年)
期末工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
期末工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：108 年 2 月 13 日

附錄 B-16：「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」(108-109 年)
第一次期中工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
第一次期中工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：108 年 10 月 7 日

附錄 B-17：「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」(108-109 年)
第二次期中工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
第二次期中工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：109 年 7 月 20 日

附錄 B-18：「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」(108-109 年)
期末工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
期末工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：110 年 2 月 23 日

附錄 B-19：「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」
期中工作檢討會議紀錄---------- 附錄 B-19A
期中工作檢討會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 附錄 B-19B
會議日期：111 年 2 月 9 日

附錄 B-20：「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」
期末工作檢討會議紀錄---------- 附錄 B-20A
期末工作檢討會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 附錄 B-20B
會議日期：112 年 2 月 7 日

附錄 C： 110-111 年度核能設施附近海域生態放射性物質調查計畫 附錄 C
期末報告定稿本
執行期間：110~111 年
契約編號：056090000701 <南部核能設施>
委託單位：台灣電力股份有限公司
執行單位：國立清華大學
中華民國 112 年 1 月

✱說明：

依台電公司 102 年 3 月 8 日
「核能電廠及蘭嶼附近海域之生態調查」，101 年期末工作檢討會
暨 102 年度新委辦工作開案會議紀錄 (附錄 B-4) 辦理。

『七、討論與決議事項』之
(十一) **自 102 年起放射性物質之調查**及核四廠海域調查監測等資料，分別**由本公司放射試驗室**及美商傑明公司提供。請兩個單位配合南、北核案研究團隊之作業時程盡早提供資料俾及時納入報告書初稿。

Zimbra **apsara@mail.nsysu.edu.tw**

核能設施附近海域生態放射性物質調查計畫 期末報告定稿

寄件者：王逢新 <u677854@taipower.com.tw> 2023 2月 03 週五, 上午 08:21
主旨：核能設施附近海域生態放射性物質調查計畫 期末報告定稿 1 個附件
收件者：apsara@mail.nsysu.edu.tw

黃小姐 您好,
附檔為清大海域放射性物質調查報告，請查照。
請於期末報告定稿時併入報告中，感謝您。

^^
台灣電力股份有限公司
環境保護處 監測組
王逢新
電話：(02)2366-7213
e-mail：u677854@taipower.com.tw

202301台電期末定稿本**.pdf**
3 MB

表 目 錄　　頁次

表 1-1　第三核能發電廠附近海域民國 110 年第 1 次漂流浮標追蹤調查成果表(民國 110 年 1 月 22 日)---------- 光碟

表 1-2　第三核能發電廠附近海域民國 110 年第 2 次漂流浮標追蹤調查成果表(民國 110 年 4 月 16 日)---------- 光碟

表 1-3　第三核能發電廠附近海域民國 110 年第 3 次漂流浮標追蹤調查成果表(民國 110 年 8 月 13 日)---------- 光碟

表 1-4　第三核能發電廠附近海域民國 110 年第 4 次漂流浮標追蹤調查成果表(民國 110 年 11 月 18 日)---------- 光碟

表 1-5　第三核能發電廠附近海域民國 110 年第 1 次漂流浮標追蹤調查成果表(民國 111 年 3 月 5 日)---------- 光碟

表 1-6　第三核能發電廠附近海域民國 110 年第 2 次漂流浮標追蹤調查成果表(民國 111 年 5 月 20 日)---------- 光碟

表 1-7　第三核能發電廠附近海域民國 110 年第 3 次漂流浮標追蹤調查成果表(民國 111 年 7 月 22 日)---------- 光碟

表 1-8　第三核能發電廠附近海域民國 110 年第 4 次漂流浮標追蹤調查成果表(民國 111 年 11 月 12 日)---------- 光碟

表 1-9　第三核能發電廠附近海域 (民國 109 年 12 月 24 日～110 年 2 月 20 日)定點海流觀測調和分析表---------- 光碟

表 1-10　第三核能發電廠附近海域(民國 110 年 2 月 20 日～110 年 4 月 15 日)定點海流觀測調和分析表---------- 光碟

表 1-11　第三核能發電廠附近海域 (民國 110 年 4 月 15 日～110 年 7 月 20 日)定點海流觀測調和分析表---------- 光碟

表 1-12　第三核能發電廠附近海域 (民國 110 年 8 月 19 日～110 年 9 月 9 日)定點海流觀測調和分析表---------- 光碟

表 1-13　第三核能發電廠附近海域 (民國 110 年 9 月 16 日～110 年 11 月 18 日)定點海流觀測調和分析表---------- 光碟

表 1-14　第三核能發電廠附近海域 (民國 110 年 11 月 18 日～111 年 1 月 15 日)定點海流觀測調和分析表---------- 光碟

表 1-15　第三核能發電廠附近海域 (民國 111 年 1 月 15 日～111 年 3 月 14 日)定點海流觀測調和分析表----------=---------- 光碟

表 1-16　第三核能發電廠附近海域 (民國 111 年 3 月 14 日～111 年 4 月 21 日)定點海流觀測調和分析表---------- 光碟

表 1-17　第三核能發電廠附近海域 (民國 111 年 7 月 13 日～111 年 11 月 10 日)定點海流觀測調和分析表---------- 光碟

表 1-18　歷年距出水口 500m 處之溫昇---------- 光碟

表 1-19　第三核能發電廠附近海域民國 87～110 年度漂流浮標追蹤調查結果---- 光碟

表 1-20　第三核能發電廠附近海域長期海流測站平均流速、流向及絕對流速表 光碟

表 1-21　第三核能發電廠附近海域歷年 CTD 調查水團屬性---------- 光碟

表 1-22　第三核能發電廠附近海域海潮流歷年調查結果摘要整理---------- 光碟

表 1-23　民國 95 至 110 年水溫基本統計表---------- 光碟

表 2-1　民國 110 年第 1 次~111 年第 4 次水文暨水質化學資料---------- 2-33

表 2-2　聖嬰年及反聖嬰年開始及結束時間---------- 2-41

表 2-3　WOCE PR-20, PR-21 測線上海研一號(OR-I)、海研三號及KEEP-MASS測站之水質資料---------- 2-42

表 2-4　低放貯存場附近海域民國 110 年第 1 次~111 年第 4 次水文暨水質化學資料---------- 2-71

表 3-1　民國 110 年 2 月 26 日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-環保署公告之沈澱法---------- 3-23

表 3-2　民國 110 年 5 月 14 日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-環保署公告之沈澱法---------- 3-24

表 3-3　民國 110 年 8 月 17 日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-環保署公告之沈澱法---------- 3-25

表 3-4　民國 110 年 11 月 5 日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-環保署公告之沈澱法---------- 3-26

表 3-5　民國 111 年 2 月 16 日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-環保署公告之沈澱法---------- 3-27

表 3-6　民國 111 年 5 月 5 日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-環保署公告之沈澱法---------- 3-28

表 3-7　民國 111 年 8 月 12 日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-環保署公告之沈澱法---------- 3-29

表 3-8　民國 111 年 11 月 17 日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-環保署公告之沈澱法---------- 3-30

表 3-9　民國 110 年 2 月 26 日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-原過濾濃縮法---------- 3-31

表 3-10　民國 110 年 5 月 14 日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-原過濾濃縮法---------- 3-32

表 3-11　民國 110 年 8 月 17 日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-原過濾濃縮法---------- 3-33

表 3-12　民國 110 年 11 月 5 日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-原過濾濃縮法---------- 3-34

表 3-13　民國 111 年 2 月 16 日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-原過濾濃縮法---------- 3-35

表 3-14　民國 111 年 5 月 5 日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-原過濾濃縮法---------- 3-36

表 3-15　民國 111 年 8 月 12 日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-原過濾濃縮法---------- 3-37

表 3-16　民國 111 年 11 月 17 日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-原過濾濃縮法---------- 3-38

表 3-17　民國 110 年 2 月 26 日第三核能發電廠附近海域表層採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000 m3)及生物量---------- 3-39

表 3-18　民國 110 年 2 月 26 日第三核能發電廠附近海域垂直採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000 m3)及生物量---------- 3-40

表 3-19　民國 110 年 5 月 14 日第三核能發電廠附近海域表層採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000 m3)及生物量---------- 3-41

表 3-20　民國 110 年 5 月 14 日第三核能發電廠附近海域垂直採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000 m3)及生物量---------- 3-42

表 3-21　民國 110 年 8 月 17 日第三核能發電廠附近海域表層採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000 m3)及生物量---------- 3-43

表 3-22　民國 110 年 8 月 17 日第三核能發電廠附近海域垂直採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000 m3)及生物量---------- 3-44

表 3-23　民國 110 年 11 月 5 日第三核能發電廠附近海域表層採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000 m3)及生物量---------- 3-45

表 3-24　民國 110 年 11 月 5 日第三核能發電廠附近海域垂直採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000 m3)及生物量---------- 3-46

表 3-25　民國 111 年 2 月 16 日第三核能發電廠附近海域表層採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000 m3)及生物量---------- 3-47

表 3-26 民國 111 年 2 月 16 日第三核能發電廠附近海域垂直採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000 m3)及生物量---------- 3-48

表 3-27 民國 111 年 5 月 5 日第三核能發電廠附近海域表層採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000 m3)及生物量---------- 3-49

表 3-28 民國 111 年 5 月 5 日第三核能發電廠附近海域垂直採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000 m3)及生物量---------- 3-50

表 3-29 民國 111 年 8 月 12 日第三核能發電廠附近海域表層採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000 m3)及生物量---------- 3-51

表 3-30 民國 111 年 8 月 12 日第三核能發電廠附近海域垂直採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000 m3)及生物量---------- 3-52

表 3-31 民國 111 年 11 月 17 日第三核能發電廠附近海域表層採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000 m3)及生物量---------- 3-53

表 3-32 民國 111 年 11 月 17 日第三核能發電廠附近海域垂直採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000 m3)及生物量---------- 3-54

表 3-33 民國 110 至 111 年八次第三核能發電廠附近海域對照與監測測站植物性浮游生物之平均密度比較(cells/l)---------- 3-55

表 3-34 民國 110 至 111 年八次第三核能發電廠附近海域對照與監測測站動物性浮游生物之平均豐度比較(ind./m3) ---------- 3-56

表 3-35 民國 110 至 111 年八次第三核能發電廠附近海域對照與監測測站蝦蟹幼生、魚卵及仔魚之平均豐度比較(ind./m3)---------- 3-57

表 3-36 One-way ANOVA 統計分析動物性浮游生物物(ZP)、植物性浮游生物(PP)、魚卵(F-egg)、仔魚(F-lar)、蟹幼生(C-lar)及蝦幼生(S-lar)在各季節之不同年間差異---------- 3-58

表 3-37 Duncan's 多變距統計分析動物性浮游生物(ZP)、植物性浮游生物(PP)、魚卵(F-egg)、仔魚(F-lar)、蟹幼生(C-lar)及蝦幼生(S-lar)在第 1 次(冬季)與第 2 次(春季)之不同年份間的差異---------- 3-59

表 3-38 Duncan's 多變距統計分析動物性浮游生物(ZP)、植物性浮游生物(PP)、魚卵(F-egg)、仔魚(F-lar)、蟹幼生(C-lar)及蝦幼生(S-lar)在第 3 次(夏季)與第 4 次(秋季)之不同年份間的差異---------- 3-60

表 3-39 民國 85 年 7 月至 111 年 11 月第三核能發電廠附近海域浮游生物於各季之總平均豐/密度---------- 3-61

表 3-40 民國 85 年 7 月至 111 年 11 月在第三核能發電廠停機大修和運轉下，植物性和動物性浮游生物、蝦蟹幼生和魚卵及仔魚於各次之總平均豐/密度的比較---------- 3-62

表 4-1 軸孔珊瑚在入水口右側 (Influ-2) 與出水口水深 8 公尺處 (Efflu) 之成長情形---------- 4-32

表 4-2　98-111 年入、出水口底棲動物著生量之非颱風季與颱風季之比較表--- 4-33
表 4-3　87-111 年 Niño3.4 index 與底棲動物著生量之相關表---------- 4-34
表 4-4　87-111 年 Niño4 index 與底棲動物著生量之相關表---------- 4-35
表 4-5　87-111 年 PDO index 與底棲動物著生量之相關表---------- 4-36
表 4-6　94 年第 3 季固定橫截線調查入水口及出水口南側之底棲生物種類及覆蓋率---------- 4-37
表 4-7　94-111 年海面水溫指數 Niño3.4、Niño4 及 PDO index 與底棲生物覆蓋率變化之相關表---------- 4-38
表 4-8　94-111 年海面水溫指數 Niño3.4、Niño4 及 PDO index 與各測站水溫之相關表---------- 4-39
表 4-9　93-111 年各次 (季) 測站間的溫度與底棲動物著生量之相關性---------- 4-40
表 5-1　第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查(調查日期：110 年 2 月)---------- 5-20
表 5-2　第三核能發電廠附近海域漁獲魚類相之調查(調查日期：110 年 2 月、5 月、8 月及 12 月)---------- 5-23
表 5-3　第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查(調查日期：110 年 5 月)---------- 5-25
表 5-4　第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查(調查日期：110 年 8 月)---------- 5-28
表 5-5　第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查(調查日期：110 年 11 月)---------- 5-31
表 5-6　第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚類相及後壁湖魚類相一覽表(民國 110 年 4 次調查)---------- 5-34
表 5-7　民國 110 年第三核能發電廠附近海域各測站魚類相之調查---------- 5-40
表 5-8　第三核能發電廠附近海域民國 110 年 2 月各測站魚類相之相似度------- 5-45
表 5-9　第三核能發電廠附近海域民國 110 年 5 月各測站魚類相之相似度------- 5-45
表 5-10　第三核能發電廠附近海域民國 110 年 8 月各測站魚類相之相似度------ 5-45
表 5-11　第三核能發電廠附近海域民國 110 年 11 月各測站魚類相之相似度----- 5-46
表 5-12　第三核能發電廠附近海域民國 110 年 4 次調查各測站魚類相之相似度- 5-46
表 5-13　第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查 (調查日期：111 年 2 月)---------- 5-47
表 5-14　第三核能發電廠附近海域漁獲魚類相之調查(調查日期：111 年 2 月、5 月、8 月及 12 月)---------- 5-50

表 5-15 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查 (調查日期：111 年 5 月)---------- 5-52

表 5-16 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查 (調查日期：111 年 8 月)---------- 5-55

表 5-17 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查 (調查日期：111 年 11 月)---------- 5-58

表 5-18 第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚類相及後壁湖魚類相一覽表 (民國 111 年 4 次調查)---------- 5-61

表 5-19 民國 111 年第三核能發電廠附近海域各測站魚類相之調查---------- 5-66

表 5-20 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 2 月各測站魚類相之相似度------- 5-71

表 5-21 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 5 月各測站魚類相之相似度------- 5-71

表 5-22 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 8 月各測站魚類相之相似度------- 5-71

表 5-23 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 11 月各測站魚類相之相似度----- 5-72

表 5-24 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 4 次調查各測站魚類相之相似度- 5-72

表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查---------- 5-73

表 6-3-1 第三核能發電廠附近海域的浮游生物豐度與水質因子間之相關性分析 6-24

表 6-3-2 第三核能發電廠附近海域的浮游生物豐度與氣候指數間之相關性分析 6-25

表 6-4-1 Station 22 及 Station 24 於 94-111 年間之營養鹽相對於入水口灣內及出水口南側小灣固定橫截線之底棲生物覆蓋率迴歸關係表---------- 6-26

表 6-4-2 Station 20、Station 22 及 Station 24 於 94-111 年間之營養鹽相對於對照站（SNS）、入水口及出水口南側小灣之底棲動物著生量迴歸關係表-- 6-27

表 6-4-3 入水口 (Influ-2) 樽海鞘出現之季別與歷年 (92-111 年) 相關次別之的底棲動物著生量、水溫資料、測站 22 的水文水質及動物性浮游生物相之觀測項目 (註 1) 差異比較表---------- 6-28

表 6-5-1 各測站主要魚種平均出現數量及魚種相似度百分比---------- 6-29

表 6-5-2 第三核能發電廠附近海域環境因素分析---------- 6-32

表 6-2-1 核三廠 82 年後電廠運轉 (無大修) 與大修時，表水水溫之比較表------- 6-33

表 6-2-2 秋季時核三廠在正常年、聖嬰年以及反聖嬰年時正常運轉(無大修)與大修時，表水水溫之比較表---------- 6-33

圖 目 錄

頁次

圖 1-1 第三核能發電廠附近海域 CTD 及定點海流觀測作業位置圖---------- 光碟

圖 1-2 民國 110 年 1 月 22 日漂流浮標暨溫度追蹤調查結果---------- 光碟

圖 1-3 民國 110 年 4 月 16 日漂流浮標暨溫度追蹤調查結果---------- 光碟

圖 1-4 民國 110 年 8 月 13 日漂流浮標暨溫度追蹤調查結果---------- 光碟

圖 1-5 民國 110 年 11 月 18 日漂流浮標暨溫度追蹤調查結果---------- 光碟

圖 1-6 民國 111 年 3 月 5 日漂流浮標暨溫度追蹤調查結果---------- 光碟

圖 1-7 民國 111 年 5 月 20 日漂流浮標暨溫度追蹤調查結果---------- 光碟

圖 1-8 民國 111 年 7 月 22 日漂流浮標暨溫度追蹤調查結果---------- 光碟

圖 1-9 民國 111 年 11 月 12 日漂流浮標暨溫度追蹤調查結果---------- 光碟

圖 1-10 民國 109 年 12 月 24 日～111 年 11 月 10 日定點海流觀測結果---------- 光碟

圖 1-11 民國 109 年 12 月 25 日～111 年 11 月 9 日定點海流低通過濾結果---------- 光碟

圖 1-12 定點海流調查海流玫瑰圖(民國 109 年 12 月 24 日～111 年 11 月 10 日)---- 光碟

圖 1-13 定點海流調查流速流向散佈圖(民國 109 年 12 月 24 日～111 年 11 月 10 日) 光碟

圖 1-14 民國 109 年 12 月 24 日～111 年 11 月 10 日定點海流調查流速向量進行圖 光碟

圖 1-15 民國 109 年 12 月 24 日～111 年 11 月 10 日定點海流調查各分潮潮流橢圓 光碟

圖 1-16 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 1 月 23 日、4 月 15 日、8 月 12 日、11 月 10 日、111 年 2 月 16 日、5 月 11 日、8 月 12 日、11 月 17 日 CTD 調查深溫鹽分布---------- 光碟

圖 1-17 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 1 月 23 日、4 月 15 日、8 月 12 日、11 月 10 日、111 年 2 月 16 日、5 月 11 日、8 月 12 日、11 月 17 日出水口附近溫鹽剖面圖---------- 光碟

圖 1-18 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 1 月 23 日水溫與鹽度分佈---------- 光碟

圖 1-19 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 4 月 15 日水溫與鹽度分佈---------- 光碟

圖 1-20 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 8 月 12 日水溫與鹽度分佈---------- 光碟

圖 1-21 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 11 月 10 日水溫與鹽度分佈---------- 光碟

圖 1-22 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 2 月 16 日水溫與鹽度分佈---------- 光碟

圖 1-23 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 5 月 11 日水溫與鹽度分佈---------- 光碟

圖 1-24 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 8 月 12 日水溫與鹽度分佈---------- 光碟

圖 1-25 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 11 月 17 日水溫與鹽度分佈---------- 光碟

圖 1-26 第三核能發電廠附近海域歷年距出水口 500 米處溫昇變化圖---------- 光碟

圖 1-27 民國 92 至 94 年逐時水溫曲線 (上)、同期後壁湖逐時水位曲線 (中) 與蘭嶼每日平均風速、風向棍棒圖 (下)---------- 光碟

圖 1-28 民國 97 至 98 年颱風季節期間海流儀水溫紀錄變化與颱風發生時間關係圖---------- 光碟

圖2-1 研究區域暨採樣位置圖---------- 2-43

圖2-2 110年第1次~111年第4次採樣時衛星資料取得之海水表面溫度分佈圖------ 2-44

圖2-3 110及111年第1次第三核能發電廠附近海域表水溫度、鹽度、pH、溶氧飽和度、營養鹽以及葉綠素甲等值圖---------- 2-46

圖2-4 75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域溫度距平值 (當月測值-歷年月平均值) 與ONI, PDO之變化圖---------- 2-48

圖2-5 110~111年共8次第三核能發電廠附近海域溫度隨深度之變化圖---------- 2-49

圖2-6 長時間溫度記錄與預報潮高記錄圖---------- 2-51

圖2-7 南灣海域102-111年7/15-8/15同時間的出水口3公尺深的水溫比較---------- 2-59

圖2-8 89年至111年11月共92次調查之N/P比值圖---------- 2-60

圖2-9 研究區域暨採樣點位置圖---------- 2-75

圖2-10 在蘭嶼附近1000 公尺以淺之流速分佈斷面圖---------- 2-76

圖2-11 110年第1次~111年第4次於低放貯存場附近海域採樣時之衛星海表水溫分佈圖---------- 2-77

圖2-12 低放貯存場附近海域72年7月~111年11月硝酸鹽、磷酸鹽以及矽酸鹽分別對鹽度作圖---------- 2-79

圖2-13 低放貯存場附近海域72年7月~111年11月N/P比值圖---------- 2-80

附圖2-1 電廠運轉前(a)及運轉後(b)四測站水層水溫在各月份的平均值，其中14站為0～25公尺平均值, 其他為0-10公尺平均---------- 光碟

附圖2-2 四個測站在電廠運轉前、後各月份的平均值---------- 光碟

附圖2-3 24站水溫在電廠運轉前後與16、18、19、23站比較---------- 光碟

附圖2-4 75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域溫度變化圖---------- 光碟

附圖2-5 測站22與24表水水溫之sin 曲線變化圖---------- 光碟

附圖2-6 測站24、22、18之間的水溫差距---------- 光碟

附圖2-7　第三核能發電廠附近海域7 站表水各月份的平均值(75年至今)與WOCE測站比較---------- 光碟

附圖2-8　75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域鹽度變化圖---------- 光碟

附圖2-9　75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域pH變化圖---------- 光碟

附圖2-10　75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域溶氧飽和度變化圖---------- 光碟

附圖2-11　75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域硝酸鹽變化圖---------- 光碟

附圖2-12　75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域亞硝酸鹽變化圖---------- 光碟

附圖2-13　75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域磷酸鹽變化圖---------- 光碟

附圖2-14　75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域矽酸鹽變化圖---------- 光碟

附圖2-15　75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域葉綠素甲變化圖---------- 光碟

附圖2-16　低放貯存場附近海域72年7月~111年11月溫度之變化圖---------- 光碟

附圖2-17　低放貯存場附近海域72 年7月～109年11月各測站溫度平均值與sin曲線變化圖---------- 光碟

附圖2-18　低放貯存場附近海域72年7月~111年11月鹽度之變化圖---------- 光碟

附圖2-19　低放貯存場附近海域72年7月~111年11月pH之變化圖---------- 光碟

附圖2-20　低放貯存場附近海域72年7月~111年11月溶氧量之變化圖---------- 光碟

附圖2-21　低放貯存場附近海域72年7月~111年11月溶氧飽和度之變化圖---------- 光碟

附圖2-22　低放貯存場附近海域72年7月~111年11月硝酸鹽之變化圖---------- 光碟

附圖2-23　低放貯存場附近海域72年7月~109年11月亞硝酸鹽之變化圖---------- 光碟

附圖2-24　低放貯存場附近海域72年7月~111年11月磷酸鹽之變化圖---------- 光碟

附圖2-25　低放貯存場附近海域72年7月~111年11月矽酸鹽之變化圖---------- 光碟

附圖2-26　低放貯存場附近海域6測站表水溫度在各月份的平均值(72年至今)及與WOCE測站比較---------- 光碟

附圖2-27　低放貯存場附近海域6測站表水鹽度在各月份的平均值(72年至今)及與WOCE測站比較---------- 光碟

附圖2-28　低放貯存場附近海域6測站表水pH在各月份的平均值(72年至今)及與WOCE測站比較---------- 光碟

圖3-1 第三核能電廠附近海域各測站之位置圖---------- 3-63
圖3-2 民國110年四次第三核能發電廠附近海域各測站之植物性浮游生物組成圖(以沉澱法之數據分析)---------- 3-64
圖3-3 民國111年四次第三核能發電廠附近海域各測站之植物性浮游生物組成圖(以沉澱法之數據分析) ---------- 3-65
圖3-4 民國110年四次第三核能發電廠附近海域各測站之植物性浮游生物組成圖(以濃縮法之數據分析) ---------- 3-66
圖3-5 民國111年四次第三核能發電廠附近海域各測站之植物性浮游生物組成圖(以濃縮法之數據分析) ---------- 3-67
圖3-6 民國110年四次第三核能發電廠動物性浮游生物豐度於入出水口及其擴散情形---------- 3-68
圖3-7 民國111年四次第三核能發電廠動物性浮游生物豐度於入出水口及其擴散情形---------- 3-69
圖3-8 民國110年四次日第三核能發電廠附近海域各測站中植物性浮游生物之群聚分析 (以沉澱法之數據分析)---------- 3-70
圖3-9 民國111年四次日第三核能發電廠附近海域各測站中植物性浮游生物之群聚分析 (以沉澱法之數據分析)---------- 3-71
圖3-10 民國110年四次第三核能發電廠附近海域各測站中植物性浮游生物之群聚分析 (以濃縮法之數據分析) ---------- 3-72
圖3-11 民國111年四次第三核能發電廠附近海域各測站中植物性浮游生物之群聚分析 (以濃縮法之數據分析) ---------- 3-73
圖3-12 民國110年四次第三核能發電廠附近海域各測站中動物性浮游生物之群聚分析---------- 3-74
圖3-13 民國111年四次第三核能發電廠附近海域各測站中動物性浮游生物之群聚分析---------- 3-75
圖3-14 民國110年2月26日第三核能發電廠附近海域各測站動物性浮游生物之出現百分率---------- 3-76
圖3-15 民國110年5月14日第三核能發電廠附近海域各測站動物性浮游生物之出現百分率---------- 3-77
圖3-16 民國110年8月17日第三核能發電廠附近海域各測站動物性浮游生物之出現百分率---------- 3-78
圖3-17 民國110年11月5日第三核能發電廠附近海域各測站動物性浮游生物之出現百分率---------- 3-79
圖3-18 民國111年2月16日第三核能發電廠附近海域各測站動物性浮游生物之出現百分率---------- 3-80

圖3-19　民國111年5月5日第三核能發電廠附近海域各測站動物性浮游生物之出現百分率---------- 3-81
圖3-20　民國111年8月12日第三核能發電廠附近海域各測站動物性浮游生物之出現百分率---------- 3-82
圖3-21　民國111年11月17日第三核能發電廠附近海域各測站動物性浮游生物之出現百分率---------- 3-83
圖3-22　民國110年2月26日第三核能發電廠附近海域蝦蟹幼生、魚卵及仔魚之豐度於入出水口及其擴散情形---------- 3-84
圖3-23　民國110年5月14日第三核能發電廠附近海域蝦蟹幼生、魚卵及仔魚之豐度於入出水口及其擴散情形---------- 3-85
圖3-24　民國110年8月17日第三核能發電廠附近海域蝦蟹幼生、魚卵及仔魚之豐度於入出水口及其擴散情形---------- 3-86
圖3-25　民國110年11月5日第三核能發電廠附近海域蝦蟹幼生、魚卵及仔魚之豐度於入出水口及其擴散情形---------- 3-87
圖3-26　民國111年2月16日第三核能發電廠附近海域蝦蟹幼生、魚卵及仔魚之豐度於入出水口及其擴散情形---------- 3-88
圖3-27　民國111年5月5日第三核能發電廠附近海域蝦蟹幼生、魚卵及仔魚之豐度於入出水口及其擴散情形---------- 3-89
圖3-28　民國111年8月12日第三核能發電廠附近海域蝦蟹幼生、魚卵及仔魚之豐度於入出水口及其擴散情形---------- 3-90
圖3-29　民國111年11月17日第三核能發電廠附近海域蝦蟹幼生、魚卵及仔魚之豐度於入出水口及其擴散情形---------- 3-91
圖3-30　民國85年7月至111年11月第三核能發電廠附近海域植物性浮游生物(濃縮法和沉澱法分析)之密度---------- 3-92
圖3-31　民國85年7月至111年11月第三核能發電廠附近海域動物性浮游生物豐度- 3-93
圖3-32　民國85年7月至111年11月第三核能發電廠附近海域蝦幼生之豐度---------- 3-94
圖3-33　民國85年7月至111年11月第三核能發電廠附近海域蟹幼生之豐度---------- 3-95
圖3-34　民國85年7月至111年11月第三核能發電廠附近海域魚卵之豐度---------- 3-96
圖3-35　民國85年7月至111年11月第三核能發電廠附近海域仔魚之豐度---------- 3-97
圖3-36　民國85年7月至111年11月在第三核能發電廠停機大修和運轉下，沉澱法、過濾濃縮法植物性浮游生物和動物性浮游生物群聚之非度量多維度分析(nMDS)---------- 3-98
圖 3-37　民國 85 年至 111 年在第三核能發電廠停機大修開始與出海採樣間隔日數和浮游生物總量變化趨勢圖---------- 3-99

圖 4-1　68 年至 82 年底棲動物調查之測站---------- 4-41
圖 4-2　68-80 年第三核能發電廠附近海域藻類及底棲動物之消長情形---------- 4-42
圖 4-3　各類底棲動物之幼生型態---------- 4-43
圖 4-4　底棲動物調查之測站---------- 4-44
圖 4-5　軸孔珊瑚在入水口右側 (Influ-2) 與出水口南堤外側小灣水深 8 公尺(Efflu) 之成長情形---------- 4-45
圖 4-6　97 年至 111 年各次 (季) 入水口珊瑚平均日成長率與颱風相關資料之迴歸相關圖---------- 4-46
圖 4-7　珊瑚在 89-111 年各次 (季) 各測站附著板之著生情形---------- 4-47
圖 4-8　軟體動物在 89-111 年各次 (季) 各測站附著板之著生情形---------- 4-48
圖 4-9　多毛類在 89-111 年各次 (季) 各測站附著板之著生情形---------- 4-49
圖 4-10　苔蘚蟲在 89-111 年各次 (季) 各測站附著板之著生情形---------- 4-50
圖 4-11　海鞘在 89-111 年各次 (季) 各測站附著板之著生情形---------- 4-51
圖 4-12　藤壺在 89-111 年各次 (季) 各測站附著板之著生情形---------- 4-52
圖 4-13　珊瑚在 88-111 年間各測站附著板之著生情形---------- 4-53
圖 4-14　軟體動物在 88-111 年間各測站附著板之著生情形---------- 4-54
圖 4-15　多毛類在 88-111 年間各測站附著板之著生情形---------- 4-55
圖 4-16　苔蘚蟲在 88-111 年間各測站附著板之著生情形---------- 4-56
圖 4-17　海鞘在 88-111 年間各測站附著板之著生情形---------- 4-57
圖 4-18　藤壺在 88-111 年間各測站附著板之著生情形---------- 4-58
圖 4-19　90-111 年間第 1 次（冬）各測站 6 大類底棲動物著生量群聚分析---------- 4-59
圖 4-20　90-111 年間第 2 次（春）各測站 6 大類底棲動物著生量群聚分析---------- 4-60
圖 4-21　90-111 年第 3 次（夏）各測站 6 大類底棲動物著生量群聚分析---------- 4-61
圖 4-22　90-111 年第 4 次（秋）各測站 6 大類底棲動物著生量群聚分析---------- 4-62
圖 4-23　珊瑚 87-111 年各測站著生量之相似度群聚分析---------- 4-63
圖 4-24　軟體動物 87-111 年各測站著生量之相似度群聚分析---------- 4-64
圖 4-25　多毛蟲 87-111 年各測站著生量之相似度群聚分析---------- 4-65
圖 4-26　苔蘚蟲 87-111 年各測站著生量之相似度群聚分析---------- 4-66

圖 4-27 海鞘 87-111 年各測站著生量之相似度群聚分析---------- 4-67
圖 4-28 藤壺 87-111 年各測站著生量之相似度群聚分析---------- 4-68
圖 4-29 出水口南側小灣測站之多毛蟲著生量在停機及非停機時期的比較---------- 4-69
圖 4-30 固定橫截線調查入水口及出水口南側各測線底棲生物之群聚分析---------- 4-70
圖 4-31 固定橫截線調查入水口各測線底棲生物覆蓋率---------- 4-71
圖 4-32 固定橫截線調查出水口南側各測線底棲生物覆蓋率---------- 4-72
圖 4-33 固定橫截線調查入水口及出水口南側各測線白化珊瑚覆蓋率之主成份分析---------- 4-73
圖 4-34 各季固定橫截線調查入水口及出水口南側各測線白化珊瑚平均之物種數隨時間變化圖---------- 4-74
圖 4-35 歷年 4 次 (季) 入、出水口各測站的沉積物沉積量---------- 4-75
圖 4-36 各次 (季) 颱風之累計警報天數及雨量與入、出水口的沉積物沉積量之迴歸相關圖---------- 4-76
圖 4-37 入水口各測站之日沉積量與各類底棲動物著生量之迴歸相關圖---------- 4-77
圖 4-38 入水口內二測站在停機清除附著生物時期及正常運作時期，及在颱風季與非颱風季之沉積量比較---------- 4-78
圖 4-39 109-111 年出水口南側及入水口各測站之水溫變化圖---------- 4-79
圖 4-40 94-111 年出水口南側及入水口各測站之各月水溫、Nino3.4、Nino4 及 PDO index 變化圖---------- 4-80
圖 4-41 出水口南側水深 8 公尺處 (Efflu) 與水深 3 公尺處 (Efflu-3) 的珊瑚著生量比較---------- 4-81
圖 4-42 出水口南側水深 8 公尺處 (Efflu) 與水深 3 公尺處 (Efflu-3) 的軟體動物著生量比較---------- 4-81
圖 4-43 出水口南側水深 8 公尺處 (Efflu) 與水深 3 公尺處 (Efflu-3) 的多毛蟲著生量比較---------- 4-82
圖 4-44 出水口南側水深 8 公尺處 (Efflu) 與水深 3 公尺處 (Efflu-3) 的苔蘚蟲著生量比較---------- 4-82
圖 4-45 出水口南側水深 8 公尺處 (Efflu) 與水深 3 公尺處 (Efflu-3) 的海鞘著生量比較---------- 4-83
圖 4-46 出水口南側水深 8 公尺處 (Efflu) 與水深 3 公尺處 (Efflu-3) 的藤壺著生量比較---------- 4-83
圖 5-1 82 年度第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚類相觀測地點---------- 5-100
圖 5-2 83 及 84 年度第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚類相觀測地點---------- 5-101

圖 5-3　85 年至 111 年第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚類相觀測地點---------- 5-102
圖 5-4　第三核能發電廠附近海域民國 110 年 4 次調查珊瑚礁魚類相組成百分比-- 5-103
圖 5-5　第三核能發電廠附近海域民國 110 年 4 次調查魚類相頻度圖---------- 5-104
圖 5-6　第三核能發電廠附近海域民國 110 年 4 次調查各測站珊瑚礁魚類相組成百分比---------- 5-105
圖 5-7　第三核能發電廠附近海域民國 110 年 4 次調查各測站珊瑚礁魚類相頻度圖---------- 5-106
圖 5-8　第三核能發電廠附近海域民國 111 年 4 次調查珊瑚礁魚類相組成百分比-- 5-107
圖 5-9　第三核能發電廠附近海域民國 111 年 4 次調查魚類相頻度圖---------- 5-108
圖 5-10　第三核能發電廠附近海域民國 111 年 4 次調查各測站珊瑚礁魚類相組成百分比---------- 5-109
圖 5-11　第三核能發電廠附近海域民國 111 年 4 次調查各測站珊瑚礁魚類相頻度圖---------- 5-110
圖 5-12　第三核能發電廠附近海域民國 89 年至 111 年調查各測站珊瑚礁魚尾數變動情形---------- 5-111
圖 5-13　第三核能發電廠附近海域民國 89 年至 111 年調查珊瑚礁魚類種類數的變動情形---------- 5-112
圖 5-14　第三核能發電廠附近海域歷年各季刺尾鯛科、蝴蝶魚科、隆頭魚科及雀鯛科珊瑚礁魚類相累積組成百分比---------- 5-113
圖 5-15　第三核能發電廠附近海域歷年各季珊瑚礁魚類刺尾鯛科、蝴蝶魚科、隆頭魚科及雀鯛科之魚種數變動情形---------- 5-114
圖 5-16　第三核能發電廠附近海域歷年各測站刺尾鯛科、蝴蝶魚科、隆頭魚科及雀鯛科珊瑚礁魚類相組成百分比---------- 5-115
圖 5-17　民國 89-111 年 5 個測站珊瑚礁魚類群聚之二度空間排序---------- 5-116
圖 5-18　珊瑚礁魚類在 5 個測站中出現情形---------- 5-117
圖 5-19　珊瑚礁魚類與後壁湖販售魚類年間相似度---------- 5-118
圖 5-20　後壁湖魚市場販售魚種數年度變動情形---------- 5-118
圖 5-21　後壁湖魚市場販售魚種數之季節變動情形---------- 5-119
圖 6-2-1　103年8月珠江口至台灣海峽(a)衛星葉綠素甲與(b)透明度之圖像---------- 6-34
圖 6-2-2　75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域鹽度距平值 (當月測值-歷年月平均值) 之a) 逐年變化圖以及b) 不同季節與PDO之相關性---------- 6-35

圖 6-2-3　本海域於PDO冷、暖相時之溫鹽變化圖---------- 6-36
圖 6-2-4　本海域表水pH逐年變化圖與PDO 指數之相關性---------- 6-37
圖 6-2-5　本海域a)硝酸鹽逐年變化圖以及b)硝酸鹽距平值與PDO之變化圖---------- 6-38
圖 6-2-6　本海域a)硝酸鹽以及b)硝酸鹽距平值與PDO 指數之相關性---------- 6-39
圖 6-2-7　核三廠82年後電廠正常運轉 (紅) 與大修時 (藍色) 表水溫度之距平值圖--- 6-40
圖 6-2-8　南灣海域水溫下降與強降雨，颱風，渦漩之關係---------- 6-41
圖 6-2-9　營養鹽 (實線) 與表層植浮 (虛線) 隨著時間之變化圖---------- 6-42
圖 6-2-10 表層植浮與營養鹽之相關圖---------- 6-43
圖 6-2-11 束毛藻四季數量之變化---------- 6-44
圖 6-2-12 珊瑚生長於入、出水口與硝酸鹽濃度之比較---------- 6-45
圖 6-3-1　民國 85 年 7 月至 111 年 11 月第三核能發電廠附近海域監測和對照測站植物性浮游生物(>55μm)各大類之密度---------- 6-46
圖 6-3-2　民國 85 年 7 月至 111 年 11 月第三核能發電廠附近海域監測和對照測站動物性浮游生物各大類之豐度---------- 6-47
圖 6-3-3　民國 85 年 7 月至 111 年 11 月第三核能發電廠附近海域監測和對照測站蝦蟹幼生之豐度---------- 6-48
圖 6-3-4　民國 85 年 7 月至 111 年 11 月第三核能發電廠附近海域監測和對照測站魚卵及仔魚之豐度---------- 6-49
圖 6-3-5　民國 85 年 7 月至 111 年 11 月第三核能發電廠附近海域束毛藻百分比之變化---------- 6-50
圖 6-4-1　Station 20 (SNS：石牛溪)
A.水溫變化與多毛類幼生在附著板著生情形之迴歸關係(N=78; p>0.05)；
B.多毛類在水表層之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係 (N=708p>0.05);
C.多毛類在水層中之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係 (N=78; p>0.05)---------- 6-51
圖 6-4-2　Station 20 (SNS：石牛溪)
A.水溫變化與藤壺幼生在附著板著生情形之迴歸關係(N=78; p>0.05) ；
B.藤壺在水表層之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係 (N=78; p<0.05)；
C.藤壺在水層中之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係 (N=78; p>0.05)---------- 6-52

圖 6-4-3 Station 20 (SNS：石牛溪)
A.水溫變化與軟體動物幼生在附著板著生情形之迴歸關係(N=78; p>0.05)；
B.軟體動物在水表層之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係 (N=78; p>0.05)；
C.軟體動物在水層中之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係 (N=78; p>0.05)---------- 6-53
圖 6-4-4 Station 22 (Influ-10：入水口南堤外側)
A.水溫變化與多毛類幼生在附著板著生情形之迴歸關係(N=83; p>0.05)；
B.多毛類在水表層之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係 (N=85; p>0.05)；
C.多毛類在水層中之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係 (N=85; p>0.05) ---------- 6-54
圖 6-4-5 Station 22 (Influ-10：入水口南堤外側)
A.水溫變化與藤壺幼生在附著板著生情形之迴歸關係(N=83; p>0.05)；
B.藤壺在水表層之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係 (N=85; p>0.05)；
C.藤壺在水層中之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係 (N=85; p>0.05)---------- 6-55
圖 6-4-6 Station 22 (Influ-10：入水口南堤外側)
A.水溫變化與軟體動物幼生在附著板著生情形之迴歸關係 (N=83; p>0.05)；
B.軟體動物在水表層之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係 (N=85; p>0.05)；
C.軟體動物在水層中之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係 (N=85; p>0.05)---------- 6-56
圖 6-4-7 Station 24 (Efflu：出水口南堤外側小灣水深 8 公尺)
A.水溫變化與多毛類幼生在附著板著生情形之迴歸關係(N=88; p>0.05)；
B.多毛類在水表層之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係 (N=90; p>0.05)；
C.多毛類在水層中之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係 (N=90; p>0.05)---------- 6-57
圖 6-4-8 Station 24 (Efflu：出水口南堤外側小灣水深 8 公尺)
A.水溫變化與藤壺幼生在附著板著生情形之迴歸關係(N=88; p>0.05)；
B.藤壺在水表層之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係 (N=90; p>0.05)；
C.藤壺在水層中之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係 (N=90; p<0.05) ---------- 6-58
圖 6-4-9 Station 24 (Efflu：出水口南堤外側小灣水深 8 公尺)
A.水溫變化與軟體動物幼生在附著板著生情形之迴歸關係 (N=88; p>0.05)；
B.軟體動物在水表層之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係 (N=90; p>0.05)；
C.軟體動物在水層中之浮游幼生豐度與其在附著板著生之迴歸關係 (N=90; p>0.05)---------- 6-59

圖 6-4-10 Station 22 (Influ：入水口灣內固定橫截線)
A.水深0 m 之PO_4與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; p<0.05)；
B.水深3m 之PO_4與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=209; p<0.05)；
C.水深10 m 之PO_4與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=209; p>0.05)---------- 6-60
圖 6-4-11 Station 22 (Influ：入水口灣內固定橫截線)
A.水深0 m之SiO_2與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; p>0.05)；
B.水深3m 之SiO_2與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=209; p>0.05)；
C.水深10 m之SiO_2與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=209; p>0.05)---------- 6-61
圖 6-4-12 Station 22 (Influ：入水口灣內固定橫截線)
A.水深0 m 之NO_3與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; p>0.05)；
B.水深3m 之NO_3與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=209; p>0.05)；
C.水深10 m 之NO_3與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=209; p>0.05)---------- 6-62
圖 6-4-13 Station 24 (Efflu：出水口南側小灣固定橫截線)
A. 水深0 m 之PO_4與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; p>0.05)；
B. 水深3 m 之PO_4與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; p>0.05)；
C.水深10 m 之PO_4與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; p<0.05)---------- 6-63
圖 6-4-14 Station 24 (Efflu：出水口南側小灣固定橫截線)
A.水深0 m 之SiO_2與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; p>0.05)；
B.水深3m 之SiO_2與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=207; p<0.05)；
C.水深10 m 之SiO_2與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; p>0.05)---------- 6-64
圖 6-4-15 Station 24(Efflu：出水口南側小灣固定橫截線)
A.水深0 m 之NO_3與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; p>0.05)；
B.水深3m 之NO_3與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; p>0.05)；
C.水深10 m 之NO_3與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; p>0.05)---------- 6-65
圖 6-4-16 110、111年各測站水溫與子計畫一海潮流測站N3C1的水溫變化。
A.110年；B.111年---------- 6-66
圖 6-4-17 潭美颱風影響期及102年8月25日樽海鞘大量出現期的水溫變化圖---------- 6-67
圖 6-4-18 103年5月22日樽海鞘大量出現前後期的水溫變化圖---------- 6-68
圖 6-5-1 機組歲修保養期間及運轉期間測站3~測站5(影響域)珊瑚礁魚種數變動---- 6-69
圖 6-5-2 機組歲修保養期間及運轉期間測站3~測站5(影響域)珊瑚礁魚尾種數變動- 6-70
圖 6-5-3 民國89-109年機組歲修保養期間及運轉期間測站3~測站5(影響域)珊瑚礁魚類群聚組成---------- 6-71
圖 6-5-4 太平洋十年振盪指數 (PDO) 與海洋聖嬰指數 (ONI) 對計畫區附近海域珊瑚礁魚種數距平值---------- 6-72
圖 6-5-5 颱風期過後第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚種數變動---------- 6-73
圖 6-5-6 第三核能發電廠附近海域生態系之概念模式---------- 6-74
圖 6-5-7 第三核能發電廠附近海域表層生態系之實證模式---------- 6-75

圖 6-5-8　第三核能發電廠附近海域生態系之實證模式---------- 6-76
圖 6-5-9　第三核能發電廠附近海域硝酸鹽與珊瑚礁魚種數的相關性---------- 6-77
圖 6-6-1　本計畫之網頁首頁---------- 6-78
圖 6-6-2　研究人員專區首頁-水文資料歷年時間序列圖---------- 6-78
圖 6-6-3　研究人員專區首頁-動物性浮游生物資料歷年時間序列圖---------- 6-79
圖 6-6-4　同一採樣季節資料展示頁面示意圖---------- 6-80
圖 6-6-5　水文資料線上繪圖之時間序列圖操作介面---------- 6-80
圖 6-6-6　水文資料線上繪圖之時間序列圖進階操作介面---------- 6-81
圖 6-6-7　查詢參數及其相互比較時間序列圖---------- 6-80
圖 6-6-8　散射圖之搜尋介面---------- 6-82
圖 6-6-9　st14之0m 溫度與st14之0m 鹽度之散射圖---------- 6-82
圖 6-6-10　水平面溫度分佈圖搜尋頁面---------- 6-83
圖 6-6-11　水平面溫度分佈圖---------- 6-83
圖 6-6-12　水文資料查詢列表---------- 6-84
圖 6-6-13　水文資料統計圖表---------- 6-84
圖 6-6-14　浮游生物資料查詢頁面---------- 6-84
圖 6-6-15　底棲動物資料查詢頁面---------- 6-85
圖 6-6-16　底棲生物各測站時間序列圖頁面一---------- 6-85
圖 6-6-17　底棲生物各測站時間序列圖頁面二---------- 6-85
圖 6-6-18　底棲動物各參數繪圖頁面---------- 6-86
圖 6-6-19　海流資料之搜尋介面---------- 6-87
圖 6-6-20　海流資料之時間序列圖。由上至下分別為流矢圖、溫度圖、東西向流速圖、南北向流速圖---------- 6-88
圖 6-6-21　流場統計圖之搜尋介面---------- 6-89
圖 6-6-22　流速發生機率分佈圖---------- 6-89
圖 6-6-23　流向發生機率分佈圖---------- 6-90

圖 6-6-24 玫瑰圖---------- 6-90
圖 6-6-25 海流漸進線圖---------- 6-91
圖 6-6-26 流年歷年季節統計圖之搜尋介面---------- 6-91
圖 6-6-27 流速發生機率分佈圖---------- 6-92
圖 6-6-28 流向發生機率分佈圖---------- 6-92
圖 6-6-29 玫瑰圖---------- 6-93
圖 6-6-30 浮標漂流軌跡查詢繪圖介面---------- 6-93
圖 6-6-31 2020年浮標漂流軌跡繪圖結果---------- 6-93
圖 6-6-32 海流資料查詢頁面---------- 6-94
圖 6-6-33 CTD水平分佈圖選擇介面---------- 6-94
圖 6-6-34 CTD水平分佈圖---------- 6-95
圖 6-6-35 CTD資訊與Google Map整合介面---------- 6-95
圖 6-6-36 C09測站，110年溫度剖面圖---------- 6-96
圖 6-6-37 珊瑚礁魚類各測站歷年魚種數---------- 6-97
圖 6-6-38 珊瑚礁魚類各測站歷年魚尾數---------- 6-98
圖 6-6-39 海表面溫度資料快速搜尋介面---------- 6-99
圖 6-6-40 海表面溫度資料之大圖---------- 6-99
圖 6-6-41 海面溫度分佈查詢頁面---------- 6-99
圖 6-6-42 海表面溫度資料---------- 6-100
圖 6-6-43 SST資料下載搜尋頁面---------- 6-100
圖 6-6-44 SST資料之逗點分隔檔案頁面---------- 6-101
圖 6-6-45 衛星雲圖查詢介面---------- 6-102
圖 6-6-46 放大之衛星雲圖---------- 6-102
圖 6-6-47 氣象局鵝鑾鼻資料浮標測站之海象資料查詢介面---------- 6-103
圖 6-6-48 CODAR海流資料展示頁面---------- 6-103
圖 6-6-49 AVISO海面高度與地轉流查詢介面---------- 6-104

圖 6-6-50 AVISO海面高度與地轉流分布圖---------- 6-104
圖 6-6-51 AVISO海面高度與地轉流分布查詢介面---------- 6-105
圖 6-6-52 AVISO海面高度與地轉流分布圖---------- 6-105
圖 6-6-53 AVISO海面高度與地轉流原始資料查詢下載介面---------- 6-105
圖 6-6-54 AVISO海面高度與地轉流原始資料---------- 6-106
圖 6-6-55 MODIS水色衛星資料查詢介面---------- 6-107
圖 6-6-56 MODIS海洋葉綠素衛星資料查詢介面---------- 6-107

第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查

甲、工作背景

壹. 緣起

第三核能發電廠有兩部發電機組，分別於 73 年 7 月與 74 年 5 月商轉發電。為瞭解電廠運轉後，對該地區附近海域生態及海洋資源的影響程度，行政院原子能委員會與台電公司於 68 年 7 月開始委託中央研究院國際環境科學委員會中國委員會（環科會）進行長期調查與研究工作。目的在於瞭解第三核能發電廠附近海域，及核能發電廠運轉前與開始運轉後之生態系的平衡狀況：包括非生物環境因子（如海水之溫度、餘氯等物理與化學性質，以及海洋生物含放射性物質之調查），生物環境因子（如基礎生產力，浮游植物與浮游動物、海藻、無脊椎動物及魚類之種間關係），海潮流調查，漁場經濟效益調查、統計及評估，以及利用珊瑚骨骼同位素回推水溫等，以求取得核能發電廠對該海域影響的基礎資料。

貳. 辦理內容及方式

1. 68~82 年委託中央研究院國際環境科學委員會中國委員會進行長期調查與研究工作，經費則由台電經原能會撥付。
2. 82 年起轉委託國立中山大學執行。
3. 85 年起則改由台電公司接續委託國立中山大學執行。
4. 本計畫就每一單項子計畫，分別邀請國內學者專家主持，其項目包括海潮流、水文與水質化學、動物及植物性浮游生物、底棲動物、魚類、漁業經濟、放射性物質調查及綜合討論。
5. 87~89 年調查目有些微變動如下：
   (1) 珊瑚同位素部份已於 87 年 6 月完成，自該年 7 月起改為南灣海域增溫調查。
   (2) 89 年本計畫已提出各項證據，顯示第三核能發電廠附近海域並未因第三核能發電廠運轉而增溫，因此該年 7 月起增溫調查亦不再進行，而併入水文與水質化學中。
6. 在臺灣陸地有限，人口密集的情形下，行政院原子能委員會經過數年的調查研究，慎重地選擇人口稀少，地質結構良好，且具有天然屏障的離島蘭嶼設立低放射性待處理物料貯存場。這些放射性待處理物料在搬運與貯存期間，對附近海域環境與生態的平衡，生物群聚的消長關係，以及因這些生物群聚可能累積放射性

物質，而對該地區環境造成何種影響，必須加以調查、研究、瞭解。行政院原子能委員會放射性待處理物料管理處（85 年改制為放射性物料管理局）有鑑於此，於 73 年 7 月開始，委託環科會進行長期調查研究。研究項目包括水文與水質化學，沈積物化學，植物性與動物性浮游生物，潮間帶底棲生物以及海水與生物體含放射性物質等。


7. 82 年 7 月開始，改委國立中山大學進行調查，並刪除大部份項目，僅留水文與水質化學及放射性物質兩大部份，但自 102 年起停止執行「放射性物質調查」。
8. 100 年起魚類調查與漁業經濟效益調查已合併為魚類與漁業經濟調查，並於 102 年起改為魚類調查。

參. 成效

1. 此調查的結果可以作為核三廠附近海域生態環境影響評估之追蹤；多年來之調查結果，均符合環保法規之要求。
2. 由於核能發電可能產生的環境風險問題，向來受到社會極大的關切，包括溫排水、廢料處理、珊瑚白化與放射性核種外洩等問題。為了消除民眾疑慮，台電公司得隨時掌握核能電廠周遭的生態環境，藉由學者專家的研究整理分析，定期將結果於台電公司網站向大眾公佈 (http://www.taipower.com.tw/)，有助於減低大眾的疑慮。
3. 迄今已完成 30 餘年的研究報告，此一資料庫陸陸續續的記錄了過去 30 餘年來的浮游生物、底棲動物、魚類、水文水質與漁業環境變遷。過去 30 餘年，南部海域除了曾於 90 年發生過阿瑪斯號漏油事件之外，並無其他的重大生態事件，或其他重要的污染源出現。因此，南灣海域的整個生態系統，應該是處在大環境之變動（例如：颱風、聖嬰、反聖嬰、太平洋十年震盪等）及一般性的人為干擾情形下(例如：沿岸排污及漁業、遊憩行為)。
4. 將研究成果在每年期中、期末報告說明會時邀請行政院原子能委員會、行政院環境保護署等有關單位參與討論、釋疑，以達到雙向溝通及降低當地漁民對核三廠運轉後之疑慮，並協助及指導漁民解決有關之捕撈、養殖問題，已深獲當地區漁會及漁民之肯定。
5. 近年來不斷加強各子計畫間關聯性之探討，已知南灣之湧升不但帶來營養鹽，增進浮游植物生長，而且湧升之冷水，有助於降低南灣內之水溫，並有助於南灣內外海水之交換。
6. 協助本公司不定期的將研究成果用以答覆外界對核三廠生態調查的相關諮詢。

各子計畫精簡研究結果

第三核能發電廠附近海域調查及採樣位置圖




子計畫 1—海潮流	詹　森教授國立臺灣大學海洋研究所
子計畫 2—水文水質	陳鎮東教授國立中山大學海洋科學系
子計畫 3— 植物性及動物性 浮游生物調查	陳孟仙教授國立中山大學海洋科學系
子計畫 4— 底棲動物調查	劉莉蓮教授國立中山大學海洋科學系
子計畫 5--魚類調查	黃榮富教授國立高雄科技大學水產養殖系
子計畫 6— 資料庫建置及維護	楊穎堅教授國立臺灣大學海洋研究所

各子計畫精簡研究結果


子計畫 1--海潮流

一、自民國 92 年 1 月 1 日起，由詹森執行。

民國 92 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日精簡研究結果如下：





－漂流浮標資料顯示民國 92～109 年漲潮流從出水口流向西南或往正南流，大約與貓鼻頭沿岸地形相平行，繞過貓鼻頭，往西再沿海岸往西北走，或繞過貓鼻頭後，繼續偏南或西南走，若能進入第三核能發電廠附近海域外緣海域，則順退潮水轉往東流動。漲潮流時釋放，浮標若隨漲潮流漂向南或東南，則將轉往南-東南向流動，若於灣內，則流速不大，若離海岸影響範圍則流速增大可達 2 節 (1 m/s) 以上。漲潮時，溫度迅速下降，此一特性顯示溫排水對於海灣內的影響不大。



－漂流浮標退潮時往東流或東北流再回流至出水口岸邊或到達後壁湖港口東方，過後壁湖港口東方之後則沿著港口附近的潮間帶地形再轉往西北方流動，最後會到達後壁湖漁港東北方淺灘區；退潮時段往東流或往東北流後若再轉往東南方流動，則有往鵝鑾鼻直流之趨勢；退潮時段若往西南或東南方向流後則有轉往南方流動之趨勢。

－核三廠海域溫排水擴散區域大部份限於排水口附近海域西側，隨潮汐漲潮時往西南約 500～1000 m，退潮時往東-東南約 200～500 m，大部份分佈於海面至水深 3~5 m 以內，範圍約在距排水口 1000 m 圓弧線內。





各子計畫精簡研究結果

子計畫 1--海潮流

二、民國 110 年第 1 次 (季) 至 111 年第 4 次 (季) 期末報告精簡研究結果如下：


－民國 110 年 4 月 16 日中潮漲潮段，最大流速 0.46 m/s(對應流向為 138˚)，淨流流速 0.21 m/s(對應流向為 156˚)。浮標在出水口附近往南方漂移，離施放點 500 公尺後轉往南南東向，離施放點 1500 公尺後轉往東南向，流速略有增加，流速介於 0.30~0.46 m/s。溫排水影響範圍於漲潮時段於南側約為距排放口 500 m 之內。


－民國 111 年 11 月 12 日大潮漲潮段，最大流速 0.29 m/s (對應流向 142˚)、淨流流速 0.12 m/s (對應流向 47˚)。浮標在出水口附近往東南東方漂移，離出水口 300 公尺後續往東方流動，離出水口 650 公尺後續轉往東北向、流速介於 0.14 ~0.20 m/s，後轉往北北東偏北流動。溫排水影響範圍於東側約為距排放口 600 m 之內。


－核三廠海域溫排水擴散區域大部份於排水口附近海域西側，漲潮時往西南約 500～1000 m，退潮時往東-東南約 200～500 m，大部份分佈於海面至水深 5 m 內，距排水口 1000 m 圓弧線內。

－第三核能發電廠附近海域排水口外長期海流觀測結果顯示，海流主流向以西南向為主，110 年與 111 年共九次資料佔 25.3~35.9%，西南西或東北次之，約佔 15.0~20.0%。潮流仍為西南及東北方向流動的漲退潮流現象，漲潮流速明顯大於退潮流速，海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主。

－流經呂宋海峽之黑潮的強弱與北赤道洋流在菲賓律東部海岸的分支點位置關係密切，也跟海洋中尺度渦旋碰上黑潮有關。黑潮流速的強或弱影響黑潮水進南海的寡或多，進一步影響核三廠海域水團的特徵。







施測期間：110/02/20/08:00-04/15/08:00 H1D
最大流速：1.11m/s (對應流向225.3度)
主要流向：SW (佔33.7%)

各子計畫精簡研究結果


子計畫 2--水文水質

一、自民國 82 年 1 月 1 日起，由陳鎮東執行。


民國 82 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日精簡研究結果如下：

－本海域夏、秋季之溫度較春、冬季來得高，溫度變化大致呈此規律性；天候、季節性以及大尺度海洋事件如颱風、聖嬰、反聖嬰，以及太平洋十年期振盪為影響此區溫度變化的主要因子，而並非溫排水。溫排水只影響至 24 站表水，深度 5 公尺以下則沒有受到影響。

－由 75 年 7 月至 109 年 11 月本海域長達 34 年溫度距平值 (當月測值-歷年月平均值) 與 PDO 之變化可以看見，本海域的溫度距平值早期大都偏低，而於 87 年之後則大都偏高，似乎顯示了海洋暖化的現象；75~78 年的聖嬰/正 PDO (暖相) 對應的是低溫度距平值，而 99~103 年的反聖嬰/負 PDO (冷相) 則對應了高溫度距平值，然而並非所有的大尺度海洋溫度距平高低都對應著本海域的溫度變化 (下圖)。




－本海域 pH 值皆符合環保署所公佈的甲類海域的水體標準「甲類海域之水質標準，氫離子濃度指數應在 7.5~8.5 之間」。比較 88 年至今，pH 值隨著時間有漸漸變低的現象，似乎反應著全球海洋因二氧化碳含量增加而趨向酸化之現象，而與電廠之運轉無關。



－溶氧量以及總殘餘氧化劑濃度值均符合環保署「甲類海域之水質標準，溶氧量應在 5.0 mg/l 以上」以及「殘餘氯量 1 mg/l 以下」之規定。

－營養鹽資料顯示，此海域目前並沒有受到有機質的污染。而水體中營養鹽含量的變化似乎受控於植浮的利用或是釋出，兩者之間呈現負相關 (下圖)。




各子計畫精簡研究結果

子計畫 2--水文水質

二、民國 110 年第 1 次(季)至 111 年第 4 次(季)期末報告精簡研究結果如下：

－110、111 年第 1~4 次海水的溫、鹽值顯示屬於西菲律賓海水以及南海水的混合水，季節性變化不大。110 年第 1 次的海水表溫為歷年次低，然而第 4 次則為歷年次高。111 年的鹽度則都比歷年平均值低。




表水溫度 (扣除24站)	第1次 (2月)	第2次 (5月)	第3次 (8月)	第4次 (11月)
110年	23.1±0.6	27.9±0.3	29.3±0.5	27.3±0.3
111年	25.3±0.3	27.3±0.2	30.5±0.4	26.5±0.4
歷年平均	**24.3±1.1**	**27.6±1.0**	**29.1±0.8**	**26.0±1.1**

表水鹽度 (扣除24站)	第1次 (2月)	第2次 (5月)	第3次 (8月)	第4次 (11月)
110年	34.44±0.02	33.99±0.01	33.53±0.10	33.97±0.04
111年	34.43±0.08	33.95±0.01	33.52±0.04	33.80±0.04
歷年平均	**34.46±0.31**	**34.16±0.26**	**33.68±0.44**	**34.20±0.32**

－110 年 7/27~8/9 出水口 3 公尺深，水溫從 29°C 降至 21°C，降溫幅度大、延續時間長，歷年少見。此段時間恆春的降雨量高達 815mm，加上低壓渦漩的出現，可能是溫降的主要原因。

－本海域在 99~102 年 PDO 冷相頻頻觀察到低於歷史記錄的鹽度，而在本年度 (110、111 年) 也是觀察到較低鹽度的現象，也正逢歷時 2 年多的 PDO 冷相，顯示本海域的鹽度變化與 PDO 變化有明顯的正相關。



各子計畫精簡研究結果

子計畫 3--植物性及動物性浮游生物調查

一、自民國 85 年 7 月 1 日起，由陳孟仙執行。

民國 82 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日精簡研究結果如下：

一歷年來溫排水對南灣海域之浮游生物的豐(密)度並無明顯的影響。植物性浮游生物的密度在近岸監測(含入出水口附近海域)和離岸對照測站間並無明顯差異；動物性浮游生物的豐度則多以監測測站高於對照測站。本海域浮游生物的變動，除自然的四季更迭外，亦與大尺度的氣候變遷有關，近七年浮游生物的季節豐度的上下波動明顯較調查前期(85 年-98 年)為大(圖 1-(A&B))。




圖 1. 歷年第三核能發電廠附近海域監測和對照測站的(A)植物性浮游生物密度(B)動物性浮游生物豐度

圖 2. 歷年第 2 和 4 次水平採樣在第三核能發電廠停機和運轉下，(A)植物性浮游生物(B)動物性浮游生物總平均豐/密度和標準差 SD

一電廠停機大修及運轉時浮游生物豐(密)度差異，於歷年第 2 和第 4 次的樣品中，除植物性浮游生物總平均密度在第 4 次(10~12 月)採樣，於 24 測站測得停機大修時(1.9±1.8 cells/ml)明顯高於運轉時(0.5±0.4 cells/ml)的情形，其餘皆無顯著差異(圖 2)。

各子計畫精簡研究結果

子計畫 3--植物性及動物性浮游生物調查

二、民國 110 年第 1 次 (季) 至 111 年第 4 次 (季) 期末報告精簡研究結果如下：

－110-111 年八次(季)的調查結果顯示，沉澱法和濃縮法分析之密度趨勢相似，因 110 和 111 年為反聖嬰期，浮游生物豐/密度測值皆較歷年同次的平均值為低或相近，僅植物性浮游生物沉澱法 110 年第 4 次採樣和 111 年第 2 次、濃縮法 111 年第 2 次，以及動物性浮游生物豐度在 110 年第 1、3 次和 111 年第 4 次較歷年同次平均值略高。

表 1. 歷年第三核能發電廠附近海域一年四次(季)浮游生物在 8 測站採樣所得之季次總平均值(粗體數據為大於歷年同次平均值)

年份	植物性浮游生物 (cells/l)								動物性浮游生物(ind./m^3)			
	沈澱法				濃縮法							
季次	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
85							**9,874**	291			**952**	**1,395**
86					**539**	**1,077**	646	**1,447**	**1,489**	643	738	505
87					251	711	**5,393**	**5,880**	767	**1,142**	730	368
88					**1,820**	**1,120**	1,222	236	**914**	363	230	298
89					123	**4,101**	624	**3,213**	**1,063**	**2,161**	311	460
90					339	61	1,061	84	260	182	806	176
91					25	168	168	670	273	760	352	311
92					**466**	**1,090**	896	604	**1,120**	299	343	346
93					69	730	1,941	**2,245**	427	450	492	**833**
94					358	337	456	248	714	248	826	481
95					198	377	186	348	663	510	**1,317**	600
96	10	23	213	264	34	301	314	**1,870**	888	935	383	523
97	**269**	40	524	80	**1,028**	223	1,051	814	**1,143**	869	**975**	**665**
98	30	194	65	165	151	290	170	713	289	**1,201**	**2,487**	616
99	115	28	84	34	253	219	194	166	**1,771**	**1,374**	**1,022**	**1,024**
100	20	23	48	86	106	249	183	83	**2,372**	**1,444**	**1,634**	584
101	81	397	166	187	73	334	815	667	**1,044**	**2,473**	**1,141**	**1,116**
102	**253**	**1,089**	3,201	**2,945**	206	**1,036**	1,926	**3,136**	855	**2,137**	**1,145**	**1,246**
103	**674**	**1,048**	**78,925**	285	**1,176**	**1,341**	**77,163**	316	594	1,039	**1,270**	616
104	178	268	366	**699**	161	443	368	**6,636**	603	**1,118**	**2,146**	601
105	131	**2,288**	161	80	235	**2,299**	244	377	584	952	659	442
106	110	**2,463**	4,970	306	252	**4,930**	**9,062**	398	492	**2,610**	770	**931**
107	**775**	**90**	2,258	85	**791**	435	**22,611**	189	**1,131**	**2,436**	**1,114**	606
108	144	509	23	170	**501**	**2,495**	81	534	**1,273**	420	**956**	**671**
109	30	382	1,026	96	63	**1,232**	2,148	152	522	**1,209**	593	289
110	49	39	83	**581**	123	107	130	1,035	**1,003**	692	**1,041**	403
111	21	**678**	685	140	67	**1,250**	1,403	427	359	640	238	**688**
Mean	181	597	5,800	388	362	1,037	5,197	1,214	870	1,089	914	622
S.D	227	775	19,550	707	420	1,207	15,147	1,692	490	726	542	300


各子計畫精簡之研究結果

子計畫 4--底棲動物調查


一、 自民國 82 年 1 月 1 日起，由劉莉蓮教授執行。

民國 82 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日精簡研究結果如下：

一底棲生物資料顯示入水口底棲生物相之結構與出水口不同（圖一、二），如入水口主要底棲生物為藻類、石珊瑚及海葵；出水口為藻類、石珊瑚及軟珊瑚。105-106 及 109 年珊瑚大量白化，此與大環境赤道太平洋區海面溫度指數 Niño3.4、Niño4 index 及北太平洋年際震蕩指數（PDO）有相關，尤其是與當季之 PDO 及後二季之 Niño4 index 相關性最高，這些指數與珊瑚、海葵及軟體動物的覆蓋率為負相關；與多毛蟲的覆蓋率及珊瑚的白化率為正相關；以上結果顯示南灣底棲生物群聚的變化非小區域溫排水影響所致，而是與大環境氣候變遷有關；美國國家海洋及大氣總署（NOAA）也指出全球平均氣溫比 20 世紀(89 年前)高出 0.89℃，呈現大環境暖化的現象。




圖一、固定橫截線調查入水口及出水口南側各測線底棲生物之群聚分析。



圖二、固定橫截線調查 109 年第 3 次底棲生物照片。A、入水口; B、出水口。

一出水口南側區域沉積物沉積量高於入水口區域（圖三），這種差異在颱風期間更明顯，此結果顯示出水口南側區域比入水口區域更容易累積沉積物，這可能是因為入水口較封閉，海浪不易影響入水口灣內，故沉積量少。




圖三、歷年入、出水口颱風季(夏秋)及非颱風季(冬春)沉積物的平均沉積量。**:入水口與出水口有顯著差異(T-test, p<0.01)。

各子計畫精簡之研究結果

子計畫 4--底棲動物調查


二、民國 110 年第 1 次 (季) 至 111 年第 4 次 (季) 期末報告精簡研究結果如下：

一底棲生物相資料顯示 8 次調查皆有珊瑚白化現象，趨勢為入水口白化率較出水口高，因入水口多為對溫度變化較敏感的枝狀珊瑚種類，如軸孔珊瑚，故其白化程度較出水口的團塊狀珊瑚高。110-111 年白化率較 109 年為低，分別為 0 - 41.2% (111 年)、0 - 19% (110 年)及 9 - 80% (109 年)(圖四)，110 年第 4 季及 111 年第 3 季白化率增加與高溫有關，如 MPT 測站水溫在 110 年出水口 9 公尺深之日最高溫高於南灣珊瑚白化溫度閥值（29.5°C）有 53 天，111 年第 3 季有 33 天，且 109 年第 3 季之海水溫度較 110 年及 111 年為高。海葵覆蓋率在 110 年第 2 至 4 季增加，111 年減少，相關分析顯示與大環境海面溫度指數呈負相關，及海水的磷酸鹽濃度呈正相關。



圖四、固定橫截線調查入、出水口底棲生物之平均覆蓋率。

一110 - 111 年 8 次出水口（Efflu）的軸孔珊瑚生長量與入水口（Influ-2）無差異（圖五），但死亡率較入水口高，長期趨勢為入水口珊瑚的成長較出水口佳。




圖五、軸孔珊瑚在入水口右側(Influ-2)與出水口南堤外 (Efflu)之成長情形。
*: $p<0.05$，代表入水口與出水口南側珊瑚成長有顯著差異; Lost: 流失；new exp.:重置珊瑚

各子計畫精簡研究結果

子計畫 5--魚類調查


一、自民國 85 年 7 月 1 日起，由黃榮富教授執行。


民國 89 年 7 月 1 日至 109 年 12 月 31 日精簡研究結果如下：



－比較歷年機組歲修保養期間及運轉期間影響域測站珊瑚礁魚類群聚組成，資料顯示影響域測站 5(測站 3~測站)歲修保養期間及運轉期間珊瑚礁魚類群聚組成有重疊現象，由於溫排水的影響在表層水域，而珊瑚礁魚類主要活動區域在礁石間，因此溫排水對珊瑚礁魚類群聚組成影響不顯著。


－本研究利用結構方程式建構第三核能發電廠附近海域生態變動模式，發現調查區附近海域的營養鹽多寡及基礎生產力的高低與魚種數呈現顯著線性關係，與水溫度相關的湧升流現象與魚種數變動未達顯著水準(p>0.05)。






－太平洋十年振盪指數(PDO)及海洋聖嬰指數(ONI)與當季珊瑚礁魚種數變動趨勢並不一致。應與調查海域以珊瑚礁魚類為主，魚類群聚主要受到礁石環境影響，大環境變動可能影響少部份魚類。

－颱風入侵後，記錄到的魚種數有短暫下降的現象。






各子計畫精簡研究結果


子計畫 5—魚類調查

二、民國 110 年第 1 次 (季) 至 111 年第 4 次 (季) 期末報告精簡研究結果如下：




珊瑚礁魚類相調查

－110 年第 1 次~111 年第 4 次調查珊瑚礁魚類集群分析結果和歷年調查相仿，未發現溫排水影響域和非影響域有明顯的區隔。調查結果顯示珊瑚礁魚類的分佈受到水深、地貌及漁業行為的影響，呈現測站間群聚組成的差異。




－後壁湖海洋資源保護示範區屬於「多樣性熱點」保護區，成立後本海域珊瑚礁魚類來游率有增加的趨勢。



後壁湖販售魚類相調查

－歷年珊瑚礁魚類與後壁湖販售魚類年間相似度值介於 5~17%，未發現逐年增加，係因灣內海域非主要經濟性作業漁場。



各子計畫精簡研究結果

子計畫 6--資料庫建置及維護


一、自民國 102 年 1 月 1 日起，由楊穎堅執行。

民國 102 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日精簡研究結果如下：


一為求有效將各子計畫的成果與其他子計畫的研究人員分享，以期展現更完整的成果，本子計畫由楊穎堅教授實際執行作業平台之運作，設置一個網站(https://npp3.nsysu.edu.tw/，首頁請見右圖)，將歷年的調查與研究成果公佈網路，提供參與研究人員、業主參考及查詢，並將各子計畫各季的實驗結果與調查資料製成資料庫，使相關研究人員可立即查詢並相互比對，快速而有效地連接各個子計畫，呈現本計畫整體的成效。



一研究人員專區架構主要分為觀測資料查詢及線上繪圖兩大部份，觀測資料查詢將海流資料、水文資料、生物資料等，建立快速查詢與數據列表。線上繪圖部份則將各項調查資料圖形化展示，各項資料繪圖有水文時間序列圖、散射圖、水平面溫度分佈圖、海流時間序列圖、流場統計圖形、漂流浮標軌跡及 Google Map 展示 CTD 調查資料成果。



一網站所架構的資料庫，除彙整本計畫的觀測資料外，為能橫向整合與研究南灣海域與外海環境之關聯，亦建立呂宋海峽及北南海附近海域衛星遙測海表面溫度、氣象雲圖、PDO、SOI 等資料庫，供各個子計畫運用。





各子計畫精簡研究結果


子計畫 6--資料庫建置及維護

二、民國 110 年第 1 次 (季) 至 111 年第 4 次 (季) 期末報告精簡研究結果如下：

一持續更新網頁中各項資料至111年第四季，包含水文資料、海流資料、生物資料、海表溫資料、氣象資料、海面高度與地轉流資料、水色衛星資料等。







一今年度新增了珊瑚礁魚類的查詢頁面，提供各測站歷年魚種數與魚尾數的條狀圖。此時間序列圖的展示方式，和首頁中的水文與生物歷年時間序列圖查詢之方式相同，圖右上方的功能列可調整展示時間間距、左右平移、縮放、截圖等功能，讓使用者查詢資料時更佳方便。



肆. 摘要

第三核能發電廠有兩部發電機組，分別於民國 73 年 7 月與 74 年 5 月進行商業運轉發電。為瞭解電廠運轉後，對該地區海域生態及海洋資源的影響程度，故行政院原子能委員會與台灣電力股份有限公司，於 68 年 7 月開始資助中央研究院國際環境科學委員會中國委員會 (環科會) 進行長期調查與研究工作。目的在於瞭解第三核能發電廠附近海域，在核能發電廠開始運轉前與運轉時之生態系的平衡狀況：包括非生物環境因子 (如海水之溫度、餘氯等物理與化學性質，以及海洋生物含放射性物質之調查)，生物環境因子 (如基礎生產力，浮游植物與浮游動物、海藻、無脊椎動物及魚類之種間關係)，海潮流調查，漁場經濟效益調查、統計及評估，以及利用珊瑚骨骼同位素回推水溫等，以求取得核能發電廠對該海域影響的基礎資料。82 年 7 月起改委國立中山大學執行，85 年 7 月起改台灣電力股份有限公司資助。本計畫就每一項目，分別邀請國內學者專家主持。其中珊瑚同位素部份已於 87 年 6 月完成，自該年 7 月起改為南灣海域增溫調查。89 年本計畫提出各項證據，顯示第三核能發電廠附近海域並未因第三核能發電廠運轉而增溫，因此 89 年 7 月起增溫調查亦不再進行，而併入子計畫 (二)，但加列綜合討論專章。從 100 年起魚類調查與漁業經濟效益調查已合併為魚類與漁業經濟調查，並於 102 年起改為魚類調查。

在第三核能發電廠之前，也就是民國 67 年，在第 1 座核能發電廠第 1 部發電機組開始運轉發電後，臺灣業已正式進入核能時代；核能發電廠運轉發電，必然會產生放射性待處理物料；然而在臺灣陸地有限，人口密集的情形下，行政院原子能委員會經過數年的調查研究，慎重地選擇人口稀少，地質結構良好，且具有天然屏障的離島蘭嶼設立低放射性待處理物料貯存場。這些放射性待處理物料在搬運與貯存期間，對附近海域環境與生態的平衡，生物群聚的消長關係，以及因這些生物群聚可能累積放射性物質，而對該地區環境造成何種影響，必須加以調查、研究、瞭解。行政院原子能委員會放射性待處理物料管理處 (85 年改制為放射性物料管理局) 有鑑於此，於 73 年 7 月開始，委託環科會進行長期調查研究。研究項目包括水文與水質化學，沈積物化學，植物性與動物性浮游生物，潮間帶底棲生物以及海水與生物體含放射性物質等。82 年 7 月開始，改委託國立中山大學進行調查，並刪除大部份項目，僅留水文與水質化學及放射性物質兩大部份，但自 102 年起停止執行「放射性物質調查」。

調查結果如下：

一、海潮流

第三核能發電廠附近海域排水口外海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主，第三核能發電廠附近海域排水口外民國110年度第1季至第4季五次觀測結果顯示主要全日與半日潮流振幅均介於0.03 m/s～0.30 m/s，民國111年度第1季至第4季四次觀測結果顯示主要全日與半日潮流振幅均介於0.01 m/s～0.18 m/s。

110年第1段長期海流觀測期 (民國109年12月24日至110年2月20日) 之平均流流速為0.08 m/s，流向229°；第2段 (民國110年2月20日至110年4月15日) 之平均流流速為0.14 m/s，流向235°；第3段 (民國110年4月15日至110年7月20日) 之平均流流速為0.18 m/s，流向232°；第4段 (民國110年8月19日至110年9月9日) 之平均流流速為0.19 m/s，流向229°；第5段 (民國110年9月16日至110年11月18日) 之平均流流速為0.15 m/s，流向237°。

111年第1段長期海流觀測期 (民國110年11月18日至111年1月15日) 之平均流流速為0.11 m/s，流向245°；第2段 (民國111年1月15日至111年3月14日) 之平均流流速為0.15 m/s，流向240°；第3段 (民國111年3月14日至111年4月21日) 之平均流流速為0.20 m/s，流向232°；第4段 (民國111年7月13日至111年11月10日) 之平均流流速為0.17 m/s，流向232°。

民國110年1月22日第1次漂流浮標調查時段為小潮退潮段，共移動4.46 km，淨移動3.94 km，漂流時段最大流速為0.48 m/s (對應流向56°)、淨流流速為0.35 m/s (對應流向88°)。浮標於退潮時段離出水口後先往東北東-東北方流動，流速約0.40～0.48 m/s，漂流2.50 km後轉為向東方漂流，隨即平行海岸轉往東南方流動。由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於退潮時段於東側約為距排放口400 m之內。

民國110年4月16日第2次漂流浮標調查時段為漲潮段，浮標共移動2.54 km，淨移動2.43 km，施測時段最大流速為0.46 m/s (對應流向為138°)，淨流流速為0.21 m/s (對應流向為156°)。浮標在出水口附近往南方漂移，離施放點500公尺後轉往南南東向，離施放點1500公尺後轉往東南向，流速略有增加，流速介於0.30~0.46 m/s。由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於漲潮時段於南側約為距排放口500 m之內。

民國110年8月13日第3次漂流浮標調查時段為退潮段，浮標共移動2.37 km，淨移動0.76 km，施測時段最大流速為0.41 m/s (對應流向為217°)，淨流流速為0.07 m/s (對應流向為61°)。漂流浮標離出水口後往東方漂移，隨即轉往東北方漂流，離施放點1300公尺後依逆時鐘方向先轉往北，再轉往西，續轉往西南西方漂流，觀測後段偏向西南向漂流，流速略有增加，流速介於0.25~0.41 m/s。由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於退潮時段於東北側約為距排放口500 m之內 (背景溫度約為27.5°C)。

民國110年11月18日第4次漂流浮標調查時段為漲潮段，浮標共移動2.74 km，淨移動2.50 km，施測時段最大流速為0.48 m/s (對應流向為212°)，淨流流速為0.22 m/s (對應流向為201°)。浮標在出水口附近往東南方漂移、流速介於0.10~0.15 m/s，離施放點350公尺後轉往西南偏南南西南方流動，流速略有增加，流速介於0.20~0.48 m/s。由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於漲潮時段於西南側約為距排放口400m之內。

民國111年3月5日第1次漂流浮標調查時段為大潮退潮段，共移動4.45 km，淨移動4.00 km，漂流時段最大流速為0.57 m/s (對應流向147°)、淨流流速為0.34 m/s (對應流向192°)。浮標於退潮時段離出水口後先往南方流動，隨即轉往南南西，之後漂流流型略呈逆時針方向流動，轉往南方再轉往南南東方。由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於大潮退潮時段於南側約為距排放口550 m之內。

民國111年5月20日第2次漂流浮標調查時段為漲潮段，浮標共移動2.77 km，淨移動1.91 km，施測時段最大流速為0.42 m/s (對應流向為22°)，淨流流速為0.16 m/s (對應流向為57°)。浮標在出水口附近往東南方漂移，離施放點500公尺後轉往東向，離施放點900公尺後轉往東北向，之後轉往北北東方流動、流速介於0.30 ~0.42 m/s。由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於中潮漲潮時段於東側約為距排放口700 m之內。

民國111年7月22日第3次漂流浮標調查時段為小潮退潮段，浮標共移動2.39 km，淨移動2.18 km，施測時段最大流速為0.57 m/s (對應流向為152°)，淨流流速為0.20 m/s (對應流向為159°)。浮標在出水口附近往東南方漂移，離施放點400公尺後轉往南方，離施放點1300公尺後轉往南南東向，離施放點1900公尺後轉往東南方流動。由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於小潮退潮潮時段於南側約為距排放口300 m之內。

民國111年11月17日第4次漂流浮標調查時段為大潮漲潮段，浮標共移動1.77 km，淨移動1.41 km，施測時段最大流速為0.29 m/s (對應流向為142°)，淨流流速為0.12 m/s (對應流向為47°)。浮標在出水口附近往東南東方漂移，離施放點300公尺後轉往東方流動，離施放點650公尺後轉往東北流動，之後轉往北北東偏北流動。由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於大潮漲潮時段於東側距排放口600 m之內。

溫鹽調查結果，110年第1次觀測 (民國110年1月23日) 水溫介於22.7°C～27.3°C之間，鹽度介於34.01～34.50之間；110年第2次觀測 (4月15日) 水溫介於22.0°C～25.6°C之間，鹽度介於34.05～34.69之間；110年第3次觀測 (8月12日) 水溫介於23.0°C～31.5°C之間，鹽度介於32.67～34.32之間；110年第4次觀測 (11月10日) 水溫介於

24.0℃～29.6℃之間，鹽度介於33.63～34.19之間；111年第1次觀測 (民國111年2月16日) 水溫介於24.5℃～29.7℃之間，鹽度介於33.47～34.58之間；111年第2次觀測 (5月11日) 水溫介於21.3℃～29.5℃之間，鹽度介於33.87～34.58之間；111年第3次觀測 (8月12日) 水溫介於21.7℃～30.4℃之間，鹽度介於32.67～34.26之間；111年第4次觀測 (11月17日) 水溫介於22.9℃～30.6℃之間，鹽度介於33.41～34.12之間。溫排水擴散舌在漲潮時段多往西南擴散，退潮時段往東南-東方向擴散，受西南向淨流的作用，漲潮時溫水舌的擴散範圍較退潮時溫水舌大。湧升帶來的冷水，有助於南灣之珊瑚避免海水暖化之衝擊；冷水所含之營養鹽，亦有助於藻類生長，但因南灣海水內外交換甚快，藻類來不及長大即被送至灣外，因此營養鹽利用率不高。

二、水文水質

(二-甲)、第三核能發電廠附近海域水文與水質化學

第三核能發電廠附近海域水溫的變化，主要受天候、季節性以及大尺度海洋事件如颱風、聖嬰、反聖嬰，以及太平洋十年期振盪的影響。110、111 年第 1~4 次海水的溫、鹽值顯示屬於西菲律賓海水以及南海水的混合水，但季節性變化不大，偏向南海水。110 年第 1 次的海水表溫為歷年次低，然而第 4 次則為歷年次高。111 年的鹽度則都比歷年平均值低。

回顧本海域溫、鹽之變化與 ONI/PDO 指數之間，在早期時，大致呈現 PDO 暖相時，水溫偏低，然而後期反而呈現水溫偏高；本海域水溫的變化似乎主要反應海溫上升的趨勢，而與 PDO 相關性較為多變。本海域在 99~102 年 PDO 冷相頻頻觀察到低於歷史記錄的鹽度，而在本年度 (110、111 年) 也是觀察到較低鹽度的現象，也正逢歷時 2 年多的 PDO 冷相，顯示本海域的鹽度變化與 PDO 變化有明顯的正相關。

海域的 pH 值介於 7.922 至 8.082 之間，符合海保署所公佈海域環境分類及海洋環境品質標準第 5 條「甲類海域之水質標準，氫離子濃度指數應在 7.5~8.5 之間」之規定。溶氧量亦符合海保署「甲類海域之水質標準，溶氧量應在 5.0 mg/l 以上」之規定。

營養鹽資料顯示，此海域目前大多沒有受到有機質的污染，110 及 111 年在西側的表水有較高值營養鹽現象，可能與南灣西南側有順時針渦流，將台灣海峽較高值的營養鹽帶入有關。由 N/P 比值顯示，此海域浮游植物之生長限制因子為 N，因此對 N 的污染途徑應該特別注意。此海域之葉綠素甲測值偏低，屬於低生產力之海域。整體而言，第三核能發電廠附近海域之水文與水質化學受溫排水的影響並不明顯，海域之水文與水質皆符合我國甲類海域的水質標準。

(二-乙)、低放貯存場附近海域之水文及水質化學

調查結果顯示，海域之水溫主要受天候及季節性變化的影響。鹽度無季節性變化，反而是各站的變異較大，顯示陸源水對近岸海域的鹽度有某種程度的影響，其中漁人村的鹽度偏低，此乃陸源水大量流入海域所致。pH 及溶氧量都符合海保署 (原中央主管為環保署，於 107 年 4 月 27 日由行政院公告更改為海保署) 107 年 2 月 13 日所公佈「海域環境分類及海洋環境品質標準」所規範甲類 (適用於一級水產用水、游泳) 海域水體之標準。較高 pH 的測站，往往伴隨較高的溶氧量，顯示本海域有較旺盛的光合作用。各測站的營養鹽 (硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽) 均較外海來得高，此乃近岸海水長期受到含有高量營養鹽陸源水流入之故。

三、植物性及動物性浮游生物調查

110-111 年八次採樣的結果，顯示植物性浮游生物沉澱法和濃縮法分析之密度趨勢相似，由於時值反聖嬰期，浮游生物測值大多低於歷年同次的平均值，僅植物性浮游生物沉澱法 110 年第 4 次採樣和 111 年第 2 次和濃縮法 111 年第 2 次密度高於歷年同次平均值，和動物性浮游生物豐度在 110 年第 1、3 次和 111 年第 4 次結果較歷年同次平均值為高。整體而言，南灣海域的植物性浮游生物密度和動物性浮游生物豐度多以近岸監測站較離岸對照站為高，且呈現明顯的季節分群現象。此外，本海域從 90 年以來植物性浮游生物密度偏低的現象已不復見，且從 102 年開始呈現密度明顯增加且大幅震盪的情形。歷年入出水口間的植物性和動物性浮游生物豐/密度無顯著電廠運轉與否的差異及季節分群。動物性浮游生物和蝦蟹幼生的豐度於 97 年後多呈現年年出現春或夏季高峯。歷年魚卵和仔魚豐度皆維持在一定範圍內變動，且呈現明顯的春夏季高峯。束毛藻在春季 (第 2 次) 經常為本海域的優勢藻，可佔全海域的 37%，且在聖嬰期時，第 3 和 4 次採樣較其它年為高，同時其密度與當月的 PDO 呈顯著正相關係。

四、底棲動物調查

本研究的目的在了解溫排水對墾丁地區底棲動物群聚是否有影響。以第三核能發電廠附近海域 (入水口、出水口南堤外側小灣 (以下簡稱為出水口南側) 及石牛溪等海域)之(1)軸孔珊瑚成長變化；(2)底棲動物著生量及消長情形；(3)固定橫截線底棲生物覆蓋率變化；(4)入、出水口微環境沉積物沉積量之變化；(5)入、出水口附近水溫變化，為監測項目。出水口南側區域軸孔珊瑚於 110 - 111 年 8 次之生

長量與入水口區域沒有差異，死亡率則較入水口區域高，長期趨勢為入水口珊瑚的成長較出水口佳，除水溫之外，影響珊瑚生長的因子尚有颱風和掠食者啃食等，且颱風季（夏秋)的沉積物沉積量明顯高於非颱風季 (冬春)。110 - 111 年 8 次之橫截線調查都有觀察到珊瑚白化現象，白化率較 109 年為低，分別為 0 - 41.2% (111 年)、0 - 19% (110 年)及 9 - 80% (109 年)，已知入水口底棲生物相之結構與出水口不同，如入水口以枝狀軸孔珊瑚為主，出水口是團塊及平鋪狀珊瑚；且平均白化率與大環境北太平洋年際震蕩指數 PDO 及赤道太平洋區海面溫度指數 Niño4 index 有關，當指數高時，白化率也高；而珊瑚、海葵及軟體動物覆蓋率則與指數呈負相關，指數高時覆蓋率低。底棲動物著生量、南灣之水溫、及 PDO index 三者有相關，當 PDO 越高，相對後 1-2 季南灣的水溫較高 (正相關)，後 1-2 季的底棲動物著生量則較低 (負相關)，顯示此非小區域溫排水影響所致，應是與大環境氣候變遷有關；底棲動物著生量長期趨勢為入水口區域高於出水口南側區域，底棲動物在年度消長方面亦呈現相似的趨勢，造成這些現象的原因可能有：1、溫排水的效應；2、非入水口區域有較大的人為或自然干擾；3、入水口區域因冷卻機組抽水，導致總水體量與幼生量大於非入水口區域；4、出水口區域沉積物沉積量較入水口區域高。水溫變化僅出水口南側 3 公尺水深的測站 (Efflu-3) 較其他測站之平均值高 0.8 - 2.6°C，其餘各測站之水溫變化無差異，此結果顯示溫排水不影響出水口南側區域 6 公尺以深的水溫變化。

五、魚類調查

民國110年4次的採樣調查，第三核能發電廠附近海域之珊瑚礁魚類相共記錄36科89屬224種，歧異度方面以隆頭魚科(48種)最高，是本海域同階生態地位利用較完整的科別，其次為雀鯛科(33種)；數量方面以雀鯛科的族群量最多。後壁湖魚市場110年4次的調查共記錄30科47屬86種魚類相，合併珊瑚礁魚類相及後壁湖魚類相2種調查方式所記錄到的魚種，110年4次魚類調查部份共記錄47科117屬281種。

民國111年4次的採樣調查，第三核能發電廠附近海域之珊瑚礁魚類相共記錄35科88屬199種，歧異度方面以隆頭魚科(39種)最高，是本海域同階生態地位利用較完整的科別，其次為雀鯛科(34種)；數量方面以雀鯛科的族群量最多。後壁湖魚市場111年4次的調查共記錄30科46屬72種魚類相，合併珊瑚礁魚類相及後壁湖魚類相2種調查方式所記錄到的魚種，111年4次魚類調查部份共記錄45科114屬244種。

由於本研究珊瑚礁魚類相調查的海域為沿近海域，是多數魚類幼生棲息的場所，多樣性的補充群，顯示本海域是魚類幼生成長的場所。歷年第三核能發電廠附近海域之魚類相調查共分二部份進行，珊瑚礁魚類相的部份從82年開始，後壁湖魚市場漁獲種類的調查自民國87年開始，二項調查至目前為止共記錄第三核能發電廠附近海域的魚類相有112科309屬845種，隨著調查次數的增加，本海域記錄到的魚種數亦呈現上升趨勢，係因墾丁海域擁有多樣的魚類相所致。本研究分析5個測站珊瑚礁魚類的群聚組成，探討受溫排水影響區(測站3、4、5)與未影響區之間(測站1、2)魚類群聚組成變化，以MDS 二度空間排序後發現，未受溫排水影響區(測站1)與受溫排水影響區(測站3、4及5)的重疊性較高，89-110年調查期間記錄到648種珊瑚礁魚類，其中在影響域(測站3、4、5)及未影響域(測站1、2)間皆可發現的魚種比率為69%。機組歲修保養期間，影響域測站(S3~S5) 珊瑚礁魚類的種類數、豐度及群聚組成與運轉期間有溫排水輸出的魚類多樣性並無明顯差異，係因珊瑚礁魚類主要活動區域在礁石間，而溫排水的影響在表層。歷年珊瑚礁魚類與後壁湖販售魚類年間相似度值介於5~17%，未發現逐年增加，係因灣內海域非主要經濟性作業漁場。

六、資料庫建置及維護

海流調查結果顯示，排水口附近海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主，造成海水經常往西南繞過貓鼻頭往西輸送之趨勢。溫排水擴散區域大部份限於排水口附近海域西南側，其擴散範圍在漲潮時段往西南約 500～1000 m，退潮時段往東-東南約 200～800 m，溫排水大部份分佈於海表層以下水深 3 m 以內，擴散影響範圍多侷限在距排水口 1000 m 弧內，空間溫降率自排水口往外至 500 m 弧內約 1°C/100 m。除此以外，核三廠海域近岸海底海溫陡降現象，除了是因為大潮潮流在南灣內引起的湧升流將次表層冷水帶上來所造成外，在呂宋海峽產生的巨大內潮、內波傳入海灣內亦有相當程度的貢獻。湧升帶來的冷水，可能有助於南灣之珊瑚免於海水暖化之衝擊；冷水所含之營養鹽，亦有助於藻類生長，但因南灣海水內外交換甚快，藻類來不及長大即被送至灣外，因此營養鹽利用率不高 (Chen et al., 2004a, 2004b, 2005；Jan and Chen, 2009)。水溫長期觀測資料顯示發現颱風季期間某些颱風經過台灣附近後會造成1～4 週長的水溫下降與回升變化，其間動力因素複雜，值得進一步分析。

本海域水文的改變與聖嬰/反聖嬰現象、太平洋十年期振盪指數等之大尺度海洋事件相關係頗高，例如 92~96 年、103~108 年 PDO 暖相時，溫鹽訊號較集中在南海水以及黑潮水之間，而 99-102、108-111 年冷相時，溫鹽訊號明顯偏向南海水。本區較大的溫降與強降雨、颱風、渦漩有密切關係，這三個機制的變化將直接影響珊瑚的生長，尤其夏天的溫降更有助於珊瑚免受過熱而白化之傷害。pH 值在 PDO 冷、暖相的差異不明顯，研判為大氣二氧化碳增加所造成之海水酸化，與 PDO 相關性不大，而硝酸鹽的距平值與 PDO 指數相關性也不高，因此水質的改變與 PDO 的相關性較小。多年的資料顯示，水體中營養鹽含量的變化似乎受控於植浮的利用或是釋出，兩者之間呈現負相關。束毛藻在本海域的季節性變化非常明顯：春天好發，隨著季節演遞漸漸變少，至冬天低溫時降為全年最低。束毛藻雖然是黑潮水的指標種，但水溫需升高至生長溫度，才能見到束毛藻生長，因此鹽度之單一因素並不能指示束毛藻的出現。

整體而言，核三廠附近海域浮游生物的豐度變動反應大自然的季節變化，夏秋高冬春低，與溫排水的關聯並不顯著，且與多項幾個月前的氣候指數(尤其是 PDO 指數)有顯著正相關性。本期兩年適逢反聖嬰期，植物性和動物性浮游生物、蝦幼生的豐/密度偏低，符合過去經統計檢驗的結果。因此本調查海域浮游生物的豐度變化與大尺度的氣候變遷有較密切的關連，值得未來深入研究。

水溫或底棲動物幼生豐度與底棲動物著生量多無迴歸相關，可能因為無論是水溫測量，或是浮游幼生的撈取，皆為定點即時紀錄，而底棲動物著生是 2-3 個月的累進結果，不同類型調查之時間尺度有差別。固定橫截線調查在入、出水口皆以藻類之覆蓋率最高，分析結果顯示營養鹽低時，藻類覆蓋率增加，當營養鹽高時，海葵及海綿覆蓋率增加，還有珊瑚白化率也變高；各測站底棲動物著生量與營養鹽之迴歸關係沒有一致性，但此結果仍顯示營養鹽對各類底棲動物著生有影響；此外，調查結果未發現受南灣廢污水異常排放影響之訊號。與子計畫一海潮流提供的水深 28 公尺水溫資料比較，出水口南側地區除 3 公尺水深的測站(Efflu-3)外，其餘各測站之水溫與子計畫一的水溫變化無異，顯示溫排水不影響出水口南側地區 6-8 公尺以深的水溫變化。南灣 102 年 8 月 25 日（第 3-4 次期間）及入水口 103 年 5 月 22 日（第 2-3 次期間）樽海鞘大量出現前後，雖有入水口及灣外水溫變動不一致的現象，但水文水質、動物性浮游生物相、底棲動物著生量及季水溫變化與樽海鞘出現無明確相關，本部分將持續監測探討。

珊瑚礁魚類的分佈可能受到海流、潮汐、水深、地貌、水文、水質、食物來源(浮游生物、底棲生物)、人類活動(放流、垂釣及漁業行為)的影響，呈現測站間群聚組成的差異。本研究參照水質因子、浮游生物及本計畫的調查結果，利用結構方程模式預設出 3 個環境變動的潛在變項(營養鹽、湧升流及基礎生產力)及 2 個生物變動的潛在變項(浮游動物群聚及魚類群聚)，建構第三核能發電廠附近海域之珊瑚礁生態系之概念模式。結構方程式的分析的實證模式顯示營養鹽流對浮游動物群聚的變動呈負相關；營養鹽對魚類群聚為負相關，基礎生產力對魚類群聚則呈現正相關。整體而言，溫排水對第三核能發電廠附近海域魚類相影響小。

壹、海潮流

一、計畫目的與緣起

海流、溫鹽度與潮汐是海洋物理水文資料中，最基本且最重要的參數，這些資料因帶有海水運動及水團衍變的訊息，所以通常為物理海洋暨生地化研究採用為海洋水文、水質、動物性浮游生物、植物性浮游生物、魚類生態、漁場經濟效益、放射性元素分佈等觀測資料現象解釋之參考。在海洋工程應用方面，全面的物理水文資料可供規劃設計溫排水導流堤位置及開口方向參考，除此以外，電廠冷卻水的抽取和經發電機組加溫後排放至海洋後的擴散過程等，亦都深受背景海洋環境裡的海流、溫鹽度與潮汐所影響。因此不論由建立海域環境背景資料、發電機組營運管理、或環境生態保護等議題來考量，流場調查均有其必要與重要性。

本計畫調查海域位處台灣最南端，為一半封閉型海灣，面向呂宋海峽，東為太平洋，西為南海，第三核能發電廠附近海域恰位於南海環流與黑潮邊緣之一端，黑潮之高溫高鹽水、南海中鹽水及近岸混合水交匯於此，水團衍變呈複雜的季節變化。第三核能發電廠建廠於此，並將電廠排水口設於近貓鼻頭角，經發電機組增溫後的冷卻水之排放，是否對海域生態及珍貴的珊瑚造成影響，應進行長期之物理水文調查，以了解溫排水影響範圍，另一方面亦可以釐清人為排放水和第三核能發電廠附近海域複雜的自然環境水團，對生態的影響程度之異同。與其他子計畫之關聯方面，流場資料尚可提供給其他各子計畫分析生地化參數、生態與海況、水文條件之相關性。綜言之，海流水文探測的目的主要在界定溫水舌擴張範圍，提供物理水文參數，予其他有關生地化及生態研究的子計畫參考，追蹤聖嬰南方振盪 ENSO 現象 (El Nino Southern Oscillation)、探討冷水湧升現象以及分析南海水、黑潮水與近岸水團衍替之時序。

二、文獻回顧

第三核能發電廠附近海域第一項受注意的問題為溫排水的擴散範圍，歸納分析本研究歷年的水文調查資料，以及輔以成功大學水工試驗所民國 87 年以來，在距排放口 1000 m 弧線以內的高頻率高測點密度的溫排水調查與分析結果 (余進利等，1998，1999，2001；黃煌輝等，2002)，溫水舌的型態受當地潮流往復運動的作用，而有由南向東北及由東北向南擺動的現象，其中又以向南擴張的趨勢佔調查次數的多數，主要仍受淨流為沿貓鼻頭東岸向南南西流動所導引。溫排水的空間擴散率方面，大約在距排放口 500 m～700 m 之間即已降溫至與週遭環境水溫相近 (溫差<1°C)，溫排水通常不影響至距排放口 1000 m 以外水溫，因此第三核能發電廠溫排水舌屬小尺度的水舌動力，不影響第三核能發電廠附近海域其它中大尺度的海洋現象，如冷水湧升、水團季節變化等。

其二是水團的區分及季節性替換的問題，Shaw (1989) 指出，台灣西南海域的水團計有沿岸水、南海水及黑潮水 3 種，其中沿岸混合水可分為 3 股，其一為長江和閩浙諸江之沿岸流，因其來自較高緯度，故具備低溫、低鹽特性；其二為廣東和閩南之沿岸水，因來自較低緯度，故水溫較高；其三為台灣沿岸水，因台灣之河川流量夏盛冬衰，不如前 2 者豐沛，故影響範圍僅在鄰貼台灣岸邊之水域。黑潮水為北赤道洋流之延續，可分為上下兩層，上層為高溫高鹽之水團，下層則溫鹽終年不變。南海水則具備高溫及中等鹽度之特色，由於其受到沿岸低鹽水和大洋高鹽水混合影響，其鹽度介於兩者之間。第三核能發電廠附近海域可能受廣東沿岸水，以及後 2 種水團作用影響。王胄及陳慶生 (1987) 分析南海北部的水文資料認為，黑潮水於冬季東北季風強盛時會偏入巴士海峽而於南海北部形成一暖心渦流，因此第三核能發電廠附近海域水與黑潮近似者，至少有季節性的替換過程。Shaw (1989) 更進一步推論沿岸水於春季

時只出現於台灣西南隅，夏季時西南風將廣東沿岸水吹來，覆蓋整個西南海域表面，水溫可達 27°C 以上；黑潮水在冬季時出現於靠近台灣之大陸坡上；南海水在春季時開始與黑潮水團互為消長，夏季時則佔據西南海域，因此在春季後，第三核能發電廠附近海域亦可見南海水的蹤影。

第三核能發電廠附近海域的流場及水文特性，依據范光龍教授自民國 68 年至 82 年在第三核能發電廠附近海域所進行的海流調查結果，漲潮時海域外海流向西南流動，退潮時轉向東流動。第三核能發電廠出水口之溫排水不易迴流至入水口，至少須以每秒 0.2 m/s 連續流動 4 小時以上才會流到入水口，但在此過程中會遇到後壁湖漁港外側淺灘阻擋海流轉向東流動，而擴散到第三核能發電廠附近海域中央。另一方面溫排水因密度小，浮於海水上層，容易散熱，在此 4 小時以上之流程中其熱量已散失許多，而且其只存在於表層 3 m 深，甚至只有 1 m 深之海表面，而入水口卻在海下 6 m 處抽取海水冷卻，因此受溫排水迴流之影響有限。由於排水口附近淨流向西南，而夏季海水水溫本身就常高達 28～29°C 甚至 30°C 以上，加上溫排水之增溫效果常達 3～4°C，南風、西南風、東南風之吹拂，常使溫排水停滯於出水口西側之小灣淺海珊瑚礁區。海域內可能受由菲律賓海域傳來的內波振盪所影響，常造成第三核能發電廠附近海域下層低溫海水抬升，使水溫驟降，於民國 80 年 5 月 22 日 19:30 記錄到下層低溫海水曾自水深 19 m 上升至 8 m 即為一例。另，據陳鎮東教授與王冰潔於民國 88 年所發表之南部核能電廠附近海域之增溫調查結果，溫排水之影響主要只在出水口附近，並未明顯擴散至第三核能發電廠附近海域東端，溫排水排入海域雖造成表層溫度升高，但不擴及底層 (10 m 以下)，整個第三核能發電廠附近海域水溫並沒有比貓鼻頭南方較屬於外洋海水水溫來得高。

Lee et al. (1997, 1999a, 1999b) 的研究，解釋第三核能發電廠附近海域冷水湧升造成短期溫度陡降現象的動力機制，據其研究結果在大潮時之退潮流將導致一氣旋式 (逆時旋轉) 渦旋二次環流 (Secondary eddy) 盤據著南灣海域，此一渦旋環流將導致附近海域持續幾小時之溫度突降。另一反氣旋 (順時旋轉) 規模較小之二次漩渦則在漲潮流時發生於南灣海域東側。造成漲、退潮時渦旋環流不等之原因為地形上之特徵，如環繞第三核能發電廠附近海域東端之海底山脊，另外則是在第三核能發電廠附近海域半封閉入口處之蜿蜒海山，此地形特徵迫使潮流轉向成反氣旋方向，若潮流方向為向灣內時此二次渦旋將消失，相反的，若潮流方向為向海時，將使渦旋加強，此 2 地形特徵之結合，在退潮流時將加強二次渦流，尤其是在離開第三核能發電廠附近海域之潮流十分強勁時。經過動力分析，這兩類渦旋因為都是以離心力和海表面壓力梯度力的平衡為主，地轉科氏力相對地不重要，所以不論順時或逆時旋轉，都會在渦流中心產生湧升過程，造成第三核能發電廠附近海域之中冷水湧升的現象。

民國 92～93 年第三核能發電廠附近海域海流與水文量測，是以更深入了解溫排水在空間及時間上的變化為主要目的。根據調查與分析結果所撰寫的論文 (Jan et al., 2004)，第三核能發電廠附近海域的主要潮型為全日潮及半日潮的混合潮，其中全日潮比半日潮稍大一些，主要分潮包括 O_1、P_1、K_1、N_2、M_2、S_2。從海流觀測可以觀察到沿岸流主要影響因子為潮汐，漲潮時主要流向為西南向，退潮則約為東北向，其潮流振幅為 0.2～0.4 m/s。潮流調和分析結果顯示，第三核能發電廠附近海域近岸的潮流主要是由混合潮及高頻的倍潮組成，漲潮時西南向的潮流相對較弱 (約 0.15 m/s)。平均流在每段觀測時期幾乎都向西南流，平均流速介於 0.15 和 0.20 m/s 之間。沿岸流的流速可經由即時潮位觀測 [η (t)] 套用以下經驗公式估計：

$$v(t) = 0.1830 \times \eta(t-1) + 0.1858 \times \eta(t-4) - 0.3371，$$

亦即以前 1 和 4 小時於後壁湖測得的潮位，可推估沿岸流速分量的大小的方向。上式估算值與觀測值間的平方根誤差為 0.18 m/s。

Jan et al. (2004) 的分析結果也指出，第三核能發電廠的冷卻水經由出水口排放到外海形成溫排水舌，及在出水口外海 200 公尺的海域觀察到水溫的急遽下降，是出水口附近沿岸的主要水溫變化特徵。溫排水出海後溫度高於一般海水，較輕且浮在海面，厚度約為 5～7 公尺，愈往外海與海水混合後，厚度漸漸變薄，到了距出水口約 1000 公尺處就幾乎與外海水一致了；溫排水出海的水平分佈型態幾乎由潮流掌控，漲潮時，溫排水向西南沿著海岸往外海延伸約 600 公尺，退潮時，溫排水則往東北方向擴展，像一個鼓脹的氣球。從密集的鹽溫深量測 (CTD) 及浮標溫度計軌跡觀察，兩項觀測都顯示了溫排水出海後，在距離出水口 500～800 m 處，每公尺的水溫下降率為–0.008°C /m～–0.01°C /m，即 300 公尺的距離，水溫的下降幅度約為 2.4°C～3°C。從水溫空間變化分析，出水口的溫排水並不會回流至進水口。

第三核能發電廠海域的週期性水溫陡降現象，除了 Lee et al. (1997, 1999a, 1999b) 說明是因潮汐渦流所造成的之外，Jan and Chen (2009)進一步研究指出，這種潮週的水溫陡降和臨近呂宋海峽中因潮流通過海脊引發的內潮傳入南灣，亦有密切關係。該研究亦指出，每回內潮傳入南灣所造成冷水湧升，也會將富含營養鹽的次表層水帶到表層，可能有利珊瑚的生長。

另落山風是屬於下坡風（山風），恆春半島的中央山脈高度降低至 400-1000 公尺左右，每年從 10 月到次年 4 月，東北季風翻過山脈而下，強勁的下坡風直撲恆春半島西岸，襲捲在背風坡的車城、牡丹、恆春等地區。根據中央氣象局在 1990 年所發表的”恆春落山風的分析與機制探討”一文中提到，落山風大致發生在北至枋山，南至白沙的西南邊海岸，對位處恆春半島南端的南灣海域影響不高，故落山風對南灣海域物理因子影響不大。

三、研究方法與進度說明

3.1 調查研究方法

本計畫海潮流調查包含 3 項，除往年採用之漂流浮標調查及鹽溫深儀 (CTD) 調查外，民國 86 年秋季起，以一具自記式海流儀在出水口東北方約 1 km、水深 18 m 處進行定點海流觀測。自民國 89 年第 3 次開始再將此定點海流測站移往出水口東南東方約 300 m、水深 20 m 處，進行每季 1 個月之長期海流觀測。民國 92 年在浮標上加設一溫度計量取表層水溫。定點海流觀測於民國 94 年開始改採都普勒式流剖儀長期連續觀測。

3.1.1 漂流浮標調查

漂流浮標調查預定每年進行 4 次，每季進行 1 次，其方法乃以一個包含十字型導流板之漂流浮標，上為浮球、下置重錘，並於水深 1 公尺處繫一自記式溫度計，浮球中並放置衛星定位儀及 GSM 通訊設備，以漁船攜至第三核能發電廠出水口外 50 m 處，將浮標投入海中，由浮標自行每分鐘記錄本身之經緯度位置 (也可由陸上透過 GSM 通訊系統即時收錄浮標之位置)，觀測 3 小時後取回返航。漂流浮標施放點位如圖 1-1 所示。浮標溫度計的軌跡記錄採用 Garmin 公司製造的 GPS (衛星定位儀)，其接收儀共有 8 個頻道可同時追蹤所有衛星資料。

自記式溫度計(Pace Scientific Ins., 型號 XR5-T) 之規格如下：

數據	範圍	準確度	解析度
溫度 (℃)	0~40	0.15	0.02

3.1.2 定點海流觀測

民國 94 年起海流調查改用都普勒式流剖儀連續觀測，測站位置請參視圖 1-1。本項工作採用挪威 NorTek AS 公司製造型號 Aquadopp 之水下都普勒音波式剖面海流儀 (簡稱 ADP)，儀器測量規格如下：

數據	範圍	準確度	解析度
速度 (m/s)	±10	1% of measured value ±0.5 cm/s	0.0001
方向 (°)	0~360	2	0.1
溫度 (℃)	-4 ~40	0.1	0.01
壓力 (m)	0~100	0.25% of full scale	0.005% of full scale

3.1.3 溫鹽深調查方法

本項工作仍租用漁船使用 SeaBird SBE19 溫鹽深儀 (CTD) 及 GPS 定位系統，航行到預定測站將 CTD 緩慢下放入海中，量取海水之溫度、導電度及壓力剖面，同時抄錄船位之 GPS 經緯度，返航後再將 CTD 記錄的資料以電腦讀出。CTD 測站位置請參見圖 1-1。以下為美國 Sea Bird 公司生產之 SBE19 型攜帶式溫鹽深儀之特性及規格：

儀器數據	範圍	準確度	解析度
導電度(S/m)	0～9	0.0005	0.00005
溫度(℃)	-5～+35	0.005	0.0001
深度(m)	0~100	0.1% of full scale	0.002% of full scale

3.1.4 歷年來實測資料之整理分析

本項工作蒐集歷年來之 CTD 及漂流資料，並與第三核能發電廠附近海域實測潮汐，或中央氣象局後壁湖潮汐測站當時之實測潮位記錄加以比對，期更進一步了解第三核能發電廠附近海域水團的季節性變化。此外亦統計歷年海流、水溫觀測成果，期了解流場與水文狀況是否異常，也供他項子計畫資料分析之參考。

3.2 調查日期

漂流浮標調查民國 110 年四季次調查皆已完成，浮標調查時間分別在民國 110 年 1 月 22 日、110 年 4 月 16 日、110 年 8 月 13 日及 110 年 11 月 18 日。111 年四季次調查皆已完成，浮標調查時間分別在民國 111 年 3 月 5 日、111 年 5 月 20 日、111 年 7 月 22 日及 111 年 11 月 12 日。

定點長期海流調查於民國 110 年完成五次調查，民國 109 年 12 月 24 日至 110 年 2 月 20 日間進行 110 年第 1 次調查，民國 110 年 2 月 20 日至 110 年 4 月 15 日間進行第 2 次調查，民國 110 年 4 月 15 日至 110 年 8 月 19 日進行第 3 次調查 (民國 110 年 7 月 20 日至 110 年 8 月 19 日資料無效)，民國 110 年 8 月 19 日至 110 年 11 月 18 日調查時段，其中民國 110 年 9 月 9 日至 110 年 9 月 16 日資料無效，現場資料分成第 4 次調查民國 110 年 8 月 19 日至 110 年 9 月 9 日及第 5 次調查民國 110 年 9 月 16 日至 110 年 11 月 18 日兩段資料分析。民國 111 年完成四次調查，民國 110 年 11 月 18 日至 111 年 1 月 15 日間進行 111 年第 1 次調查，民國 111 年 1 月 15 日至 111 年 4 月 21 日調查時段，其中民國 111 年 3 月 14 日有部分資料錯謬無法使用，現場資料分成第 2 次調查民國 111 年 1 月 15 日至 111 年 3 月 14 日及第 3 次調查民國 111 年 3 月 14 日至 111 年 4 月 21 日兩段資料進行分析，民國 111 年 7 月 13 日至 111 年 11 月 10 日間進行第 4 次調查，111 年 11 月 10 日重新佈放儀器，目前儀器持續施放中。

大範圍的鹽溫深調查於民國 110 年完成四次調查，分別於民國 110 年 1 月 23 日、110 年 4 月 15 日、110 年 8 月 12 日及 110 年 11 月 10 日，民國 111 年完成四次調查，分別於民國 111 年 2 月 16 日、111 年 5 月 11 日、111 年 8 月 12 日及 111 年 11 月 17 日。

四、調查研究結果

4.1 漂流浮標調查結果

民國 110 年 1 月 22 日第 1 次漂流浮標調查結果如報告書光碟表 1-1 及圖 1-2 所示 (圖 1-2 亦附於報告內文中當做範例)。觀測時間為 15:50～19:00，觀測時段為小潮退潮段，觀測時段中，浮標共移動 4.46 km，淨移動 3.94 km，漂流時段最大流速為 0.48 m/s (對應流向 56˚)、淨流流速為 0.35 m/s (對應流向 88˚)。浮標於退潮時段離出水口後先往東北東-東北方流動，流速約 0.40～0.48 m/s，漂流 2.50 km 後轉為向東方漂流、流速約 0.25～0.30 m/s，隨即平行海岸轉往東南方流動、流速約 0.32～0.43 m/s。浮標初施放時水溫 27.0°C，退潮段往東北方漂流 495 公尺溫度降為 25.0°C，離施放點 1000 公尺溫度降至 24.2°C，由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於退潮時段於東側約距排放口 400 m 之內 (由 CTD 水團資料顯示背景溫度約為 23.2°C)。




圖 1-2 民國 110 年 1 月 22 日漂流浮標暨溫度追蹤調查結果

民國 110 年 4 月 16 日第 2 次漂流浮標調查結果如報告書光碟表 1-2 及圖 1-3 所示，觀測時間為 16:20～19:33，觀測時段為漲潮段，觀測時段中浮標共移動 2.54 km，淨移動 2.43 km，施測時段最大流速為 0.46 m/s (對應流向為 138°)，淨流流速為 0.21 m/s (對應流向為 156°)。浮標在出水口附近往南方漂移、流速介於 0.08~0.20 m/s，離施放點 500 公尺後轉往南南東向、流速介於 0.12~0.26 m/s，離施放點 1500 公尺後轉往東南向，流速略有增加，流速介於 0.30~0.46 m/s。浮標初施放時水溫 30.0°C，漲潮段往南-南南東方漂流，離施放點 500 公尺溫度降為 26.5°C，離施放點 1000 公尺溫度降至 26.1°C，由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於漲潮時段於南側約為距排放口 500 m 之內 (背景溫度約為 25.0°C)。

民國 110 年 8 月 13 日第 3 次漂流浮標調查結果如報告書光碟表 1-3 及圖 1-4 所示，觀測時間為 12:35～15:49，觀測時段為退潮段，觀測時段中浮標共移動 2.37 km，淨移動 0.76 km，施測時段最大流速為 0.41 m/s (對應流向為 217°)，淨流流速為 0.07 m/s (對應流向為 61°)。漂流浮標離出水口後往東方漂移、流速約 0.32 m/s，隨即轉往東北方漂流、流速介於 0.09～0.39 m/s，離施放點 1300 公尺後依逆時鐘方向先轉往北，再轉往西，續轉往西南西方漂流、流速介於 0.05～0.12 m/s，觀測後段偏向西南向漂流，流速略有增加，流速介於 0.25~0.41 m/s。浮標初施放時水溫 30.4°C，退潮段往東北方漂流，離施放點 500 公尺溫度降為 29.0°C，離施放點 1000 公尺溫度維持 28.9°C，由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於退潮時段於東北側約為距排放口 500 m 之內 (背景溫度約為 27.5°C)。

民國 110 年 11 月 18 日第 4 次漂流浮標調查結果如報告書光碟表 1-4 及圖 1-5 所示，觀測時間為 10:50～14:00，觀測時段為大潮漲潮段，觀測時段中浮標共移動 2.74 km，淨移動 2.50 km，施測時段最大流速為 0.48 m/s (對應流向為 212°)，淨流流速為 0.22 m/s (對應流向為 201°)。浮標在出水口附近往東南方漂移、流速介於 0.10~0.15

m/s，離施放點 350 公尺後轉往西南偏南南西南方流動，流速略有增加，流速介於 0.20~0.48 m/s。由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於漲潮時段於西南側約為距排放口 400 m 之內。

民國 111 年 3 月 5 日第 1 次漂流浮標結果如報告書光碟表 1-5 及圖 1-6 所示，觀測時間為 08:57～12:14，觀測時段為大潮退潮段，觀測時段中浮標共移動 4.45 km，淨移動 4.00 km，施測時段最大流速為 0.57 m/s (對應流向 147°)、淨流流速為 0.34 m/s (對應流向 192°)。浮標在出水口附近往南方流動、流速介於 0.25 ~0.36 m/s，離出水口後往南南西方漂移、流速介於 0.32 ~0.50 m/s，出貓鼻頭後，浮標轉往西南方流動、流速介於 0.50 ~0.57 m/s，之後漂流流型略呈逆時針方向流動，轉往南方再轉往南南東方，流速約 0.22~0.50 m/s。由溫度計紀錄可知，溫排水影響範圍於大潮退潮段約為距排放口 550 m 以內 (背景溫度約為 25.3°C)。

民國 111 年 5 月 20 日第 2 次漂流浮標結果如報告書光碟表 1-6 及圖 1-7 所示，觀測時間為 05:52～09:06，觀測時段為漲潮段，觀測時段中浮標共移動 2.27 km，淨移動 1.91 km，施測時段最大流速為 0.42 m/s (對應流向 22°)、淨流流速為 0.16 m/s (對應流向 57°)。浮標在出水口附近往東南方漂移、流速約 0.12~0.30 m/s，離出水口 500 公尺後續往東方流動、流速約 0.15~0.28m/s，離出水口 900 公尺後續轉往東北向、流速介於 0.17 ~0.30 m/s，後轉往北北東方流動、流速介於 0.30 ~0.42 m/s。由溫度計紀錄可知，溫排水影響範圍於中潮漲潮時段於東側約為距排放口 700 m 之內。

民國 111 年 7 月 22 日第 3 次漂流浮標結果如報告書光碟表 1-7 及圖 1-8 所示，觀測時間為 05:39～08:44，觀測時段為小潮退潮段，觀測時段中浮標共移動 2.39 km，淨移動 2.18 km，施測時段最大流速為 0.57 m/s (對應流向 152°)、淨流流速為 0.20 m/s (對應流向 159°)。浮標在出水口附近先往東南方漂移、流速介於 0.14~0.57 m/s，離施放點 400 公尺後轉往南方流動、流速介於 0.16~0.27 m/s，離施放點 1300 公尺後轉往

南南東向、流速介於 0.19~0.22 m/s，離施放點 1900 公尺後轉往東南方流動、流速介於 0.18~0.30 m/s。浮標初施放時水溫 32.8°C，小潮退潮段往南-南南東方漂流，離施放點 500 公尺溫度降為 30.4°C，離施放點 1000 公尺溫度降至 30.1°C，由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於小潮退潮時段於南側約為距排放口 600 m 之內。

民國 111 年 11 月 12 日第 4 次漂流浮標結果如報告書光碟表 1-8 及圖 1-9 所示，觀測時間為 13:41～16:57，觀測時段為大潮漲潮段，觀測時段中浮標共移動 1.77 km，淨移動 1.41 km，施測時段最大流速為 0.29 m/s (對應流向 142°)、淨流流速為 0.12 m/s (對應流向 47°)。浮標在出水口附近往東南東方漂移、流速約 0.14~0.29 m/s，離出水口 300 公尺後續往東方流動、流速約 0.15~0.28 m/s，離出水口 650 公尺後續轉往東北向、流速介於 0.14 ~0.20 m/s，後轉往北北東偏北流動、流速介於 0.15 ~0.22 m/s。浮標初施放時水溫 32.5°C，離施放點 500 公尺溫度降為 28.0°C，離施放點 1000 公尺溫度降至 27.4°C，由溫度計紀錄可知，溫排水影響範圍於大潮漲潮時段於東側約為距排放口 600 m 之內。

4.2 定點海流連續調查結果

110 年度第 1 次調查於民國 109 年 12 月 24 日開始，研究人員將水下超音波式海流儀安置於出水口東南方約 200 m 處海底，該處水深 28 m，儀器錨碇於底床，民國 110 年 2 月 20 日收回；第 2 次調查自民國 110 年 2 月 20 日起至 110 年 4 月 15 日止；第 3 次調查自民國 110 年 4 月 15 日起至 110 年 8 月 19 日止 (7 月 20 日至 8 月 19 日資料無效)；第 4 次調查自民國 110 年 8 月 19 日至 110 年 11 月 18 日止，其間於璨樹颱風過後，請當地潛水員儀器站狀況，通報 9 月 16 日潛水時發現儀器架傾倒，隨即幫忙扶正，內業分析發現民國 110 年 9 月 9 日至 110 年 9 月 16 日資料無效，現場資料分成第 4 次調查民國 110 年 8 月 19 日至 110 年 9 月 9 日及第 5 次調查民國 110 年 9 月 16 日至 110 年 11 月 18 日兩段資料分析。民國 111 年完成四次調查，民國 110

年 11 月 18 日至 111 年 1 月 15 日間進行 111 年第 1 次調查，民國 111 年 1 月 15 日至 111 年 4 月 21 日調查時段，其中民國 111 年 3 月 14 日有資料錯謬無法使用，現場資料分成第 2 次調查民國 111 年 1 月 15 日至 111 年 3 月 14 日及第 3 次調查民國 111 年 3 月 14 日至 111 年 4 月 21 日兩段資料進行分析，民國 111 年 7 月 13 日至 111 年 11 月 10 日間進行第 4 次調查，111 年 11 月 10 日重新佈放儀器，目前儀器持續施放中。

110 年第 1 次定點海流調查分析結果定點海流調查結果如圖 1-10、1-11、1-12、1-13、1-14、1-15，詳見報告書光碟。調查結果顯示漲潮時海流往西南-西南西流動，退潮時則朝東北-北北東流動，漲潮流速明顯大於退潮流速，因此漲退潮後將產生西南向之淨流，圖 1-13 流速流向散佈及圖 1-14 流速向量進行圖亦顯示恆流向西南。平均流流速為 0.08 m/s，平均流向為 229°，施測時段最大流速為 1.44 m/s、流向為 48° 朝東北退潮段。圖 1-12 海流玫瑰圖 (亦附於本文中) 顯示，流向以西南 (SW) 佔 31.16%最多，其次為東北 (NE) 佔 20.01%，南南西 (SSW) 佔 8.95%居第 3、北北東 (NNE) 佔 8.36%居第 4、西南西 (WSW) 佔 7.83%居第 5，其餘方向皆在 5%以下。連續水溫變化附於圖 1-10 調查期間溫度介於 18.1°C 至 25.1°C 之間，平均溫度約為 22.9°C。潮流部分之調和分析結果如表 1-9 及圖 1-15，主要分潮以 K_1 分潮最大 (半長軸 0.30 m/s)，M_2 分潮次之 (半長軸 0.22 m/s)，O_1 潮再次之第 3 (半長軸 0.19 m/s)，S_2 潮再次之第 4 (半長軸 0.04 m/s)，潮流變化屬全日潮型。




圖 1-12 定點海流調查海流玫瑰圖 (民國 109 年 12 月 24 日～110 年 2 月 20 日)

110 年第 2 次定點海流調查分析結果定點海流調查結果如圖 1-10、1-11、1-12、1-13、1-14、1-15，詳見報告書光碟。調查結果與第 1 次結果相似，漲潮時海流往西南-西南西流動，退潮時則朝東北-北北東流動，漲潮流速明顯大於退潮流速，形成西南向之淨流，平均流流速為 0.14 m/s，平均流向為 235°，最大流速為 1.11 m/s、流向為 225°朝西南漲潮段。圖 1-12 海流玫瑰圖顯示，流向以西南 (SW) 佔 33.70%最多，其次為西南西 (WSW) 佔 16.11%，東北 (NE) 佔 11.43%居第 3、南南西 (SSW) 佔 7.64%居第 4、北北東 (NNE) 佔 5.88%居第 5、西 (W) 佔 5.75%居第 6，其餘方向皆在 5%以下。連續水溫變化附於圖 1-10，調查期間溫度介於 19.3°C 至 26.9°C 之間，平均溫度約為 23.9°C。潮流部分之調和分析結果如報告書光碟表 1-10 及圖 1-15，主要分潮以 M_2 分潮最大 (半長軸 0.19 m/s)，K_1 潮次之 (半長軸 0.16 m/s)，O_1 潮再次之第 3 (半長軸 0.12 m/s)，S_2 潮再次之第 4 (半長軸 0.06 m/s)，潮流變化屬偏全日潮之混合潮型。

110 年第 3 次定點海流調查分析結果定點海流調查結果如圖 1-10、1-11、1-12、1-13、1-14、1-15，詳見報告書光碟。調查結果與第 1 次結果相似，漲潮時海流往西

南-西南西流動，退潮時則朝東北-北北東流動，漲潮流速明顯大於退潮流速，形成西南向之淨流，平均流流速為 0.18 m/s，平均流向為 232°，最大流速為 1.16 m/s、流向為 239°朝西南漲潮段。圖 1-12 海流玫瑰圖顯示，流向以西南 (SW) 佔 28.59%最多，其次為西南西 (WSW) 佔 16.78%，南南西 (SSW) 佔 14.47%居第 3、東北 (NE) 佔 7.31%居第 4、西 (W) 佔 6.56%居第 5、北北東 (NNE) 佔 6.22%居第 6，其餘方向皆在 5%以下。連續水溫變化附於圖 1-10，調查期間溫度介於 18.5°C 至 29.1°C 之間，平均溫度約為 24.7°C。潮流部分之調和分析結果如報告書光碟表 1-11 及圖 1-15，主要分潮以 M_2 分潮最大 (半長軸 0.13 m/s)，O_1 潮次之 (半長軸 0.13 m/s)，K_1 潮再次之第 3 (半長軸 0.12 m/s)，S_2 潮再次之第 4 (半長軸 0.06 m/s)，潮流變化屬偏全日潮之混合潮型。

110 年第 4 次定點海流調查分析結果定點海流調查結果如圖 1-10、1-11、1-12、1-13、1-14、1-15，詳見報告書光碟。調查結果於漲潮時海流往西南-西南西流動，退潮時則朝東北-北北東流動，漲潮流速明顯大於退潮流速，形成西南向之淨流，平均流流速為 0.19 m/s，平均流向為 232°，最大流速為 0.98 m/s、流向為 227°朝西南漲潮段。圖 1-12 海流玫瑰圖顯示，流向以西南 (SW) 佔 35.93%最多，其次為西南西 (WSW) 佔 15.04%，南南西 (SSW) 佔 14.57%居第 3、北北東 (NNE) 佔 6.95%居第 4、東北 (NE) 佔 6.38%居第 5，其餘方向皆在 5%以下。連續水溫變化附於圖 1-10，調查期間溫度介於 24.0°C 至 29.7°C 之間，平均溫度約為 28.5°C。潮流部分之調和分析結果如報告書光碟表 1-12 及圖 1-15，主要分潮以 K_1 潮最大 (半長軸 0.18 m/s)，M_2 次之 (半長軸 0.17 m/s)，O_1 潮再次之第 3 (半長軸 0.12 m/s)，S_2 潮再次之第 4 (半長軸 0.07 m/s)，潮流變化屬全日潮潮型。

110 年第 5 次定點海流調查分析結果定點海流調查結果如圖 1-10、1-11、1-12、1-13、1-14、1-11，詳見報告書光碟。調查結果於漲潮時海流往西南-西南西流動，退潮時則朝東北-北北東流動，漲潮流速明顯大於退潮流速，形成西南向之淨流，平均流流速為 0.15 m/s，平均流向為 237°，最大流速為 1.12 m/s、流向為 46°朝東北小潮漲潮段。圖 1-12 海流玫瑰圖顯示，流向以西南 (SW) 佔 28.25%最多，其次為西南西 (WSW) 佔 17.70%，南南西 (SSW) 佔 10.48%居第 3、東北 (NE) 佔 8.93%居第 4、西 (W) 佔 7.47%居第 5、北北東 (NNE) 佔 7.03%居第 6，其餘方向皆在 5%以下。連續水溫變化附於圖 1-10，調查期間溫度介於 20.1°C 至 30.1°C 之間，平均溫度約為 27.2°C。潮流部分之調和分析結果如報告書光碟表 1-13 及圖 1-15，主要分潮以 M_2 潮最大 (半長軸 0.14 m/s)，K_1 次之 (半長軸 0.09 m/s)，O_1 潮再次之第 3 (半長軸 0.09 m/s)，S_2 潮再次之第 4 (半長軸 0.07 m/s)，潮流變化屬混合潮潮型。

111 年第 1 次定點海流調查分析結果定點海流調查結果如圖 1-10、1-11、1-12、1-13、1-14、1-15，詳見報告書光碟。調查結果顯示漲潮時海流往西南-西南西流動，退潮時則朝東北-北北東流動，漲潮流速明顯大於退潮流速，因此漲退潮後將產生西南向之淨流，圖 1-13 流速流向散佈及圖 1-14 流速向量進行圖亦顯示恆流向西南。平均流流速為 0.11 m/s，平均流向為 245°，施測時段最大流速為 1.33 m/s、流向為 49°朝東北退潮段。圖 1-12 海流玫瑰圖顯示，流向以西南 (SW) 佔 25.32%最多，其次為西南西 (WSW) 佔 17.84%，東北 (NE) 佔 11.56%居第 3、西(W)佔 7.92%居第 4、北北東 (NNE) 佔 7.34%居第 5、南南西 (SSW)佔 7.32%居第 6，其餘方向皆在 5%以下。連續水溫變化附於圖 1-10 調查期間溫度介於 16.8°C 至 26.5°C 之間，平均溫度約為 24.0°C。潮流部分之調和分析結果如表 1-14 及圖 1-15，主要分潮以 K_1 分潮最大 (半長軸 0.14 m/s)，M_2 分潮次之 (半長軸 0.13 m/s)，O_1 潮再次之第 3 (半長軸 0.10 m/s)，S_2 潮再次之第 4 (半長軸 0.07 m/s)，潮流變化屬偏全日潮之混合潮型。

111 年第 2 次定點海流調查分析結果定點海流調查結果如圖 1-10、1-11、1-12、1-13、1-14、1-15，詳見報告書光碟。調查結果與第 1 次結果相似，漲潮時海流往西南-西南西流動，退潮時則朝東北-北北東流動，漲潮流速明顯大於退潮流速，形成西南向之淨流，平均流流速為 0.15 m/s，平均流向為 240°，最大流速為 1.01 m/s、流向為 43°朝東北退潮段。圖 1-12 海流玫瑰圖顯示，流向以西南 (SW) 佔 31.03%最多，其次為西南西 (WSW) 佔 16.61%，東北 (NE) 佔 9.40%居第 3、北北東 (NNE) 佔 8.12%居第 4、西 (W) 佔 7.15%居第 5、南南西 (SSW) 佔 6.14%居第 6，其餘方向皆在 5%以下。連續水溫變化附於圖 1-10，調查期間溫度介於 20.4°C 至 25.7°C 之間，平均溫度約為 24.3°C。潮流部分之調和分析結果如報告書光碟表 1-15 及圖 1-15，主要分潮以 M_2 分潮最大 (半長軸 0.18 m/s)，K_1 潮次之 (半長軸 0.16 m/s)，O_1 潮再次之第 3 (半長軸 0.11 m/s)，S_2 潮再次之第 4 (半長軸 0.05 m/s)，潮流變化屬偏全日潮之混合潮型。

110 第 3 次定點海流調查分析結果定點海流調查結果如圖 1-10、1-11、1-12、1-13、1-14、1-15，詳見報告書光碟。調查結果與第 1 次結果相似，漲潮時海流往西南-西南西流動，退潮時則朝東北-北北東流動，漲潮流速明顯大於退潮流速，形成西南向之淨流，平均流流速為 0.20 m/s，平均流向為 232°，最大流速為 0.96 m/s、流向為 227°朝西南漲潮段。圖 1-12 海流玫瑰圖顯示，流向以西南 (SW) 佔 34.80%最多，其次為西南西 (WSW) 佔 17.93%，南南西 (SSW) 佔 10.00%居第 3、西 (W) 佔 6.95%居第 4、東北 (NE) 佔 6.60%居第 5、北北東 (NNE) 佔 5.61%居第 6，其餘方向皆在 5%以下。連續水溫變化附於圖 1-10，調查期間溫度介於 20.2°C 至 27.3°C 之間，平均溫度約為 25.2°C。潮流部分之調和分析結果如報告書光碟表 1-16 及圖 1-15，主要分潮以 M_2 分潮最大 (半長軸 0.18 m/s)，O_1 潮次之 (半長軸 0.13 m/s)，S_2 潮再次之第 3 (半長軸 0.11 m/s)，K_1 再次之第 4 (半長軸 0.07 m/s)，潮流變化屬偏半日潮之混合潮型。

110 第 4 次定點海流調查分析結果定點海流調查結果如圖 1-10、1-11、1-12、1-13、1-14、1-15，詳見報告書光碟。調查結果於漲潮時海流往西南-西南西流動，退潮時則朝東北-北北東流動，漲潮流速明顯大於退潮流速，形成西南向之淨流，平均流流速為 0.19 m/s，平均流向為 232°，最大流速為 0.98 m/s、流向為 227°朝西南漲潮段。圖 1-12 海流玫瑰圖顯示，流向以西南 (SW) 佔 31.61%最多，其次為西南西 (WSW) 佔 15.43%，南南西 (SSW) 佔 12.93%居第 3、東北 (NE) 佔 7.49%居第 4、西 (W) 佔 6.64%居第 5、北北東 (NNE) 佔 6.30%居第 6，其餘方向皆在 5%以下。連續水溫變化附於圖 1-10，調查期間溫度介於 24.0°C 至 29.7°C 之間，平均溫度約為 28.5°C。潮流部分之調和分析結果如報告書光碟表 1-17 及圖 1-15，主要分潮以 M_2 潮最大 (半長軸 0.14 m/s)，O_1 次之 (半長軸 0.10 m/s)，K_1 潮再次之第 3 (半長軸 0.09 m/s)，S_2 潮再次之第 4 (半長軸 0.06 m/s)，潮流變化屬混合潮型。

4.3 水文調查結果

4.3.1 溫鹽度分佈

溫鹽調查結果之溫鹽分佈如圖 1-16～圖 1-25，詳見報告書光碟。圖 1-18 顯示民國 110 年第一次溫鹽調查結果 (民國 110 年 1 月 23 日) 整體水溫介於 22.7°C～27.3°C 之間，鹽度介於 34.01～34.50 之間；表層 1m 水溫為 23.0°C～27.3°C，鹽度介於 34.01～34.50，水深 1 m 之表層溫度在距排放口 500 m 內大於 25.5°C，表層 5m 水溫為 23.0°C～25.3°C，鹽度介於 34.08～34.38；整體鹽度值於出水口附近 1000m 內變化較大，其餘水深水層平面變化不大；溫度分佈則至水深 10 m 水層以下整體水溫已在 23.5°C 以下、已不見溫排水訊息。

110 年 4 月時，氣溫逐漸升高，圖 1-19 (亦附於本文中) 顯示 110 年第二次調查結果 (民國 110 年 4 月 15 日) 整體水溫為 22.0°C～28.8°C，鹽度介於 33.80～34.79，表

層 1m 水溫為 24.7°C～28.8°C，鹽度介於 33.80～34.19，表層 1 m 水溫較 110 年 2 月略有上昇，排水口附近水溫亦相對地上升至 27°C 以上，表層 5m 水溫則上昇至 24.5°C～28.0°C，鹽度介於 33.94～34.66；水深 5 m 以下水層溫度分佈即不見溫排水水團訊息，即溫排水之影響在垂直方向上，水深 10 m 水層以下整體水溫已在 26.8°C 以下、溫排水訊息仍侷限於表層水深 1～10 m 以內。




圖 1-19 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 4 月 15 日水深 5m 水溫與鹽度分佈

110 年 8 月時，氣溫再次升高，圖 1-20 顯示 110 第三次調查結果 (民國 110 年 8 月 12 日) 整體水溫為 23.0°C～31.5°C，鹽度介於 32.67～34.32，表層 1 m 水溫為 27.2°C～31.5°C，鹽度介於 32.67～33.41，表層 1 m 水溫較 110 年 5 月明顯上昇，排水口附近水溫亦相對地上升至 29°C 以上，表層 5m 內水溫則上昇至 25.8°C～29.0°C，鹽度介於 32.98～33.75；至水深 10 m 水層以下整體水溫已在 27.8°C 以下，溫排水訊息於溫度分佈中不明顯，即溫排水之影響在垂直方向上，仍侷限於表層水深 1～10 m 以內。

110 年 11 月時，氣溫逐漸下降，圖 1-21 顯示 110 第四次調查結果 (民國 110 年 11 月 10 日) 整體水溫為 24.0°C～29.6°C，鹽度介於 33.63～34.19，表層 1 m 水溫較 110 年 8 月明顯下降，排水口附近水溫亦相對地下降至 27 以上，表層 1 m 水溫為 25.4°C～29.6°C，鹽度介於 33.63～34.04，表層下 5m 水溫為 25.5°C～26.7°C，鹽度介於 33.72～34.03；至水深 5 m 以下水層整體水溫已在 26.8°C 以下，溫排水訊息於溫度分佈中不明顯，即溫排水之影響在垂直方向上，仍侷限於表層水深 1～5 m 以內。

圖 1-22 顯示民國 111 年第一次溫鹽調查結果 (民國 111 年 2 月 16 日) 整體水溫介於 24.5°C～29.7°C 之間，鹽度介於 33.47～34.58 之間；表層 1m 水溫為 24.5°C～29.6°C，鹽度介於 33.47～34.58，水深 1 m 之表層溫度在距排放口 500 m 內大於 26.0°C，表層 5m 水溫為 24.8°C～28.5°C，鹽度介於 33.80～34.46；整體鹽度值於出水口附近 1000m 內變化較大，其餘水深水層平面變化不大；溫度分佈至水深 10 m 水層以下整體水溫已在 26.2°C 以下、已不見溫排水訊息。

111 年 5 月時，氣溫逐漸升高，圖 1-23 顯示 111 年第二次調查結果 (民國 111 年 5 月 11 日) 整體水溫為 21.3°C～29.5°C，鹽度介於 33.87～34.53，表層 1m 水溫為 26.7°C～29.5°C，鹽度介於 33.94～34.33，表層 1 m 水溫較 111 年 2 月略有上昇，排水口附近水溫亦相對地上升至 28°C 以上，表層 5m 水溫則上昇至 25.0°C～27.6°C，鹽度介於 33.87～34.53；水深 10 m 水層以下整體水溫已在 26.9°C 以下、溫度分佈已無法分辨溫排水水團訊息，即溫排水之影響在垂直方向上，仍侷限於表層水深 1～10 以內。

111 年 8 月時，氣溫再次升高，圖 1-24 顯示 111 年第三次調查結果 (民國 111 年 8 月 12 日) 整體水溫為 21.8°C～30.4°C，鹽度介於 32.69～34.26，表層 1 m 水溫為 27.6°C～30.2°C，鹽度介於 32.69～33.85，表層 1 m 水溫較 111 年 5 月略有上昇，灣內溫度整體上升至 29°C 以上，表層 5m 內水溫則上昇至 26.2°C～30.1°C，鹽度介於 33.34～34.10，灣內近岸附近溫度仍在 29°C 以上，相對溫排水口附近溫度溫度在 28.4°C 以下、相對較低：水深 10m 水層體以下整體水溫已在 29.8°C 以下，溫排水口附近溫度溫度在 26.0°C 以下、溫排水訊息於溫度分佈中已不明顯，即溫排水之影響在垂直方向上，仍侷限於表層水深 1～10 m 以內。

110 年 11 月時，氣溫逐漸下降，圖 1-25 顯示 111 年第四次調查結果 (民國 111 年 11 月 17 日) 整體水溫為 22.9°C～30.6°C，鹽度介於 33.41～34.12，表層 1 m 水溫較 111 年 8 月明顯下降，排水口外圍水溫亦相對地下降至 28°C 以上，表層 1 m 水溫為

25.7°C～30.6°C，鹽度介於 33.41～33.79，表層下 5m 水溫為 25.7°C～27.7°C，鹽度介於 33.66～33.82；溫度分佈則至水深 10 m 水層以下整體水溫已在 26.2°C 以下、已不見溫排水訊息。

由歷年溫鹽調查資料中距出水口約 1500m 的 C11、C12 及 C16 三點資料平均值視為背景溫度，出水口至前述 3 點之方向線上距出水口 500m 處之點位溫度 (92～111 年由平面分布圖中內插得到，110 年開始實際量測)，500m 處之點位溫度減背景溫度可得距出水口 500m 處溫昇變化如圖 1-26 (詳細溫昇數據詳表 1-18)，依據行政院環境保護署水污染防治法於民國 108 年 04 月 29 日訂定修正之「放流水標準」中附表六發電廠放流水水質項目及限值有關水溫部分，放流水直接排放於海洋者，其放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過背景溫度攝氏四度。圖 1-26 中顯示歷年調查結果 500m 處溫昇大多在 2°C 之內，且皆小於 4°C。




圖 1-26 第三核能發電廠附近海域歷年距出水口 500m 處溫昇變化圖

4.3.2 水團分析

據前人調查研究，南灣海域水團可能受 3 種以上不同水團影響，然而應不脫離以黑潮水和南海水為主的交換。簡言之，1 月的溫鹽值所代表的水團比較偏黑潮典型水 (黑潮南海分支水)；2 月時海水鹽度降低，由此以後溫度則逐漸上升，水團性質漸趨南海水。這種水團衍變的趨勢，以及發生 ENSO 時第三核能發電廠附近海域水團性質的變異，在子計畫 2 中有更詳細的分析。

4.4 歷年調查結果探討

4.4.1 漂流浮標

本報告將第三核能發電廠附近海域民國 87～110 年度漂流浮標追蹤調查結果(整理如表 1-19 詳見報告書光碟)，由表中漂流軌跡顯示漲潮流從出水口流向西南或往正南流，大約與貓鼻頭沿岸地形相平行，繞過貓鼻頭，往西再沿海岸往西北走，或繞過貓鼻頭後，繼續偏南或西南走，若能進入第三核能發電廠附近海域外緣海域，則順退潮水轉往東流動。漲潮流時釋放，浮標若隨漲潮流漂向南或東南，則將轉往南-東南向流動，若於灣內，則流速不大，若離海岸影響範圍則流速增大可達 2 節 (1 m/s) 以上。

退潮時往東流或東北流再回流至出水口岸邊或到達後壁湖港口東方，過後壁湖港口東方之後則沿著港口附近的潮間帶地形再轉往西北方流動，最後會到達後壁湖漁港東北方淺灘區；退潮時段往東流或往東北流後若再轉往東南方流動，則有往鵝鑾鼻直流之趨勢；退潮時段若往西南或東南方向流後則有轉往南方或轉往東方流動之趨勢。

4.4.2 定點海流

由民國 86 年 10 月至 111 年 11 月共 148 次之海流觀測，其中自民國 89 年 9 月 17 日開始將海流測站由進出水口中間東側往南移到出水口東南方約 300 公尺處。所得到之平均流速與流向結果如報告書光碟表 1-20 所示；由前 11 次觀測結果顯示，在出入水口中間位置之測站，其中層海流淨流流向除第 3 及第 5 次外皆有朝北之分量；將測站往南移到出水口東南方 300 公尺處，如第 12 次至第 148 次海流觀測，海流即變成以流向南南西方或西南方為主要流向之海流，由此判斷溫排水可順著淨流往西南方及正東方向輸送，不致於迴流至入水口。

4.4.3 水文分佈

報告書光碟表 1-21 歷年來針對 CTD 所作之 114 次調查研究，將歷年來調查結果以 4 季 (春、夏、秋、冬) 及 3 種水團屬性 (南海中鹽水團、混合水團及黑潮水團) 區分。歷年來在春季共調查 34 次，夏季 24 次，秋季 31 次，冬季 25 次，4 季共調查 114 次，其中以混合水團共出現 99 次 (較多) 及 14 次 (稀疏) 為最多；其次為南海中鹽水團，共出現 21 次 (較多) 及 398 次 (稀疏) 次之，而以黑潮水團 8 次 (較多) 及 12 次 (稀疏) 較少。可見本區海域受南海中鹽水入侵而與沿岸低鹽水及黑潮水團混合而成獨立之混合水團為主要之水團型式。

綜言之，本區海域以南海水團混合當地沿岸低鹽水及局部黑潮水所形成之混合水團為主 (全年皆有)，南海水團次之 (春末、夏季為強)，而黑潮水團，只在春、夏兩季入侵，秋季甚少入侵，冬季則偶然有機會入侵本海域或沉降於本區海域較下層。但依據范光龍教授之調查分析，本區外海之海水於約 50 m 處有分層現象，且常以內波方式使其密度界面上升至 20 公尺以上而入侵第三核能發電廠附近海域，或形成湧升流，更增加本海域溫鹽性質之複雜性。

4.4.4 流場綜合分析

報告書光碟表 1-22 為第三核能發電廠附近海域海潮流歷年調查結果摘要整理結果。根據吳重坤教授民國 82 年至 86 年的調查結果，第三核能發電廠附近海域水團特性的季節變化非常明顯，整體來說混合水團 1 年 4 季都存在。秋季第三核能發電廠附近海域的水團鹽度較低而溫度較高，冬季及春初，第三核能發電廠附近海域的水團鹽度較高而溫度較低。漂流軌跡顯示漲潮流從出水口流向西南，大約與貓鼻頭沿岸地形相平行。此種往外流的軌跡可初分為兩大類。第 1 類是從出水口沿著海岸地形一路往西南，繞過貓鼻頭，往西再往西北，指向白沙海域。第 2 類是從出水口沿著海岸地形一路往西南，過了貓鼻頭後，繼續偏南或西南走，到了 21.9°N 附近，接上第三核能發電廠附近海域外緣海域的退潮水往東，漂流軌跡呈 L 型。退潮流比較單純，從出水口處開始往東北流，到了後壁湖港口東方，則沿著港口附近的潮間帶地形，轉向北再轉向西北。

沈建全教授民國 86 年至 91 年調查結果顯示，第三核能發電廠附近海域漂流浮標調查顯示各季在漲潮時海流往西南流，或往正南流，有繞過貓鼻頭之勢；退潮時往東流或東北流，夏季退潮有往鵝鑾鼻直流之趨勢，部份測次如民國 86 年冬季 2 月 28 日則在退潮時有回流至出水口岸邊之情形發生。海流流速在各季大體皆以漲潮流速大於退潮流速，亦即整體水質量有往西南繞過貓鼻頭往南灣外輸送之趨勢。定點海流觀測於民國 89 年下半前施放於出水口東北方 1.5 km 處，其漲退潮時之流向頗不規則，且與漂流浮標所測得結果並不一致，之後定點長期海流移至出水口東南 300 m 處，長期海流觀測結果皆往西南或南南西流動，有利溫排水往海域外擴散，溫水舌亦大多往東及正南、西南擴散。

民國 92～111 年海流調查結果均顯示漂流浮標在漲潮時從出水口流向西南或往正南流，大約與貓鼻頭沿岸地形相平行，繞過貓鼻頭，往西流動；漲潮流時釋放，浮標若隨漲潮流漂向南或東南，則將轉往南-東南向流動，若於灣內，則流速不大，若離海岸影響範圍則流速增大可達 2 節 (1 m/s) 以上。漂流浮標退潮時段若往東南方向轉往西南流，若超出海灣範圍，若退潮段流速仍強，則轉為向東流動；退潮時往東流或東北流再回流至出水口岸邊或到達後壁湖港口東方後沿著港口附近的潮間帶地形再轉往西北方流動，到達後壁湖漁港東北方淺灘區；退潮時段往東流或往東北流後若再轉往東南方流動，則有往鵝鑾鼻直流之趨勢；退潮時段若往西南或東南方向流後則有轉往南方流動之趨勢；退潮時段若往東南方向轉往西南流，若無法出海灣，則將依逆時針方向流動後轉往東北向石牛溪方向流動；退潮時段若往東南方向轉往西南流，若超出海灣範圍，若退潮段流速仍強，則轉為向東流動，若退潮段流速已弱，則留滯或轉往西北向流動。

民國 92～111 年定點海流調查結果顯示出水口附近長期海流特性季節變化不大，淨流皆往西南流動，流速介於 0.05 m/s～0.24 m/s，流向介於 225°～245°，有利溫排水往西南方灣外擴散。潮流調和分析結果顯示主要分潮以 M_2 分潮、O_1 分潮、K_1 分潮及 S_2 分潮為主，潮型則以混合潮型為主、全日潮型次之。潮流主宰溫排水的擴散方向，漲潮時段溫水舌多往西南擴散，退潮時段往北北東-東方向擴散，受西南向淨流的作用，漲潮時溫水舌的擴張範圍較退潮時溫水舌大，溫排水擴散影響範圍約在距排水口 1000 m 弧內。

4.5 核三廠溫排水口附近長期水溫分析

為監測南灣水溫變化，受國科會計畫資助自民國 87 年開始在核三廠溫排水口南方約 1500 公尺、水深約 20 公尺之海底 (坐標：120.741°E，21.926°N) 置放了一個自記式溫度計 (Pace Scientific Ins., 型號 XR5-T)，長期記錄水溫變化，此溫度計的準確

度與解析度分別為 0.1 和 0.01°C，足以鑑別本海域每日動輒 1～2°C 以上的水溫變化。本期計畫取得民國 92 至 94 年逐時連續資料，另本計畫自 95 年以來在海流儀 CUR 點位亦同時記錄水溫變化，所有水溫資料進行統計分析，此外並向中央氣象局申購得後壁湖水位與蘭嶼風速、風向資料，以分析核三廠水溫變化和潮汐、風場及颱風的關係。

報告書光碟圖 1-27 (亦附於本文中) 民國 92 至 94 年逐時水溫曲線、同期後壁湖逐時水位曲線與蘭嶼每日平均風速、風向棍棒圖，其中水溫原始資料顯示本地點海溫變化複雜，較顯著的特徵包括：每日有一或兩次明顯的海溫變化，熱季 (5～10 月) 海溫日變化比冷季 (11～4 月) 大，年間每日最高溫約 30°C 最低溫約 19°C。由於溫排水比較輕，多半浮在海洋上層大約 5 m 以淺的表層，因此本溫度站反應的應該是不受溫排水影響的自然水溫變化。統計分析 95 至 110 年海溫資料如報告書光碟表 1-23，95～110 年期間之年均溫介於 25.04～26.29°C，年夏均溫 (5-10 月) 介於 26.15～27.46°C，年冬均溫 (11-4 月) 介於 23.75～25.31°C，期間日平均溫差介於 2.82～3.81°C，期間的最高溫紀錄為 31.02°C，發生在民國 109 年 7 月 23 日，最低溫紀錄為 15.66°C，發生在民國 98 年 12 月 31 日，單日最大溫差達 10.58°C，發生在民國 101 年 6 月 20 日。

每日的水溫變化和潮汐有密切關係，近年國內海洋學界亦發現呂宋 (巴士) 海峽以西至南海北部有很大的海洋內潮、內波，這些內潮、波造成的等溫面垂直起伏可高達 150 m (Yang et al., 2004)。根據 Jan and Chen (2009) 的研究指出，這種潮週的水溫陡降和臨近呂宋海峽中因潮流通過海脊引發的內潮傳入南灣，有密切關係。該研究亦指出，每回內潮傳入南灣所造成冷水湧升，也會將富含營養鹽的次表層水帶到表層，可能有利珊瑚的生長。




圖 1-27 民國 92 至 94 年逐時水溫曲線(上)、同期後壁湖逐時水位曲線(中)與蘭嶼每日平均風速、風向棍棒圖(下)

對水溫原始資料進行 3 天 (72 小時) 週期的低通過濾處理以濾除和潮汐週期相關的海溫震盪，報告書光碟圖 1-27(a) 中白色歷線即為低通過濾後的海溫變化，這部分的變化亦為夏季大於冬季，變動週期在 1～4 週間，其原因可能和某些路徑類型的颱風經過台灣附近造成的海溫垂直變化與水平流場變動有關，例如民國 93 年 6 月底由南而北的敏督利颱風 (報告書光碟圖 1-27 中 2) 過後，即可能造成大幅的降溫事件，

其餘尹布都 (報告書光碟圖 1-27 中 1)、蘭寧 (報告書光碟圖 1-27 中 3)、艾莉 (報告書光碟圖 1-27 中 4)、海棠 (報告書光碟圖 1-27 中 5)、瑪莎 (報告書光碟圖 1-27 中 6) 和泰利 (報告書光碟圖 1-27 中 7) 颱風，是這三年中幾個可能和核三廠海域溫降有關的颱風，其原因可能和颱風經過期間或過後引起的西南氣流在南灣西邊海岸造成冷水湧升現象有關。核三廠海域的水溫變化受颱風的影響狀況，由 97 年 9、10 月間及 99 年 8 月間水溫紀錄變化和颱風的關係 (報告書光碟圖 1-28 窺知一二，97 年間辛樂克、哈克比及薔蜜三個颱風來襲期間皆有造成大幅的降溫事件，而 98 年 8 月上旬莫拉克颱風來襲更有明顯的大幅的降溫事件，其前後水溫差異可達 9°C。其實颱風在核三廠海域造成的溫降過程可能非常複雜，包括表水冷卻、近岸冷水湧升、黑潮與南海北部環流的互動等等，其細節除了和颱風經過期間或過後引起的西南氣流在南灣西邊海岸造成冷水湧升現象有關，也跟颱風的強烈風應力直接作用在海面上，提供紊流耗散能量，引起上下水層垂直混合有關；此外，颱風前的南灣水層分層條件、混合層厚度、躍溫層深度也深深影響南灣表水對颱風吹襲作用的反應，薄的混合層受颱風風應力作用較容易被深化，躍溫層強度下降、深度變深，表水溫度下降，反之則降溫幅度較不顯著。

五、結論

110 年四次漂流浮標及溫度調查結果，民國 110 年 1 月 22 日第 1 次調查為小潮退潮段，漂流時段最大流速為 0.48 m/s (對應流向 56°)、淨流流速為 0.35 m/s (對應流向 88°)，浮標於退潮時段離出水口後先往東北東-東北方流動，流速約 0.40～0.48 m/s，漂流 2.50 km 後轉為向東方漂流，隨即平行海岸轉往東南方流動，流速約 0.32～0.43 m/s。民國 110 年 4 月 16 日第 2 次調查為漲潮段，施測時段最大流速為 0.46 m/s (對應流向為 138°)，淨流流速為 0.21 m/s (對應流向為 156°)，浮標在出水口附近往南方漂移，離施放點 500 公尺後轉往南南東向，離施放點 1500 公尺後轉往東南向，流速略有增加，流速介於 0.30~0.46 m/s。民國 110 年 8 月 13 日第 3 次調查時段為退潮段，施測時段最大流速為 0.41 m/s (對應流向為 217°)，淨流流速為 0.07 m/s (對應流向為 61°)，漂流浮標離出水口後往東方漂移，隨即轉往東北方漂流，離施放點 1300 公尺後依逆時鐘方向先轉往北，再轉往西，續轉往西南西方漂流，觀測後段偏向西南向漂流，流速略有增加，流速介於 0.25~0.41 m/s。民國 110 年 11 月 18 日第 4 次調查時段為大潮漲潮段，施測時段最大流速為 0.48 m/s (對應流向為 212°)，淨流流速為 0.22 m/s (對應流向為 201°)，漂流浮標離出水口後往東南方漂移，流速介於 0.10~0.15 m/s，離施放點 350 公尺後轉往西南偏南南西南方流動，流速略有增加，流速介於 0.20~0.48 m/s。

111 年四次漂流浮標及溫度調查結果，民國 111 年 3 月 5 日第 1 次漂流浮標調查時段為大潮退潮段，共移動 4.45 km，淨移動 4.00 km，漂流時段最大流速為 0.57 m/s (對應流向 147°)、淨流流速為 0.34 m/s (對應流向 192°)，浮標於退潮時段離出水口後先往南方流動，隨即轉往南南西，之後漂流流型略呈逆時針方向流動，轉往南方再轉往南南東方。由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於退潮時段於南側約為距排放口 550 m 之內。民國 111 年 5 月 20 日第 2 次漂流浮標調查時段為漲潮段，浮標共

移動 2.77 km，淨移動 1.91 km，施測時段最大流速為 0.42 m/s (對應流向為 22°)，淨流流速為 0.16 m/s (對應流向為 57°)，浮標在出水口附近往東南方漂移，離施放點 500 公尺後轉往東向，離施放點 900 公尺後轉往東北向，之後轉往北北東方流動、流速介於 0.30~0.42 m/s。民國 111 年 7 月 22 日第 3 次漂流浮標調查時段為小潮退潮段，浮標共移動 2.39 km，淨移動 2.18 km，施測時段最大流速為 0.57 m/s (對應流向為 152°)，淨流流速為 0.20 m/s (對應流向為 159°)，浮標在出水口附近往東南方漂移，離施放點 400 公尺後轉往南方，離施放點 1300 公尺後轉往南南東向，，離施放點 1900 公尺後轉往東南方流動。民國 111 年 11 月 12 日第 4 次漂流浮標調查時段為大潮漲潮段，浮標共移動 1.77 km，淨移動 1.41 km，施測時段最大流速為 0.29 m/s (對應流向為 142°)，淨流流速為 0.12 m/s (對應流向為 47°)。浮標在出水口附近往東南東方漂移，離施放點 300 公尺後轉往東方流動，離施放點 650 公尺後轉往東北流動，之後轉往北北東偏北流動。

由漂流浮標溫度計紀錄可知，溫排水影響範圍於小潮退潮段，溫降率自排水口往外至 200 m 內約為 1°C /200 m，浮標離出水口 500 m 後水溫即降至與背景水溫溫差 2°C 以內，溫排水影響範圍侷限於出水口東南方 500 m 內或南方約 300m 內。中潮漲潮段，溫降率自排水口往外至 200 m 內約為 1°C /150 m，浮標離出水口 500 m 後水溫即降至與背景水溫溫差 2°C 以內，溫排水影響範圍侷限於出水口南方 500 m 內或東方口 700 m 內；中潮退潮段，溫降率自排水口往外至 200 m 內約為 1°C /150 m，浮標離出水口 500 m 後水溫即降至與背景水溫溫差 2°C 以內，溫排水影響範圍侷限於出水口東北方 500 m 內；大潮漲潮段，溫降率自排水口往外至 300 m 內約為 1°C /150 m，浮標離出水口 500 m 後水溫即降至與背景水溫溫差 2°C 以內，溫排水影響範圍侷限於出水口西南方 400 m 內或東方 600 m 內；大潮退潮段，溫降率自排水口往外至 200 m 內約為 1°C /80 m，浮標離出水口 500 m 後水溫即降至與背景水溫溫差 2°C 以內，溫排水影響範圍侷限於出水口東方 600 m 內。

排放口東南方之定點海流長期觀測結果，110 第 1 段長期海流觀測期 (民國 109 年 12 月 24 日至 110 年 2 月 20 日) 之平均流流速為 0.08 m/s，流向 229°；第 2 段 (民國 110 年 2 月 20 日至 110 年 4 月 15 日) 之平均流流速為 0.14 m/s，流向 235°；第 3 段 (民國 110 年 4 月 15 日至 110 年 7 月 20 日) 平均流流速為 0.18 m/s，流向 232°；第 4 段 (民國 110 年 8 月 19 日至 110 年 9 月 9 日) 之平均流流速為 0.19 m/s，流向 229°；第 5 段 (民國 110 年 9 月 16 日至 110 年 11 月 18 日) 之平均流流速為 0.15 m/s，流向 237°。111 年第 1 段長期海流觀測期 (民國 110 年 11 月 18 日至 111 年 1 月 15 日) 之平均流流速為 0.11 m/s，流向 245°；第 2 段 (民國 111 年 1 月 15 日至 111 年 3 月 14 日) 之平均流流速為 0.15 m/s，流向 240°；第 3 段 (民國 111 年 3 月 14 日至 111 年 4 月 21 日) 之平均流流速為 0.20 m/s，流向 232°；第 4 段 (民國 111 年 7 月 13 日至 111 年 11 月 10 日) 之平均流流速為 0.17 m/s，流向 232°。

110 年 5 段流速流向玫瑰圖顯示，海流主流向以西南向為主，佔 28.3~35.9%以上，西南西或東北第 2，約佔 15.0~20.0%，南南西或東北佔第 3，約佔 9.0~14.6%。潮流仍為西南及東北方向往復之潮流運動為主，漲潮流速明顯大於退潮流速，即有西南向淨流存在。110 年 5 段流速資料全日分潮 K_1 潮流分量之振幅大小約為 0.09 m/s～0.30 m/s，半日分潮 M_2 潮流分量振幅大小約為 0.13 m/s～0.22 m/s，全日分潮 O_1 潮流分量之振幅大小約為 0.09 m/s～0.19 m/s， S_2 潮流分量與 N_2 潮流分量之振幅大小約為 0.03 m/s～0.07 m/s。111 年 4 段流速流向玫瑰圖顯示，海流主流向以西南向為主，佔 25.3~34.8%以上，西南西第 2，約佔 15.4~17.9%，南南西或東北佔第 3，約佔 9.4~12.9%。潮流仍為西南及東北方向往復之潮流運動為主，漲潮流速明顯大於退潮流速，即有西南向淨流存在。111 年 4 段流速資料全日分潮 K_1 潮流分量之振幅大小約為 0.11 m/s～0.16 m/s，半日分潮 M_2 潮流分量振幅大小約為 0.13 m/s～0.18 m/s，全日分潮 O_1 潮流分量之振幅大小約為 0.10 m/s～0.13 m/s， S_2 潮流分量與 N_2 潮流分量之振幅大小約為 0.04 m/s～0.11 m/s。

110年及111年共八次溫鹽調查結果，110年第1次觀測 (民國110年1月23日) 水溫介於22.7℃～27.3℃之間，鹽度介於34.01～34.50之間；110年第2次觀測 (4月15日) 水溫介於22.0℃～25.6℃之間，鹽度介於34.05～34.69之間；110年第3次觀測 (8月12日) 水溫介於23.0℃～31.5℃之間，鹽度介於32.67～34.32之間；110年第4次觀測 (11月10日) 水溫介於24.0℃～29.6℃之間，鹽度介於33.63～34.19之間。111年第1次觀測 (民國111年2月16日) 水溫介於24.5℃～29.7℃之間，鹽度介於33.47～34.58之間；111年第2次觀測 (5月11日) 水溫介於21.3℃～29.5℃之間，鹽度介於33.87～34.58之間；111年第3次觀測 (8月12日) 水溫介於21.7℃～30.4℃之間，鹽度介於32.67～34.26之間；111年第4次觀測 (11月17日) 水溫介於22.9℃～30.6℃之間，鹽度介於33.41～34.12之間。溫排水擴散舌在漲潮時段多往西南擴散，退潮時段往東南-東方向擴散，受西南向淨流的作用，漲潮時溫水舌的擴散範圍較退潮時溫水舌大。湧升帶來的冷水，有助於南灣之珊瑚避免海水暖化之衝擊；冷水所含之營養鹽，亦有助於藻類生長，但因南灣海水內外交換甚快，藻類來不及長大即被送至灣外，因此營養鹽利用率不高。

溫鹽調查結果顯現溫排水訊息僅見於表層，至水深 10 m 甚至 5 m 水層溫度分佈則不見溫排水訊息。110 年 1 月整體水溫介於 22.7°C～27.3°C 之間，表層 1m 水溫為 23.0°C～27.3°C，水深 1 m 之表層溫度在距排放口 500 m 內大於 25.5°C，表層 5 m 水溫為 23.0°C～25.3°C。110 年 4 月，氣溫逐漸升高、整體水溫為 22.0°C～28.8°C，表層 1 m 水溫為 24.7°C～28.8°C，表層 5 m 水溫則上昇至 25.8°C～29.0°C。110 年 8 月時，氣溫再次升高，整體水溫為 23.0°C～31.5°C，表層 1 m 水溫為 27.2°C～31.5°C，排水口附近水溫亦相對地上升至 29°C 以上，表層 5m 內水溫則上昇至 25.8°C～29.0°C。110 年 11 月時，氣溫下降，整體水溫為 24.0°C～29.6°C，表層 1 m 水溫為 25.4°C～29.6°C，排水口附近水溫下降至 27°C 以上，表層 5m 內水溫則下降至 25.5°C～26.7°C。111 年

2 月 整體水溫介於 24.5°C～29.7°C，表層 1m 水溫 24.5°C～29.6°C，距排放口 500 m 內大於 26.0°C，表層 5m 水溫為 24.8°C～28.5°C。111 年 5 月時，整體水溫為 21.3°C～29.5°C，表層 1m 水溫為 26.7°C～29.5°C，排水口附近水溫亦相對地上升至 28°C 以上，表層 5m 水溫則上昇至 25.0°C～27.6°C。111 年 8 月時，整體水溫為 21.8°C～30.4°C，表層 1 m 水溫為 27.6°C～30.2°C，灣內表層 1 m 水溫整體上升至 29°C 以上，表層 5m 內水溫則上昇至 26.2°C～30.1°C，灣內近岸附近水溫仍在 29°C 以上，溫排水口附近溫度溫度在 28.4°C 以下、相對較低。111 年 11 月時，整體水溫為 22.9°C～30.6°C，表層 1 m 水溫為 25.7°C～30.6°C，表層下 5m 水溫為 25.7°C～27.7°C。

分析民國 92 年至 94 年溫排水口南方接近海底的逐時水溫變化和潮汐、風場和颱風的關係，水溫資料經 72 小時低頻過濾處理並與蘭嶼風速風向資料比較後，發現颱風季期間某些颱風經過台灣附近後會造成 1～4 週長的水溫變化，值得進一步探討。

綜合而言，各項海流觀測結果和歷年調查結果一致，在統計上未有顯著差異。排水口附近之西南向淨流造成溫排水大部份往西南擴散之趨勢，溫排水影響所及亦多限於排水口附近海域西側，其擴散範圍在漲潮時段往西南伸展約 800 m，退潮時段往東-東南約 200～800 m，在垂直方向上，溫排水大部份分佈於海表層以下水深 3 m 以內，溫降率自排水口往外至 500 m 弧內約 1°C /100 m ~1°C /150 m。南灣海域集中作業漁場在溫排水擴散影響範圍之外。

六、附表及附圖

詳報告書光碟。

(說明：

依 101 年期末工作檢討會議紀錄 (會議日期：102 年 3 月 8 日) 之『 (八) 本案調查報告書中之書面附錄或原始資料文件，請刪除並註明該資料已放入調查報告書所附光碟電子檔中，以減少書面報告之篇幅。』辦理。)

表 1-1 第三核能發電廠附近海域民國 110 年第 1 次漂流浮標追蹤調查成果表
(民國 110 年 1 月 22 日)

日期: 01/22/2021(農曆十二月初十, 小潮) 點位:出水口退潮

流速絕對值平均= 0.391m/s

施測時段淨流流速= 0.346m/s(88 度)

施測時段最大流速= 0.476m/s(56 度) 發生時間:16:15

施測時段最小流速= 0.243m/s(81 度) 發生時間:17:30

時	分	XE 座標	YN 座標	溫度℃	距施放點距離	速度	方向
15	50	223914.9	2425903.8	27.00	0.00	(m/sec)	(度)
15	55	224031.4	2425930.8	25.95	119.59	0.399	77
16	0	224142.9	2425999.2	24.95	247.10	0.436	58
16	5	224243.4	2426067.4	25.25	366.99	0.405	56
16	10	224351.2	2426138.1	24.95	495.24	0.430	57
16	15	224469.4	2426218.2	24.36	637.39	0.476	56
16	20	224593.5	2426286.6	24.66	779.08	0.472	61
16	25	224720.6	2426343.5	24.23	917.83	0.464	66
16	30	224845.7	2426404.4	24.25	1056.86	0.464	64
16	35	224971.3	2426454.9	24.14	1191.46	0.451	68
16	40	225099.7	2426504.5	23.96	1328.37	0.459	69
16	45	225227.9	2426559.4	23.93	1467.54	0.465	67
16	50	225357.1	2426617.0	23.84	1608.91	0.472	66
16	55	225482.9	2426666.1	23.78	1743.50	0.450	69
17	0	225607.0	2426714.9	23.78	1876.42	0.444	69
17	5	225730.5	2426771.7	23.76	2012.37	0.453	65
17	10	225847.8	2426810.3	23.84	2134.90	0.412	72
17	15	225972.4	2426860.0	23.40	2268.75	0.447	68
17	20	226095.9	2426910.4	23.67	2402.04	0.445	68
17	25	226177.8	2426931.6	23.69	2485.33	0.282	75
17	30	226249.8	2426943.1	23.71	2555.77	0.243	81
17	35	226328.3	2426954.6	23.67	2632.27	0.265	82
17	40	226411.5	2426957.0	23.69	2709.64	0.277	88
17	45	226495.7	2426948.3	23.67	2784.10	0.282	96
17	50	226578.5	2426930.2	23.60	2854.53	0.283	102
17	55	226669.4	2426900.2	23.51	2929.14	0.319	108
18	0	226773.1	2426850.7	23.49	3011.00	0.383	115
18	5	226858.0	2426797.5	23.40	3075.79	0.334	122
18	10	226954.3	2426744.5	23.27	3153.47	0.366	119
18	15	227070.1	2426684.8	23.22	3250.43	0.434	117
18	20	227174.1	2426619.9	23.22	3336.93	0.409	122
18	25	227274.2	2426549.4	23.24	3420.77	0.408	125
18	30	227367.6	2426479.0	23.22	3500.26	0.390	127
18	35	227458.7	2426409.4	23.18	3579.63	0.382	127
18	40	227543.8	2426339.8	23.20	3654.96	0.367	129
18	45	227628.4	2426268.8	23.18	3731.37	0.368	130
18	50	227709.4	2426197.0	23.16	3805.78	0.361	132
18	55	227786.8	2426128.5	23.13	3878.36	0.344	132
19	0	227856.9	2426063.9	23.13	3945.25	0.318	133

表 1-2 第三核能發電廠附近海域民國 110 年第 2 次漂流浮標追蹤調查成果表
(民國 110 年 4 月 16 日)

日期: 04/16/2021(農曆三月初五)　點位:出水口漲潮　流速絕對值平均= 0.222m/s

施測時段淨流流速= 0.210m/s(156 度)

施測時段最大流速= 0.462m/s(138 度)　發生時間:19:25

施測時段最小流速= 0.075m/s(135 度)　發生時間:16:30

時	分	XE 座標	YN 座標	溫度℃	距施放點距離	速度	方向
16	20	223825.5	2425898.5	30.02	0.00	(m/sec)	(度)
16	25	223843.3	2425875.2	28.63	29.36	0.098	143
16	30	223853.6	2425855.1	28.70	51.78	0.075	153
16	35	223857.1	2425824.9	28.65	80.10	0.101	173
16	40	223856.4	2425787.0	28.65	115.72	0.126	181
16	45	223850.9	2425745.9	28.65	154.74	0.138	188
16	50	223843.6	2425703.6	28.51	195.73	0.143	190
16	55	223837.1	2425657.1	27.16	241.66	0.156	188
17	0	223831.9	2425608.9	28.56	289.72	0.162	186
17	5	223827.0	2425564.2	27.26	334.37	0.150	186
17	10	223829.6	2425521.0	27.88	377.56	0.144	177
17	15	223836.8	2425477.3	27.79	421.36	0.148	171
17	20	223851.9	2425416.1	26.91	483.13	0.210	166
17	25	223871.6	2425346.0	26.48	554.48	0.243	164
17	30	223893.7	2425262.0	26.48	640.17	0.289	165
17	35	223924.0	2425173.9	26.43	731.29	0.311	161
17	40	223939.1	2425107.3	26.43	799.29	0.227	167
17	45	223948.9	2425045.0	26.30	862.39	0.210	171
17	50	223960.3	2424978.4	26.23	930.00	0.225	170
17	55	223971.4	2424912.8	26.18	996.44	0.222	170
18	0	223983.1	2424845.0	26.14	1065.29	0.230	170
18	5	223995.2	2424779.7	26.11	1131.66	0.221	169
18	10	224005.5	2424728.6	26.61	1183.72	0.174	169
18	15	224017.5	2424682.1	26.41	1231.54	0.160	166
18	20	224030.4	2424640.3	26.36	1274.79	0.146	163
18	25	224044.0	2424606.9	26.45	1309.96	0.120	158
18	30	224060.1	2424573.0	26.86	1346.14	0.125	155
18	35	224077.6	2424535.2	26.57	1386.44	0.139	155
18	40	224093.9	2424499.4	26.39	1424.65	0.131	156
18	45	224117.5	2424449.1	26.20	1478.57	0.185	155
18	50	224156.2	2424381.7	26.11	1552.47	0.259	150
18	55	224214.5	2424309.6	26.14	1635.88	0.309	141
19	0	224283.6	2424228.8	26.00	1731.41	0.354	139
19	5	224355.7	2424143.1	25.98	1833.77	0.373	140
19	10	224434.3	2424063.3	25.93	1933.60	0.373	135
19	15	224518.9	2424006.8	25.93	2014.78	0.339	124
19	20	224608.6	2423930.0	25.93	2118.64	0.394	131
19	25	224701.6	2423827.2	25.91	2249.06	0.462	138
19	30	224770.0	2423740.2	25.93	2356.01	0.369	142
19	33	224804.1	2423677.7	25.93	2426.90	0.395	151

表 1-3 第三核能發電廠附近海域民國 110 年第 3 次漂流浮標追蹤調查成果表
(民國 110 年 8 月 13 日)

日期: 08/13/2021(農曆七月初六)　點位:出水口退潮　流速絕對值平均= 0.205m/s

施測時段淨流流速= 0.066m/s(61 度)

施測時段最大流速= 0.412m/s(217 度)　發生時間:15:45

施測時段最小流速= 0.048m/s(358 度)　發生時間:14:35

時	分	XE 座標	YN 座標	溫度℃	距施放點距離	速度	方向
12	35	223870.0	2425876.9	30.39	0.00	(m/sec)	(度)
12	40	223965.4	2425880.1	29.67	95.45	0.318	88
12	45	224062.7	2425916.6	30.02	196.77	0.347	69
12	50	224158.8	2425982.6	29.26	307.55	0.389	56
12	55	224250.8	2426051.2	29.29	418.80	0.382	53
13	0	224333.7	2426111.9	28.88	519.87	0.343	54
13	5	224412.3	2426180.1	28.42	621.32	0.347	49
13	10	224499.7	2426247.9	28.14	730.85	0.369	52
13	15	224568.5	2426301.9	28.02	817.63	0.292	52
13	20	224644.9	2426368.7	28.88	917.76	0.338	49
13	25	224705.4	2426428.9	28.98	1001.34	0.285	45
13	30	224760.6	2426475.7	29.29	1073.18	0.241	50
13	35	224813.3	2426517.3	29.00	1140.19	0.224	52
13	40	224837.9	2426543.3	28.70	1175.14	0.119	43
13	45	224857.2	2426563.4	28.67	1202.45	0.093	44
13	50	224882.1	2426588.8	28.49	1237.36	0.118	44
13	55	224913.1	2426615.6	28.42	1278.15	0.137	49
14	0	224934.8	2426643.0	28.21	1311.76	0.117	38
14	5	224947.9	2426675.2	28.21	1341.38	0.116	22
14	10	224955.6	2426710.8	28.21	1368.89	0.121	12
14	15	224957.9	2426746.3	28.23	1392.66	0.119	4
14	20	224960.6	2426779.9	28.21	1415.89	0.112	4
14	25	224963.1	2426810.1	28.16	1437.27	0.101	5
14	30	224964.9	2426832.4	28.12	1453.21	0.075	5
14	35	224964.5	2426847.0	28.16	1462.49	0.048	358
14	40	224953.0	2426862.9	28.14	1464.63	0.065	324
14	45	224936.5	2426877.0	28.14	1462.05	0.073	310
14	50	224916.4	2426887.1	28.16	1454.52	0.075	297
14	55	224897.9	2426890.5	28.16	1443.56	0.063	280
15	0	224877.1	2426878.1	28.16	1420.09	0.081	239
15	5	224856.4	2426856.3	28.19	1390.10	0.100	223
15	10	224837.9	2426819.9	28.21	1351.37	0.136	207
15	15	224810.6	2426742.3	28.23	1278.13	0.274	199
15	20	224780.0	2426672.0	28.30	1208.44	0.255	204
15	25	224756.9	2426615.3	28.35	1154.00	0.204	202
15	30	224734.0	2426558.2	28.40	1100.35	0.205	202
15	35	224711.4	2426490.7	28.37	1041.48	0.237	199
15	40	224674.8	2426417.1	28.37	969.32	0.274	206
15	45	224600.2	2426318.6	28.33	853.38	0.412	217
15	49	224535.4	2426251.4	28.28	763.56	0.389	224

表 1-4 第三核能發電廠附近海域民國 110 年第 4 次漂流浮標追蹤調查成果表
(民國 110 年 11 月 18 日)

日期: 11/18/2021(農曆十月十四，大潮)　點位:出水口漲潮

流速絕對值平均= 0.205m/s

施測時段淨流流速= 0.219m/s(201 度)

施測時段最大流速= 0.484m/s(212 度)　發生時間:13:20

施測時段最小流速= 0.091m/s(137 度)　發生時間:10:55

時	分	XE 座標	YN 座標	溫度℃	距施放點距離	速度	方向
10	50	223857.3	2425885.9	29.65	0.00	(m/sec)	(度)
10	55	223875.9	2425866.0	29.39	27.26	0.091	137
11	0	223897.5	2425847.1	29.13	55.89	0.096	131
11	5	223920.2	2425830.5	28.71	83.87	0.094	126
11	10	223945.0	2425812.7	28.29	114.24	0.102	126
11	15	223968.7	2425796.1	28.41	143.14	0.097	125
11	20	223992.4	2425778.3	28.41	172.76	0.099	127
11	25	224014.1	2425758.3	28.64	202.15	0.098	133
11	30	224034.7	2425737.3	28.41	231.48	0.098	136
11	35	224051.2	2425712.9	27.95	259.91	0.098	146
11	40	224064.6	2425685.2	28.19	288.57	0.103	154
11	45	224073.9	2425654.2	27.90	317.19	0.108	163
11	50	224076.9	2425618.7	28.25	345.85	0.119	175
11	55	224074.8	2425576.7	27.91	378.06	0.140	183
12	0	224065.4	2425530.2	28.06	412.14	0.158	191
12	5	224048.8	2425477.1	26.72	451.48	0.186	197
12	10	224023.9	2425416.2	27.87	498.38	0.219	202
12	15	223988.6	2425348.7	27.70	553.03	0.254	208
12	20	223945.1	2425272.4	27.05	619.78	0.293	210
12	25	223890.2	2425187.2	27.77	699.47	0.338	213
12	30	223824.0	2425094.3	27.33	792.28	0.380	216
12	35	223746.3	2425000.4	26.75	892.50	0.406	220
12	40	223665.6	2424907.5	27.33	997.04	0.410	221
12	45	223600.4	2424822.3	26.69	1094.17	0.358	217
12	50	223564.1	2424743.8	26.53	1179.17	0.288	205
12	55	223542.2	2424665.2	27.00	1260.71	0.272	196
13	0	223515.2	2424578.9	26.50	1351.04	0.301	197
13	5	223467.5	2424476.0	26.46	1462.79	0.378	205
13	10	223402.3	2424362.1	26.08	1590.32	0.438	210
13	15	223326.6	2424240.4	26.48	1728.96	0.478	212
13	20	223249.0	2424117.6	26.28	1870.00	0.484	212
13	25	223178.5	2424001.5	26.55	2002.94	0.453	211
13	30	223122.5	2423897.5	26.60	2119.80	0.394	208
13	35	223087.3	2423810.1	26.81	2214.02	0.314	202
13	40	223066.5	2423737.1	26.53	2289.74	0.253	196
13	45	223051.9	2423676.2	26.74	2351.91	0.209	193
13	50	223036.3	2423626.4	26.76	2404.03	0.174	197
13	55	223010.4	2423584.4	26.80	2452.40	0.165	212
14	0	222967.0	2423547.9	26.76	2501.79	0.189	230

表 1-5 第三核能發電廠附近海域民國 111 第 1 季漂流浮標追蹤調查成果表
(民國 111 年 3 月 5 日)

日期: 03/05/2022(農曆二月初三，大潮)　點位:出水口退潮

流速絕對值平均= 0.371m/s

施測時段淨流流速= 0.337m/s(192 度)

施測時段最大流速= 0.568m/s(147 度)　發生時間:10:40

施測時段最小流速= 0.179m/s(222 度)　發生時間:10:30

時	分	XE 座標	YN 座標	溫度℃	距施放點距離	速度	方向
8	57	223860.8	2425884.9	28.44	0.00	(m/sec)	(度)
9	0	223895.3	2425820.2	26.57	73.25	0.244	152
9	5	223904.6	2425732.4	25.76	158.61	0.294	174
9	10	223886.3	2425636.2	25.98	249.93	0.326	191
9	15	223857.4	2425529.8	26.40	355.09	0.368	195
9	20	223831.1	2425441.6	26.26	444.26	0.307	197
9	25	223785.9	2425353.0	25.26	537.07	0.331	207
9	30	223736.2	2425265.2	25.19	632.03	0.336	209
9	35	223670.5	2425182.9	25.00	727.27	0.351	219
9	40	223604.0	2425098.5	24.70	827.24	0.358	218
9	45	223546.8	2425007.6	25.30	931.78	0.358	212
9	50	223508.6	2424918.4	24.85	1028.65	0.323	203
9	55	223459.0	2424824.4	25.18	1133.99	0.354	208
10	0	223402.0	2424719.9	24.63	1252.03	0.397	209
10	5	223362.5	2424608.5	24.51	1370.23	0.394	200
10	10	223317.4	2424490.3	24.44	1496.73	0.422	201
10	15	223248.5	2424359.0	24.33	1644.11	0.494	208
10	20	223144.4	2424229.3	24.37	1803.94	0.554	219
10	25	223030.9	2424104.8	24.33	1964.01	0.562	222
10	30	222916.9	2423978.3	24.34	2127.41	0.568	222
10	35	222865.9	2423894.1	25.42	2225.51	0.328	211
10	40	222895.0	2423849.1	25.31	2253.27	0.179	147
10	45	222874.4	2423786.0	24.99	2319.08	0.221	198
10	50	222853.8	2423718.8	25.01	2388.72	0.234	197
10	55	222829.5	2423642.7	24.93	2467.99	0.266	198
11	0	222797.0	2423565.2	25.00	2551.91	0.280	203
11	5	222760.8	2423488.2	24.97	2637.06	0.284	205
11	10	222697.4	2423390.8	24.87	2752.02	0.387	213
11	15	222623.6	2423286.6	25.07	2877.81	0.426	215
11	20	222567.1	2423163.9	24.86	3012.87	0.450	205
11	25	222533.6	2423067.3	25.00	3114.55	0.341	199
11	30	222534.9	2422963.1	25.03	3208.52	0.347	179
11	35	222548.4	2422869.5	25.32	3288.60	0.315	172
11	40	222585.6	2422765.2	25.39	3370.17	0.369	160
11	45	222620.8	2422673.2	25.12	3442.71	0.328	159
11	50	222666.2	2422561.9	24.99	3531.15	0.401	158
11	55	222756.3	2422448.7	25.28	3609.37	0.482	142
12	0	222803.5	2422327.2	25.16	3711.45	0.434	159
12	5	222873.9	2422215.7	25.22	3799.55	0.440	148
12	10	222949.2	2422089.0	25.23	3903.76	0.491	149
12	15	223036.2	2421969.3	25.30	4001.42	0.493	144

表 1-6 第三核能發電廠附近海域民國 111 第 2 季漂流浮標追蹤調查成果表
(民國 111 年 5 月 20 日)

日期: 05/20/2022(農曆四月二十)　點位:出水口漲潮　流速絕對值平均= 0.239m/s

施測時段淨流流速= 0.164m/s(057 度)

施測時段最大流速= 0.424m/s(022 度)　發生時間:09:00

施測時段最小流速= 0.121m/s(163 度)　發生時間:06:25

時	分	XE 座標	YN 座標	溫度℃	距施放點距離	速度	方向
5	52	223875.7	2425824.4	30.80	0.00	(m/sec)	(度)
5	55	223894.6	2425774.6	29.25	53.28	0.178	159
6	0	223934.8	2425697.7	29.08	139.78	0.289	152
6	5	223949.2	2425626.1	29.34	211.50	0.244	169
6	10	223952.4	2425565.3	28.82	270.20	0.203	177
6	15	223974.7	2425517.9	29.02	322.09	0.175	155
6	20	223995.0	2425461.6	28.81	381.90	0.199	160
6	25	224005.6	2425426.9	28.87	418.19	0.121	163
6	30	224037.8	2425400.7	28.84	453.58	0.138	129
6	35	224088.5	2425385.0	28.76	488.18	0.177	107
6	40	224144.2	2425389.9	28.57	510.74	0.186	85
6	45	224204.5	2425402.1	28.58	535.17	0.205	79
6	50	224251.5	2425414.4	28.58	556.11	0.162	75
6	55	224297.5	2425410.7	28.53	590.81	0.154	95
7	0	224362.1	2425404.0	28.38	642.90	0.216	96
7	5	224445.6	2425397.9	28.50	711.76	0.279	94
7	10	224521.1	2425402.6	27.94	770.98	0.252	86
7	15	224582.5	2425407.5	27.75	820.56	0.205	85
7	20	224626.7	2425410.5	27.64	857.49	0.148	86
7	25	224663.5	2425429.7	27.49	881.15	0.138	62
7	30	224696.1	2425452.5	27.39	900.75	0.133	55
7	35	224732.6	2425490.7	27.26	919.55	0.176	44
7	40	224772.3	2425531.3	27.27	943.29	0.189	44
7	45	224807.6	2425572.8	27.25	965.26	0.182	40
7	50	224840.3	2425615.0	27.23	987.04	0.178	38
7	55	224862.2	2425662.2	27.79	999.76	0.173	25
8	0	224889.7	2425708.8	27.20	1020.54	0.180	30
8	5	224922.9	2425762.0	27.37	1049.08	0.209	32
8	10	224959.2	2425815.0	27.28	1083.57	0.214	34
8	15	225002.3	2425873.7	27.26	1127.66	0.243	36
8	20	225052.2	2425938.9	27.44	1182.07	0.274	37
8	25	225116.3	2426011.7	27.19	1254.68	0.323	41
8	30	225172.6	2426082.8	27.34	1322.40	0.302	38
8	35	225214.8	2426172.9	27.54	1383.71	0.332	25
8	40	225252.6	2426266.8	27.61	1446.23	0.337	22
8	45	225286.8	2426373.9	27.56	1514.28	0.375	18
8	50	225321.8	2426486.8	27.40	1590.60	0.394	17
8	55	225366.7	2426601.8	27.33	1681.55	0.412	21
9	0	225415.3	2426719.4	27.33	1780.91	0.424	22
9	5	225468.1	2426834.5	27.27	1885.73	0.422	25
9	6	225478.7	2426856.1	27.20	1906.28	0.401	26

表 1-7 第三核能發電廠附近海域民國 111 第 3 季漂流浮標追蹤調查成果表
(民國 111 年 7 月 22 日)

日期: 07/22/2022(農曆六月二十四, 小潮) 點位:出水口退潮

流速絕對值平均= 0.223m/s

施測時段淨流流速= 0.197m/s(019 度)

施測時段最大流速= 0.573m/s(152 度) 發生時間:05:40

施測時段最小流速= 0.125m/s(173 度) 發生時間:06:10

時	分	XE 座標	YN 座標	溫度℃	距施放點距離	速度	方向
5	39	223837.5	2425909.8	32.80	0.00	(m/sec)	(度)
5	40	223853.4	2425879.3	32.29	34.38	0.573	152
5	45	223910.1	2425778.5	31.57	150.02	0.386	151
5	50	223958.0	2425716.4	31.29	227.79	0.261	142
5	55	223993.2	2425675.0	31.17	281.74	0.181	140
6	0	224019.3	2425641.8	30.90	323.81	0.141	142
6	5	224034.4	2425602.0	30.93	365.40	0.142	159
6	10	224038.8	2425564.7	30.52	399.49	0.125	173
6	15	224039.7	2425517.1	30.43	441.67	0.159	179
6	20	224035.4	2425453.8	30.43	497.03	0.211	184
6	25	224027.2	2425396.3	30.43	547.39	0.194	188
6	30	224023.0	2425338.6	30.05	600.50	0.193	184
6	35	224015.2	2425275.9	30.24	658.27	0.211	187
6	40	224004.0	2425198.2	30.24	730.81	0.262	188
6	45	223995.2	2425118.7	30.19	806.66	0.267	186
6	50	223976.9	2425048.0	30.17	873.01	0.244	195
6	55	223970.3	2424985.8	30.10	933.49	0.208	186
7	0	223967.3	2424934.1	30.05	984.22	0.172	183
7	5	223970.2	2424877.9	30.05	1040.33	0.188	177
7	10	223977.2	2424817.6	30.00	1101.10	0.203	173
7	15	223984.4	2424756.2	29.95	1162.92	0.206	173
7	20	223989.4	2424691.7	30.05	1227.53	0.216	176
7	25	223989.3	2424624.4	30.02	1294.30	0.224	180
7	30	223994.7	2424558.3	30.05	1360.59	0.221	175
7	35	224012.7	2424494.2	30.02	1426.40	0.222	164
7	40	224034.3	2424431.0	30.07	1491.83	0.223	161
7	45	224057.9	2424369.9	30.10	1555.60	0.218	159
7	50	224091.8	2424311.1	30.12	1618.75	0.226	150
7	55	224123.5	2424257.3	30.10	1677.08	0.208	149
8	0	224157.0	2424201.2	30.10	1738.21	0.218	149
8	5	224188.9	2424155.3	30.10	1789.32	0.186	145
8	10	224226.9	2424110.6	30.10	1840.82	0.196	140
8	15	224272.7	2424071.7	30.10	1888.92	0.200	130
8	20	224324.5	2424039.3	30.10	1932.88	0.204	122
8	25	224372.4	2424016.4	30.12	1967.52	0.177	116
8	30	224427.6	2423994.8	30.12	2003.82	0.197	111
8	35	224491.2	2423960.3	30.10	2056.17	0.241	119
8	40	224555.9	2423913.7	30.07	2121.44	0.266	126
8	44	224612.5	2423867.6	30.14	2184.27	0.304	129

表 1-8 第三核能發電廠附近海域民國 111 第 4 季漂流浮標追蹤調查成果表
(民國 111 年 11 月 12 日)

日期: 11/12/2022(農曆十月十九, 大潮)　點位:出水口漲潮

流速絕對值平均= 0.152m/s

施測時段淨流流速= 0.120m/s(047 度)

施測時段最大流速= 0.289m/s(142 度)　發生時間:13:45

施測時段最小流速= 0.090m/s(066 度)　發生時間:14:40

時	分	XE 座標	YN 座標	溫度℃	距施放點距離	速度	方向
13	41	223835.5	2425890.4	32.46	0.00	(m/sec)	(度)
13	45	223878.4	2425836.0	30.48	69.34	0.289	142
13	50	223931.1	2425807.3	29.19	126.72	0.200	119
13	55	223978.7	2425794.0	29.14	172.61	0.165	106
14	0	224019.3	2425785.5	28.53	211.68	0.138	102
14	5	224062.1	2425771.1	28.19	256.16	0.151	109
14	10	224104.9	2425762.7	28.47	298.12	0.145	101
14	15	224139.2	2425760.3	28.19	330.40	0.115	94
14	20	224175.9	2425760.4	28.33	364.38	0.122	90
14	25	224205.4	2425764.7	28.21	390.70	0.100	82
14	30	224232.1	2425770.8	28.21	414.29	0.091	77
14	35	224259.2	2425779.8	28.07	437.89	0.095	72
14	40	224284.0	2425790.7	28.02	459.47	0.090	66
14	45	224309.8	2425801.2	28.09	482.67	0.093	68
14	50	224339.5	2425812.2	27.95	510.02	0.105	70
14	55	224370.5	2425821.9	27.84	539.39	0.108	73
15	0	224398.4	2425833.7	27.88	565.73	0.101	67
15	5	224431.4	2425850.7	27.58	597.21	0.124	63
15	10	224463.1	2425867.0	27.79	628.09	0.119	63
15	15	224491.5	2425901.7	27.79	656.16	0.150	39
15	20	224514.1	2425943.8	27.79	680.67	0.159	28
15	25	224540.7	2425977.2	27.79	710.50	0.142	39
15	30	224566.4	2426009.0	27.79	740.47	0.136	39
15	35	224590.1	2426044.5	27.60	770.20	0.142	34
15	40	224612.6	2426089.2	27.37	802.13	0.167	27
15	45	224632.9	2426136.0	27.44	834.36	0.170	23
15	50	224647.1	2426180.2	27.33	861.81	0.155	18
15	55	224660.0	2426227.4	27.28	890.70	0.163	15
16	0	224676.9	2426281.1	27.37	927.73	0.188	17
16	5	224700.0	2426335.9	27.40	972.50	0.198	23
16	10	224725.5	2426384.9	27.40	1018.12	0.184	27
16	15	224747.1	2426427.3	27.42	1057.93	0.159	27
16	20	224755.9	2426474.3	27.21	1089.94	0.159	11
16	25	224759.5	2426538.6	27.05	1128.71	0.215	3
16	30	224768.0	2426592.7	27.00	1167.37	0.182	9
16	35	224776.3	2426643.3	26.98	1204.98	0.171	9
16	40	224791.7	2426695.2	27.14	1249.85	0.180	17
16	45	224810.4	2426749.5	27.07	1299.37	0.191	19
16	50	224832.0	2426795.8	27.07	1346.36	0.170	25
16	55	224854.9	2426841.9	27.16	1394.43	0.172	26
16	57	224865.0	2426859.2	27.14	1413.67	0.167	30

表 1-9 第三核能發電廠附近海域 (民國 109 年 12 月 24 日～110 年 2 月 20 日)
定點海流觀測調和分析表

點位	時間		恆流流速 (m/s)	恆流流向 (度)
南灣	12/24/08:00 2020 -02/20/07:30 2021		0.0746	229.18
各分潮 角速度 (°/hr)	X(E)方向 流向振幅 (m/s)	X(E)方向 位相差 (° ' ")	Y(N)方向 流向振幅 (m/s)	Y(N)方向 位相差 (° ' ")
M_2: 28.9841	0.1388	258°31 ' 05.4"	0.1689	256°24 ' 28.4"
K_1: 15.0411	0.2098	98°57 ' 46.4"	0.2215	92°56 ' 17.4"
S2: 30.0000	0.0301	100°47 ' 06.1"	0.0306	70°30 ' 07.6"
O_1: 13.9430	0.1308	314°22 ' 14.2"	0.1325	307°48 ' 24.5"
N_2: 28.4397	0.0207	85°10 ' 10.9"	0.0234	57°39 ' 28.0"

分潮名稱	長軸半徑(m/s)	短軸半徑(m /s)	長軸方位(度)
M_2	0.2185	0.0039	39.4180
K_1	0.3047	0.0160	43.4280
S_2	0.0414	0.0112	44.3879
O_1	0.1859	0.0107	44.6260
N_2	0.0304	0.0074	41.0952

表 1-10 第三核能發電廠附近海域 (民國 110 年 2 月 20 日～110 年 4 月 15 日)
定點海流觀測調和分析表

點位	時間		恆流流速 (m/s)	恆流流向 (度)
南灣	02/20/08:00 2021 -04/15/08:00 2021		0.1370	235.34
各分潮 角速度 (°/hr)	X(E)方向 流向振幅 (m/s)	X(E)方向 位相差 (° ' ")	Y(N)方向 流向振幅 (m/s)	Y(N)方向 位相差 (° ' ")
M_2: 28.9841	0.1213	211°09 ' 31.2"	0.1411	203°59 ' 54.3"
K_1: 15.0411	0.1258	80°27 ' 08.1"	0.1080	68°21 ' 25.4"
S2: 30.0000	0.0395	116°49 ' 25.3"	0.0458	105°09 ' 25.8"
O_1: 13.9430	0.0900	326°40 ' 37.4"	0.0803	318°24 ' 24.0"
N_2: 28.4397	0.0485	55°24 ' 08.9"	0.0397	31°59 ' 47.0"

分潮名稱	長軸半徑(m/s)	短軸半徑(m /s)	長軸方位(度)
M_2	0.1858	0.0115	40.6484
K_1	0.1649	0.0173	49.4487
S_2	0.0602	0.0061	40.6677
O_1	0.1203	0.0086	48.2792
N_2	0.0614	0.0124	51.2374

表 1-11 第三核能發電廠附近海域 (民國 110 年 4 月 15 日～110 年 7 月 20 日)
定點海流觀測調和分析表

點位	時間		恆流流速 (m/s)	恆流流向 (度)
南灣	04/15/08:30 2021 -07/20/07:00 2021		0.1831	231.6
各分潮 角速度 (°/hr)	X(E)方向 流向振幅 (m/s)	X(E)方向 位相差 (° ' ")	Y(N)方向 流向振幅 (m/s)	Y(N)方向 位相差 (° ' ")
M_2: 28.9841	0.0616	222°08 ' 18.3"	0.1172	207°58 ' 12.7"
K_1: 15.0411	0.0901	24°07 ' 11.4"	0.0922	342°13 ' 50.2"
S2: 30.0000	0.0174	16°14 ' 10.1"	0.0535	32°45 ' 07.0"
O_1: 13.9430	0.0885	89°53 ' 24.6"	0.0977	63°02 ' 15.3"
N_2: 28.4397	0.0123	278°15 ' 53.5"	0.0289	283°14 ' 41.3"

分潮名稱	長軸半徑(m/s)	短軸半徑(m /s)	長軸方位(度)
M_2	0.1318	0.0134	27.3205
K_1	0.1204	0.0461	44.1514
S_2	0.0561	0.0047	17.4323
O_1	0.1282	0.0304	41.8233
N_2	0.0314	0.0010	22.9399

1-12 第三核能發電廠附近海域 (民國 110 年 8 月 19 日～110 年 9 月 9 日)
定點海流觀測調和分析表

點位	時間		恆流流速 (m/s)	恆流流向 (度)
南灣	08/19/14:00 2021- 09/09/08:30 2021		0.19267	228.86
各分潮 角速度 (°/hr)	X(E)方向 流向振幅 (m/s)	X(E)方向 位相差 (° ' ")	Y(N)方向 流向振幅 (m/s)	Y(N)方向 位相差 (° ' ")
M_2: 28.9841	0.0894	137°59 ' 35.0"	0.1456	122°05 ' 04.9"
K_1: 15.0411	0.1171	65°19 ' 58.2"	0.1344	51°58 ' 12.3"
S2: 30.0000	0.0532	38°06 ' 24.4"	0.0380	30°28 ' 14.0"
O_1: 13.9430	0.0911	296°59 ' 08.0"	0.0790	284°48 ' 50.1"
N_2: 28.4397	0.0384	276°23 ' 04.5"	0.0470	268°15 ' 38.5"

分潮名稱	長軸半徑(m/s)	短軸半徑(m /s)	長軸方位(度)
M_2	0.1696	0.0210	31.0796
K_1	0.1771	0.0205	40.9488
S_2	0.0652	0.0041	54.5296
O_1	0.1199	0.0127	49.1380
N_2	0.0605	0.0042	39.1748

表 1-13 第三核能發電廠附近海域 (民國 110 年 9 月 16 日～110 年 11 月 18 日)
定點海流觀測調和分析表

點位	時間		恆流流速 (m/s)	恆流流向 (度)
南灣	09/16/17:00 2021-11/18/06:30 2021		0.1546	237.41
各分潮角速度 (°/hr)	X(E)方向流向振幅 (m/s)	X(E)方向位相差 (° ' ")	Y(N)方向流向振幅 (m/s)	Y(N)方向位相差 (° ' ")
M_2: 28.9841	0.0705	231°02 ' 07.7"	0.1204	211°03 ' 55.0"
K_1: 15.0411	0.0753	0°52 ' 20.0"	0.0636	325°29 ' 31.8"
S2: 30.0000	0.0364	337°04 ' 41.1"	0.0628	320°46 ' 38.8"
O_1: 13.9430	0.0590	89°11 ' 32.4"	0.0707	60°30 ' 24.1"
N_2: 28.4397	0.0113	252° 5 ' 37.1"	0.0291	269°09 ' 31.9"
分潮名稱	長軸半徑(m/s)	短軸半徑(m /s)		長軸方位(度)
M_2	0.1387	0.0219		30.0892
K_1	0.0933	0.0285		51.3391
S_2	0.0726	0.0088		28.2934
O_1	0.0873	0.0218		39.9874
N_2	0.0326	0.0033		21.4151

表 1-14 第三核能發電廠附近海域 (民國 110 年 11 月 18 日～111 年 1 月 15 日)
定點海流觀測調和分析表

點位	時間		恆流流速 (m/s)	恆流流向 (度)
南灣	11/18/07:00 2021-01/15/07:30 2022		0.1079	244.65
各分潮角速度 (°/hr)	X(E)方向流向振幅 (m/s)	X(E)方向位相差 (° ' ")	Y(N)方向流向振幅 (m/s)	Y(N)方向位相差 (° ' ")
M_2: 28.9841	0.0819	20°09 ' 17.1"	0.1051	14°06 ' 41.7"
K_1: 15.0411	0.0861	150°01 ' 23.9"	0.1155	128°04 ' 59.0"
S2: 30.0000	0.0422	35°17 ' 57.7"	0.0612	57°19 ' 06.5"
O_1: 13.9430	0.0633	40°18 ' 45.9"	0.0795	32°37 ' 02.2"
N_2: 28.4397	0.0303	164°33 ' 53.7"	0.0262	174°55 ' 45.2"
分潮名稱	長軸半徑(m/s)	短軸半徑(m /s)		長軸方位(度)
M_2	0.1331	0.0068		37.8759
K_1	0.1416	0.0262		36.0783
S_2	0.0732	0.0132		33.8648
O_1	0.1013	0.0066		38.4681
N_2	0.0398	0.0036		49.2086

表 1-15 第三核能發電廠附近海域 (民國 111 年 1 月 15 日～111 年 3 月 14 日)
定點海流觀測調和分析表

點位	時間		恆流流速 (m/s)	恆流流向 (度)
南灣	01/15/08:00 2022- 03/14/17:00 2022		0.1475	239.86
各分潮 角速度 (°/hr)	X(E)方向 流向振幅 (m/s)	X(E)方向 位相差 (° ' ")	Y(N)方向 流向振幅 (m/s)	Y(N)方向 位相差 (° ' ")
M_2: 28.9841	0.1140	218°52 ' 04.8"	0.1416	213°52 ' 52.1"
K_1: 15.0411	0.1044	48°59 ' 00.2"	0.1223	25°12 ' 06.1"
S2: 30.0000	0.0301	6°14 ' 08.2"	0.0287	326°41 ' 30.3"
O_1: 13.9430	0.0733	357°03 ' 29.4"	0.0854	345°20 ' 40.9"
N_2: 28.4397	0.0337	42°31 ' 12.6"	0.0403	27°40 ' 44.4"

分潮名稱	長軸半徑(m/s)	短軸半徑(m /s)	長軸方位(度)
M_2	0.1816	0.0077	38.8204
K_1	0.1574	0.0327	40.0523
S_2	0.0391	0.0141	46.8235
O_1	0.1120	0.0114	40.5601
N_2	0.0521	0.0067	39.7031

表 1-16 第三核能發電廠附近海域 (民國 111 年 3 月 14 日～111 年 4 月 21 日)
定點海流觀測調和分析表

點位	時間		恆流流速 (m/s)	恆流流向 (度)
南灣	03/14/17:30 2022- 04/21/09:00 2022		0.1977	231.99
各分潮 角速度 (°/hr)	X(E)方向 流向振幅 (m/s)	X(E)方向 位相差 (° ' ")	Y(N)方向 流向振幅 (m/s)	Y(N)方向 位相差 (° ' ")
M_2: 28.9841	0.1113	304°17 ' 58.6"	0.1371	290°04 ' 51.7"
K_1: 15.0411	0.0425	345°10 ' 01.5"	0.0561	307°46 ' 10.6"
S2: 30.0000	0.0700	318°35 ' 00.4"	0.0822	313°20 ' 39.0"
O_1: 13.9430	0.0857	151°55 ' 08.9"	0.0973	130°05 ' 31.9"
N_2: 28.4397	0.0302	10°39 ' 39.9"	0.0452	17°41 ' 58.3"

分潮名稱	長軸半徑(m/s)	短軸半徑(m /s)	長軸方位(度)
M_2	0.1753	0.0214	38.8927
K_1	0.0669	0.0216	35.2553
S_2	0.1078	0.0049	40.3966
O_1	0.1273	0.0243	41.0912
N_2	0.0543	0.0031	33.7200

表 1-17 第三核能發電廠附近海域 (民國 111 年 7 月 13 日～111 年 11 月 10 日)

定點海流觀測調和分析表

點位	時間		恆流流速 (m/s)	恆流流向 (度)
南灣	07/13/07:00 2022-11/10/07:30 2022		0.1739	232.25
各分潮角速度 (°/hr)	X(E)方向流向振幅 (m/s)	X(E)方向位相差 (°' ”)	Y(N)方向流向振幅 (m/s)	Y(N)方向位相差 (°' ”)
M_2: 28.9841	0.0723	71°08 ' 13.9”	0.1261	59°46 ' 49.7”
K_1: 15.0411	0.0558	256°05 ' 35.4”	0.0730	221°36 ' 41.9”
S2: 30.0000	0.0384	113°23 ' 39.2”	0.0462	120°02 ' 32.6”
O_1: 13.9430	0.0653	14°41 ' 34.1”	0.0811	352°53 ' 30.0”
N_2: 28.4397	0.0093	180°56 ' 52.4”	0.0138	119°46 ' 44.5”

分潮名稱	長軸半徑(m/s)	短軸半徑(m /s)	長軸方位(度)
M_2	0.1448	0.0124	29.5698
K_1	0.0881	0.0262	35.8756
S_2	0.0600	0.0034	39.6722
O_1	0.1023	0.0192	38.3851
N_2	0.0148	0.0076	25.2390

表 1-18 歷年距出水口 500m 處之溫昇

日期	距出水口 500m 處			背景	溫昇值		
	北側	中側	南側		北側	中側	南側
92/03/01	26.534	26.876	27.813	25.556	0.978	1.320	2.257
92/05/07	28.463	27.942	29.246	27.951	0.512	-0.009	1.295
92/08/01	30.171	30.400	30.394	29.740	0.431	0.660	0.654
92/11/01	26.530	26.902	26.773	25.822	0.708	1.080	0.951
93/02/17	24.230	23.518	25.147	23.711	0.519	-0.193	1.436
93/05/07	28.319	27.771	28.619	27.400	0.919	0.371	1.219
93/08/02	28.495	28.606	29.306	27.899	0.596	0.707	1.407
93/11/05	26.186	25.834	26.619	25.901	0.285	-0.067	0.718
94/01/20	23.511	24.026	24.263	22.475	1.036	1.551	1.788
94/05/17	29.622	29.797	29.949	29.295	0.327	0.502	0.654
94/07/13	30.259	30.043	30.447	29.521	0.738	0.522	0.926
94/10/20	28.668	29.172	29.431	27.646	1.022	1.526	1.785
95/01/17	24.325	24.524	24.312	22.945	1.381	1.580	1.368
95/05/02	28.530	28.766	28.988	27.835	0.695	0.931	1.153
95/07/21	29.845	29.853	30.258	26.858	2.987	2.995	3.400
95/10/17	28.726	29.063	29.240	27.518	1.208	1.545	1.722
96/01/17	25.159	25.660	25.553	24.382	0.777	1.278	1.171
96/05/11	27.923	28.417	28.678	26.809	1.114	1.608	1.869
96/08/29	29.012	29.275	29.612	29.193	-0.181	0.082	0.419
96/11/16	26.129	25.968	26.297	25.664	0.465	0.304	0.633
97/03/14	26.925	27.276	27.478	25.729	1.196	1.547	1.749
97/05/01	28.421	28.748	28.774	28.025	0.396	0.723	0.749
97/09/05	28.843	29.031	29.366	27.722	1.121	1.309	1.644
97/11/07	28.468	28.380	29.021	27.977	0.491	0.403	1.044
98/01/16	24.446	24.195	25.003	23.825	0.621	0.370	1.178
98/05/13	26.631	26.218	27.083	25.846	0.785	0.372	1.237
98/08/26	29.525	29.558	29.750	28.367	1.158	1.191	1.383
98/10/28	26.989	26.741	27.362	26.659	0.330	0.082	0.703
99/02/05	25.644	26.363	26.706	24.288	1.356	2.075	2.418
99/05/11	28.481	28.818	29.052	27.591	0.890	1.227	1.461
99/08/17	30.298	30.647	30.736	28.388	1.910	2.259	2.348
99/11/22	25.968	25.606	25.946	25.223	0.745	0.383	0.723
100/02/24	25.730	25.538	26.101	25.023	0.707	0.515	1.078
100/05/13	28.070	27.897	28.600	27.537	0.533	0.360	1.063
100/08/10	28.789	28.577	29.151	28.263	0.526	0.314	0.888
100/11/19	28.002	28.342	28.480	27.426	0.576	0.916	1.054
101/02/23	26.890	27.261	27.005	25.875	1.015	1.386	1.130
101/05/01	28.426	28.703	28.814	27.672	0.754	1.031	1.142










續表 1-18 歷年距出水口 500m 處之溫昇

日期	距出水口 500m 處			背景	溫昇值		
	北側	中側	南側		北側	中側	南側
101/08/20	29.420	29.877	30.083	28.589	0.831	1.288	1.494
101/11/09	26.648	26.510	27.209	26.152	0.496	0.358	1.057
102/02/27	25.704	25.977	26.394	24.716	0.988	1.261	1.678
102/05/28	27.705	27.150	27.342	27.651	0.054	-0.501	-0.309
102/08/08	28.813	28.855	29.073	27.723	1.090	1.132	1.350
102/11/27	24.758	24.579	25.159	24.380	0.378	0.199	0.779
103/02/25	24.602	25.028	25.355	23.297	1.305	1.731	2.058
103/05/07	27.019	26.869	27.063	26.593	0.426	0.276	0.470
103/08/18	30.168	30.550	30.627	28.789	1.379	1.761	1.838
103/11/22	26.560	26.971	27.104	25.924	0.636	1.047	1.180
104/02/11	23.850	24.427	24.804	22.448	1.402	1.979	2.356
104/05/05	27.743	27.737	28.071	27.268	0.475	0.469	0.803
104/08/18	30.200	30.312	30.380	28.966	1.234	1.346	1.414
104/11/06	28.115	28.653	28.972	26.532	1.583	2.121	2.440
105/02/19	25.364	25.276	25.730	24.988	0.376	0.288	0.742
105/05/10	27.211	27.747	28.010	27.551	-0.340	0.196	0.459
105/08/25	27.903	28.248	28.516	27.349	0.554	0.899	1.167
105/11/18	26.140	26.111	26.194	25.823	0.317	0.288	0.371
106/02/23	26.089	26.500	26.739	24.742	1.347	1.758	1.997
106/05/22	27.556	27.451	27.937	27.184	0.372	0.267	0.753
106/08/18	30.183	29.895	30.669	29.957	0.226	-0.062	0.712
106/11/17	27.427	27.557	27.802	26.149	1.278	1.408	1.653
106/11/17	27.427	27.557	27.802	26.149	1.278	1.408	1.653
107/02/20	24.258	24.370	24.582	22.739	1.519	1.631	1.843
107/05/14	28.108	27.795	28.352	27.856	0.252	-0.061	0.496
108/05/10	28.235	28.704	29.021	27.469	0.766	1.235	1.552
108/08/23	29.844	30.160	30.554	28.907	0.937	1.253	1.647
108/11/18	26.342	26.369	26.249	25.890	0.452	0.479	0.359
109/02/14	25.839	25.654	26.453	24.996	0.843	0.658	1.457
109/05/07	27.807	28.045	28.324	27.255	0.552	0.790	1.069
109/08/15	29.648	29.704	29.578	29.802	-0.154	-0.098	-0.224
109/10/22	27.021	29.053	28.735	27.445	-0.424	1.608	1.290
110/01/23	24.888	25.341	25.412	23.809	1.079	1.532	1.603
110/04/15	24.737	24.668	28.359	25.955	-1.218	-1.287	2.404
110/08/12	27.420	27.522	29.638	27.838	-0.418	-0.316	1.800
110/11/18	25.382	25.757	25.873	26.065	-0.683	-0.308	-0.192
111/02/16	25.666	25.447	25.784	25.544	0.122	-0.097	0.240








續表 1-18 歷年距出水口 500m 處之溫昇

日期	距出水口 500m 處			背景	溫昇值		
	北側	中側	南側		北側	中側	南側
111/05/11	28.471	28.070	27.242	27.366	1.105	0.704	-0.124
111/08/12	29.773	28.680	29.261	29.527	0.246	-0.847	-0.266
111/11/17	27.786	28.237	28.026	26.377	1.409	1.860	1.649









表1-19 第三核能發電廠附近海域民國87～111年度漂流浮標追蹤調查結果

87～88年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
87年第1次	87.8.11	06:00～09:00		5.62	5.18	0.480/220	0.781/216	
	農曆6月20日，中潮							
87年第2次	87.10.01	06:00～09:00		3.37	2.95	0.298/218	0.836/243	
	農曆8月11日，中潮							
87年第3次	88.1.27	06:00～09:00		3.56	1.32	0.123/158	1.201/167	
	農曆12月11日，中潮							
87年第4次	88.3.7	06:00～09:00		5.19	4.75	0.440/191	0.867/181	
	農曆1月20日，中潮							
87年第5次	88.5.25	06:00～09:00		2.43	2.21	0.205/80	0.394/ 90	
	農曆4月11日，中潮							
88年第1次	88.8.1	06:00～09:00		5.54	4.35	0.363/225	0.903/266	
	農曆6月20日，中潮							




續表 1-19 第三核能發電廠附近海域民國 87～111 年度漂流浮標追蹤調查結果

88～89年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
88年第2次	88.8.18	06:00～09:00		3.40	1.85	0.172/193	0.641/25	
	農曆7月8日，小潮							
88年第3次	88.8.30	06:00～09:00		2.0	1.52	0.141/183	0.425/188	
	農曆7月20日，中潮							
88年第4次	88.9.29	08:25～09:24		6.6	6.4	0.593/180	0.849/191	
	農曆8月20日，中潮							
89年第1次	89.1.14	06:00～09:00		1.2	1.1	0.103/52	0.195/64	
	農曆12月8日，小潮							
89年第2次	89.1.15	15:00～18:00		4.1	3.8	0.352/207	0.633/217	
	農曆12月9日，小潮							
89年第3次	89.3.21	06:00～09:00		7.0	6.50	0.598/210	1.177/ 229	
	農曆2月16日，大潮							
89年第4次	89.5.30	06:00～08:00		1.4	0.80	0.113/228	0.415/160	
	農曆4月27日，中潮							








續表1-19 第三核能發電廠附近海域民國87～111年度漂流浮標追蹤調查結果

89～90年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
89年第5次	89.8.16	06:00～11:40		7.18	4.52	0.215/114	0.655/103	
	農曆7月17日，大潮							
89年第6次	89.8.16	12:00～18:00		10.88	4.25	0.197/165	0.893/88	
	農曆7月17日，大潮							
89年第7次	89.11.9	06:00～11:50		16.94	12.55	0.697/122	1.445/94	
	農曆10月14日，大潮							
89年第8次	89.11.9	13:00～17:00		16.94	12.55	0.504/192	0.796/207	
	農曆10月14日，大潮							
90年第1次	90.2.5	06:00～12:00		17.35	12.37	0.589/122	1.445/94	
	農曆1月13日，中潮							
90年第2次	90.4.6	06:00～12:00		3.75	2.19	0.102/136	0.380/151	
	農曆3月13日，中潮							
90年第3次第1段	90.7.20	06:00～11:50		11.14	3.67	0.174/171	0.223/94	
	農曆5月30日，大潮							









續表1-19 第三核能發電廠附近海域民國87～111年度漂流浮標追蹤調查結果

90～91年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
90年 第3次 第2段	90.7.20	12:00～13:40		1.80	0.69	0.115/225	0.606/179	
	農曆5月30日，大潮							
90年 第3次 第3段	90.7.20	13:50～18:00		2.86	0.89	0.059/154	0.437/208	
	農曆5月30日，大潮							
90年 第4次 第1段	90.11.21	06:00～11:30		10.70	10.36	0.524/218	1.401/233	
	農曆10月7日，小潮							
90年 第4次 第2段	90.11.21	12:00～17:50		4.73	3.01	0.143/123	0.379/99	
	農曆10月7日，小潮							
91年 第1次	91.3.26	10:00～16:00		2.21	1.56	0.072/182	0.382/136	
	農曆2月13日，大潮							
91年 第2次	91.5.10	11:00～17:00		8.39	6.59	0.305/219	0.611/191	
	農曆3月28日，中潮							
91年 第3次	91.9.25	06:00～12:00		15.27	12.9	0.597/189	1.018/157	
	農曆8月19日，大潮							







續表1-19 第三核能發電廠附近海域民國87～111年度漂流浮標追蹤調查結果

91～92年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
91年第4次第1段	91.11.07	06:00～12:00		15.87	14.64	0.678/211	1.107/197	
	農曆10月3日，大潮							
91年第4次第2段	91.11.07	06:00～12:00		3.51	1.64	0.076/218	0.657/192	
	農曆10月3日，大潮							
92年第1次	92.3.2	12:43～15:45		2.87	2.55	0.233/227	0.519/197	
	農曆1月30日，大潮							
92年第2次	92.5.6	10:42～16:40		2.73	1.85	0.086/23	0.286/34	
	農曆4月6日，小潮							
92年第3次第1段	92.8.2	10:14～12:50		1.38	0.03	0.004/72	0.403/285	
	農曆7月5日，中潮							
92年第3次第2段	92.8.2	12:55～13:27		0.54	0.50	0.262/168	0.342/176	
	農曆7月5日，中潮							
92年第4次	92.12.11	12:43～15:45		5.07	4.00	0.347/109	0.674/150	
	農曆11月18日，大潮							







續表1-19 第三核能發電廠附近海域民國87～111年度漂流浮標追蹤調查結果

93年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
93年 第1次 第1段	93.02.18	12:21～13:33		1.12	1.08	0.249/220	0.357/175	
	農曆正月28日，大潮							
93年 第1次 第2段	93.02.18	13:39～15:30		2.02	1.56	0.270/257	0.556/292	
	農曆正月28日，大潮							
93年 第2次	93.05.06	09:45～13:00		1.99	0.73	0.062/64	0.324/246	
	農曆3月18日，大潮							
93年 第3次 第1段	93.08.03	09:55～11:19		0.60	0.47	0.006/14	0.274/99	
	農曆6月18日，大潮							
93年 第3次 第2段	93.08.03	11:30～15:21		3.14	1.65	0.116/51	0.459/134	
	農曆6月18日，大潮							
93年 第4次 第1段	93.11.04	14:26～15:55		1.04	0.97	0.178/212	0.249/234	
	農曆9月22日，小潮							
93年 第4次 第2段	93.11.04	16:20～17:40		4.67	4.14	0.812/272	1.138/281	
	農曆9月22日，小潮							







續表1-19 第三核能發電廠附近海域民國87～111年度漂流浮標追蹤調查結果

94～95年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
94年第1次	94.03.28	13:59～17:11		4.53	2.92	0.254/238	1.037/259	
	農曆2月29日，大潮							
94年第2次	94.06.18	17:38～20:49		4.50	2.22	0.194/128	0.776/198	
	農曆5月12日，小潮							
94年第3次	94.08.10	19:16:～22:30		8.80	7.73	0.630/271	1.460/273	
	農曆7月6日，小潮							
94年第4次	94.08.10	13:31～16:45		4.07	3.67	0.315/223	0.566/261	
	農曆7月6日，小潮							
95年第1次第1段	95.01.17	13:26～13:50		0.73	0.72	0.500/218	0.570/205	
	農曆12月18日，大潮							
95年第1次第2段	95.01.17	13:55～15:10		0.92	0.35	0.078/261	0.333/220	
	農曆12月18日，大潮							








續表1-19 第三核能發電廠附近海域民國87～111年度漂流浮標追蹤調查結果

95～96年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
95年 第1次 第3段	95.01.17	13:26～13:50		0.38	0.03	0.006/208	0.143/198	
	農曆12月18日，大潮							
95年 第2次	95.04.12	19:57～21:03		4.19	4.13	0.546/188	0.910/180	
	農曆3月15日，大潮							
95年 第3次	95.07.19	10:51～13:59		4.55	3.763	0.334/213	0.606/210	
	農曆6月24日，小潮							
95年 第4次	95.11.14	11:12～14:12		4.71	4.296	0.398/232	0.734/254	
	農曆9月24日，小潮							
96年 第1次 第1段	96.02.05	09:47～10:29		1.01	0.99	0.394/213	0.547/197	
	農曆12月18日，大潮							
96年 第1次 第2段	96.02.05	10:32～11:41		1.03	0.92	0.223/248	0.499/235	
	農曆12月18日，大潮							








續表1-19 第三核能發電廠附近海域民國87～111年度漂流浮標追蹤調查結果

96 年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
96年 第1次 第3段	96.02.05	11:44～12:51		0.51	0.40	0.100/87	0.218/88	
	農曆12月18日，大潮							
96年 第2次 第1段	96.04.29	13:56～14:42		1.02	0.96	0.347/216	0.531/193	
	農曆3月13日，大潮							
96年 第2次 第2段	96.04.29	14:49～15:34		0.85	0.84	0.312/247	0.561/241	
	農曆3月13日，大潮							
96年 第2次 第3段	96.04.29	15:41～17:09		2.72	2.61	0.495/284	0.816/290	
	農曆3月13日，大潮							
96年 第3次	96.09.11	07:35～10:32		3.17	2.19	0.273/154	0.433/153	
	農曆8月1日，大潮							
96年 第4次 第1段	96.10.11	13:19～13:49		0.91	0.919	0.504/217	0.700/200	
	農曆9月1日，大潮							







續表1-19 第三核能發電廠附近海域民國87～111年度漂流浮標追蹤調查結果

96～97年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
96年第4次第2段	96.10.11	13:19~13:49		7.75	8.41	0.818/196	1.342/179	
	農曆9月1日，大潮							
97年第1次	97.04.06	07:45~10:58		3.25	3.20	0.276/130	0.557/138	
	農曆3月1日，大潮							
97年第2次	97.04.30	14:54~18:10		2.99	2.87	0.244/89	0.398/128	
	農曆3月25日，小潮							
97年第3次	97.09.21	07:02~10:17		3.22	2.85	0.244/216	0.621/175	
	農曆8月22日，小潮							
97年第4次第1段	97.11.06	15:00~15:38		1.59	1.45	0.637/210	1.153/166	
	農曆10月9日，小潮							
97年第4次第2段	97.11.06	15:44~18:17		2.95	2.20	0.307/274	0.694/233	
	農曆10月9日，小潮							









續表1-19 第三核能發電廠附近海域民國87～111年度漂流浮標追蹤調查結果

98~99年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
98年第1次	98.01.17	05:04~08:20		4.41	3.92	0.333/190	0.801/172	
	農曆12月22日，小潮							
98年第2次	98.05.12	08:44~12:00		3.86	2.75	0.233/084	0.576/044	
	農曆4月18日，大潮							
98年第3次	98.08.25	10:50~14:10		4.63	3.11	0.259/206	0.818/225	
	農曆7月6日，大潮							
98年第4次	98.10.30	06:57~10:18		1.82	0.85	0.070/164	0.557/151	
	農曆9月13日，大潮							
99年第1次	99.02.03	05:04~08:20		5.68	5.24	0.441/223	0.771/231	
	農曆12月20日，小潮							
99年第2次	99.05.10	07:11~10:28		6.77	6.70	0.567/097	0.714/110	
	農曆3月27日，小潮							












續表1-19 第三核能發電廠附近海域民國87～111年度漂流浮標追蹤調查結果

99-100年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
99年第3次第1段	99.08.16	08:28~10:26		1.61	1.20	0.170/216	0.444/158	
	農曆7月7日，小潮							
99年第3次第2段	99.08.16	10:39~11:56		1.70	1.62	0.350/265	0.775/242	
	農曆7月7日，小潮							
99年第4次	99.11.23	12:57~16:12		2.36	2.16	0.185/203	0.443/181	
	農曆10月18日，大潮							
100年第1次	100.02.23	06:25~09:54		5.77	5.65	0.451/195	0.692/205	
	農曆正月21日，小潮							
100年第2次第1段	100.05.14	07:11~08:01		0.76	0.70	0.232/227	0.401/181	
	農曆4月12日，小潮							
100年第2次第2段	100.05.14	08:08~09:27		1.32	0.99	0.206/236	0.516/216	
	農曆4月12日，小潮							












續表1-19 第三核能發電廠附近海域民國87～111年度漂流浮標追蹤調查結果

100-101年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
100年第2次第3段	100.05.14	09:34~10:21		1.50	1.49	0.529/205	0.621/206	
	農曆4月12日，小潮							
100年第3次	100.08.09	07:30~10:44		3.57	2.76	0.237/153	0.511/181	
	農曆7月10日，小潮							
100年第4次	100.11.19	15:04~18:16		2.85	2.65	0.230/160	0.419/184	
	農曆10月24日，小潮							
101年第1次	101.02.24	15:04~18:16		7.15	5.83	0.501/130	1.133/100	
	農曆2月3日，大潮							
101年第2次	101.04.30	08:00~11:39		2.76	2.67	0.235/80	0.322/79	
	農曆4月10日，小潮							
101年第3次	101.08.19	09:45~12:55		2.79	1.96	0.172/178	0.495/204	
	農曆7月3日，大潮							









續表1-19 第三核能發電廠附近海域民國87～111年度漂流浮標追蹤調查結果

101-102年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
101年第4次	101.11.10	05:55~09:09		1.95	1.27	0.109/206	0.342/157	
	農曆9月27日，小潮							
102年第1次	102.02.26	13:52~17:01		3.19	2.59	0.228/206	0.579/209	
	農曆正月17日，大潮							
102年第2次	102.05.30	05:15~08:31		3.48	3.36	0.286/163	0.531/144	
	農曆4月21日，小潮							
102年第3次第一段	102.08.07	07:36~08:09		0.29	0.25	0.124/17	0.182/347	
	農曆7月1日，大潮							
102年第3次第二段	102.08.07	08:17~10:50		2.76	2.66	0.290/20	0.406/10	
	農曆7月1日，大潮							
102年第4次	102.11.27	15:45~19:08		2.49	2.25	0.185/112	0.413/150	
	農曆10月25日，小潮							








續表1-19 第三核能發電廠附近海域民國87～111年度漂流浮標追蹤調查結果

103-104年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
103年第1次第一段	103.02.27	15:54~16:29		0.89	0.87	0.414/213	0.448/175	
	農曆1月28日，大潮							
103年第1次第二段	103.02.27	16:35~19:09		5.87	5.69	0.616/240	0.874/230	
	農曆1月28日，大潮							
103年第2次	103.05.08	16:44~20:05		2.27	2.06	0.171/218	0.445/165	
	農曆4月10日，小潮							
103年第3次	103.08.19	04:37~07:51		1.40	1.10	0.094/148	0.683/141	
	農曆7月24日，小潮							
103年第4次	103.11.21	07:35~10:50		3.17	0.99	0.084/167	0.443/233	
	農曆閏9月29日，大潮							
104年第1次	104.02.11	15:26~18:40		3.38	3.26	0.280/086	0.489/068	
	農曆12月23日，小潮							
104年第2次	104.05.04	07:56~11:12		2.71	2.53	0.215/114	0.482/144	
	農曆3月16日，大潮							








續表1-19 第三核能發電廠附近海域民國87～111年度漂流浮標追蹤調查結果

104-105年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
104年第3次	104.08.17	11:04~14:00		3.82	3.70	0.351/73	0.495/61	
	農曆7月4日，大潮							
104年第4次第一段	104.11.07	11:11~12:18		1.33	1.26	0.315/213	0.435/167	
	農曆9月26日，小潮							
104年第4次第二段	104.11.07	12:22~14:25		5.29	4.38	0.593/206	1.016/163	
	農曆9月26日，小潮							
105年第1次第一段	105.02.18	10:57~11:24		0.77	0.74	0.459/213	0.508/181	
	農曆1月11日，小潮							
105年第1次第二段	105.02.18	11:29~14:15		4.89	4.27	0.428/209	0.728/208	
	農曆1月11日，小潮							
105年第2次第一段	105.05.09	08:50~10:41		1.37	0.36	0.054/221	0.493/156	
	農曆4月3日，大潮							
105年第2次第二段	105.05.09	10:48~12:04		0.83	0.75	0.165/044	0.364/029	
	農曆4月3日，大潮							








續表1-19 第三核能發電廠附近海域民國87～111年度漂流浮標追蹤調查結果

105-106年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
105年第3次第一段	105.08.21	09:10~10:05		0.87	0.80	0.242/207	0.434/181	
	農曆7月19日，大潮							
105年第3次第二段	105.08.21	10:14~12:12		1.17	0.99	0.140/236	0.223/235	
	農曆7月19日，大潮							
105年第3次第三段	105.08.21	12:12~12:25		0.07	0.07	0.113/278	0.115/276	
	農曆7月19日，大潮							
105年第4次第一段	105.11.17	14:10~15:05		0.86	0.80	0.243/208	0.279/157	
	農曆10月18日，大潮							
105年第4次第二段	105.11.17	15:11~17:29		1.52	0.98	0.118/159	0.357/150	
	農曆10月18日，大潮							
106年第1次第一段	106.02.22	09:58~10:42		0.89	0.78	0.297/219	0.402/150	
	農曆1月26日，小潮							









續表1-19 第三核能發電廠附近海域民國87～111年度漂流浮標追蹤調查結果

106 年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 Km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
106年 第1次 第二段	106.02.22	10:54~11:31		0.87	0.81	0.367/220	0.478/167	
	農曆1月26日，小潮							
106年 第1次 第三段	106.02.22	11:42~12:29		1.04	0.95	0.338/217	0.445/235	
	農曆1月26日，小潮							
106年 第1次 第四段	106.02.22	12:39~13:18		0.99	0.94	0.400/217	0.462/228	
	農曆1月26日，小潮							
106年 第2次	106.05.14	08:52~12:12		2.49	1.61	0.134/107	0.362/160	
	農曆4月19日，大潮							
106年 第3次 第一段	106.08.17	12:47~14:40		1.37	1.15	0.169/211	0.540/156	
	農曆閏6月26日，小潮							
106年 第3次 第二段	106.08.17	14:47~16:05		1.09	1.06	0.227/219	0.469/223	
	農曆閏6月26日，小潮							









續表1-19 第三核能發電廠附近海域民國87～111年度漂流浮標追蹤調查結果

106-108年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 Km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
106年第4次	106.11.17	13:18~16:30		3.08	2.79	0.242/203	0.554/138	
	農曆9月29日，大潮							
107年第1次	107.02.16	08:59~12:15		2.97	2.47	0.210/040	0.686/054	
	農曆1月1日，大潮							
107第2季	107.05.13	08:01~11:16		3.08	2.83	0.242/084	0.471/145	
	農曆3月28日，中潮							
107年第3季	107.09.08	08:50~12:09		6.45	3.29	0.276/153	1.199/078	
	農曆7月29日，大潮							
107年第4季	107.11.05	07:01~10:16		2.78	2.41	0.206/078	0.454/127	
	農曆9月28日，大潮							
108年第1季	108.02.20	13:46~16:53		2.70	2.51	0.224/192	0.399/191	
	農曆1月16日，大潮							

續表1-19 第三核能發電廠附近海域民國87～111年度漂流浮標追蹤調查結果

108-109年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 Km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
108年第2季	108.05.12	08:00~11:16		7.06	5.98	0.509/249	0.962/270	
	農曆4月8日，小潮							
108年第3季	108.08.23	12:10~15:28		7.74	7.52	0.633/193	0.980/207	
	農曆7月23日，小潮							
108年第4季	108.11.16	14:30~17:47		3.72	3.04	0.257/242	0.434/268	
	農曆10月20日，小潮							
109年第1季	109.02.07	12:08~15:15		2.70	2.41	0.215/188	0.380/230	
	農曆1月14日，大潮							
109年第2季	109.05.07	15:47~19:03		5.38	5.15	0.438/158	0.809/141	
	農曆4月15日，大潮							

續表1-19 第三核能發電廠附近海域民國87～111年度漂流浮標追蹤調查結果

109-110年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 Km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
109年第3季	109.08.16	06:09~09:16		3.47	2.16	0.192/213	0.753/222	
	農曆 6 月 27 日，中潮							
109年第4季	109.10.22	06:57~11:07		1.73	0.49	0.033/142	0.287/130	
	農曆 9 月 6 日，中潮							
110年第1季	110.01.22	15:50~19:00		4.46	3.94	0.346/088	0.476/056	
	農曆十二月初十，小潮							
110年第2季	110.04.16	16:20~19:33		2.54	2.43	0.210/156	0.462/171	
	農曆三月初五，中潮							
110年第3季	110.08.13	12:35~15:49		2.37	0.76	0.066/061	0.412/217	
	農曆七月初六，中潮							
110年第4季	110.11.18	10:50~14:00		2.74	2.50	0.219/201	0.484/201	
	農曆十月十四，大潮							

續表1-19 第三核能發電廠附近海域民國87～111年度漂流浮標追蹤調查結果







111年	日期	時間	潮汐	流程 km	淨流程 Km	淨流速 m/s/流向°	最大流速 m/s/流向°	漂流流型
111年 第1季	111.03.05	08:57~12:14		4.45	4.00	0.337/192	0.568/147	
	農曆二月初三，大潮							
111年 第2季	111.05.20	05:52~09:06		2.77	1.91	0.164/057	0.424/022	
	農曆四月二十，中潮							
111年 第3季	111.07.22	05:39~08:44		2.39	2.18	0.197/159	0.573/152	
	農曆六月二十四，小潮							
111年 第4季	111.11.12	13:41~16:57		1.77	1.41	0.120/047	0.289/142	
	農曆十月十九，大潮							

表1-20 第三核能發電廠附近海域長期海流測站平均流速、流向及絕對流速表

次序	有效資料日期	平均流速 (m/s)	平均流向 (°)	絕對平均 (m/s)
1	86.10.24~86.11.20	0.031	69	0.143
2	86.12.29~87.02.16	0.045	320	0.146
3	87.04.11~87.05.04	0.033	258	0.095
4	87.10.04~87.11.18	0.030	347	0.084
5	87.12.14~88.01.27	0.029	234	0.093
6	88.01.27~88.03.14	0.006	290	0.029
7	88.04.22~88.04.25	0.022	328	0.086
8	88.05.25~88.06.21	0.030	340	0.133
9	88.09.29~88.10.01	0.100	23	0.148
10	89.01.15~89.02.16	0.040	326	0.094
11	89.05.02~89.05.29	0.052	359	0.107
12	89.09.17~89.09.30	0.223	210	0.304
13	89.10.01~89.11.07	0.093	205	0.243
14	90.02.03~90.03.31	0.154	224	0.237
15	90.04.05~90.05.25	0.169	222	0.232
16	90.11.28~91.01.04	0.116	210	0.219
17	91.01.04~91.03.05	0.161	219	0.220
18	91.03.26~91.04.12	0.147	219	0.213
19	91.04.29~91.05.10	0.164	222	0.221
20	91.08.27~91.09.29	0.119	232	0.227
21	91.10.01~91.11.05	0.115	232	0.213
22	92.01.17~92.03.02	0.176	235	0.247
23	92.04.13~92.05.08	0.152	232	0.232
24	92.08.01~92.08.17	0.213	231	0.273
25	92.10.22~92.12.11	0.104	232	0.198
26	93.02.17~93.03.24	0.155	237	0.242
27	93.05.06~93.06.05	0.186	226	0.262
28	93.08.01~93.09.02	0.116	238	0.252
29	93.12.11~94.01.18	0.105	233	0.295
30	94.01.18~94.03.19	0.111	232	0.306
31	94.03.19~94.04.28	0.099	236	0.272

續表1-20 第三核能發電廠附近海域長期海流測站平均流速、流向及絕對流速表

次序	有效資料日期	平均流速 (m/s)	平均流向 (°)	絕對平均 (m/s)
32	94.05.17~94.07.08	0.199	232 ↙	0.298
33	94.10.01~94.12.09	0.134	231 ↙	0.265
34	94.12.09~95.01.29	0.096	233 ↙	0.267
35	95.01.30~95.03.18	0.135	234 ↙	0.268
36	95.03.18~95.05.01	0.197	234 ↙	0.287
37	95.05.01~95.07.22	0.216	234 ↙	0.315
38	95.07.22~95.09.23	0.176	235 ↙	0.298
39	95.09.23~95.12.08	0.193	238 ↙	0.284
40	96.01.20~96.03.10	0.147	236 ↙	0.220
41	96.03.10~96.04.22	0.186	232 ↙	0.267
42	96.04.22~96.05.27	0.210	234 ↙	0.293
43	96.05.27~96.07.01	0.230	231 ↙	0.315
44	96.07.01~96.09.08	0.211	234 ↙	0.297
45	96.09.08~96.10.25	0.144	236 ↙	0.260
46	96.12.14~97.01.28	0.196	235 ↙	0.265
47	97.02.12~97.04.06	0.176	240 ↙	0.245
48	97.05.23~97.07.02	0.228	233 ↙	0.324
49	97.08.30~97.10.18	0.174	235 ↙	0.277
50	97.12.02~98.01.17	0.219	233 ↙	0.289
51	98.01.17~98.03.05	0.185	235 ↙	0.279
52	98.03.05~98.05.02	0.195	230 ↙	0.284
53	98.05.02~98.07.06	0.201	230 ↙	0.295
54	98.07.06~98.08.28	0.176	225 ↙	0.289
55	98.08.28~98.10.02	0.168	232 ↙	0.274
56	98.10.14~98.11.20	0.130	237 ↙	0.293
57	98.11.20~98.12.30	0.087	229 ↙	0.303
58	98.12.30~99.01.31	0.146	230 ↙	0.280
59	99.01.31~99.03.05	0.179	232 ↙	0.274
60	99.03.05~99.04.10	0.166	228 ↙	0.261
61	99.04.10~99.05.20	0.200	230 ↙	0.282

續表1-20 第三核能發電廠附近海域長期海流測站平均流速、流向及絕對流速表

次序	有效資料日期	平均流速 (m/s)	平均流向 (°)	絕對平均 (m/s)
62	99.05.20~99.07.08	0.23	226 ↙	0.321
63	99.07.08~99.08.22	0.22	231 ↙	0.314
64	99.08.22~99.09.26	0.21	227 ↙	0.286
65	99.09.26~99.11.08	0.20	232 ↙	0.290
66	99.11.08~99.12.14	0.10	235 ↙	0.270
67	99.12.14~100.01.26	0.05	245 ↙	0.265
68	100.01.27~100.03.11	0.19	232 ↙	0.289
69	100.03.11~100.04.25	0.13	235 ↙	0.268
70	100.04.25~100.06.02	0.17	232 ↙	0.275
71	100.06.02~100.07.24	0.20	230 ↙	0.296
72	100.07.24~100.09.08	0.21	229 ↙	0.293
73	100.09.08~100.10.28	0.11	234 ↙	0.275
74	100.10.28~100.12.15	0.11	237 ↙	0.294
75	100.12.15~101.01.19	0.12	232 ↙	0.312
76	101.01.19~101.03.02	0.18	228 ↙	0.290
77	101.03.02~101.04.20	0.22	232 ↙	0.300
78	101.04.20~101.05.28	0.18	229 ↙	0.285
79	101.05.28~101.07.07	0.21	235 ↙	0.304
80	101.07.07~101.08.10	0.21	234 ↙	0.293
81	101.08.10~101.09.10	0.22	234 ↙	0.302
82	101.09.10~101.10.24	0.11	237 ↙	0.275
83	101.10.24~101.11.23	0.07	227 ↙	0.322
84	101.11.23~102.01.12	0.20	234 ↙	0.300
85	102.01.12~102.02.19	0.16	234 ↙	0.259
86	102.02.19~102.03.28	0.20	233 ↙	0.283
87	102.03.28~102.05.10	0.18	234 ↙	0.269
88	102.05.10~102.06.16	0.24	230 ↙	0.333
89	102.06.16~102.07.24	0.21	229 ↙	0.317
90	102.07.24~102.09.07	0.18	234 ↙	0.292
91	102.09.07~102.10.01	0.14	242 ↙	0.288
92	102.10.01~102.11.15	0.12	234 ↙	0.292

續表1-20 第三核能發電廠附近海域長期海流測站平均流速、流向及絕對流速表

次序	有效資料日期	平均流速 (m/s)	平均流向 (°)	絕對平均 (m/s)
93	102.11.15~102.12.30	0.14	237 ↙	0.272
94	102.12.30~103.02.07	0.14	241 ↙	0.265
95	103.02.07~103.03.20	0.19	239 ↙	0.265
96	103.03.20~103.05.07	0.19	231 ↙	0.282
97	103.05.07~103.06.19	0.22	230 ↙	0.302
98	103.06.19~103.08.23	0.21	232 ↙	0.310
99	103.08.23~103.09.21	0.18	230 ↙	0.265
100	103.10.03~103.11.25	0.14	236 ↙	0.282
101	103.11.25~104.01.27	0.15	235 ↙	0.272
102	104.01.27~104.03.23	0.12	234 ↙	0.264
103	104.03.23~104.05.31	0.19	227 ↙	0.269
104	104.05.31~104.07.17	0.21	228 ↙	0.264
105	104.07.17~104.09.11	0.18	232 ↙	0.269
106	104.09.11~104.11.07	0.13	229 ↙	0.295
107	104.12.24~105.01.30	0.15	237 ↙	0.283
108	105.01.30~105.03.22	0.17	233 ↙	0.273
109	105.05.16~105.06.23	0.19	233 ↙	0.304
110	105.06.23~105.07.20	0.22	230 ↙	0.304
111	105.07.20~105.09.12	0.20	234 ↙	0.289
112	105.10.28~105.12.13	0.15	241 ↙	0.286
113	105.12.13~106.01.19	0.11	229 ↙	0.317
114	106.01.19~106.03.14	0.16	233 ↙	0.281
115	106.03.14~106.05.10	0.21	228 ↙	0.299
116	106.05.10~106.07.06	0.20	233 ↙	0.289
117	106.07.06~106.08.29	0.23	232 ↙	0.312
118	106.08.29~106.10.21	0.18	229 ↙	0.266
119	106.10.21~106.12.15	0.13	235 ↙	0.264

續表1-20 第三核能發電廠附近海域長期海流測站平均流速、流向及絕對流速表

次序	有效資料日期	平均流速 (m/s)	平均流向 (°)	絕對平均 (m/s)
120	106.12.15~107.02.16	0.08	233 ↙	0.276
121	107.02.16~107.03.19	0.15	236 ↙	0.264
122	107.03.19~107.04.21	0.19	234 ↙	0.284
123	107.04.21~107.06.02	0.17	232 ↙	0.265
124	107.06.02~107.07.20	0.20	229 ↙	0.285
125	107.07.20~107.09.12	0.18	233 ↙	0.293
126	107.09.23~107.11.04	0.19	236 ↙	0.265
127	107.11.04~107.12.16	0.09	234 ↙	0.279
128	107.12.16~108.03.10	0.17	234 ↙	0.281
129	108.03.10~108.05.11	0.21	229 ↙	0.290
130	108.05.11~108.07.16	0.20	230 ↙	0.299
131	108.07.24~108.09.15	0.19	229 ↙	0.292
132	108.09.15~108.11.10	0.12	239 ↙	0.271
133	108.11.10~109.01.08	0.07	235 ↙	0.307
134	109.01.08~109.02.28	0.20	238 ↙	0.285
135	109.02.28~109.04.19	0.14	237 ↙	0.264
136	109.04.19~109.06.20	0.20	229 ↙	0.284
137	109.06.20~109.08.17	0.21	229 ↙	0.301
138	109.08.17~109.10.16	0.20	229 ↙	0.299
139	109.10.16~109.12.24	0.09	232 ↙	0.286
140	109.12.24~110.02.20	0.08	229 ↙	0.335
141	110.02.20~110.04.15	0.14	235 ↙	0.278
142	110.04.15~110.07.20	0.18	232 ↙	0.296
143	110.08.19~110.09.09	0.19	229 ↙	0.269
144	110.09.16~110.11.18	0.15	237 ↙	0.269
145	110.11.18~111.01.15	0.11	245 ↙	0.266
146	111.01.15~111.03.14	0.15	240 ↙	0.268
147	111.03.14~111.04.21	0.20	232 ↙	0.283
148	111.07.13~111.11.10	0.17	232 ↙	0.282

表 1-21 第三核能發電廠附近海域歷年 CTD 調查水團屬性

季節	日期	航次	南海中鹽水團	混合水團	黑潮水團
春季	83.03.31	1-3	※	○	○
	83.05.25	1-4	※	○	○
	84.03.22	2-3	○	○	
	84.04.28	2-4	○	○	※
	85.04.14	3-3		○	○
	85.05.11	3-4	○	○	※
	86.05.11	4-3	○		
	87.05.04	5-3		○	※
	88.05.25	6-3		○	
	89.03.21	7-3	※	○	
	89.05.30	7-4	○	※	
	90.04.13	9-2	※	○	
	92.03.01	11-1		○	
	92.05.07	11-2	※	○	※
	93.05.07	12-2		○	
	94.05.17	13-2		○	
	95.05.04	14-2		○	
	96.05.11	15-2		○	
	97.03.14	16-2		○	
	98.03.14	17-1		○	
	98.05.13	17-2		○	
	99.05.11	18-2		○	
	100.05.13	19-2	※(底層)	○	
	101.05.01	20-2		○	
	102.05.28	21-2	※	○	
	103.05.07	22-2	※(底層)	○	
	104.05.05	23-2	※	○	
	105.05.10	24-2		○	○
	106.05.22	25-2		○	
	107.05.14	26-2	※(底層)	○	
	108.05.10	27-2		○	
	109.05.20	28-2		○	
	110.04.15	29-2	※(底層)	○	
	111.05.11	30-2	※(底層)	○	

○：較多　　※：稀疏

續表1-21 第三核能發電廠附近海域歷年 CTD 調查水團屬性

季節	日期	航次	南海中鹽水團	混合水團	黑潮水團
夏季	83.07.26	2-1	○	○	※
	86.06.01	4-4	○	○	○
	87.08.11	6-1	○		
	89.08.11	8-1	※	○	
	90.07.17	9-3	※(底層)	○	
	91.06.18	10-2	※	○	
	91.07.24	10-3		○	
	92.08.01	11-3		○	
	93.08.02	12-3	※(底層)	○	
	94.07.13	13-3	※(底層)	○	
	95.07.21	14-3	※(底層)	○	
	98.08.26	17-3		○	
	99.08.17	18-3	**※(底層)**	○	
	100.08.10	19-3		○	
	101.08.20	20-3		○	
	102.08.08	21-3		○	
	103.08.18	22-3		○	
	104.08.18	23-3		○	
	105.08.25	24-3		○	
	106.08.18	25-3	※(底層)	○	
	108.08.23	27-3	※(底層)	○	
	109.08.15	28-3		○	
	110.08.12	29-3	※(底層)	○	
	111.08.12	30-3		○	

○：較多　　※：稀疏

續表1-21 第三核能發電廠附近海域歷年 CTD 調查水團屬性

季節	日期	航次	南海中鹽水團	混合水團	黑潮水團
秋季	82.09.21	1-1		○	
	82.11.30	1-2	※	○	※
	83.10.02	2-2	※	○	
	86.09.22	5-1		○	
	88.09.29	7-1		○	
	89.10.03	8-2		○	
	90.10.30	9-4		○	
	91.10.25	10-4		○	
	92.11.01	11-4	※	○	
	93.11.05	12-4		○	※
	94.10.20	13-4		○	
	95.10.17	14-4		○	
	96.09.28	15-3		○	
	96.11.16	15-4	○	※	
	97.09.05	16-3		○	
	97.11.07	16-4		○	
	98.10.28	17-4		○	
	99.11.16	18-4		○	
	100.11.19	19-4	※	○	
	101.11.09	20-4	※	○	
	102.11.27	21-4		○	
	103.11.22	22-4		○	
	104.11.06	23-4		○	
	105.11.18	24-4		○	
	106.11.17	25-4	※(底層)	○	
	107.09.07	26-3	※(底層)	○	
	107.11.15	26-4	※	○	
	108.11.18	27-4	※(底層)	○	
	109.10.22	28-4	※(底層)	○	
	110.11.10	29-4		○	
	111.11.17	30-4		○	

○：較多　　※：稀疏

續表1-21 第三核能發電廠附近海域歷年 CTD 調查水團屬性

季節	日期	航次	南海中鹽水團	混合水團	黑潮水團
冬季	85.12.14	3-2	※	○	
	86.03.01	4-2	○	※	
	86.12.29	5-2		※	○
	88.01.27	6-2	※	○	
	89.02.23	7-2	○(中底層)	○(表層)	
	90.01.31	9-1	○	※	
	91.01.11	10-1	○	○	
	93.02.17	12-1		○	
	94.01.20	13-1	※(表層)	○	※(底層)
	95.01.17	14-1	○	※(表層)	
	96.01.17	15-1	※(表層)	○	
	97.01.16	16-1	※(表層)	○	
	99.02.05	18-1	※(表層)	○	※(表層)
	100.02.24	19-1		○	
	101.02.23	20-1		○	
	102.02.27	21-1	○	※	
	103.02.25	22-1		○	※(表層)
	104.02.11	23-1	※(表層)	○	※(表層)
	105.02.19	24-1		※	○
	106.02.23	25-1		※	○
	107.02.20	26-1	○	※	
	108.02.22	27-1	※(表層)	○	※(底層)
	109.02.14	28-1	○	※(表層)	
	110.01.22	29-1	○	※(表層)	
	111.02.16	30-1	※(表層)	○	

○：較多　　※：稀疏

表1-22　第三核能發電廠附近海域海潮流歷年調查結果摘要整理

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第1年	68－69	范光龍 張湘電	漂流資料(65~66年)只分析以往實測	第三核能發電廠出水口附近海域的海水在落潮時段有時會迴流至入水口附近，尤其是在大潮時更明顯，風力有時或許會助長迴流之發生，但風向並非主要的決定因素，潮流才是主宰的力量。靠近岸邊的迴流受底部摩擦的影響，流速減慢；離岸較遠處流速較快，落潮流也有可能迴流至入水口附近，但離岸較遠，至於這些迴流會否影響第三核能發電廠之運轉則有待今後2～3年進一步之研究證實。夏季常發生迴流，風向不是影響迴流之最重要因素。熱排水僅及表面3m，但入水口抽取水下6 m之冷卻水，不易受其影響。
第2年	69－70	范光龍 張湘電	A站：出水口東側約200 m B站：出水口南側約200 m	落潮時段，排水口附近海水確實常會流向入水口附近。又發現排水口的東側與南側海流方向並非一致，有時有反向的情形。海面下4m海水溫度在8月18日～9月24日平均約為28.55°C，11月30日～1月8 日為24.53°C，3月4日～4月13日為24.89°C。排水口附近海水一般都往西南流，只有在落潮時可能會往東北流而造成向進水口迴流的現象，1天一般都有2次漲、落潮，但兩次落潮都有迴流現象的極為少見，全日僅有短暫迴流現象而不足為害的情形反而較多。在3次測流期間，迴流現象較明顯的日子，其流速、流向及每次迴流的持續時間，其中流向(direction)的度數是取正北為零度，順時鐘方向轉的角度，表中所列為取0°～60°較易造成迴流問題的海流資料。8月18日～9月24日期間落潮流可能造成迴流的天數有9天，其流速平均為18.15cm/sec，平均時間為5.44小時，其中9月19日最是嚴重，迴流時間連續8 小時，平均流速為19.4cm/sec，前4小時內排水口附近海水已流回入水口附近，其後4小時就可能發生熱廢水再使用的問題。11月30日～1月7日可能有迴流問題的佔12天，流速平均為12.78cm/sec，平均迴流時間為6.92小時，其中迴流時間8小時以上的有4天，1月5日那天竟達13小時，3月4日～4月1日可能有迴流問題的佔6天，流速平均為15.84cm/sec，迴流時間僅4.17小時，3段測流期間，這是迴流問題最小的一段。 A、B 兩測站海流有時同向，有時則反向，所以排水口附近海水之海流不論在漲或落潮時都有兩種較可能的不同流況，這當然是因為受地形的影響，由於這種特殊的流況，如果要在A、B 兩點間築一堤以防止熱廢水之迴流，效果應該是不錯的。 1年3次的測流期間，雖然大部份同是落潮流引起迴流問題，但迴流的強弱還是隨季節不同，以本年度測流的3段期間為例，夏季與初冬的迴流現象就比初春較常出現，這可能與第三核能發電廠附近海域水團來源之不同有關。
第3年	70－71年	范光龍 張湘電	A站：出水口東側約500 m B站：出水口南側約500 m	一般說來，第三核能發電廠附近海域水溫相當高，在1、2月間測得的日平均水溫仍在23°C以上，4、5月的平均水溫在27°C以上，而7、8月的每日平均最高達29°C，而這只是1日的平均，由記錄的資料中，我們發現當日在下午三、四點的時候，水溫高達30°C以上，可見防止第三核能發電廠熱廢水的迴流問題實在相當重要。 統計潮流特性後，所得在第三核能發電廠附近海域較可能的落潮流況。其中第1型就是發生迴流現象的情形，第2型的落潮流況則與一般漲潮流況相同，即入水口附近海水流向排水口，然後向貓鼻頭方向而去，這種流況對第三核能發電廠而言，冷卻效果最好。第3型則是排水口附近海水流向入水口，而入水口附近海水，流向排水口，二者在中途相遇後，一起流向第三核能發電廠附近海域中央。第4種之情況則與第3型相反，同樣不會造成熱廢水的迴流問題。

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第3年	70｜71年	范光龍 張湘電	A站：出水口東南側約500 m B站：出水口東南側約500 m	民國70年8月26日下午4點的時候(其實是3:30至4:30一小時的平均)，海流指向北方偏東約4°，流速16.5cm/sec，在A、B二點同時測得海流有迴流方向的時間相當長，當天熱廢水發生迴流的現象相當顯著，但在三、四個月的測流期間這麼明顯的迴流現象並不常見。 一般有迴流的情況是，A點海水流向入水口，流至B點時，流速已減緩許多，這可能是由於流近入水口之前深度變淺，尤其是後壁湖之東側，落潮時淺灘都還露出水面，海流流速受底部摩擦之影響自然會減慢；將來第三核能發電廠排出熱廢水後，縱然有迴流現象，一部份海水流向入水口中途，流速會減緩，另一部份海水會往第三核能發電廠附近海域中央擴散，第三核能發電廠附近海域熱海水較輕，浮在表層，較容易擴散往第三核能發電廠附近海域中央，更不易流回入水口重新使用。 第三核能發電廠熱廢水可能生迴流的現象極為少見，但由於第三核能發電廠附近海域的海水水溫相當高，夏季可高達30°C，冬季仍有23°C，所以縱使迴流時間不長，情況不很嚴重，我們還是要慎重處理。 第三核能發電廠附近海域內的流況也常有自成環流(circulation)系統的現象。
第4年	71｜72	范光龍 張湘電	A站：出水口東南側約500 m B站：出水口東南側約500 m	由於第三核能發電廠附近海域排水口的排水堤已大部份竣工，熱廢水發生迴流的可能性已更減少，近1年測流測得的海流資料才發現1次迴流現象，且為時甚短，要多注意的倒是第三核能發電廠附近海域海水水溫偏高，月平均水溫在24～27°C之間，日平均水溫時有超過28°C的情形。 第三核能發電廠附近海域水溫偏高是第三核能發電廠的一個隱憂，月平均水溫在10、11月間及5、6月間不會比7、8月間低，這可能是由於第三核能發電廠附近海域水團在夏季時來自南中國海，其他季節則來自黑潮(Fan, 12)。 第三核能發電廠附近海域海流主要受潮流之影響，一般而言，當地潮流以半日潮為主，漲、落潮流各約維持6小時左右，漲潮時Inlet海水流向Outlet，落潮時才有可能由Outlet流向Inlet，但流速不如漲潮流強，且流向也不穩定，發生迴流的可能性不大。 Inlet與Outlet的距離約為3km，A、B二點同時往北流的流速及時間必需配合方有可能發生迴流現象，如果Outlet流向Inlet之海流穩定維持6小時，則流速需14cm/sec以上才有可能再使用熱廢水，在A點有202天的海流資料，海流流速、流向及延續時間配合而可能引起迴流問題的有46次，B點160天資料中僅19次，前面已述及，熱廢水再利用之可能必需A、B二點的海流配合，我們研究A點的46之及B點的19次，發現只有在71年7月25日那天可能發生迴流現象，而那是近乎1年的測流期間僅有的1次，可見核第三核能發電廠附近海域發生迴流現象的可能性極低，7月25日早上9點至晚上9點的13小時內(大約是潮汐一週期)，A、B二點的每小時海流變化情形，推算Outlet 熱廢水可能在下午一點左右流至Inlet附近，而熱廢水再利用的時間不會超過半小時，Inlet附近海水便開始往南流。與以前的海流資料比較(蘇仲卿等，1981)，我們發現，現在發生迴流現象的頻率遠較2年前為低，這大概是因為Outlet突出的排水堤已開始發生效用。

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第5年	72—73（73年5月9日一號機開始發電）	范光龍 張湘電	A站：出水口 B站：入水口 C站：東南方500m 東南方500m 100mm	第三核能發電廠附近海域沿海海流以半日潮流為主，漲潮時，第三核能發電廠入水口海水流向西南方之排水口，落潮時排水口海水方有可能流向入水口，但流速較緩，入、排水口間距離約3km，且中途有淺灘，而且入水口在水面下6m取水，因此熱廢水環流被再利用的可能性極微。 結果顯示在這冬季兩個多月期間，排水口附近海水在落潮時偶有流向入水口的情形，但一般落潮流速都不快，而且延續的時間也不長，所以要造成熱廢水再利用的可能性極微。再看水溫記錄，民國72年12月中至隔年1月底，水溫平均23°C左右，2月初至3月2日，水溫平均升至24°C左右，在冬季尚且如此，可見第三核能發電廠附近海域水溫偏高之一般。 台灣沿海的核電廠，熱水均由海表面排放，卻在海面下6m抽取海水冷卻，所以只要不是太明顯的迴流，否則也不易造成熱廢水再利用的問題。第三核能發電廠附近海域的潮流以半日潮為主(劉長遠，1978)，潮汐週期約12小時25分，換句話說，第三核能發電廠附近海域受海灣地形的影響，第三核能發電廠附近海域，漲潮方向的海流佔著相當大的優勢，漲潮時海流幾乎全是由東北向西南流，流至貓鼻頭後快速向西去，落潮時方有可能由西南流向東北，由排水口流向入水口，但流速遠不及漲潮流流速，前面兩年收集的海流、浮標追蹤及染料擴散試驗資料顯示，平均2～4天都會記錄到1次可能發生迴流的流況，但情形都不嚴重，第三(70)年以後蒐集的資料則顯示迴流情況更少見了，那可能是由於排水口增建的排水堤已開始發揮效用，阻止了部份的迴流。造成第三核能發電廠附近海域熱廢水迴流不常見的原因，除了海灣地形的影響外，還受了海底地形的影響，排水口至入水口間有一部份海底較淺，低潮時尚可見淺灘露出海面，如果在落潮時排水口的熱廢水流向入水口，流至較淺的地方，海流受底部摩擦影響，流速減緩，或令海流方向改變而流向海灣中央。更進一步說，縱有部份的熱廢水流回入水口，但它已在海面漂流3km，水溫一定已降低很多，再加上抽取海水在海面下6m，因此熱廢水再使用的機會真是微乎其微了。 將資料做了低頻過率(low pass)處理，這對海流而言已濾掉潮流的部份，對風而言已濾掉日、夜吹向不同的海陸風成份，海流主要還是以向南及西南為主。 1月底至2月底應屬冬季，水溫主要在24～25°C之間，有時甚至達26°C，當東北風較強盛時，第三核能發電廠附近海域可能產生西南流向的風漂流，而A點測站水溫常會顯著下降，有時可降2～3°C，東北風且愈來愈大，西南流向之海流亦增強，水溫也同時下降，兩天後，東北風速已逐增至最大，水溫也已由26°C降至最低的24°C，再看其他東北風強盛的時段，也多有類似的現象，這可能是由於吹東北風時第三核能發電廠附近海域北岸海水被風吹離岸而去，較深海水上來補充，也就是所謂的上昇流(upwelling)現象，水溫自然降低。發現這是一個相當普遍的現象，吹東北風後，第三核能發電廠附近海域入水口之西南向海流增強，水溫亦隨之而降，所以吹東北風時，第三核能發電廠附近海域的冷卻系統效果應會更好。 第三核能發電廠要考慮的還是當地海水溫度偏高的問題，第三核能發電廠附近海域海水在冬季主要來自黑潮支流，夏季則受中國南海海水的影響(Fan, 1982b)，由低緯度來的海水水溫自然比較高，第三核能發電廠附近海域海水溫度在冬季一般在22～24°C左右，夏季平均高達28°C左右，且時有30°C的記錄。

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第6年	73—74（二號機於74年5月18日開始發電）	范光龍 張湘電	A站：出水口東方500m	第三核能發電廠已開始運轉，其排出的溫排水或許稍微改變了排水口的流況，也增加了附近表層海水的溫度，但影響僅限於排出口附近很小的範圍，在排水口東方500m，水面下4m量得的資料顯示，海流及水溫幾乎不受第三核能發電廠運轉的影響，但第三核能發電廠附近海域水溫偏高，冬季為22～24°C範圍，夏季常達28°C以上，仍然是應該重視的問題。 根據以往多年的調查，第三核能發電廠附近海域的潮流以半日潮為主(葉國傑，1984)，大約12 小時25分冬有一高、低潮，但第三核能發電廠附近海域沿岸海流一般流往西南貓鼻頭方向為主，只有落潮時才有可能發現排水口海水流向入水口，即所謂的迴流(蘇仲卿等，1982)，只有平均海流往東北方向才有可能，140天中只有3天可能發現明顯的迴流現象，機率很小，而且排水口流回入水口的溫排水僅限於表層海水，估計不可能超過1m，而入水口是吸入表層下6m深的海水冷卻，再加上迴流抵達之時間極短，估計不會超過2小時，所以第三核能發電廠附近海域的迴流問題幾乎是不存在的。 夏季時第三核能發電廠附近海域水溫主要在24～26°C範圍，大部份在28°C以上，而這是水面下4m測得的資料，在表面的海水有時應可達30°C，可見第三核能發電廠附近海域水溫夏季時相當高，74年1月9日至4月28日測量期間，水溫主要在22～26°C範圍，1、2月冬季期間則多在22～24°C，這與以往測得的資料一樣(蘇仲卿等，1984)，並沒有因為第三核能發電廠的運轉而使水溫增加，這說明了一點，測站A點乃迴流必經之地，A點水面下4m的水溫不受第三核能發電廠運轉的影響，溫排水縱有迴流現象，水溫絕不會影響至水面下4m，A點離入水口約1.5km左右，表層溫排水再經過如此長距離以及3、4小時的漂流、擴散，流回入水口之溫水提高的溫度一定極小，水量也一定很少，因此迴流問題不必擔心，但第三核能發電廠附近海域水溫原本偏高，仍是值得注意的問題。 7月10日以後，u值全為正，v值全為負，表示風吹向東南方，即所謂的西北風，對第三核能發電廠附近海域沿海而言，是吹著離岸而去的風，這種風向可能把表層海水吹離沿岸，下層海水上升來補充，而使水溫降低。74 年1～4月第三核能發電廠附近海域主要吹東北風，只有在夏季方有可能吹西北風，西北風對於第三核能發電廠附近海域的冷卻系統應是有利。 第三核能發電廠排出的溫水，表面水溫提高2°C的範圍主要局限於距離排水口1公里內，其影響深度亦僅限於表層3m左右。而且排水口附近地形很陡，離岸100m，水深已達10m以上，所以溫排水極不可能傷害到海底的生物。這也是第三核能發電廠附近海域沿岸的主要潮流方向，極少發生流回入水口的情形。
第7年	74—75（74年7月7日一號機火災）	范光龍 張湘電	A站：入水口 B站：出水口東南方300m 500m	在冷卻系統離入水口300m及離排水口500m處各設1站測海流及水溫，1年來共測量3次，每次測1個多月，入水口的海流儀固定在水面下2.5m左右，排水口的前2次在水面下3.5m，第3次提高到水面下1.5m，測量結果發現兩點水溫很接近，溫差很少超過0.5°C，可見第三核能發電廠附近海域溫排水的影響僅限於表面很薄的一層，其他的海流資料比往年的，沒什麼顯著的變化。 可以看出入水口A點的海流，不論漲或落潮，流向一般往西南西，流速有時達40cm/sec以上，顯然受第三核能發電廠附近海域吸入冷卻水的影響。排水口B點的海流，漲潮時一般流向西南，落潮時則有可能流向東北，平均海流則以流向西南為主，落潮流速一般在10～30cm/sec的範圍，漲潮流速則較慢，迴流的時間也不夠長，所以我們幾乎已可肯定地排除溫排水流回入水口可能造成的問題。夏季時較常有吹西北風的機會，研究水溫變化與風向的關係後發現，吹離岸而去的西北風時，排水口的水溫有降低的傾向，大約可降低1°C左右。

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第8年	75—76（76年1月二部機全面發電）	范光龍 王冑	A站：出水口東南方200 m B站：入水口西南方400 m C站：出水口西南方100 m	民國76年3月22日至4月25日在排水口西南側200 m處的水面下3 m及6 m測海流及水溫，發現上層水溫比中層水溫平均高約2°C，且溫排水有時會在排水口西南側小灣內聚集，尤其是漲潮時較易發生。 民國76年3月22日至4月25日B站水面下3 m及6 m測得的海流及水溫資料，可明顯看出上層海水的海流流速主要在20～30 cm/sec，中層在15～25 cm/sec，海流主要流向東北，與在A點附近今年的情況不同，這可能是由於海流在B點附近的小灣內形成小渦旋。比較2層的水溫，發現上層比中層的溫度高約2°C，可見溫排水有時會在B點附近小灣內聚集，再比較2層水溫的變化，可明顯看出上層水溫變動較大，一日之間的變化常可達4°C，尤其是在漲潮時較易發生高溫現象，換句話說，漲潮流流向西南時，B 點水溫較高。
第9年	76—77	范光龍	A站：入水口東方50 m B站：出水口東南方100 m C站：出水口西南方80 m D站：出水口西南方300 m	第三核能發電廠附近海域排水口附近海水在漲潮時一般流向西南，在落潮時也流向西南，部分溫排水常會流入排水堤西側小灣，小灣內表面水溫在夏季時往往升至31°C以上，而傷害珊瑚生長。在夏季時西南風盛行，白天風向一般由海上吹往陸地，而這種風向有助於溫排水流入小灣內，因而容易造成灣內淺處珊瑚的傷害。 第三核能發電廠附近海域位處台灣最南端，海域內海水冬季時來自黑潮，夏季時來自中國南海，因此海水溫度一般很高，夏季時常達29°C，冬季也多在24°C以上。第三核能發電廠附近海域排水口附近潮流以半日潮為主，漲潮時流向西南方貓鼻頭，落潮時則可能流向東北或西南，由於排水導流堤的建築，溫排水流回進水口重新再用的可能性幾乎等於零。 A站民國76年7月19日～8月17日之海流及水溫變化情形：進水口測站其水溫資料顯示，水溫平均近30°C，一日之內的水溫變化有時達6°C以上，可見此處水團混合相當複雜。 B站民國76年7月19日～8月17日之海流及水溫變化情形：海流在7月份有往東南趨勢，8月份則趨向西北，而平均水溫則達31°C以上，一日之內水溫變化相差6°C以上的情況也是常見。 7月3～9日主要吹南風或西南風，第三核能發電廠附近海域溫排水很容易被吹入排水口西側小灣聚集，而事實也證明，這個時候剛好是小灣內珊瑚開始白化了。 由於排水口附近海域的海流一般流向西南，因而使得溫排水有向西南方擴散的趨勢，民國76年7月8日早上8:30～9:00 在排水口附近測得表面及水面下3m的水溫資料，可明顯看出溫排水有往西南之趨勢，比背景站水溫提高之溫度ΔT=2°C之等直線幾乎涵蓋了全部小灣區，而背景站表面水溫28.4°C，換句話說，小灣表面水溫都在30°C以上，而靠近導流堤附區，而背景站表面水溫28.4°C，換句話說，小灣表面水溫都在30°C以上，而靠近導流堤附近則高達32°C以上，這就難怪珊瑚會白化了。 排水口附近海水流向西南時，灣內常會有溫排水流入，如有風向從SE～SW 範圍吹往小灣，則溫排水易在小灣內聚集不散，其中1次在5月17日下午測量時，東南風使排水口附近之小皮球擋流板都飄入小灣內，並停留在小灣內近岸處久久不去。

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第10年	77 ｜ 78	范光龍	A站：出水口西南80 0mm B站：出水口西南300 mm	第三核能發電廠附近海域排水口附近潮流較常流往西南方，使溫排水流往貓鼻頭方向，加上夏季白天常吹海風，溫排水常會傷害近岸淺處的珊瑚，尤其夏季第三核能發電廠附近海域表面水溫常達29°C以上，溫排水溫升3°C的範圍往往涵蓋排水堤西側大部份小灣面積，使小灣表面水溫達32°C以上，淺處珊瑚難免受其影響，此外，第三核能發電廠附近海域每年10月至隔年4月的7個月中常吹東北風而在第三核能發電廠附近海域形成落山風，使部份沿岸海水離岸而流，而造成上升流，有時會使近岸表面水溫遽降，有時甚至降低達10°C。 從水溫資料，可明顯看出B站水面下3m的水溫在28～34°C之範圍，表面水溫有時會稍高一些，難怪排水口至貓鼻頭之間沿海淺處的珊瑚易受傷害。出水口2天內之海流流向西南及流向排水口西側小灣的機會各佔一半，而水溫則高達33～35°C之間，這當然是由於測站靠近排水口的緣故，這些溫水流入小灣後，水溫仍高，因而使得小灣淺處珊瑚較易受到傷害。 第三核能發電廠附近海域海底地形相當陡，在有些地方離岸1公里處深度已達60公尺，到了海域外深度很快就達100公尺以上，大陸棚的範圍很小，外海深處二、三百公尺的冷海水很容易〝侵入〞第三核能發電廠附近海域內，而成上、下2層海水，這些冷水有時在海面下五、六十公尺，有時則上升至海面下二、三十公尺處，造成這種種變化的因素受外海自然變數的影響，很難掌握，在第三核能發電廠附近海域潛水的人常會感覺到這種現象，如第三核能發電廠附近海域吹很強的東北風(落山風)，則背風面近岸淺區的表層海水被吹離海岸，下層冷海水湧升補充，使得表層水溫降低，民國77年1月下旬船帆石附近發生死魚事件，應是這現象造成的，根據調查，發生死魚事件時，很強的落山風已持續吹了3天。 在夏季表面水溫較高時，白天常吹海風，擋流板及小皮球常隨溫水流往淺灣或其附近岸邊，久久不去，因為擋流板及小皮球都是隨流而漂，換句話說，溫排水也是在淺灣或岸邊徘徊不去。 民國77年7月21日上午第三核能發電廠附近海域溫排水在排水口附近的擴散情形，早上九點左右收集資料時，剛好在平潮時段，潮流緩慢，溫排水主要往排水口前方擴散，背景站表面水溫29.2°C，而溫升3°C的範圍涵蓋了淺灣大部份面積，換句話說，淺灣大部份地區表面水溫都在32.2°C以上，而水面下3 m的背景站水溫高達29.1°C，溫升3°C的範圍也涵蓋了淺灣相當大的面積，換句話說，水面下3 m水溫也多在32.1°C以上，淺灣及其附近淺處珊瑚自然無法避免溫排水的影響。

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第11年	78—79	范光龍	A站：入水口西南80 m B站：出水口西南100 m	夏季時，在第三核能發電廠附近海域排水口附近的表層水溫一般都超過30°C，這仍將威脅排水口西側小灣淺處的珊瑚，在冬季時，水溫仍達24°C以上，但甚少超過26°C。第三核能發電廠附近海域之潮汐是以全日潮與半日潮為主的混合潮，其他週期更短的海流振動也相當明顯，這應是由於第三核能發電廠離岸不遠處，水深已達數百公尺，外海的信息很容易傳抵第三核能發電廠。在出水口西南方100 m處，水下4.5 m海流多流往東北，水下9 m之海流多流往西南。
第12年	79—80	范光龍	C、D站：第三核能發電廠附近海域中央部份(水溫) B站：出水口東南100m(水溫)	第三核能發電廠附近海域潮流以全日潮和半日潮為主，漲潮時在第三核能發電廠附近海域內逆時鐘方向而流，落潮順時鐘而流。第三核能發電廠附近海域左側有一海底峽谷的地形，在峽谷內的水溫較低，漲潮時略往西抬升而使西側沿海水溫有時會突降3～5°C，不久又回到正常狀況，落潮時這種水溫突降又回升的現象有時也會在第三核能發電廠附近海域東側沿海發生。 C站上、下兩層的水溫常有突降2～3°C，甚至4～5°C，幾個小時後又回升的現象，這些資料與當時潮汐相驗證，發現水溫突降又回升的現象大多發生在落潮時段，再研究A、B兩站，從民國66年至76年的水溫資料，也常發現這種水溫突降又升的現象，且大多在漲潮時發生，這種現象應與下層冷海水入侵至海域內有關，漲潮時，冷水層往西側抬升，使A、B兩站的水溫突降，落潮時，冷水層往東側抬升，使C站之水溫突降，事實上，在第三核能發電廠附近海域這種峽谷海底地形中，漲、落潮常會產生使水溫突升或突降的現象。 在D站用溫度計串測11個深度的連續水溫資料，很明顯地，5月22日19:30水溫分層約在水深19m處，到22:00已提高到大約8m處，換句話說，在這段時間內，水溫明顯分層的位置由深而淺，之後隨潮流轉變而消失。
第13年	80—81	范光龍	ABC站：東側船帆石連成一線 D站：出水口南側80m	第三核能發電廠附近海域潮流以全日潮及半日潮為主，漲潮時，潮流在第三核能發電廠附近海域以逆時針轉方向往西流，落潮時則相反，漲潮時，第三核能發電廠附近海域的溫排水一般流往西南，因而常會流入排水口西側淺灣，落潮時，排水口附近海水有時也流往西南。恆春地區，冬季盛行東北風，在第三核能發電廠附近海域常會吹著強勁的落山風，強風常把上層海水吹離海岸而造成沿岸上升流，因而使得近岸水溫劇降。 上、下層水溫有多次突降後又陡升的現象，這在下層更明顯，例如11月24日，上層水溫突降3°C，下層甚至突降7°C，在這之前，恆春地區已連續吹了強勁東北風好幾天，因此水溫突降應是由於東北風把表層海水吹離海岸，而使底層水上升造成的。A 站上、下兩層海流的向量行進圖，可明顯看出上層海流向西流之趨勢最強，下層海流則有向西南之趨勢。

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第14年	81—82	范光龍	A B站C：站排：水船口帆東石南近80岸m成一直線	第三核能發電廠附近海域潮流以全日潮及半日潮為主，漲潮時，潮流在第三核能發電廠附近海域以逆時針轉方向往西流，落潮時則相反，漲潮時第三核能發電廠附近海域的溫排水一般流往西南，因而常會流入排水口西側淺灣，落潮時排水口附近海水有時也流往西南。恆春地區，冬季盛行東北風，在第三核能發電廠附近海域海域常會吹著強勁的落山風，強風常把上層海水吹離海岸而造成沿岸上升流，因而使得近岸水溫劇降，這種水溫突降的現象每隔兩星期發生1次，都是在大潮時發生，這應是由台灣南方菲律賓附近的孤立波以內波方式傳到第三核能發電廠附近海域的現象。 向西南的漲潮流較佔優勢，流速一般在10～40 cm/sec 範圍，海面下，3m的水溫主要在28～31°C範圍，其中超過30°C的機會很多，顯然是受溫排水的影響。上、下層的水溫相差有限，主要在27～31°C範圍內，而受溫排水影響的只在3 m深的水層，再深則整層上、下水溫變動一致，不受溫排水影響。 20 m的B站，水面下19 m之海流及水溫資料，可明顯看出民國80年11月9日及11月24日兩天，水溫有突降的現象，這兩天都是在大潮的時候，尤其是11月24日那次，降溫達7°C左右，從海流資料，發現一個有趣的現象，當下層水溫突降時，上層水向東流，屬落潮流，但下層卻向西流，這反常的冷水其實是下層受到冷水入侵的影響，這冷水是海域外深層海水由孤立波以內波的方式由遠處傳來。 第三核能發電廠附近海域躍溫層深度都在50m以上，這躍溫層界面易形成內波 (internal wave)，並以孤立波(solitary wave)的形式存在，第三核能發電廠附近海域潮流為全潮及半日潮之混合潮型，水溫變化以全日週期為主，而根據張永佳(1998)的研究，靠近菲律賓的海域，潮汐以全日潮為主，因此推測，孤立波在菲律賓附近形成，以內波方式傳入第三核能發電廠附近海域，內波的波動使第三核能發電廠附近海域近岸海底水溫每日有1次的升降，而每兩星期1次，在大潮時水溫會有陡降、突升的現象。在漲潮時，第三核能發電廠附近海域潮流往西，落潮時往東，在大潮的落潮時段，海域內常會有逆時針轉的渦漩，李宏仁(1993)利用數值模式計算，也發現了這種逆時針轉動的渦漩現象。
第15年	82—83	吳重坤	未設長期測站	第三核能發電廠附近海域水團特性的季節變化非常明顯，整體來說混合水團1年4季都存在。秋季第三核能發電廠附近海域的水團鹽度較低而溫度較高，冬季及春初，第三核能發電廠附近海域的水團鹽度較高而溫度較低。 鹽度較高的原因是黑潮分支水團對第三核能發電廠附近海域的影響。此外，第3航次(春初)T-S圖顯示有黑潮水入侵到第三核能發電廠附近海域，而第4航次(春末)T-S圖顯示有南海水入侵到第三核能發電廠附近海域。第三核能發電廠附近海域水溫分布說明了冷心渦旋經常存在，其位置發生在水深較深的峽谷。此外，有的季節還可看到暖渦旋存在。 漂流軌跡顯示漲潮流從出水口流向西南，大約與貓鼻頭沿岸地形相平行。此種往外流的軌跡可初分為兩大類。第1類是從出水口沿著海岸地形一路往西南，繞過貓鼻頭，往西再往西北，指向白沙海域。第2類是從出水口沿著海岸地形一路往西南，過了貓鼻頭後，繼續偏南或西南走，到了21°54'N 附近，接上第三核能發電廠附近海域的退潮水往東，漂流軌跡呈L 型。退潮流比較單純，從出水口處開始往東北流，到了後壁湖港口東方，則沿著港口附近的潮間帶地形，轉向北再轉向西北，有4次漂標流到第三核能發電廠冷卻水入口處附近。此外，漂標由出水口處釋放後，有兩次流進出水口前方西側的小灣內。

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第16年	83－84	吳重坤	未設長期測站	第三核能發電廠附近海域水團主要是由混合水團組成，上層海水會受到天候降水影響而改變其鹽度值，尤其是在夏季多雨的時候。中層與深層海水會受到第三核能發電廠附近海域海域外圍水團變化的影響。一般而言，夏季比較容易受到南海中鹽水的影響，而冬季及春季比較容易受到黑潮水的影響。第三核能發電廠附近海域的水團特性易受外圍環流的影響，因此，第三核能發電廠附近海域內的水體是很容易與外圍的水體進行交換。 潮流從出水口處流向西南，大約與貓鼻頭沿岸地形相平行。此種往外流的軌跡可分為兩大類。第1類是出水口沿著海岸地形一路往西南，繞過貓鼻頭，往西再往西北，指向白沙海域。第2類是從出水口沿著海岸地形一路往西南，過了貓鼻頭後，繼續偏南或西南走，到了北緯21°4'附近，接上第三核能發電廠附近海域的退潮水往東，漂流軌跡呈L 型。退潮流比較單純，從出水口處開始往東北流，到了後壁湖港口東方，則沿著港口附近的潮間帶地形，轉向北再轉向西北。此外，漂標由出水口處釋放後，有兩次流向西北。
第17年	84－85	吳重坤	未設長期測站	漲潮流從出水口處流向西南，大約與貓鼻頭沿岸地形相平行。此種往外流的軌跡可分為兩大類。第1類是出水口沿著海岸地形一路往西南，繞過貓鼻頭，往西再往西北，指向白沙海域。第2類是從出水口沿著海岸地形一路往西南，過了貓鼻頭後，繼續偏南或西南走，到了北緯21°54'N，120°44'E 附近，接上第三核能發電廠附近海域的退潮水往東或東南，漂流軌跡呈1個L 型。退潮流比較單純，從出水口處開始往東北流，到了後壁湖港口東方，則沿著港口附近的潮間帶地形，轉向北再轉向西北。今年4個航次的觀測資料碰巧都沒遇上退潮流的時段,所以沒有這方面的漂流軌跡。
第18年	85－86	吳重坤 沈建全	未設長期測站	今年4個航次的漂流實驗結果與過去多位學者(梁乃匡等，1978；蘇仲卿等，1984；陳鎮東等，1994，1995，1996)所做的調查結果一致。第三核能發電廠附近海域熱廢水出水口附近的水流軌跡與鄰近後壁湖漁港內的水位高低變化有密切相關。當後壁湖漁港相對水位為退潮時，漂流軌跡顯示退潮流(ebb)流向東北。當後壁湖漁港水位為漲潮時，漂流軌跡顯示漲潮流(flood)流向西南，漂流軌跡大約與海岸線平行。上述漂流實驗也同樣顯示第三核能發電廠附近海域表層海水的交換非常頻繁。
第19年	86－87	沈建全	出水口東北方1.5公里處	第三核能發電廠附近海域漂流浮標調查顯示各季在漲潮時海流往西南流，或往正南流，有繞過貓鼻頭與台灣海峽潮流系統呼應之勢；退潮時往東流或東北流，夏季退潮有往鵝鑾鼻直流之趨勢，部份測次如86年冬季2月28日則在退潮時有回流至出水口岸邊之情形發生。 海流流速各季大體皆以漲潮流速大於退潮流速，亦即整體水質量有往西南繞過貓鼻頭往台灣海峽輸送之趨勢。漲潮往西南流速最大測得每小時5.82公里，合每秒162公分，各航次測得平均流速介於23.5cm/s～131cm/s之間，整體而言本海域海水流動快速，交換良好。定點海流觀測結果，其漲退潮時之流向頗不規則，且與漂流浮標所測得結果並不一致，此可能與調查位置不同，一在較靠近灣內，另一在出水口已靠近第三核能發電廠附近海域西南，且觀測深度一為水下10米，一為表層易受風影響有關，但亦有可能是定點海流測站受到灣內次級環流控制，導致其流向變化而無法與漂流測站相呼應，並導致流速偏小，流向不定，但仍需做進一步探究。 溫排水擴散舌調查結果，在民國86年9月22日退潮時，溫排水會自出水口流至入水口，其與週圍水溫差可達0.9°C，冬季漲潮時(民國86年12月29日)其溫排水擴散舌則往正南流動，其流型結構自表層至15m深處頗為一致。

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第20年	87－88	沈建全	出水口東北方1.5公里處	第三核能發電廠附近海域漂流浮標調查顯示漲潮時往正南再偏西流動或往正南流動，退潮時則往南或往正東流動，流速最大可達120cm/s。CTD調查結果顯示夏季海水高溫且鹽度分布較廣，測得局部點之最高溫可達33°C，鹽度介於33.54‰～34.57‰ 之間，屬混合水團性質。冬季溫度在25°C以上，鹽度34.3%0～34.5%0之間，亦屬混合水團，春季溫度介於24.6°C～27.9°C之間，鹽度介於33.68‰～34.39‰之間，屬混合及南中海水團。 定點海流調查秋季最大流速51.66cm/s，平均流速2.95cm/s，流向103.46°，流速絕對值平均為8.39 cm/s。冬季最大流速為52.83 cm/s，平均流速2.87 cm/s，流速絕對值平均為9.28 cm/s。春季最大流速為32.10 cm/s，平均流速2.19 cm/s，絕對流速平均為8.55 cm/s。溫排水擴散舌調查顯示，第三核能發電廠附近海域西北側較海域外水溫高約1.5°C左右，出水口附近水溫一般較其他地方為高，但為表層性質，高溫海水僅在表面1m、2m，在水面下5m則未受影響。春季部份溫排水往西南貓鼻頭流動，且達於較深水層，可能係受漩渦所帶下去。
第21年	88－89	沈建全	出水口東北方1.5公里處	民國88～89年共執行8次漂流觀測，其在漲潮或高潮時表面漂流皆往西南及正南漂移，流速介於14～59cm/s 間，在退潮時則往東北偏東及小灣流動，其流速介於10.3cm/s～11.3cm/s 之間，二者相較以漲潮流較居優勢。定點海流在出水口與入水口連線中央偏東約800公尺處長期海流測站所測得之海流往往具有向北分量，但一般其流速甚小，只有3～4cm/s 且中途可能轉向，故不會使入水口產生迴流，其流速絕對值平均介於2.93～14.79cm/s，流速亦不大，與數值模擬者相似。CTD 調查結果顯示本區海域全年大部份時間以混合水團為主，南海中鹽水團在春、夏2季時常入侵，而黑潮水團僅在春、秋、冬季偶爾才入侵本海域。
22年	90年	沈建全	出水口東南方300公尺	民國90年第1次(冬季)漂流朝正南方向流動再折向東南東流動，呈L型，最大流速144.47cm/s，平均流速為58.91cm/s 朝東南方流動。第2次(春季)漂流在退潮時刻，先往南南西流動，繞一小弧後再往西北流動，呈V型，至貓鼻頭再往正西流動，最大流速38.00cm/s，平均流速為10.15cm/s，第3次(夏季)在退潮時先往東北流，再順原路朝西南回流，抵達貓鼻頭南方1.5 公里後再往東南東流動，最大流速223cm/s，平均流速17.5cm/s，另二段在低潮時一朝小灣呈U 字型流動，另一則在出水口東方及東南方盤繞。第4次(冬季)漂流在漲潮時，直接往西南流動，流速最大為114cm/s，平均為52.3cm/s，第2段則由出水口往正東流約3公里後再順時針繞一半圓。 CTD調查結果，第1次調查結果，其表面溫度介於24.2°C～27.7°C之間，鹽度則在34.41～34.40之間，屬南海中鹽水團，夾雜一些混合水團。第2次調查結果，其水團性質又由南海中鹽水團再轉變回混合水團佔優勢之性質，其表面溫度介於26.82°C～27.36°C之間，鹽度介於34.32～34.36之間，第3次調查水團性質屬混合水團，下層夾雜一些南海中鹽水團，表層、中層溫度介於25.5～29.2°C，鹽度介於33.1～33.6之間，下層溫度介於22～27°C之間，鹽度介於33.3～34.4之間。第4次調查水團屬混合水團性質，上下層間溫度十分一致皆在27.4°C左右，鹽度介於33.8～34.20之間。 長期海流第1季調查最大流速為83.34cm/s，平均流速為15.36cm/s，流向為223.58°第2季最大流速為80.14cm/s，平均流速為16.89cm/s，流向為221.8°第4次調查其最大流速為83.35cm/s，平均流為11.55cm/s，流向為210°，朝西南流。 溫排水擴散舌第1次調查結果，水溫達26°C～27°C，與外圍溫差在3°C以內，其溫排水舌往南呈梯度分布。第2次因電廠停機維修，並無溫排水舌現象，其溫度梯度自西北往東南遞增，第3次及第4次溫排水舌調查結果，其溫排水舌皆在排水口東方及南方附近一小範圍內形成較大之溫度梯度，且只存於表面1～5m並未擴散很大。7月份10m、15m處一冷水舌自中央向灣頂延伸，將第三核能發電廠附近海域切割成左右兩塊溫度較高區域，20m以下則以來自東方之低溫高鹽海水佔據第三核能發電廠附近海域大部份海域。10月份則呈上下溫度一致，但鹽度東高西低呈鹽度梯度，貓鼻頭東方約2公里處，則存在一湧升之高鹽水團。

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第23年	91年	沈建全	出水口東南方300公尺	民國91年4季長期海流測站之平均流速分別為第1次16.13cm/s、第2次第1段14.7，第2次第2段16.35cm/s、第3次11.87 cm/s 及第4次11.52 cm/s，四者皆往西南流動，其流型較為固定。漂流平均流速介於7.22～59.7cm/s 之間，皆往正南或南南西流動。 CTD調查結果，表層冬季水溫介於23.25°C～27.87°C之間，鹽度介於33.91～34.6之間，夏天水溫介於29.03°C～31.61°C之間，鹽度介於32.93～33.53之間。溫排水擴散舌調查，全年溫差皆在法定範圍4°C以內。往東及正南、西南擴散。其溫排水射流兩側常伴隨產生冷渦海水上升現象。
第24年	92年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國92年長期海流觀測結果顯示，仍以往復之潮流運動及恆流為主要成分，全日與半日潮流振幅的數量級皆為0.10 m/s；第1季之平均流流速為0.176 m/s (對應流向235度)、第2季為0.152 m/s (對應流向232度) 、第3季為0.213 m/s (對應流向231度)、第4季為0.104 m/s (對應流向232度)，施測時段皆往西南流動，和歷年同時期調查結果吻合。 漂流浮標第1季施測漲潮段淨流流速為0.233 m/s (對應流向227度)，往西南流動，第2季施測退潮段淨流流速為0.086 m/s (對應流向23度)，往北北東流動，第3季第一段施測為退潮段，浮標迴流回出水口附近、淨流流速為0.004 m/s (對應流向72度)，第3季第2段施測為退潮段，淨流流速為0.262 m/s (對應流向168度) ，往南偏南南東向流動，第4季施測時段為退潮段，施測所得淨流流速為0.347 m/s (對應流向109度)，施放初期先往東北流動，後轉為向東流動再轉為往東南流動。 溫鹽深調查結果，春初 (民國92年3月1日) 水溫介於24.5 °C～29.9°C之間，鹽度介於34.27～34.78之間，春末 (民國92年5月7日) 水溫介於25.7 °C～32.5°C之間，鹽度介於34.14～35.18之間，夏季 (民國92年8月1日) 水溫介於23.9 °C～32.2 °C之間，鹽度介於33.81～34.51之間，秋季 (民國92年11月1日) 水溫介於23.3 °C～27.8 °C之間，鹽度介於34.21～34.59之間。溫排水擴散舌在漲潮時段多往西南擴散、退潮時段往北北東方向擴散，受西南向恆流的作用，漲潮時溫水舌的擴張範圍較退潮時溫水舌大。
第25年	93年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國93年前3季次排放口外長期海流觀測結果顯示，海流仍以往復之潮流運動及西南向恆流為主，全日與半日潮流振幅的數量級皆為0.10 m/s；第1季之平均流流速為0.155 m/s (對應流向237度)、第2季為0.186 m/s (對應流向226度)、第3季為0.116 m/s (對應流向237度)、第4季為0.105 m/s (對應流向233)，施測時段皆往西南流動，和歷年同時期調查結果吻合。 漂流浮標第1季第1段施測為漲潮段其淨流流速為0.249 m/s (對應流向220度)，往西南流動，第1季第2段施測為漲潮段其淨流流速為0.270 m/s (對應流向257度)，往西南西流動，第2季施測退潮段，其淨流流速為0.062 m/s (對應流向64度)，往東北東流動，流速較第1季漲潮時段為緩，第3季第1段施測退潮段，其淨流流速為0.006 m/s (對應流向14度) ，第3季第2段施測退潮段，其淨流流速為0.116 m/s (對應流向51度)，往東北向流動，第4季第1段施測為漲潮段其淨流流速為0.178 m/s (對應流向212度)，往西南流動，第4季第2段施測為漲潮段其淨流流速為0.812 m/s (對應流向272度)，往西流動，顯示漲潮段流速遠較退潮段為大。 溫鹽調查結果，冬末 (民國94年3月26日) 水溫介於22.5°C～29.1°C之間，鹽度介於34.43～34.78之間；春末 (民國94年5月17日) 水溫上升至25.7 °C～32.3 °C，鹽度介於33.96～35.09；夏末 (民國93年8月2日) 水溫維持在24.4 °C～30.2 °C，鹽度介於33.84～34.44；秋末 (民國93年11月5日) 水溫下降至22.9 °C～28.9 °C，鹽度介於34.15～34.77。溫排水擴散舌在漲潮時段多往西南擴散、退潮時段往東南-東方向擴散，受西南向恆流的作用，漲潮時溫水舌的擴張範圍較退潮時溫水舌大。

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第26年	94年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國94年前兩季次排放口外長期海流觀測結果顯示，海流仍以往復之潮流運動及西南向恆流為主，全日與半日潮流振幅的數量級皆為0.10 m/s；第1季之平均流流速為0.111m/s (對應流向232度)、第2季為0.099 m/s (對應流向236度) 、第3季為0.199 m/s (對應流向232度) 、第4季為0.134 m/s (對應流向231度)，施測時段皆往西南流動，和歷年同時期調查結果吻合。 漂流浮標第1季第1段施測為漲潮段其淨流流速為0.254 m/s (對應流向238度)，往西南流動，第2季施測退潮段，其淨流流速為0.194 m/s (對應流向128度)，先往南流動，出峽灣遮蔽區域後轉往東北東流動，漂流軌跡呈L型，流速較第1季漲潮時段為緩，第3第施測為漲潮段其淨流流速為0.630m/s (對應流向271度)，先往西南流動，再沿著海岸地形一路往西走，過了貓鼻頭後，再轉為往西北西流動，此一型態流速值最大，第4季施測為漲潮段其淨流流速為0.315m/s (對應流向223度)，一路往西南流動。 溫鹽調查結果，冬末 (民國94年1月20日) 水溫介於21.8°C～26.2°C之間，鹽度介於34.29～34.84之間；春末 (民國94年5月17日) 水溫上升至25.8 °C～30.9 °C，鹽度介於34.12～34.50；夏季 (民國94年7月13日) 水溫上升至25.2 °C～33.1 °C，鹽度介於33.36～34.48；秋末 (民國94年10月20日) 水溫略為下降至27.3 °C～31.6 °C，鹽度介於33.71～34.26。溫排水擴散舌在漲潮時段多往西南擴散、退潮時段往東南-東方向擴散，受西南向恆流的作用，漲潮時溫水舌的擴張範圍較退潮時溫水舌大。
第27年	95年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國95年第三核能發電廠附近海域排水口外長期海流觀測結果顯示，海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主，全日與半日潮流振幅均約為0.10 m/s～0.20 m/s。第1次 (民國94年12月9日至95年1月29日) 之平均流流速為0.10 m/s，流向233°；第2次 (民國95年1月30日至95年3月18日)之平均流流速為0.14 m/s，流向234°；第3次 (民國95年3月18日至95年5月1日)之平均流流速為0.20 m/s，流向234°；第4次 (民國95年3月18日至95年5月1日)之平均流流速為0.22 m/s，流向234°；第5次 (民國95年3月18日至95年5月1日)之平均流流速為0.18 m/s，流向235°，第6次 (民國95年9月23日至95年12月8日)之平均流流速為0.19 m/s，流向238°，海流觀測結果和歷年同時期調查結果吻合。 漂流浮標第1季施測為漲潮段，在出水口附近往西南方漂移、流速約0.50 m/s，但很快靠岸擱淺，重新佈放後，漂流流型先呈逆時針方向流動，最後仍往西南方流動、再度擱淺、流速約0.08 m/s，再次於離岸較遠處佈放，漂流流型呈逆時針方向流動、流速不大，往岸向流動後續往西南方流動；第2季施測為退潮段，退潮流約0.54 m/s，浮標一路往南流動，測得最大流速可達0.91 m/s；第3季施測為漲潮段，漲潮流約0.40 m/s，浮標隨漲潮流漂向西南，過貓鼻頭後沿海岸線往西向流動，測得最大流速為0.61 m/s；第4季施測為漲潮段，漲潮流約0.43 m/s，浮標流況與第3季雷同，測得最大流速為0.73 m/s。浮標溫度資料顯示溫降率自排水口往外至500 m弧內約1°C /100 m。 溫鹽調查結果，冬季 (民國95年1月17日) 水溫介於19.9°C～26.3°C之間，鹽度介於33.94～34.68之間，此時鹽度為全年最高；春季 (民國95年5月4日) 水溫上升至26.8°C～30.4°C，鹽度介於33.96～34.37；夏季 (民國95年7月21日) 水溫為21.9°C～32.9°C，鹽度介於33.25～34.79；秋季 (民國95年10月17日) 水溫上升至27.1°C～30.4°C，鹽度介於33.92～34.15。溫排水擴散舌在漲潮時段多往西南擴散，退潮時段往東南-東方向擴散，受西南向淨流的作用，漲潮時溫水舌的擴散範圍較退潮時溫水舌大。

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第28年	96年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國96年第三核能發電廠附近海域排水口外長期海流觀測結果顯示，海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主，全日與半日潮流振幅均約為0.10 m/s～0.20 m/s。第1次 (民國96年1月20日至96年3月10日) 之平均流流速為0.15 m/s，流向236°；第2次 (民國96年3月10日至96年4月22日)之平均流流速為0.19 m/s，流向232°；第3次 (民國96年4月22日至96年5月27日)之平均流流速為0.21 m/s，流向234°；第4次 (民國96年5月27日至96年7月1日)之平均流流速為0.23 m/s，流向231°；第5次 (民國96年7月1日至96年9月8日)之平均流流速為0.21 m/s，流向234°；第6次 (民國96年9月8日至96年10月25日)之平均流流速為0.14 m/s，流向236°；海流觀測結果和歷年同時期調查結果吻合。 民國96年漂流浮標第1季施測為退潮段，在出水口附近往南南西方漂移、流速約0.40 m/s，但很快靠岸擱淺於貓鼻頭，重新佈放後，漂流流型呈順時針方向流動，由西南向轉西向再轉西北西向後再度擱淺於檳榔腳附近、流速約0.25 m/s，再次於離岸較遠處佈放，於施放位置附近依逆時針方向打轉 (流速小於0.10 m/s) 後朝東北東方向流動、流速約0.13 m/s；第2季施測為漲潮段，在出水口附近往西南西方漂移、流速約0.36 m/s，但很快靠岸擱淺於下潭子，重新佈放後往西南西方轉西向漂移、流速約0.33 m/s，很快靠岸擱淺於貓鼻頭西側，再次於離岸較遠處佈放，施放後浮標沿海岸方向往西方流動，過龍蝦堀後再沿海岸線轉往西北西流動，再轉向西北方向流動，流速值逐漸增強，最大流速可達0.82 m/s；第3季施測為退潮段，在出水口附近往南方漂移、流速約0.30 m/s，再依逆時針方向轉南南東方移動、流速約0.25～0.40 m/s s；第4季施測為漲潮段，在出水口附近往西南西方漂移、流速約0.45 m/s，靠岸擱淺後重新施放，續往西南西方漂移、流速為0.50～0.80 m/s，過貓鼻頭後轉往南向流動，流速值逐漸增強，最大流速可達1.34 m/s。浮標溫度資料顯示溫降率自排水口往外至500 m弧內約1°C /100 m。 民國96年溫鹽調查結果，冬季 (民國96年1月17日) 水溫介於23.2°C～26.8°C之間，鹽度介於34.23～34.63之間；春季 (民國96年5月11日) 水溫上升至26.0°C～31.2°C，鹽度介於33.86～34.42；夏季 (民國96年8月29日) 水溫為24.8°C～31.2°C，鹽度介於33.19～34.35；冬季 (民國96年11月16日) 水溫下降至20.5°C～29.3°C，鹽度則上升至34.09～34.75。溫排水擴散舌在漲潮時段多往西南擴散，退潮時段往東南-東方向擴散，受西南向淨流的作用，漲潮時溫水舌的擴散範圍較退潮時溫水舌大。
第29年	97年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國97年第三核能發電廠附近海域排水口外長期海流觀測結果，根據資料分析結果，海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主，全日與半日潮流振幅均約為0.10 m/s～0.20 m/s。第1次 (民國96年12月14日至97年1月28日) 之平均流流速為0.20 m/s，流向235°；第2次 (民國97年2月12日至97年4月5日)之平均流流速為0.18 m/s，流向240°；第3次 (民國97年5月23日至97年7月2日)之平均流流速為0.23 m/s，流向233°；第4次 (民國97年8月30日至97年10月18日)之平均流流速為0.17 m/s，流向235°。海流觀測結果和歷年同時期調查結果一致。 漂流浮標及溫度調查結果，民國97年第1季施測為退潮段，在出水口附近往東南方漂移、流速約0.35m/s～0.50 m/s，之後持續往東南方移動、流速約0.20～0.30 m/s，整段施放期間流速變化不大，漂流時段最大流速為0.56 m/s，對應流向為138°，淨流流速為0.28 m/s，流向為130°；第2季施測為退潮段，浮標於退潮時於出水口時流向為東南向，離開出水口後逐漸轉往東方漂流，流速約0.15～0.25 m/s，整段施放期間流速變化不大，漂流時段最大流速為0.40 m/s，對應流向為128°，淨流流速為0.24 m/s，流向為89°；第3季施測為漲潮段，漲潮流約0.30 m/s，浮標離出水口後往南流動，隨漲潮流漸漂向西南，過貓鼻頭後沿海岸線漸轉往西向流動，漂流時段最大流速為0.62 m/s，對應流向為175°，淨流流速為0.24 m/s，流向為216°；第4季施測為漲潮段，漲潮流約0.70 m/s，浮標隨漲潮流漂向西南，於貓鼻頭附近受岸線影響轉往南方流動、流速加快，並迅速擱淺，測得最大流速可達1.15 m/s，對應流向為166°，第4季第一段施測時段淨流流速為0.64 m/s，流向為210°，再次於離岸較遠處重新佈放，施放後浮標沿海岸方向往西方流動，其後再沿海岸線轉往西北西流動，後再轉往西-西南向流動，第4季第二段施測時段漂流最大流速為0.69 m/s，對應流向為233°。浮標溫度資料顯示溫降率自排水口往外至500 m弧內約1°C/100 m。

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第29年	97年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國97年溫鹽調查結果，春初 (民國97年3月14日) 水溫介於25.4℃～29.9℃之間，鹽度介於33.55～34.17之間；春季 (民國97年5月1日) 水溫上升至27.2℃～29.3℃，鹽度介於33.78～34.11；秋初 (民國97年9月5日) 水溫略微下降至26.2℃～32.9℃，鹽度介於33.35～33.91；秋末 (民國97年11月7日) 水溫繼續下降至22.8℃～32.3℃，鹽度介於33.42～34.14。溫排水擴散舌在漲潮時段多往西南擴散，退潮時段往東南-東方向擴散，受西南向淨流的作用，漲潮時溫水舌的擴散範圍較退潮時溫水舌大。
第30年	98年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國98年第三核能發電廠附近海域排水口外長期海流觀測結果，海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主，全日與半日潮流振幅均約為0.10 m/s～0.20 m/s。第1段觀測期 (民國97年12月2日至99年1月17日) 之平均流流速為0.22 m/s，流向233°；第2段 (民國99年1月17日至99年3月5日)之平均流流速為0.18 m/s，流向235°；第3段 (民國99年3月5日至99年5月2日)之平均流流速為0.19 m/s，流向230°；第4段 (民國99年5月2日至99年7月6日)之平均流流速為0.20 m/s，流向230°；第5段 (民國99年4月22日至99年8月28日)之平均流流速為0.18 m/s，流向225°；第6段 (民國99年8月22日至99年10月2日)之平均流流速為0.17 m/s，流向232°；第7段 (民國99年10月14日至99年11月20日)之平均流流速為0.13 m/s，流向237°；第8段 (民國98年11月20日至99年12月30日)之平均流流速為0.09 m/s，流向229°。海流觀測結果和歷年同時期調查結果相近。 漂流浮標及溫度調查結果，民國99年第1季次施測為小潮漲潮段，在出水口附近往南方流動，離出水口後往南南西方漂移、流速介於0.35~0.55 m/s，出貓鼻頭後，漂流流型略呈逆時針方向流動，轉往南方再轉往南南東方，後轉往東南方流動，流速約0.25~0.35m/s；第2季次施測為大潮退潮段，在出水口附近即往東南方漂移、流速約0.30 m/s，離出水口後續往東南方流動，後轉南南東向，轉東再轉東北向，往石牛溪出海口方向流動、流速介於0.25~0.55 m/s；第3季次施測為大潮退潮段，在出水口附近往東南方漂移、流速約0.30 m/s，離出水口後轉往西南西方流動、流速約0.40~0.75m/s，出貓鼻頭後續往西南西向流動，流速漸緩，出峽灣遮蔽區域後轉往東方向流動、流速小於0.25m/s，漂流軌跡呈之字型轉折，漂流時段最大流速為0.82 m/s，對應流向為225°；第4季次施測為大潮退潮段，在出水口附近即往南南東方漂移、流速約0.30 m/s，離出水口範圍後流速漸緩，轉往西方流動、流速約0.05~0.15m/s，之後浮標於灣內呈逆時針方向緩慢流動、流速介於0.05~0.15 m/s，最後浮標向東北方石牛溪口方向流動、流速約0.15m/s，漂流時段最大流速為0.56 m/s，對應流向為151°。浮標溫度資料顯示溫降率自排水口往外至500 m弧內約1°C/100 m。 民國98年溫鹽調查結果，第一季次 (民國98年1月16日) 水溫介於23.1℃～28.4℃之間，鹽度介於34.21～34.61之間；第二季次 (民國98年5月13日) 水溫上升至22.4℃～30.0℃，鹽度介於33.65～34.19；第三季次 (民國98年8月26日) 水溫上升至22.1℃～33.0℃，鹽度介於33.21～34.18；第四季次 (民國98年10月28) 水溫下降至26.4℃～30.6℃，鹽度介於33.19～34.13。溫排水擴散舌在漲潮時段多往西南擴散，退潮時段往東南-東方向擴散，受西南向淨流的作用，漲潮時溫水舌的擴散範圍較退潮時溫水舌大。
第31年	99年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國99年第三核能發電廠附近海域排水口外長期海流觀測結果，海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主，全日與半日潮流振幅均約為0.10 m/s～0.20 m/s。第1段觀測期 (民國98年12月31日至99年1月31日) 之平均流流速為0.15 m/s，流向230°；第2段 (民國99年1月31日至99年3月5日)之平均流流速為0.18m/s，流向232°；第3段 (民國99年3月8日至99年4月10日)之平均流流速為0.17 m/s，流向228°；第4段 (民國99年4月10日至99年5月20日)之平均流流速為0.20 m/s，流向230°；第5段 (民國99年5月20日至99年7月7日) 之平均流流速為0.23 m/s，流向226°；第6段 (民國99年7月7日至99年8月22日) 之平均流流速為0.22 m/s，流向231°；第7段 (民國99年8月22日至99年9月26日) 之平均流流速為0.21 m/s，流向227°；第8段 (民國99年9月26日至99年11月8日) 之平均流流速為0.20 m/s，流向232°；第9段 (民國99年11月8日至99年12月14日) 之平均流流速為0.10 m/s，流向235°。海流觀測結果和歷年同時期調查結果相近。

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第31年	99年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	漂流浮標及溫度調查結果，民國99年2月3日第1次漂流浮標調查時段為小潮退潮段，在出水口附近先往南方流動，離出水口後往西南方漂移，出貓鼻頭後，漂流流型仍續往西南方向流動，離開陸地影響範圍後則有轉往南方流動之趨勢，流速約0.40~0.45m/s。漂流時段最大流速發生於11:55時流速為0.77 m/s，對應流向為231°，淨流流速為0.44 m/s，流向為223°。第2次漂流浮標調查期間仍為小潮退潮段，在出水口附近即往東方漂移，離出水口後續往東方流動，後轉東南東向、流速介於0.40~0.72 m/s，再轉東向，往香蕉灣方向流動、流速介於0.55~0.60 m/s。漂流時段最大流速發生於09:30時流速為0.71 m/s，對應流向為110°，淨流流速為0.57 m/s，流向為97°。民國99年8月16日第3次漂流浮標調查時段為小潮漲潮段，離出水口後往西南西方漂移、流速約0.25 m/s，但很快靠岸擱淺於下潭子，重新佈放後沿岸現外側往西-西南西方漂移、流速為0.25～0.35 m/s，過貓鼻頭後續沿海岸線略偏西向流動，流速值略微增強，續往西向流動，離開陸地影響範圍後則有轉往西北西流動之趨勢，流速約0.45~0.55m/s。漂流時段最大流速發生於11:30時流速為0.78 m/s，對應流向為242°，第一段淨流流速為0.17 m/s，流向為216°，第二段淨流流速為0.35 m/s，流向為265°。民國99年11月23日第4次漂流浮標調查期間漲潮段，漂流時段最大流速發生於施放中期14:55、流速為0.44 m/s，對應流向為181°，淨流流速為0.19 m/s，流向為203°，浮標於漲潮時段離出水口後往南-南南西流動，流速約0.10～0.15m/s，隨漲潮流漸漂向西南，流速約0.25～0.35m/s，由溫度計紀錄可知，溫排水影響範圍於漲潮時段於南側約為距排放口350 m之內。由溫度計紀錄可知，溫排水影響範圍於退潮時段於東南側約為距排放口550 m之內。 民國99年溫鹽調查結果，第一季次 (民國99年2月3日) 水溫介於23.7°C～28.6°C之間，鹽度介於34.01～34.33之間；第二季次 (民國99年5月11日) 水溫上升至27.1°C～31.2°C，鹽度介於33.52～34.15；第三季次 (民國99年8月17) 水溫上升至22.9°C～32.9°C，鹽度介於32.98～34.32；第四季次 (民國99年12月22日) 水溫回降至21.4°C～29.1°C，鹽度介於33.46～34.31。水擴散舌在漲潮時段多往西南擴散，退潮時段往東南-東方向擴散，受西南向淨流的作用，漲潮時溫水舌的擴散範圍較退潮時溫水舌大。
第32年	100年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國100年第三核能發電廠附近海域排水口外長期海流觀測結果和歷年同時期調查結果相近，觀測結果顯示，海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主，全日與半日潮流振幅均約為0.05m/s～0.15 m/s。第1段觀測期 (民國99年12月14日至100年1月26日) 之平均流流速為0.05 m/s，流向245°；第2段 (民國100年1月27日至100年3月11日)之平均流流速為0.19 m/s，流向232°；第3段 (民國100年3月11日至100年4月25日)之平均流流速為0.13 m/s，流向235°；第4段 (民國100年4月25日至100年6月2日)之平均流流速為0.17 m/s，流向232°；第5段 (民國100年6月2日至100年7月24日)之平均流流速為0.20 m/s，流向230°；第6段 (民國100年7月24日至100年9月8日)之平均流流速為0.21 m/s，流向229°；第7段 (民國100年9月8日至100年10月28日)之平均流流速為0.11 m/s，流向234°；第8段 (民國100年10月28日至100年12月15日)之平均流流速為0.11 m/s，流向237°。。海流觀測結果和歷年同時期調查結果相近。 漂流浮標及溫度調查結果，民國100第1季次施測為為小潮漲潮段，在出水口附近往南方流動，離出水口後往南南西方漂移、流速介於0.50~0.70 m/s，出貓鼻頭後，漂流流型轉往南方再續往南南西方流動，流速約0.20~0.50m/s；民國100年第2次漂流浮標施測期間為小潮退潮段，漂流過程中曾兩度擱淺。第一段漂流於離出水口後隨即轉往西南西方漂移、流速約0.20~0.30 m/s，但很快靠岸擱淺於下潭子；於下潭子東方約500m處重新施放；第二段漂流流型呈逆時針方向流動，流速不大、流速為0.10～0.20 m/s，流向初期為西北向，漸轉西向，再轉西南向，往近岸向流動後續往南南西方流動，流速漸增為0.35～0.52 m/s，隨即擱淺於貓鼻頭；第三段漂流浮標，自施放後即往南南西方流動，流速漸增為0.41～0.62 m/。民國100年第3季次漂流浮標施測時段為小潮退潮段，在出水口附近往南南東方流動，離出水口後往南方漂移、流速介於0.40~0.50 m/s，出貓鼻頭後，漂流流型轉往南南東方再續往東方流動，流速約0.20~0.50m/s，其後流速變小、流向由向東轉往南南西向流動、流速逐漸加快。民國100年第4次漂流浮標施測時段為小潮退潮段，在出水口附近往東南方流動，離出水口後續往東南方漂移、流速介

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第32年	100年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	於0.15~0.35 m/s，出貓鼻頭後，漂流流型轉往南方持續流動，流速約0.20~0.40m/s，溫排水影響範圍並不明顯，離排水口東南方約為200 m。由溫度計紀錄可知，溫排水影響範圍於漲潮時段於南側約為距排放口1000 m之內，於退潮時段於東南側約為距排放口900 m之內。 民國100年溫鹽調查結果，第一季次 (民國100年2月24日) 水溫介於24.3℃～30.3℃之間，鹽度介於33.06～34.09之間；第二季次 (民國100年5月13日) 水溫上升至24.7℃～31.6℃，鹽度介於33.63～34.28；第三季次 (民國100年8月10日) 水溫上升至26.1℃～32.0℃，鹽度介於33.60～34.48；第四季次 (民國100年11月19日) 水溫下降至23.4℃～29.6℃，鹽度介於33.18～34.49。。溫排水擴散舌在漲潮時段多往西南擴散，退潮時段往東南-東方向擴散，受西南向淨流的作用，漲潮時溫水舌的擴散範圍較退潮時溫水舌大。
第33年	101年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國101年第三核能發電廠附近海域排水口外長期海流觀測結果和歷年同時期調查結果相近，觀測結果顯示，海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主，全日與半日潮流振幅均約為0.05 m/s～0.15 m/s。第1段觀測期 (民國100年12月15日至101年1月19日) 之平均流流速為0.12 m/s，流向232°；第2段 (民國101年1月19日至101年3月2日) 之平均流流速為0.18 m/s，流向228°；第3段 (民國101年3月2日至101年4月20日) 之平均流流速為0.22 m/s，流向232°；第4段 (民國101年4月20日至101年5月28日) 之平均流流速為0.18 m/s，流向229°；第5段 (民國101年5月28日至101年7月7日) 之平均流流速為0.21 m/s，流向235°；第6段 (民國101年7月7日至101年8月10日) 之平均流流速為0.21 m/s，流向234°；第7段 (民國101年8月10日至101年9月10日) 之平均流流速為0.22 m/s，流向234°；第8段 (民國101年9月10日至101年10月24日) 之平均流流速為0.11 m/s，流向379°；第9段 (民國101年10月24日至101年11月23日) 之平均流流速為0.07 m/s，流向227°。海流觀測結果和歷年同時期調查結果相近。 漂流浮標及溫度調查結果，民國101年第1次施測為為大潮漲潮段，在出水口附近往南南東方漂移、流速介於0.43 ~0.57 m/s，出海灣影響範圍後後，漂流流型轉逐漸轉往東方流動，軌跡型似L形壯，轉流期間流速約0.26~0.56m/s，轉往東向後後流速增快、流速約0.70~1.13m/s，漂流時段最大流速為1.13 m/s，對應流向為100°，淨流流速為0.50 m/s，流向為130°；民國101年第2次漂流浮標施測期間為小潮漲潮段，浮標於出水口時流向為東南向，離開出水口後逐漸轉往東北東方漂流，流速約0.16～0.32 m/s，整段施放期間流速變化不大，漂流時段最大流速為0.32 m/s，對應流向為79°，淨流流速為0.24 m/s，流向為80°；由溫度計紀錄可知，溫排水影響範圍於漲潮時段於南-東南側約為距排放口800 m之內；民國101年第3次漂流浮標調查觀測時段為大潮退潮段，浮標於出水口時流向為南南東向，之後轉往西南方漂流向貓鼻頭方向漂流，流速約0.20～0.33 m/s，出海灣影響範圍後，漂流流向轉往東南-南南東方流動，漂流時段最大流速0.50 m/s，對應流向為204°，平均流流速為0.17 m/s，流向為178°，溫排水影響範圍於出水口南側至下潭子海岸間，與背景水溫溫差2℃離排放口往南南東方約為250 m；民國101年第4次漂流浮標調查觀測時段為小潮退潮段，浮標於出水口時流向為東南向，流速為0.34 m/s、對應流向為157°，為施放期間最大流速，之後浮標轉往西向再轉為西南方漂流向貓鼻頭方向漂流，平均流流速為0.11 m/s，流向為206°。溫排水影響範圍侷限於出水口東南方250 m內。 民國101年溫鹽調查結果，第一次觀測 (民國101年2月23日) 水溫介於24.4℃～30.5℃之間，鹽度介於33.30～34.16之間；第二次觀測 (民國101年5月1日) 水溫上升至26.1℃～30.4℃，鹽度介於33.39～33.84；第三次觀測 (民國101年8月20日) 水溫上升至26.9℃～31.3℃，鹽度介於32.39～33.60；第四次觀測 (民國101年11月9日) 水溫上升至25.3℃～30.7℃，鹽度介於33.60～34.51。溫排水擴散舌在漲潮時段多往西南擴散，退潮時段往東南-東方向擴散，受西南向淨流的作用，漲潮時溫水舌的擴散範圍較退潮時溫水舌大。湧升帶來的冷水，有助於南灣之珊瑚避免海水暖化之衝擊；冷水所含之營養鹽，亦有助於藻類生長，但因南灣海水內外交換甚快，藻類來不及長大即被送至灣外，因此營養鹽利用率不高。

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第34年	102年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國102年第三核能發電廠附近海域排水口外長期海流觀測結果和歷年同時期調查結果相近，觀測結果顯示，海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主，全日與半日潮流振幅均約為0.05m/s～0.15 m/s。第1段觀測期 (民國101年11月23日至102年1月12日) 之平均流流速為0.20m/s，流向234°；第2段 (民國102年1月12日至102年2月19日)之平均流流速為0.16 m/s，流向234°；第3段 (民國102年2月19日至102年3月28日)之平均流流速為0.20 m/s，流向233°；第4段 (民國102年3月28日至102年5月10日)之平均流流速為0.18 m/s，流向234°；第5段 (民國102年5月10日至102年6月16日)之平均流流速為0.24 m/s，流向230°；第6段 (民國102年6月16日至102年7月24日)之平均流流速為0.21 m/s，流向229°；第7段 (民國102年7月24日至102年9月7日)之平均流流速為0.18 m/s，流向234°；第8段 (民國102年9月7日至102年10月1日)之平均流流速為0.14 m/s，流向242°；第9段 (民國102年10月1日至102年11月15日)之平均流流速為0.12 m/s，流向234°。海流觀測結果和歷年同時期調查結果相近。 漂流浮標及溫度調查結果，民國102年第1次施測為大潮漲潮段，漂流浮標在出水口附近往南南東方漂移、流速介於0.32~0.46 m/s，離放流水主控範圍後，漂流型態轉往西南方流動，再出海灣影響範圍後，流型逐漸轉往西南西方流動，流速變緩，漂流浮標於附近兜轉、流向由西南西依順時針方向轉為南南東向，之後流向由南南東轉往東南再轉為南南西向，漂流後段逐漸轉往西南方流動，流速略有增加，施測時段最大流速為0.58 m/s，對應流向為209°，淨流流速為0.23 m/s，流向為206°；民國102年第2次觀測時段為小潮漲潮段，在出水口附近往南方漂移、流速由0.47m/s逐漸變緩，之後轉往東向再轉為南南東向，漂流中後段漂流型態持續往南南東偏南方向向流動、流速介於0.33~0.40 m/s，漂流後段逐漸轉往東南方流動，流速略有增加，流速約0.38~0.53m/s，施測時段最大流速為0.53 m/s，對應流向為144°，淨流流速為0.29 m/s，流向為163°。 102年第3次漂流浮標觀測時段為大潮退潮段。第一段的退潮觀測時段中，其浮標共移動0.29 km，淨移動0.25 km，漂流時段最大流速為0.18 m/s，對應流向為347°，淨流流速為0.12 m/s，流向為17°，浮標於退潮時段離開出水口後往東方漂流，以逆時針方向逐漸轉轉往北方流動，擱淺於出水口北側礁石。回收浮標重新進行第二段的退潮觀測，觀測時段中浮標共移動2.76 km，淨移動2.66 km，漂流時段最大流速為0.41 m/s，對應流向為10°，淨流流速為0.29 m/s，流向為20°，浮標於退潮時佈放於出水口東方300m後隨即往東北東方漂流，以逆時針方向逐漸轉往北北東方流動，潮南灣方向流動。102年第4次漂流浮標觀測時段為小潮退潮段。漂流浮標在出水口附近往東南方漂移、流速由0.47m/s逐漸變緩，離施放點1000m處流速僅維持在0.20m/s，之後轉南南東向，再轉東向、流速約0.13～0.21 m/s，漂流中後段漂流型態由東方持續轉往東北東方向向流動、流速介於0.20~0.22 m/s；漂流浮標共移動2.49 km，淨移動2.25 km，最大流速為0.41 m/s，對應流向為150°，淨流流速為0.18 m/s，流向為112°。 由溫度計紀錄可知，溫排水影響範圍於大潮漲潮時段於南南東-南南西側約為距排放口750 m之內，明顯影響範圍侷限於出水口東南方350 m內，溫排水影響範圍於小潮漲潮時段於南南東-南南西側約為距排放口600 m之內，明顯影響範圍侷限於出水口東南方250 m內。 溫鹽調查結果，第一次觀測 (民國102年2月27日) 水溫介於22.6°C～29.9°C之間，鹽度介於34.01～34.37之間；第二次觀測 (民國102年5月28日) 水溫20.8°C～30.5°C，鹽度介於33.60～34.45。；第三次觀測 (民國102年8月8日) 水溫21.2°C～30.7°C，鹽度介於33.03～34.45；第四次觀測 (民國102年11月27日) 水溫23.1°C～27.4°C，鹽度介於33.00～34.15。 溫排水擴散舌在漲潮時段多往西南擴散，退潮時段往東南-東方向擴散，受西南向淨流的作用，漲潮時溫水舌的擴散範圍較退潮時溫水舌大。湧升帶來的冷水，有助於南灣之珊瑚避免海水暖化之衝擊；冷水所含之營養鹽，亦有助於藻類生長，但因南灣海水內外交換甚快，藻類來不及長大即被送至灣外，因此營養鹽利用率不高。

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第35年	103年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國103年第三核能發電廠附近海域排水口外長期海流觀測結果和歷年同時期調查結果相近，觀測結果顯示，海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主，全日與半日潮流振幅均約為0.05m/s～0.15 m/s。第1段觀測期 (民國102年12月30日至103年2月7日) 之平均流流速為0.14 m/s，流向241°；第2段 (民國103年2月7日至103年3月20日)之平均流流速為0.19 m/s，流向239°；第3段 (民國103年3月20日至103年5月7日)之平均流流速為0.19 m/s，流向231°。海流觀測結果和歷年同時期調查結果相近。 漂流浮標及溫度調查結果，民國103年第1次施測為國103年2月27日，觀測時段為大潮先漲潮後退潮段。第一段觀測時間浮標離出水口後南南東轉南南西後轉西南方漂移、流速為0.40～0.45 m/s，但很快靠岸擱淺於下潭子；第二段觀測時間重新佈放後往西南方漂移、流速為0.46～0.60 m/s，過貓鼻頭後略轉西南西向流動，流速值略微增強、流速為0.65～0.87 m/s，18:30之後流速漸緩、流速為0.26～0.65 m/s，流向由西南西西向轉為西南向。第一段漂流時段最大流速發生於15:55時，流速為0.45 m/s，對應流向為175°，第一段淨流流速為0.41 m/s，流向為213°；第二段漂流時段最大流速發生於17:10時，流速為0.87 m/s，對應流向為230°，第二段淨流流速為0.62 m/s，流向為240°。由溫度計紀錄可知，溫排水影響範圍於漲潮時段約為距排放口520 m以內。 漂流浮標第1次施測民國103年5月8日，觀測時段為小潮退潮段。漂流時段最大流速發生於初施放時刻16:45、流速為0.46 m/s，對應流向為165°，淨流流速為0.17 m/s，流向為218°，退潮時段浮標在出水口附近往南方漂移、流速由0.45m/s逐漸變緩，離施放點300m處流速僅維持在0.21m/s，之後由南向轉南南西流動，流速約0.12～0.20m/s，18:00之後漸漂向西南，流速約0.19～0.26m/s，19:00過貓鼻頭後沿岸漸轉西向，流速約0.13～0.25m/s。由溫度計紀錄可知，溫排水影響範圍於退漲潮時段於南側約為距排放口500 m之內。 民國103年8月19日第3次漂流浮標觀測時段為小潮退潮段，浮標共移動1.40 km，淨移動1.10 km，最大流速為0.68 m/s，對應流向為141°，淨流流速為0.13 m/s，流向為148°。退潮時段浮標在出水口附近往東南方漂移、流速由0.68m/s逐漸變緩，離施放點500公尺後轉往南方流動、流速約0.07~0.15m/s，離施放點位約1000公尺後續轉往東南向流動，流速緩慢、小於約0.10m/s，出峽灣遮蔽區域後轉往東方向流動、流速小於0.10m/s，漂流軌跡尾段漸轉往北方向流動。由溫度計紀錄可知，溫排水影響範圍於漲潮時段約為距排放口250 m以內。 民國103年11月21日第4次漂流浮標觀測時段為小潮退潮段，浮標共移動3.17 km，淨移動0.99 km，漂流時段最大流速為0.44 m/s，對應流向為233°，淨流流速為0.08 m/s，流向為167°，觀測時段均處於退潮段。漂流浮標在出水口附近即往東南方漂移、施放初段流速0.40 m/s，之後流速約0.20~0.25m/s，離施放點500公尺後轉往南方流動，流速維持於0.20~0.25m/s，離施放點位約1000公尺後轉往西南向流動、流速介於0.25~0.44 m/s，離施放點位約1730公尺附近，漂流軌跡由西南向迅速轉為東北向漂流尾段向東北方流動、流速介於0.25~0.33 m/s。浮標溫度資料顯示溫降率自排水口往外至300 m弧內約1°C/100 m。 溫鹽調查結果，第一次觀測 (民國103年2月25日) 水溫介於22.8°C～28.0°C之間，鹽度介於34.36～34.91之間；第二次觀測 (民國103年5月7日) 水溫24.0°C～29.2°C，鹽度介於33.60～34.29；第三次觀測(民國103年8月18日)水溫25.0°C～33.0°C，鹽度介於31.84～33.96；第四次觀測(民國103年11月22日)水溫24.0°C～29.2°C，鹽度介於33.60～34.29。 溫排水擴散舌在漲潮時段多往西南擴散，退潮時段往東南-東方向擴散，受西南向淨流的作用，漲潮時溫水舌的擴散範圍較退潮時溫水舌大。湧升帶來的冷水，有助於南灣之珊瑚避免海水暖化之衝擊；冷水所含之營養鹽，亦有助於藻類生長，但因南灣海水內外交換甚快，藻類來不及長大即被送至灣外，因此營養鹽利用率不高。

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第36年	104年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國104年第三核能發電廠附近海域排水口外長期海流觀測結果和歷年同時期調查結果相近，觀測結果顯示，海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主，全日與半日潮流振幅均約為0.05m/s～0.15 m/s。第1段觀測期 (民國103年11月25日至104年1月27日) 之平均流流速為0.15 m/s，流向235°；第2段 (民國104年1月27日至104年3月23日)之平均流流速為0.12 m/s，流向234°；第3段 (民國104年3月23日至104年5月31日)之平均流流速為0.19 m/s，流向227°；第4段 (民國104年5月31日至104年7月17日) 之平均流流速為0.21 m/s，流向228°；第5段 (民國104年7月17日至104年9月11日) 之平均流流速為0.18 m/s，流向232°；第6段 (民國104年9月11日至104年11月7日) 之平均流流速為0.13 m/s，流向229°。海流觀測結果和歷年同時期調查結果相近。 漂流浮標及溫度調查結果，民國104年第1次施測為國104年2月11日。觀測時間為15:26～18:40，觀測時段為小潮潮型為先退後漲潮段，低潮位發生時刻為17:53。漂流浮標在出水口附近往東南東方漂移、流速介於0.47~0.48 m/s，離放流水主控範圍後，漂流型態轉往東北東方流動、流速介於0.34~0.49 m/s，之後近低潮位流速轉緩、流向由東北東依順時針方向逐漸轉往東流動，流速介於0.17~0.25 m/s，再轉為東南東向(18:20~18:40)；漂流浮標共移動3.38 km，淨移動3.26 km，最大流速為0.49 m/s，對應流向為68°，淨流流速為0.28 m/s，流向為86°；由溫度計紀錄可知，溫排水影響範圍於小潮退潮時段於東北東-東南東側約為距排放口520 m之內，明顯影響範圍侷限於出水口東南東方300 m內。 民國104年5月4日第2次漂流浮標觀測時間為07:56～11:12，觀測時段為大潮退潮段。漂流浮標在出水口附近往南南東方漂移、流速由0.48m/s逐漸變緩，離施放點500m處流速僅維持在0.16m/s，漂流中段之後流向轉東南向再依逆時針方向逐漸轉往東南東流動、流速約0.12～0.26 m/s，之後再漸轉往東方流動流動、流速介於0.19 ~0.30 m/s，漂流後段流向於東向至東南東向之間流動，流速變化較大，流速介於0.08~0.38m/s；漂流浮標共移動2.71 km，淨移動2.53 km，最大流速為0.48 m/s，對應流向為144°，淨流流速為0.22 m/s，流向為114°；由溫度計紀錄可知，溫排水影響範圍於大潮退潮時段於南南東-南南側約為距排放口600 m之內，明顯影響範圍侷限於出水口東南方250 m內。 民國104年8月17日第3次漂流浮標觀測時間為11:04～14:00，觀測時段為中潮退潮段。漂流浮標在出水口附近往東方漂移、流速0.47m/s，之後流速略減，流速維持在0.36~0.50m/s，流向為東北東，浮標往南灣方向漂流，離南灣約500m附近後，流速漸緩，流速由0.36m/s漸減至0.17m/s，流向由東北東轉為向東再轉為東南東向，往石牛溪口方向流動；漂流浮標共移動3.82 km，淨移動3.70 km，最大流速為0.50 m/s，對應流向為61°，淨流流速為0.35 m/s，流向為73°；溫排水影響範圍於中潮退潮時段於東北-東向約為距排放口300 m之內，施放初期水溫33.63℃，漂流距離200m後水溫即降至29℃以下，與背景水溫溫差1℃以內。 民國104年11月7日第4次漂流浮標觀測時間為11:11～14:25，觀測時段為小潮漲潮段。第4次漂流浮標第一段漂流浮標在出水口附近往南南東方漂移、流速0.44m/s，離施放點200m後轉南向，再轉往西南方漂移後擱淺於貓鼻頭西側，速維持在0.36~0.50m/s，第4次漂流浮標第一段漂流浮標共移動1.33 km，淨移動1.26 km，最大流速為0.44 m/s，對應流向為167°，淨流流速為0.24 m/s，流向為223°。第4次漂流浮標第二段再次施放後浮標持續往西南方漂移，流速維持在0.44~0.82m/s，流向維持西南向，之後續往西南西方漂移，流速維持在0.61~0.67m/s，過貓鼻頭後轉往南南東向流動，流速值逐漸增強，流速維持在0.80~1.02m/s，第4次漂流浮標第二段漂流浮標共移動5.29 km，淨移動4.38 km，最大流速為1.02 m/s，對應流向為163°，發生於施放末期，淨流流速為0.59 m/s，流向為206°。溫降率自排水口往外至250 m內約為1℃/100 m，浮標離出水口300m後水溫即降至29℃以下，與背景水溫溫差2℃以內。

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
				溫鹽調查結果，第一次觀測 (民國104年2月11日) 水溫介於22.0°C～26.4°C之間，鹽度介於34.47～34.82之間；第二次觀測 (民國104年5月5日) 水溫25.3°C～29.9°C，鹽度介於33.72～34.30；第三次觀測 (民國104年8月18日) 水溫27.4°C～33.8°C，鹽度介於33.64～34.39；第四次觀測 (民國104年11月6日) 水溫26.3°C～31.8°C，鹽度介於34.33～34.57。 溫排水擴散舌在漲潮時段多往西南擴散，退潮時段往東南-東方向擴散，受西南向淨流的作用，漲潮時溫水舌的擴散範圍較退潮時溫水舌大。湧升帶來的冷水，有助於南灣之珊瑚避免海水暖化之衝擊；冷水所含之營養鹽，亦有助於藻類生長，但因南灣海水內外交換甚快，藻類來不及長大即被送至灣外，因此營養鹽利用率不高。
第37年	105年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國105年第三核能發電廠附近海域排水口外長期海流觀測結果和歷年同時期調查結果相近，觀測結果顯示，海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主，全日與半日潮流振幅均約為0.05m/s～0.15 m/s。105年第1段觀測期(民國103年12月24日至105年1月30日) 之平均流流速為0.15 m/s，流向237°；第2段 (民國105年1月30日至105年3月22日) 之平均流流速為0.17 m/s，流向233°；第3段 (民國105年5月16日至105年6月23日) 之平均流流速為0.19 m/s，流向233°；第4段 (民國105年6月23日至105年7月20日) 之平均流流速為0.22 /s，流向230°；第5段 (民國105年7月20日至105年9月12日) 之平均流流速為0.20 m/s，流向234°；第6段 (民國105年10月28日至105年12月13日) 之平均流流速為0.15 m/s，流向241°。 漂流浮標及溫度調查結果，民國105年2月18日第1次漂流浮標觀測時段為小潮漲潮段。第1次漂流浮標第一段漂流浮標在出水口附近往南向漂移、流速0.51m/s，離施放點200m後轉往西南方漂移後擱淺於貓鼻頭西側，漂流浮標共移動0.77 km，淨移動0.74 km，最大流速為0.51 m/s，對應流向為181°，淨流流速為0.46 m/s，流向為213°。第1次漂流浮標第二段再次施放後浮標持續往西南方漂移，流速維持在0.50~0.72m/s，之後續往西南西方漂移，過貓鼻頭後轉往南南東向流動，流速維持在0.30~0.54m/s，第二段漂流浮標共移動4.89 km，淨移動4.27 km，最大流速為0.73 m/s，對應流向為208°，淨流流速為0.43 m/s，流向為209°。溫降率自排水口往外至250 m內約為1°C /100 m。 民國105年5月9日第2次漂流浮標觀測時段為大潮退潮段。第一段的退潮觀測時段中，其浮標共移動1.37 km，淨移動0.36 km，漂流時段最大流速為0.49 m/s，對應流向為156°，淨流流速為0.05 m/s，流向為221°，浮標於退潮時段離開出水口後先往東南方漂流，以順時針方向逐漸轉轉往南方、再轉西南，迅速轉往西北方流動後擱淺於出水口西南側礁石。回收浮標重新進行第二段的退潮觀測，觀測時段中浮標共移動0.83 km，淨移動0.75 km，漂流時段最大流速為0.36 m/s，對應流向為29°，淨流流速為0.17 m/s，流向為44°，漂流浮標流動範圍均在施放點900m距離內。 民國105年8月21日第3次漂流浮標觀測時間為09:10～12:25，觀測時段為小潮退潮段。第一段觀測時段浮標共移動0.87 km，淨移動0.80 km，最大流速為0.43 m/s，對應流向為181°，淨流流速為0.24 m/s，流向為207°，浮標於退潮時段離開出水口後先往南方漂流，以順時針方向逐漸轉往西南，迅速轉往西北方流動後擱淺於出水口西南側礁石。第二段觀測時段浮標共移動1.17 km，淨移動0.99 km，最大流速為0.22 m/s，對應流向為235°，淨流流速為0.14 m/s，流向為236°，浮標於退潮時段施放後先往西南方漂流，以順時針方向逐漸轉往西，迅速轉往西北西方流動後擱淺於礁石區。第三段退潮觀測時段浮標共移動0.07 km，淨移動0.07 km，漂流時段最大流速為0.12 m/s，對應流向為276°，淨流流速為0.11 m/s，流向為278°，浮標於退潮時段施放後往西方漂流，流速均小於0.12 m/s。

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第37年	105年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國105年11月17日第4次漂流浮標觀測時間為14:10～17:29，觀測時段為小潮漲潮段。第一段觀測時段浮標共移動0.86 km，淨移動0.80 km，漂流時段最大流速為0.28 m/s，對應流向為157°，淨流流速為0.24 m/s，流向為208°，浮標於漲潮時段離開出水口後先往東南方漂流，以順時針方向逐漸轉往南方、再轉西南，擱淺於礁石區。第二段的觀測時段中浮標共移動1.52 km，淨移動0.98 km，漂流時段最大流速為0.36 m/s，對應流向為150°，淨流流速為0.12 m/s，流向為159°，浮標於漲潮段施放後先往東南方漂流後，逐漸轉往南再轉南南東，之後改以逆時針方向逐漸轉往東北東方流動。 溫鹽調查結果，105年第一次觀測 (民國105年2月19日) 水溫介於23.5℃～29.0℃之間，鹽度介於34.59～34.87之間；105年第二次觀測 (民國105年5月10日) 水溫24.2℃～29.6℃，鹽度介於34.49～34.80；105第三次觀測 (民國105年8月25日) 水溫22.7℃～30.8℃，鹽度介於33.67～34.68；105年第四次觀測 (民國105年11月18日) 水溫22.0℃～27.4℃，鹽度介於34.18～34.77。
第38年	106年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國106年第三核能發電廠附近海域排水口外長期海流觀測結果和歷年同時期調查結果相近，觀測結果顯示，海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主，全日與半日潮流振幅均約為0.05m/s～0.15 m/s。106年第1段觀測期(民國105年12月13日至106年1月19日) 之平均流流速為0.11 m/s，流向229°；第2段 (民國106年1月19日至106年3月14日) 之平均流流速為0.16 m/s，流向233°；第3段 (民國106年3月14日至106年5月10日) 之平均流流速為0.21 m/s，流向228°；第4段 (民國106年5月10日至106年7月6日) 之平均流流速為0.20 /s，流向233°；第5段 (民國106年7月6日至106年8月29日) 之平均流流速為0.23 m /s，流向232°；第6段 (民國106年8月29日至106年10月21日) 之平均流流速為0.18 m /s，流向229°；第7段 (民國106年10月21日至106年12月15日) 之平均流流速為0.13 m /s，流向235°。 漂流浮標及溫度調查結果，民國106年2月22日第1次漂流浮標觀測時段為小潮漲潮段，共分四段次佈放，漂流軌跡相近似，浮標於漲潮時段離開出水口後先往南南東方漂流，以順時針方向逐漸轉往南方、再轉西南，後擱淺於礁石區，四段次淨流流速分別為0.30 m/s、0.37 m/s、0.34 m/s及0.40 m/s，流向為219°、220°、217°及217°。民國106年5月23日第2季次施測為小潮退潮段，其淨流流速為0.134 m/s (對應流向107度)，在出水口附近即往南南東方漂移、流速約0.20~0.30 m/s，離出水口後流向依逆時鐘方向偏轉，漂流軌跡呈L型，後轉東北東向，往船帆石方向流動、流速介於0.20~0.30 m/s。 民國106年8月17日第3次漂流浮標調查觀測時段為小潮漲潮段，共分兩段次佈放，第一段觀測浮標於漲潮時段離開出水口後先往南南東方漂流，以順時針方向逐漸轉往南方、再轉西南，後擱淺於礁石區，淨流流速為0.17 m/s，流向為211°；第二段次漂流浮標施放後即往西南向流動，至貓鼻頭附近流速增快，施測時段淨流流速為0.23 m/s，流向為219°；由溫度計紀錄可知，浮標離出水口350m後水溫即由34.4℃降至31.5℃以下。民國106年11月17日第4次漂流浮標調查觀測時段為大潮漲潮段，浮標於漲潮時段離開出水口後先往東南方漂流，以順時針方向逐漸轉往南方、再轉西南往南漂流。漲潮觀測時段淨流流速為0.24m/s，流向為203°，由溫度計紀錄可知，浮標離出水口400m後水溫即降至28.5℃以下，明顯影響範圍侷限於出水口東南方400 m內。 溫鹽調查結果，106年第一次觀測 (民國106年2月23日) 水溫介於23.5℃～28.9℃之間，鹽度介於34.35～34.83之間；第二次觀測 (民國106年5月22日) 水溫24.7℃～29.7℃，鹽度介於34.20～34.61溫鹽調查結果，第三次觀測 (民國106年8月18日) 水溫23.0℃～33.4℃，鹽度介於32.38～34.76，第四次觀測 (民國106年12月15日) 水溫22.7℃～31.1℃，鹽度介於33.78～34.58。

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第39年	107年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國107年第三核能發電廠附近海域排水口外長期海流觀測結果和歷年同時期調查結果相近，觀測結果顯示，海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主，全日與半日潮流振幅均約為0.05 m/s～0.15 m/s。107年第1段觀測期(民國106年12月15日至107年2月16日) 之平均流流速為0.08 m/s，流向233°；第2段 (民國107年2月16日至107年3月19日) 之平均流流速為0.15 m/s，流向236°；第3段 (民國107年3月19日至107年4月21日) 之平均流流速為0.19 m/s，流向234°；第4段 (民國107年4月21日至107年6月2日) 之平均流流速為0.17 m/s，流向232°；第5段 (民國107年6月2日至107年7月20日) 之平均流流速為0.20 m/s，流向229°；第6段 (民國107年7月20日至107年9月12日) 之平均流流速為0.18 m/s，流向233°；第7段 (民國107年9月23日至107年11月4日) 之平均流流速為0.19 m/s，流向236°；第8段 (民國107年11月4日至107年12月16日) 之平均流流速為0.09 m/s，流向234°。 漂流浮標及溫度調查結果，民國107年2月16日第1次漂流浮標調查觀測時段為大潮退潮段，漂流浮標在出水口附近即往東南東方漂移、流速約0.59 m/s，離出水口後續往東方流動，後轉東北向，往南灣方向流動，於南灣海域流速漸緩，漂流浮標淨流流速為0.21 m/s，流向為40°，溫排水影響範圍於退潮時段於東南側約為距排放口300 m之內。民國107年5月13日第2次漂流浮標調查為中潮退潮段，漂流浮標在出水口附近往東南方漂移、流速由0.47 m/s逐漸變緩，離施放點550m處流速僅維持在0.15 m/s，之後轉東南東向，再轉東北東向、流速約0.15～0.18 m/s，漂流中後段漂流型態由東方持續轉往東北東方向向流動、流速介於0.21～0.39 m/s；由溫度計紀錄可知，溫排水影響範圍侷限於出水口東南方350m內。 民國107年9月8日第3次漂流浮標調查為大潮退潮段，浮標在出水口附近即往南南東方漂移、流速約0.32~0.43 m/s，離出水口後流向轉為西南、流速增快、流速約0.35~0.82 m/s，出貓鼻頭後轉往東北東-東南東向流動，流軌跡呈L型，溫排水影響範圍侷限於出水口東南方600 m內。民國107年11月5日第4次漂流浮標調查為大潮退潮段，在出水口附近即往東南東方漂移、流速約0.45 m/s，離出水口後續往東南方流動，後轉南南東向，流速介於0.22～0.27 m/s，轉東再轉東北向，流速介於0.13～0.30 m/s，溫排水影響範圍於退潮時段於東南側約為距排放口500 m之內。 溫鹽調查結果，107年第一次觀測 (民國107年2月20日) 水溫介於21.1°C～27.7°C之間，鹽度介於34.02～34.67之間；第二次觀測 (民國107年5月14日) 水溫24.8°C～30.8°C，鹽度介於33.80～34.76；第三次觀測 (民國107年9月7日) 水溫24.3°C～32.8°C，鹽度介於31.49～34.50；第四次觀測 (民國107年11月15日) 水溫24.5°C～29.5°C，鹽度介於33.79～34.38。
第40年	108年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國108年6段次第三核能發電廠附近海域排水口外長期海流觀測結果和歷年同時期調查結果相近，觀測結果顯示，海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主，全日與半日潮流振幅均約為0.05 m/s～0.20m/s。108第1段觀測期 (民國107年12月16日至107年3月10日) 之平均流流速為0.17 m/s，流向234°；第2段 (民國108年3月10日至108年5月11日) 之平均流流速為0.21 m/s，流向229°；第3段 (民國108年5月11日至108年7月16日) 之平均流流速為0.20 m/s，流向230°；第4段 (民國108年7月24日至108年9月15日) 之平均流流速為0.19 m/s，流向229°；第5段 (民國108年9月15日至108年11月10日) 之平均流流速為0.12 m/s，流向239°；第6段(民國108年11月10日至109年1月8日) 之平均流流速為0.07 m/s，流向235°。海流觀測結果和歷年同時期調查結果相近。 漂流浮標及溫度調查結果，民國108年2月20日第1次調查為大潮漲潮段。觀測時段中，其浮標共移動2.70 km，淨移動2.51 km，漂流時段最大流速為0.40 m/s (對應流向191度)、淨流流速為0.22 m/s (對應流向192度)，浮標於漲潮時段於出水口附近即往南-南南西流動，離出水口後隨漲潮流往西南

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第40年	108年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	向，流速約0.10～0.35 m/s，漂流1.00 km後沿岸轉為向南漂流，流速約0.32～0.40 m/s，過貓鼻頭後轉為南南東向，流速降為0.10～0.18 m/s。溫降率自排水口往外至300 m內約為1°C /100 m，浮標離出水口300 m後水溫即降至27.5℃以下，與背景水溫溫差2℃以內。 民國108年5月12日第2次施測為小潮漲潮段，其淨流流速為0.51 m/s (對應流向249度)，最大流速為0.96 m/s (對應流向270度)，在出水口附近即往南南東方漂移、流速約0.40~0.45 m/s，離出水口後流向依順時鐘方向偏轉，漂流軌跡呈弧型，離出水口後轉往西南西方流動、流速約0.35～0.60 m/s，出貓鼻頭後續往西南西向流動再轉為西向，流速漸增、流速約0.65～0.96 m/s。溫降率自排水口往外至200 m內約為1°C /100 m，浮標離出水口300m後水溫即降至29.0℃以下，浮標離出水口450m後水溫即降至28.5℃以下，溫排水影響範圍侷限於出水口南方300 m內。 民國108年8月23日第3次施測為小潮退潮段，漂流浮標離出水口後即往南方漂移、流速約0.45 m/s，再依逆時針方向轉南南西方移動、流速約0.70～0.95 m/s，離開陸域範圍後漸轉往南方移動，後段轉往東南方流動，整段施放期間流速變化不大，流速絕對值平均值為0.65 m/s，漂流時段最大流速為0.98 m/s，對應流向為207°，淨流流速為0.63 m/s，流向為193°。溫排水影響範圍於退潮時段於南側約為距排放口500 m之內。 民國108年11月16日第4次施測期間為小潮漲潮段，離出水口後往南南西方漂移、流速約0.20～0.30 m/s，後沿岸轉往西南西方漂移，過貓鼻頭後續沿海岸線轉西南略偏西向流動，流速維持0.25～0.35 m/s，續往西向流動，流速改變不大，離開陸地影響範圍後則有轉往西北方流動之趨勢，流速略增強為0.35～0.40 m/s。漂流時段最大流速為0.43 m/s，對應流向為268°，淨流流速為0.26 m/s，流向為242°，溫排水影響範圍於漲潮時段於西南側約為距排放口250 m之內。 溫鹽調查結果，108年第一次觀測 (民國108年2月22日) 水溫介於23.5°C～28.0°C之間，鹽度介於34.09～34.78之間；第二次觀測 (民國108年5月10日) 水溫26.8°C～31.3°C，鹽度介於33.88～34.53；第3次觀測 (民國108年8月23日) 水溫27.3°C～34.6°C，鹽度介於32.60～34.23；第4次觀測 (民國108年11月18日) 水溫21.6°C～27.8°C，鹽度介於33.74～34.34。
第41年	109年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國109年第1段及第2段第三核能發電廠附近海域排水口外長期海流觀測結果和歷年同時期調查結果相近，觀測結果顯示，海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主，全日與半日潮流振幅均約為0.05 m/s～0.20 m/s。109第1段長期海流觀測期 (民國109年1月8日至109年2月28日) 之平均流流速為0.20 m/s，流向238°；第2段 (民國109年2月28日至109年4月19日) 之平均流流速為0.14 m/s，流向237°；第3段 (民國109年4月19日至109年6月20日) 之平均流流速為0.20 m/s，流向229°；第4段 (民國109年6月20日至109年8月17日) 之平均流流速為0.21 m/s，流向229°；第5段 (民國109年8月17日至109年10月16日) 之平均流流速為0.20 m/s，流向229°；第6段 (民國109年10月16日至109年12月24日) 之平均流流速為0.09 m/s，流向232°。海流觀測結果和歷年同時期調查結果相近。 漂流浮標及溫度調查結果，民國109年2月7日第1次施測期間為小潮漲潮段，離出水口後持續往東南方漂移、流速約0.20～0.25 m/s，後轉往南方漂移、流速略降，離出水口約1500m後續轉西南向流動，流速再略增強為0.25～0.38 m/s。漂流時段最大流速為0.38 m/s，對應流向為230°，淨流流速為0.22 m/s，流向為188°。溫排水影響範圍於漲潮時段於西南側約為距排放口450 m之內。 民國109年5月7日第2次施測期間為大潮漲潮段，離出水口後浮標持續往東南方漂移、流速小於0.30 m/s，後漸轉往南南東方流動、流速加大為0.43～0.81 m/s，離出水口約3000m後續轉東南向流動，流速由0.81 m/s逐漸減弱，後續再轉往南方流動，流速小於0.35 m/s。漂流時段最大流速為0.81 m/s，對

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第41年	109年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	應流向為141°，淨流流速0.44 m/s，流向為158°。溫排水影響範圍於漲潮時段於東南側約為距排放口400m之內。 民國109年8月16日第3次施測期間為中潮退潮段，浮標在出水口附近先往東南方漂移，隨即轉往東北方再轉往北方流動、流速均小於0.20 m/s，離施放點東北方約500公尺後浮標依順時鐘方向漸轉往南南西方流動、流速逐漸增大至0.50 m/s，離施放點位東方約500公尺後續轉往西南向流動，流速逐漸增至0.75 m/s。漂流時段最大流速為0.75 m/s，對應流向為222°，淨流流速為0.19 m/s，流向為213°。溫排水影響範圍於退潮時段於東北側及東側約排放口500m之內。 民國109年10月22日第4次施測期間為中潮漲潮段，浮標離出水口後往東南方漂移，後持續往東南方再轉往南方流動，離施放點東南方約990公尺後依順時鐘方向漸轉往西北方流動、流速均小於0.10m/s，後持續依順時鐘方向由漸轉往東北方流動、流速均小於0.15 m/s。漂流時段最大流速0.29 m/s，對應流向為130°，淨流流速為0.03 m/s，流向為142°。溫排水影響範圍於漲潮時段於東南方約排放口500m之內。 溫鹽調查結果，109年第1次觀測 (民國109年2月14日) 水溫介於23.4°C～30.1°C之間，鹽度介於33.89～34.42之間；第2次觀測 (民國109年5月20日) 水溫介於24.0°C～28.4°C之間，鹽度介於34.12～34.57之間；第3次觀測 (民國109年8月15日) 水溫介於23.9°C～33.0°C之間，鹽度介於33.74～34.49之間；第4次觀測 (民國109年10月22日) 水溫介於22.5°C～29.9°C之間，鹽度介於34.19～34.63之間。
第42年	110年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國110年度第1至4季第三核能發電廠附近海域排水口外五次長期海流觀測結果和歷年同時期調查結果相近，觀測結果顯示，海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主，主要全日與半日潮流振幅均介於0.03 m/s～0.30 m/s。 110第1段長期海流觀測期 (民國109年12月24日至110年2月20日) 之平均流流速為0.08 m/s，流向229°；第2段 (民國110年2月20日至110年4月15日) 之平均流流速為0.14 m/s，流向235°；第3段 (民國110年4月15日至110年7月20日) 之平均流流速為0.18 m/s，流向232°；第4段 (民國110年8月19日至110年9月9日) 之平均流流速為0.19m/s，流向229°；第5段 (民國110年9月16日至110年11月18日) 之平均流流速為0.15m/s，流向237°。 民國110年1月22日第1次漂流浮標調查時段為小潮退潮段，共移動4.46 km，淨移動3.94 km，漂流時段最大流速為0.48 m/s (對應流向56°)、淨流流速為0.35 m/s (對應流向88°)。浮標於退潮時段離出水口後先往東北東-東北方流動，流速約0.40～0.48 m/s，漂流2.50 km後轉為向東方漂流，隨即平行海岸轉往東南方流動。由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於退潮時段於東側約為距排放口400 m之內。 民國110年4月16日第2次漂流浮標調查時段為漲潮段，浮標共移動2.54 km，淨移動2.43 km，施測時段最大流速為0.46 m/s (對應流向為138°)，淨流流速為0.21 m/s (對應流向為156°)。浮標在出水口附近往南方漂移，離施放點500公尺後轉往南南東向，離施放點1500公尺後轉往東南向，流速略有增加，流速介於0.30~0.46 m/s。由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於漲潮時段於南側約為距排放口500 m之內。 民國110年8月13日第3次漂流浮標調查時段為退潮段，浮標共移動2.37 km，淨移動0.76 km，施測時段最大流速為0.41 m/s (對應流向為217°)，淨流流速為0.07 m/s (對應流向為61°)。漂流浮標離出水口後往東方漂移，隨即轉往東北方漂流，離施放點1300公尺後依逆時鐘方向先轉往北，再轉往西，續轉往西南西方漂流，觀測後段偏向西南向漂流，流速略有增加，流速介於0.25~0.41 m/s。由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於退潮時段於東北側約為距排放口500 m之內。

年序	民國年代	調查研究者	測站位置	海潮流調查主要內容摘要
第42年	110年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國110年11月18日第4次漂流浮標調查時段為漲潮段，浮標共移動2.74 km，淨移動2.50 km，施測時段最大流速為0.48 m/s (對應流向為212˚)，淨流流速為0.22 m/s (對應流向為201˚)。浮標在出水口附近往東南方漂移、流速介於0.10~0.15 m/s，離施放點350公尺後轉往西南偏南南西方流動，流速略有增加，流速介於0.20~0.48 m/s。由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於漲潮時段於西南側約為距排放口400 m之內。 溫鹽調查結果，110年第1次觀測 (民國110年1月23日) 水溫介於22.7℃～27.3℃之間，鹽度介於34.01～34.50之間；第2次觀測 (民國110年4月15日) 水溫介於22.0℃～25.6℃之間，鹽度介於34.05～34.69之間；第3次觀測 (民國110年8月12日) 水溫介於23.0℃～31.5℃之間，鹽度介於32.67～34.32之間；第4次觀測 (民國110年11月10日) 水溫介於24.0℃～29.6℃之間，鹽度介於33.63～34.19之間。
第43年	111年	中山大學團隊	出水口東南方300公尺	民國111年度第1至4季第三核能發電廠附近海域排水口外四次長期海流觀測結果和歷年同時期調查結果相近，觀測結果顯示，海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主，主要全日與半日潮流振幅均介於0.01 m/s～0.18 m/s。 111第1段長期海流觀測期 (民國110年11月18日至111年1月15日) 之平均流流速為0.11 m/s，流向245˚；第2段 (民國111年1月15日至111年3月14日) 之平均流流速為0.15 m/s，流向240˚；第3段 (民國111年3月14日至111年4月21日) 之平均流流速為0.20 m/s，流向232°；第4段 (民國111年7月13日至111年11月10日) 之平均流流速為0.17m/s，流向232°。 民國111年3月5日第1次漂流浮標調查時段為大潮退潮段，共移動4.45 km，淨移動4.00 km，漂流時段最大流速為0.57 m/s (對應流向147˚)、淨流流速為0.34 m/s (對應流向192˚)。浮標於退潮時段離出水口後先往南方流動，隨即轉往南南西，之後漂流流型略呈逆時針方向流動，轉往南方再轉往南南東方。由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於大潮退潮時段於南側約為距排放口550 m之內。 民國111年5月20日第2次漂流浮標調查時段為漲潮段，浮標共移動2.77 km，淨移動1.91 km，施測時段最大流速為0.42 m/s(對應流向為22˚)，淨流流速為0.16 m/s (對應流向為57˚)。浮標在出水口附近往東南方漂移，離施放點500公尺後轉往東向，離施放點900公尺後轉往東北向，之後轉往北北東方流動、流速介於0.30 ~0.42 m/s。由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於漲潮時段於東側約為距排放口700 m之內。 民國111年7月22日第3次漂流浮標調查時段為小潮退潮段，浮標共移動2.39 km，淨移動2.18 km，施測時段最大流速為0.57 m/s(對應流向為152˚)，淨流流速為0.20 m/s(對應流向為159˚)。浮標在出水口附近往東南方漂移，離施放點400公尺後轉往南方，離施放點1300公尺後轉往南南東向，，離施放點1900公尺後轉往東南方流動。由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於小潮退潮時段於南側約為距排放口300 m之內。 民國111年11月17日第4次漂流浮標調查時段為大潮漲潮段，浮標共移動1.77 km，淨移動1.41 km，施測時段最大流速為0.29 m/s (對應流向為142˚)，淨流流速為0.12 m/s (對應流向為47˚)。浮標在出水口附近往東南東方漂移，離施放點300公尺後轉往東方流動，離施放點650公尺後轉往東北流動，之後轉往北北東偏北流動。由溫度計紀錄可知，漂流浮標溫排水影響範圍於大潮漲潮時段於東側距排放口600 m之內。 溫鹽調查結果，111年第1次觀測 (民國111年2月16日) 水溫介於24.5°C～29.7°C之間，鹽度介於33.47～34.58之間；第2次觀測 (民國111年5月11日) 水溫介於21.3°C～29.5°C之間，鹽度介於33.87～34.58之間；第3次觀測 (民國111年8月12日) 水溫介於21.7°C～30.4°C之間，鹽度介於32.67～34.26之間；第4次觀測 (民國111年11月17日) 水溫介於22.9℃～30.6℃之間，鹽度介於33.41～34.12之間。

表 1-23 民國 95 至 110 年水溫基本統計表

	海 流 儀 CUR 站															
民國(年)	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
年均溫(℃)	25.77	25.55	25.84	25.24	25.88	25.04	25.58	25.66	25.19	25.05	25.45	25.71	25.28	26.01	26.29	25.21
最高溫(℃)	29.67 (07/03)	30.69 (08/05)	30.61 (08/30)	29.87 (09/08)	30.13 (08/19)	29.86 (08/17)	29.57 (06/05)	29.68 (06/08)	30.15 (07/22)	30.07 (07/05)	30.34 (07/06)	30.25 (07/27)	30.43 (08/09)	30.39 (06/29)	***31.02 (07/23)***	30.85 (09/15)
最低溫(℃)	18.90 (01/01)	18.11 (06/14)	20.00 (07/01)	15.66 (12/31)	16.23 (01/03)	19.41 (06/13)	16.56 (06/22)	18.49 (12/05)	18.97 (09/23)	17.77 (12/25)	16.09 (12/16)	17.68 (01/14)	18.79 (06/15)	16.94 (12/17)	18.91 (01/25)	18.05 (02/13)
夏均溫(℃) (5-10 月)	26.39	26.41	26.79	26.25	26.36	27.46	26.31	26.28	26.15	26.34	26.40	26.85	26.34	27.03	27.41	26.29
冬均溫(℃) (11-4 月)	25.04	24.26	25.08	24.28	25.31	23.84	24.84	25.02	24.20	23.75	24.64	24.54	24.25	25.02	25.17	24.29
單日最大溫差(℃)	8.79 (07/21)	9.31 (06/30)	9.13 (07/01)	7.13 (08/16)	9.53 (07/11)	8.31 (07/15)	***10.58 (06/20)***	9.32 (06/22)	9.63 (07/27)	8.31 (07/13)	9.92 (08/03)	8.67 (07/31)	8.43 (06/15)	7.43 (12/17)	8.01 (06/21)	7.93 (07/12)
平均每日溫差(℃)	3.53	3.80	3.15	3.35	3.81	3.36	3.64	3.56	3.52	3.24	2.82	3.27	3.27	3.04	3.27	3.55




圖1-1 第三核能發電廠附近海域 CTD 及定點海流觀測作業位置圖




圖1-2 民國110年1月22日漂流浮標暨溫度追蹤調查結果




圖1-3 民國110年4月16日漂流浮標暨溫度追蹤調查結果




圖1-4 民國110年8月13日漂流浮標暨溫度追蹤調查結果




圖1-5 民國110年11月18日漂流浮標暨溫度追蹤調查結果




圖1-6 民國111年3月5日漂流浮標暨溫度追蹤調查結果




圖1-7 民國111年5月20日漂流浮標暨溫度追蹤調查結果




圖1-8 民國111年7月22日漂流浮標暨溫度追蹤調查結果




圖1-9 民國111年11月12日漂流浮標暨溫度追蹤調查結果







圖1-10 民國109年12月24日～110年2月20日定點海流觀測結果，自上而下：風場，-4、-10、-16、-22 m流矢，溫度與水位時序圖




續圖1-10 民國110年2月20～110年4月15日定點海流觀測結果，自上而下：風場，-4、-10、-16、-22 m流矢，溫度與水位時序圖




續圖1-10 民國110年4月15日～110年7月20日定點海流觀測結果，自上而下：風場，-4、-10、-16、-22 m流矢，溫度與水位時序圖




續圖1-10 民國110年8月19日～110年9月9日定點海流觀測結果，自上而下：風場，-4、-10、-16、-22 m流矢，溫度與水位時序圖




續圖1-10 民國110年9月16日～110年11月18日定點海流觀測結果，自上而下：風場，-4、-10、-16、-22 m流矢，溫度與水位時序圖




續圖1-10 民國110年11月18日～111年1月15日定點海流觀測結果，自上而下：風場，-4、-10、-16、-22 m流矢，溫度與水位時序圖



續圖1-10 民國111年1月15日～111年3月14日定點海流觀測結果，自上而下：風場，-4、-10、-16、-22 m流矢，溫度與水位時序圖



續圖1-10 民國111年3月14日～111年4月21日定點海流觀測結果，自上而下：風場，-4、-10、-16、-22 m流矢，溫度與水位時序圖



續圖1-10 民國111年7月13日～111年11月10日定點海流觀測結果，自上而下：風場，-4、-10、-16、-22 m流矢，溫度與水位時序圖







圖1-11 民國110年12月25日～110年2月19日定點海流低通過濾結果，自上而下：風場，-4、-10、-16、-22 m流矢，溫度與水位時序圖




續圖1-11 民國110年2月21日～110年4月14日定點海流低通過濾結果，自上而下：風場，-4、-10、-16、-22 m流矢，溫度與水位時序圖




續圖1-11 民國110年4月16日～110年7月19日定點海流低通過濾結果，自上而下：風場，-4、-10、-16、-22 m流矢，溫度與水位時序圖




續圖1-11 民國110年8月20日～110年9月8日定點海流低通過濾結果，自上而下：風場，-4、-10、-16、-22 m流矢，溫度與水位時序圖




續圖1-11 民國110年9月17日～110年11月17日定點海流低通過濾結果，自上而下：風場，-4、-10、-16、-22 m流矢，溫度與水位時序圖




續圖1-11 民國110年11月19日～111年1月14日定點海流低通過濾結果，自上而下：風場，-4、-10、-16、-22 m流矢，溫度與水位時序圖



續圖1-11 民國111年1月16日～111年3月13日定點海流低通過濾結果，自上而下：風場，-4、-10、-16、-22 m流矢，溫度與水位時序圖



續圖1-11 民國111年3月15日～111年4月20日定點海流低通過濾結果，自上而下：風場，-4、-10、-16、-22 m流矢，溫度與水位時序圖



續圖1-11 民國111年7月14日～111年11月9日定點海流低通過濾結果，自上而下：風場，-4、-10、-16、-22 m流矢，溫度與水位時序圖

測站：南灣　　施測期間：12/24/08:00 2020-02/20/07:30 2021

記錄筆數：8350　最大流速：1.44m/s (對應流向048.1度)





圖1-12 定點海流調查海流玫瑰圖
(民國109年12月24日～110年2月20日)

測站：南灣　　施測期間：02/20/08:00 2021-04/15/08:00 2021


記錄筆數：7777　最大流速：1.11m/s (對應流向225.3度)



續圖1-12 定點海流調查海流玫瑰圖
(民國110年2月20日～110年4月15日)

測站：南灣　　施測期間：04/15/08:30 2021-07/20/07:00 2021


記錄筆數：13816　最大流速：1.16m/s (對應流向238.9度)



續圖1-12 定點海流調查海流玫瑰圖
(民國110年4月15日～110年7月20日)

測站：南灣　　施測期間：08/19/14:00 2021-09/09/08:30 2021


記錄筆數：2992　最大流速：0.98m/s (對應流向226.6度)



續圖1-12 定點海流調查海流玫瑰圖
(民國110年8月19日～110年9月9日)

測站：南灣　　施測期間：09/16/17:00 2021-11/18/06:30 2021


記錄筆數：9010　最大流速：1.12m/s (對應流向046.1度)



續圖1-12 定點海流調查海流玫瑰圖
(民國110年9月16日～110年11月18日)

測站：南灣 施測期間：11/18/07:00 2021~01/15/07:30 2022


記錄筆數：8356　最大流速：1.33m/s (對應流向048.9度)



續圖1-12 定點海流調查海流玫瑰圖
(民國110年11月18日～111年1月15日)

測站：南灣 施測期間：01/15/08:00 2022~03/14/17:00 2022


記錄筆數：8407　最大流速：1.01m/s (對應流向043.4度)



續圖1-12 定點海流調查海流玫瑰圖
(民國111年1月15日～111年3月14日)

測站：南灣　施測期間：03/14/17:30/2022~04/21/09:00/2022


記錄筆數：5422　最大流速：0.96m/s (對應流向227.0度)



續圖1-12 定點海流調查海流玫瑰圖
(民國111年3月14日～111年4月21日)

測站：南灣　施測期間：07/13/07:00 2022~11/10/07:30 2022

記錄筆數：17284　　最大流速：0.94m/s (對應流向226.6度)



續圖1-12 定點海流調查海流玫瑰圖

(民國111年7月13日～111年11月10日)






圖1-13 定點海流調查流速流向散佈圖


(民國109年12月24日～110年2月20日)




續圖1-13 定點海流調查流速流向散佈圖
(民國110年2月20日～110年4月15日)




續圖1-13 定點海流調查流速流向散佈圖
(民國110年4月15日～110年7月20日)




續圖1-13 定點海流調查流速流向散佈圖
(民國110年8月19日～110年9月9日)




續圖1-13 定點海流調查流速流向散佈圖
(民國110年9月16日～110年11月18日)




續圖1-13 定點海流調查流速流向散佈圖
(民國110年11月18日～111年1月15日)



續圖1-13 定點海流調查流速流向散佈圖
(民國111年1月15日～111年3月14日)



續圖1-13 定點海流調查流速流向散佈圖
(民國111年3月14日～111年4月21日)



續圖1-13 定點海流調查流速流向散佈圖
(民國111年7月13日～111年11月10日)







圖1-14 民國110年12月24日～110年2月20日定點海流調查流速向量進行圖




續圖1-14 民國110年2月20日～110年4月15日定點海流調查流速向量進行圖




續圖1-14 民國110年4月15日～110年7月20日定點海流調查流速向量進行圖




續圖1-14 民國110年8月19日～110年9月9日定點海流調查流速向量進行圖




續圖1-14 民國110年9月16日～110年11月18日定點海流調查流速向量進行圖




續圖1-14 民國110年11月18日～111年1月15日定點海流調查流速向量進行圖



續圖1-14 民國111年1月15日～111年3月14日定點海流調查流速向量進行圖



續圖1-14 民國111年3月14日～111年4月21日定點海流調查流速向量進行圖



續圖1-14 民國111年7月13日～111年11月10日定點海流調查流速向量進行圖





圖1-15 民國109年12月24日～110年2月20日定點海流調查各分潮潮流橢圓圖



續圖1-15 民國110年2月20日～110年4月15日定點海流調查各分潮潮流橢圓圖





圖1-15 民國110年4月15日～110年7月20日定點海流調查各分潮潮流橢圓圖



續圖1-15 民國110年8月19日～110年9月9日定點海流調查各分潮潮流橢圓圖





圖1-15 民國110年9月16日～110年11月18日定點海流調查各分潮潮流橢圓圖



續圖1-15 民國110年11月18日～111年1月15日定點海流調查各分潮潮流橢圓圖





圖1-15 民國111年1月15日～111年3月14日定點海流調查各分潮潮流橢圓圖



續圖1-15 民國111年3月14日～111年4月21日定點海流調查各分潮潮流橢圓圖




圖1-15 民國111年7月13日～111年11月10日定點海流調查各分潮潮流橢圓圖







圖1-16 第三核能發電廠附近海域民國110年1月23日CTD調查深溫鹽分布




續圖1-16 第三核能發電廠附近海域民國110年4月15日CTD調查深溫鹽分布




續圖1-16 第三核能發電廠附近海域民國110年8月12日CTD調查深溫鹽分布




續圖1-16 第三核能發電廠附近海域民國110年11月10日CTD調查深溫鹽分布




續圖1-16 第三核能發電廠附近海域民國111年2月16日CTD調查深溫鹽分布



續圖1-16 第三核能發電廠附近海域民國111年5月11日CTD調查深溫鹽分布



續圖1-16 第三核能發電廠附近海域民國111年8月12日CTD調查深溫鹽分布



續圖1-16 第三核能發電廠附近海域民國111年11月17日CTD調查深溫鹽分布







圖1-17 第三核能發電廠附近海域民國110年1月23日出水口附近溫鹽剖面圖




續圖1-17 第三核能發電廠附近海域民國110年4月15日出水口附近溫鹽剖面圖




續圖1-17 第三核能發電廠附近海域民國110年8月12日出水口附近溫鹽剖面圖




續圖1-17 第三核能發電廠附近海域民國110年11月10日出水口附近溫鹽剖面圖




續圖1-17 第三核能發電廠附近海域民國111年2月16日出水口附近溫鹽剖面圖



續圖1-17 第三核能發電廠附近海域民國111年5月11日出水口附近溫鹽剖面圖



續圖1-17 第三核能發電廠附近海域民國111年8月12日出水口附近溫鹽剖面圖



續圖1-17 第三核能發電廠附近海域民國111年11月17日出水口附近溫鹽剖面圖







圖 1-18 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 1 月 23 日水深 1 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-18 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 1 月 23 日水深 5 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-18 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 1 月 23 日水深 10 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-18 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 1 月 23 日水深 20 m 水溫與鹽度分佈







圖 1-19 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 4 月 15 日水深 1 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-19 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 4 月 15 日水深 5 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-19 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 4 月 15 日水深 10 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-19 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 4 月 15 日水深 20 m 水溫與鹽度分佈







圖 1-20 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 8 月 12 日水深 1 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-20 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 8 月 12 日水深 5 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-20 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 8 月 12 日水深 10 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-20 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 8 月 12 日水深 20 m 水溫與鹽度分佈







圖 1-21 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 11 月 10 日水深 1 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-21 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 11 月 10 日水深 5 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-21 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 11 月 10 日水深 10 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-21 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 11 月 10 日水深 20 m 水溫與鹽度分佈







圖 1-22 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 2 月 16 日水深 1 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-22 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 2 月 16 日水深 5 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-22 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 2 月 16 日水深 10 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-22 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 2 月 16 日水深 20 m 水溫與鹽度分佈







圖 1-23 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 5 月 11 日水深 1 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-23 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 5 月 11 日水深 5 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-23 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 5 月 11 日水深 10 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-23 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 5 月 11 日水深 20 m 水溫與鹽度分佈







圖 1-24 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 8 月 12 日水深 1 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-24 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 8 月 12 日水深 5 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-24 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 8 月 12 日水深 10 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-24 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 8 月 12 日水深 20 m 水溫與鹽度分佈







圖 1-25 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 11 月 17 日水深 1 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-25 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 11 月 17 日水深 5 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-25 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 11 月 17 日水深 10 m 水溫與鹽度分佈



續圖 1-25 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 11 月 17 日水深 20 m 水溫與鹽度分佈




圖 1-26 第三核能發電廠附近海域歷年距出水口 500 米處溫昇變化圖




圖 1-27 民國 92 至 94 年逐時水溫曲線 (上)、同期後壁湖逐時水位曲線 (中) 與蘭嶼每日平均風速、風向棍棒圖 (下)




圖 1-28 民國 97 至 98 年颱風季節期間海流儀水溫紀錄變化與颱風發生時間關係圖

貳、水文水質

(貳-甲)、第三核能發電廠附近海域水文與水質化學

一、計畫目的與緣起

核能發電廠為海中放射性的微量來源，每一座每年隨廢水釋出大約 3.7×10^{11} Bq 的放射性物質(氚除外)，與原子塵比起來，可說是少之又少。由於人類食物中只有 1 % 是取自海洋，而海產食物只增加約 3×10^{-8} Sv 的人類放射性劑量，縱使放射性可經由多種途徑進入人體，人體中來自核能發電廠的放射性劑量(就核燃料整體循環而言)，也只是來自自然界的 0.01 % (Osterberg, 1985)。

在核能發電廠的冷卻系統中加入足量的氯，可以殺死阻礙水管的生物體。在淡水中，氯的毒性可以很快消散；但在海水中，因每公升海水中含有 65 mg 的溴離子的緣故，氯存在時間會較長。持久而毒性低的排放性副產物，主要是來自使用氯的污水處理廠，一般認為它是在封閉水體中，傷害海洋生物的主要兇手；在開闊水域中，氯則隨水擴散、影響較小。目前電廠多使用電解造成之次氯酸鈉，餘氯問題大幅下降。

台灣電力股份有限公司為配合南部突飛猛進之經濟建設與工業開發，在台灣最南端(馬鞍山附近) 興建第三核能發電廠，該廠之第 1 部及第 2 部發電機組已分別於 73 年 5 月及 74 年 2 月順利併聯發電，並於 73 年 7 月及 74 年 5 月商業運轉。由於上述兩部發電機組運轉期間，每天會汲取及排出大約一千餘萬噸冷卻用海水，使該海域之非生物環境遭受變化(如沿岸流之改變、海水混濁度，氯及溫度之增高等)。這些非生物因子的變化，可能使原來的生態系中的生物相(諸如基礎生產力、浮游植物及動物、魚類、底棲動物、珊瑚等)發生變化。由於第三核能發電廠附近海域為台灣重要的珊瑚密生地區，適合於海洋公園之建立。而第三核能發電廠之運轉、全球變遷以及人為活動可能改變原有的生態環境；例如海水酸化及缺氧，對於該地海洋資源的影響究竟如何，也必須加以研究(林，1988；洪，2011；鍾等人，2002；USEPA, 1989, 1991; Wei and Wong, 1993； IPCC, 2014, 2021； Chen et al., 2017； Lui et al., 2020)。

行政院原子能委員會與台灣電力股份有限公司，於 68 年 7 月開始委託環科會執行第三核能發電廠附近海域生態環境調查研究，82 年 7 月改委中山大學進行調查。環科會及中山大學已分別逐年完成工作報告(蘇等，1980~1991；洪等，1992~1993；陳等，1994~2016)；第三核能發電廠運轉前之生態環境背景資料也於 73 年 6 月完成(蘇

等，1984)。76 年 7 月上旬在第三核能發電廠出水口西側內凹淺灣區近岸水深 0 至 5 m 處，發生珊瑚大量白化事件，雖然至 77 年底白化珊瑚業已大部份恢復生機，但依據行政院原子能委員會、台灣電力股份有限公司、衛生署環境保護局與墾丁國家公園管理處等機構，於 76 年 7 月 14 日舉行之「核三廠溫排水對南灣珊瑚影響之防治措施討論會」，決議將該出水口西側內凹淺灣區作為「南灣珊瑚生態保護之預警區」； 因此從 77 年度除按 76 年 4 月 25 日針對「76 年度本計劃執行結果檢討會議」之建議，配合行政院衛生署於 76 年 5 月 5 日公告之「放流水標準」及同年 2 月 4 日公告之「台灣地區沿海水區範圍，水體分類及水質標準」，適當調整水質化學與物理調查項目外，並增加出水口西側內凹淺灣作為珊瑚生態預警區之調查部份。83 年度因經費問題，並尊重莊文思教授等人(1993) 之建議，刪除浮游生物及珊瑚調 查，84 年度短暫恢復珊瑚研究，但僅進行碳氧穩定同位素之分析。86 年度恢復浮游生物部份，87 年度審查委員建議刪除餘氯及基礎生產力，且由於有若干學者聲稱，第三核能發電廠之運轉已使第三核能發電廠附近海域之水溫全面上昇，因此第三核能 發電廠附近海域背景測站所測得之水溫，已無法作為背景值。本研究已證實此一說法不實，並取消原 16 站，但由第 24 站向南方拉出 1 條測線共有 5 點(含 24 站及 12 站)，以有助於研判溫排水之影響範圍。

浮游植物在最適宜的非生物條件下，利用二氧化碳及營養鹽(亞硝酸鹽、硝酸鹽、磷酸鹽及矽酸鹽等)，進行光合作用而合成有機體，同時釋出溶氧。浮游植物得以繁衍生長後，為浮游動物捕獲，使得浮游動物得以繁衍生長。浮游動、植物同為底棲生物與魚蝦等海洋生物生長繁殖時所須時之必須食物。最後，死亡之浮游生物體、底棲生物以及魚蝦等有機體，經海水微生物等消化分解後，再次釋出為無機營養鹽及二氧化碳，並消耗溶氧，而形成一個生態循環的食物鏈。因此非生物因子是所有生態調查之最基本資料。

根據多年來的調查研究結果顯示，第三核能發電廠附近海域水溫的變化，除了溫排水口附近測站(#24)比其他測站之平均表水溫度高約 0.2~2.0 °C 之外，其餘測站的水溫主要受天候、季節性及全球暖化的影響，其中全球暖化之長期趨勢易與溫排水所成之長期累積效應重疊、不容忽視。以南灣附近海域為例，1870 至 2007 年間，每年水溫上升約 0.006 - 0.008 °C 之間 (Jin and Wang, 2011)，近年之上升速率更有所增加 (Belkin and Lee, 2014)。此外，本海域常出現湧升現象，甚至有湧至表水的情形。湧升流出現時，海域的溫度下降、鹽度升高、溶氧飽和度偏低、營養鹽升高(Jan and Chen, 2009)。

湧升的水不僅將下層溫度低、鹽度高的水往上帶，同時也帶來高營養鹽的水；89 年 10 月的湧升現象甚至達到表水。這些原本在深層的高濃度營養鹽湧至光合作用區或是表水時，便對浮游植物提供了額外的營養鹽來源。因此第三核能發電廠附近海域湧升流的強度以及頻率，對此處生態系統扮演了重要的角色。整體而言，第三核能發電廠附近海域之水文與水質化學受溫排水的影響並不明顯，海域之水文與水質目前皆符合我國甲類海域的水質標準。

本子題針對海洋生態中大部份的非生物性因子及少部份的生物性因子做調查。其中非生物性因子包括海水之水溫、鹽度、pH、溶氧量、營養鹽、透明度、濁度，生物性因子為葉綠素甲與基礎生產力。

目標：

1.了解此海域的水文以及水質在時、空上的變化情形；

2.了解此海域受到溫排水影響的範圍有多大；

3.提供植浮及動浮之生態調查的基本資料；

4.建立從民國 68 年至今之水文、水質化學資料檔案；

5.將過去資料作對比，以研判長期之變化趨勢及其受湧升流、颱風、南海水及黑潮水之消長，以及聖嬰現象之影響；

預期成效：

1.經由各測點的調查，了解此海域水文及水質在空間上的變化情形；

2.經由 1 年 4 次的調查，了解此海域水文及水質在時間上的變化情形；

3.溫鹽資料可與本計畫子題 1 海潮流調查相呼應；

4.將溫度、鹽度、pH、溶氧量、營養鹽以及葉綠素甲資料提供給植浮及動浮子計畫參考，有助於調查數據之解釋；

5. 從民國 68 年至今出、入水口及背景站之溫差加以量化並作對比，以研判長期之變化趨勢，並與黑潮及南海北部水溫對比。初步成果顯示南灣似有反應全球性之增溫，並可能受颱風、聖嬰現象、湧昇流、及南海或黑潮水之消長影響。本研究將加強分析數據，以分辨第三核能發電廠溫排水及聖嬰等其它現象之影響。

二、文獻回顧

根據美國能源部專家 C. L. Osterberg 的說法，經由核能發電廠的運作，可能造成的污染為：廢熱、放射性元素及氯，這 3 種污染物排到海洋中；汲取大量冷卻水，則可能造成對生態之衝擊，並改變近海流場。因為熱不同於一般的污染物，並不會集中於海洋食物鏈中，因此熱污染只會造成少許的影響，但可能會在海洋中局部地區積聚。由於水的高熱容特性，所以它是自然界中最好的冷卻劑之一。由於自然界中有 99.4 %的液態水存在於海洋中，也因為核能發電廠需使用大量冷卻水，所以有很多核能發電廠建在濱海地區。

所有使用蒸汽的核能發電廠都需要有 3 種條件：熱源；純水，以產生蒸汽來推動渦輪機發電；以及冷卻水，用來冷凝蒸汽，減少渦輪機產生的回壓，而海水最能滿足作為冷卻水的條件(何與陳，1993)。核能發電廠比起使用其它燃料的發電廠來，需要更多的冷卻水。平均而言，核能發電廠比使用化石燃料的電廠要大，且在較低的溫度下操作。由於核能發電廠的發電效率決定於冷卻水的溫度差；因此冷卻水較小的溫差值，降低了核能發電廠的發電效率。

就使用化石燃料的電廠而言，燃料與氧結合而燃燒，結果就會有數以百萬噸計的廢氣、顆粒性物質以及廢熱，經由煙囪的排放，而散佈到空氣中。另一方面，由於鈾-235 分裂只需由內部提供中子，因此核能發電廠燃料與大氣隔離；此系統不僅具有封閉的特性，且只有極小部份的熱會直接釋入空氣中，廢熱大多利用冷卻水移走，而流入海中。由於河流和湖泊所含的水量相當少，也因淡水另有其它較迫切的用途，如飲水、工業、灌溉等，所以未來核能發電廠不可能以淡水取代海水來當冷卻水使用。相較之下，海水的量約有 14 億立方公里，可以近乎無限制地提供冷卻用水(陳，1993)。

2.1熱污染

海洋污染科學專家聯合小組對海洋污染定義如下：「直接或間接的經由人為方式進入海洋環境(包括河口灣)的物質或能量，造成傷害生物資源或危害人體健康，阻礙海洋活動如漁業，或破壞海水水質致使景觀惡化」。在能量的規定中指出，熱是 1 種能量，也是 1 種污染物。自 61 年美國聯邦水污染控制修正法中提到廢熱以來，廢熱即被認為是污染物的 1 種。正如我們所要了解的，熱在許多方面並不同於其它的污染物，因為它並不會累積在生物體內，而傳送到較高等的食物循環鏈上。

不幸的，核能發電廠不可能在沒有釋熱的情況下使用蒸汽來發電。正如熱力學第 2 定律所述，任何燃料燃燒，只有部份的能量可轉換成電力，剩餘的大部份能量是以熱的型式釋入環境中；轉換成電的熱量愈多，則釋入環境中的熱就愈少。因為核能發電廠採保守性策略，故效率較化石燃料電廠略低 1~2%，但對於熱污染之防範，核能發電廠均訂定相關程序書因應。

有些人擔憂假如人類製造熱的速率繼續增加，將來是否會嚴重的影響到氣候。由於人類經由核能或化石燃料轉換成熱量的速率，只是太陽輸送熱速率的極小一部份，所以此一顧慮尚不足為憂。同時，熱終究會散入外太空中，海洋只不過是其中短暫的停留站(Osterberg, 1985)。

溫度是控制生物生命現象和行為最重要的因子。生物出現在一定的溫度範圍之內，且只能於某特定溫度範圍內才能茂盛生長。哺乳類和鳥類的溫度由體內控制，勉強來說比起其他動物要較不受環境溫度的影響。在 1 大氣壓下，水由攝氏 0~100 °C 均以液態存在，但大部份的水中生物僅能在 50 °C 的溫度範圍內生存。

在高溫下，許多化學反應可以加速進行，生物系統內對於溫度增加的反應更是敏感。溫度增加 10 °C，則生物體內的某些反應可加倍進行。而這種加倍反應的現象，只會在特定的溫度範圍內增加，假若溫度太高，由於熱的作用便會導致化學活動的停止、生物體的死亡及生理觸媒性質的改變。規定核能發電廠放流水的出口溫度，目的是要將此種災變降至最低程度。海濱核電廠運轉時，冷凝器會在比周圍高的溫度下操作，因而影響浮游動植物。

增加溫度同時會降低水中保留溶解性氣體的能力。在 1 大氣壓下，0 °C 的淡水中所含的氧、氮量分別是 30 °C 時的 1.9 及 1.7 倍。就海洋表面而言，0 °C 和 24 °C 下平衡時之氧濃度分別是 8.8 和 5.5 cm^3/l，氮濃度分別是 14 和 9 cm^3/l 。結果，當水體變暖、氮氣溶解度減少時，魚體就會遭受氣泡病(氮栓塞)之害。

前面曾提過熱最後會逸至外太空中。雖然這是熱能的最終命運，但其中的過程並非是一蹴即成的。讓我們在ΔT 為 10 °C 的狀況下，追蹤自核能發電廠釋出的熱之行徑過程。溫暖水柱由於比冷水輕，所以會上升至表面。此水柱因與鄰近海水的混合，所以會立即冷卻，但其熱量仍能一直保留在水中，直到它上升至表水面為止。一旦它到達海水表面，熱就會以三種方式逸散：(1)直接輻射入空中；(2)傳導和對流：(3)蒸發(> 540 cal/g)。

在任何狀況下，要確定主要的散熱型式是那 1 種，並不簡單。在天空晴朗和缺乏水蒸汽，及會吸收紅外線的物質時，輻射的散失率會較快；當上覆的空氣較熱水柱冷時，經由傳導和對流所流失的熱是最大的；而當水溫高而空氣乾燥時，蒸發則成為主要的散熱方式。輻射散熱率與絕對溫度的四次方成正比。

在一般的環境溫度範圍，水溫增加 10 °C，蒸汽壓就會加倍。在濕度小於或等於 90%的狀況下，溫度每上升 10 °C，蒸發約可增加 50 %。由於風速亦可增加蒸發量，所以自然界中表面溫度上升 10 °C，蒸發率很快地就可加倍。風亦可使得底部溫暖的海水，取代受冷卻的較低溫表水，以保持高度的蒸發率。

傳導和對流亦與水柱和其上通過的空氣間的溫差，息息相關。也就是說散入空氣的熱量與水柱的溫差成正比。當溫差增加時可使用較少量的冷卻水；美國聯邦法規要求公共事業降低它們的溫差值，這造成冷卻水及擴散器之用量增加。一般能降溫最快且效果最好的是使用擴散器，來混合溫水柱和較冷的承受水體。此種狀況下，溫差的降低並非是因為熱量散入太空中，而是被較大水體稀釋所致。

因 3 種散熱方法(輻射、對流及傳導和蒸發)均受溫差所控制，因此加熱至高溫的水量愈少，則散熱愈快。另一方面看來，使用擴散器將水柱與周圍較冷的水體混合，可以將熱保持在水中，卻降低熱散入空中的速率。至少最近的兩項研究結論顯示，降低冷卻水用量，使得通過冷凝器的水溫上升，反而可以減少對環境造成的傷害(Osterberg, 1985)。依據美國之經驗，濱海核能發電廠以 1 次完全冷卻系統所產生的熱放流水，對海岸生物的影響量可小至難以偵測。這些結論經整理概要如下(Osterberg, 1985)：

(1)在浮游性植物方面：海洋中原有的浮游性植物群，並未受不良影響；且未見有任何因廢熱而引起物種異常演化的傾向，亦未見任何群體結構變異的現象。

(2)在浮游性動物方面：有些種類有局部性的改變，如橈腳類的某些種類在族群上有增減的現象發生；然而這些改變在魚類或貝類族群上並未發現。

(3)在貝類或較大的無脊椎動物方面：並沒有因熱放流水所引起的明顯退化現象的研究報告。

(4)在魚類方面：並未發現有因熱水柱影響而致死的魚類。但麻薩諸塞州的核能發電廠地區，曾有報告指出 4 種次要魚類的死亡，而被懷疑與因熱力所致的氣泡病或其他原因有關。

(5)大型動物方面：大型動物較能忍受短暫之高溫。例如與第三核能發電廠緯度相仿之美國佛羅里達州火雞角 (Turkey Point) 核能發電廠，其溫排水排入比斯開灣(Biscayne Bay)後，可使水體溫度上昇至 42 °C (Schmidt and Davis, 1978)。然而鰕魚不但能夠忍受，還甚至進入溫排水道(Mazzoti, 1983)。

台灣的情形，除了核二廠之溫排水曾造成祕雕魚之外，大體類似。然而，中國大亞灣海域之植物性浮游生物過去十年來之多樣性減少了 25%，種類組成亦有大幅改變(Wang et al., 2011)。

2.2餘氯

海水的化學性質非常複雜；它至少包含了 75 種化學元素，濃度範圍從每升 19 克的氯到 6×10^{-19} g 的氡氣。假使氡不具放射性的話，這麼低的濃度我們根本就無法偵測到它。正常說來，放射性物質偵測的下限濃度，可比非放射性物質小約 1000 到 10000 倍。除了元素態和無機化合物外，海水中尚有無數的有機化合物，有些雖已被辨明，但仍有許多尚未鑑定出來。再者，懸浮粒子的大小差異極大，從膠質體的無機礦物、單細胞生物大小，到大型哺乳動物都有。

因此海水中氯的化學特性，因其他成份而顯得非常複雜。自本世紀以來，氯被用於純化淡水及於污水中殺菌之用；然而，因存有其他成份，使氯存於淡水與海水中的反應完全不同。雖然，氯在海中的變化，我們了解不多，但因它在淡水中的殺菌效果極佳，因此濱海區核電廠亦廣泛的使用氯。

氯在冷卻系統中的作用，是要殺死冷卻管中的生物，尤其是藻類和細菌；但使用時之濃度，須考慮對人類、哺乳類和魚類是否安全。氯亦可防止生物體的附著，如蛤的幼蟲可能會附著在冷卻系統的表面，阻礙水流的循環，進而降低冷卻系統的效率。每公升 0.003 至 0.005 毫克的氯，可造成許多淡水魚和無脊椎動物有逃避的行為，並且無法再繁殖。

由於如此，與美國比較起來，英國使用較低氯濃度的連續排放系統，所釋放的氯總量並不需減少，已足以使通過冷卻系統的軟體動物不會固著下來。美國則以間歇性的方式加入氯，來去除前次處理後固著下來的生物體，以取代連續加入低濃度氯的傳統方式。雖各國規定並不相同，但核能發電廠中加入殺菌劑用的氯量，一般均約每公升 0.5 毫克。

在經氯化的淡水中，氯的主要化學物種，除了 Cl^-外，還有 Cl_2、HOCl、OCl^-。在 pH=7 時，會有 90%的 HOCl，9.9%的 OCl^-及 0.1 %的 Cl_2 存在，這三種氯的形式組成了自由氯。如果有氨存在，則會形成氯化銨；其他的化學物種則視溫度、濃度和其他因子的不同而有所變化。自由氯和其他化合物的存在，使得氯化的水有殺菌特性；同時，亦是我們測到的殘餘氯主要成份。

海水中每公升含 65 毫克的溴，並且主要是以 Br^-存在，所以氯在海水中的反應完全不同。在氯化的海水中，HOBr 及 OBr^-亦可形成；因此若有氨的存在，溴化銨及氯化氨都會存在。因為氯會殺死核能發電廠中的惡臭性生物，及污水渠道中的病原菌，因此它是良好的殺菌劑，假若使用適當，並不會對人類造成傷害。因氯會與其他的水中組成反應，且其在環境中的濃度會隨時間而降低，乃至消失。這種現象稱為氯需求量，是承受水體的特性之一。

在海洋系統中，因氯化所產生毒性較低的溴基化合物，比起氯化合物來，有較長的時間停留在水中，因此可能對下游生物造成傷害。但溴基化合物毒性較低。如果釋入海中的氯，不為環境所分解而降低其毒性的話，它將會使海洋變成不毛之地；然而，氯藉著轉換成低毒性化合物而持久存在，而這些化合物可使水中生物，在種類和數量上造成緩慢的變化。

雖然核能發電廠使用氯來處理冷卻水的次數持續增加，但為此目的而使用的氯總量並未增加。近年來開始使用海水電解法製氯，不再直接添加氯氣，海水中留存量應當更為下降。核三電廠即是用此方式製氯加入海水中並使其濃度不超過 0.2ppm。然而氯氣仍然作為消毒劑及防毒劑使用，而污水處理廠是主要的使用者。因為氯在海水中能持久存在，所以可能引起未知的影響。我們預期牡蠣會比魚受到更大的影響。因為牡蠣的幼蟲，在海洋生物體中是屬於對氯較敏感的生物，它只能忍受約每噸 10-120 微克的自由氯，和氯化產生的氯化物。其他浮游動植物亦可能受到傷害。

由於第三核能發電廠第 1 號發電機組不幸於 74 年 7 月 7 日發生火災，幾乎終年檢修，停止發電；第 2 號機組亦因第 1 號機組事故，經常停機檢查；迄至 76 年元旦止，兩部機組完成檢修工作，始正常運轉發電；因此 76 年 1 月以後的調查研究結果，將作為核能發電廠運轉對附近海域生態環境影響的重要評估資料。本研究實施的目的在於瞭解第三核能發電廠附近海域，在核能發電廠開始發電前及發電期間之生態系之平衡狀況(非生物環境包括海水之化學及物理性質；生物環境包括基礎生產力、無脊椎動物及魚類之種間關係)與該海域之漁業生物資源。由海流、溫排水擴散及生物群社(Community)之消長關係，可獲得核能發電廠影響生物生活環境情形之基礎資料；由漁獲變動曲線，可估計核能發電廠發電對該海域之漁場經濟效益之可能影響。

三、研究方法與進度說明

3.1現場取樣

歷年來第三核能發電廠附近海域生態調查資料(蘇仲卿等，1980~1991；洪楚璋等，1992, 1993；陳鎮東等，1994~2011)顯示，溫排水對海域生態影響範圍僅局限於近岸測站，故本調查在第三核能發電廠附近海域共設立 7 個採樣站，包括海域內測站 14、16、18、20 等 4 個測站，第三核能發電廠進水口(#22)、出水口(#24) 2 個測站，及後壁湖漁港港口(#23)。87 年 7 月開始，去除 14、16 站，改設 12、21 站，並由測站 24 往南拉出 1 條測線共 5 個測點(含 24 及 12 站) (圖 2-1)，此 5 站以 CTD 測定水層的海水水溫、鹽度，以了解溫鹽的變化情形。採樣位置之定位是以 GPS(全球衛星定位系統)取得。各站經緯度分別是 12 站(120.749104, 21.914593°)、18 站(120.774955,21.928521°)、20 站(120.800270, 21.934430°)、21 站(120.813570, 21.905830°)、22(120.762310, 21.954860°)、23 站(120.757970, 21.945600°)、24 站(120.748920, 21.929700°)、T1 站(120.748950, 21.923500°)、T2 站(120.749303, 21.906257°)、T3 站(120.749318, 21.897749°)。

自 110 年 1 月起，採樣日期分別是 2 月 26 日、5 月 14 日、8 月 17 日、11 月 5 日、111 年 2 月 16 日、5 月 5 日、8 月 12 日、11 月 17 日，共計 8 次，符合採樣數要求。

測量營養鹽用之 PP 塑膠瓶(100 ml)取用新購之瓶子，以蒸餾水浸泡刷洗 2~3 次後陰乾備用。溶氧瓶(60 ml)，先以 10% HCl 浸泡 24 小時以上，再以自來水徹底沖洗，並以去離子蒸餾水潤濕後，陰乾備用。鹽度瓶以自來水刷洗後，再以去離子蒸餾水潤濕後，陰乾備用。採樣時依各站水深不同，分別採取不同深度 0、3、10、25 公尺的海水 5000 ml(89 年 3 月 10 日之後恢復 18 站 50 公尺之採樣)，分別裝入水瓶中。採水的方式則以 5 公升 Niskin 採水器取得。採水器上綁的繩索事先標定長度，採樣時，以繩索垂入海面，直到到達要採樣的深度為止。若繩索與海面有夾角出現，則要求船長駛船調整角度至繩索呈垂直，迅速放下信錘，閉合採水器，取得該深度水樣。

基礎生產力選擇測站 24 站進行，在黎明時分採取表水水樣約 20 公升，經打氣後分別裝入 300 ml 明瓶 2 支及暗瓶 2 支。將瓶子分別蓋上蓋子後，分 7 個深度投入原測站光合作用層中(~可見深度的 2 倍距離)，此 7 個深度分別是 1、2、4、7、11、16、20 公尺。培養至傍晚時分，將明暗瓶取出，分裝至 60 ml 溶氧瓶中，馬上以試劑將溶

解氧固定。首先將溶氧瓶緩緩裝滿水樣，勿讓氣泡介入，取 0.5 ml 氯化錳($MnCl_2$)伸進瓶底後才加入，再取 0.5 ml 鹼性的碘化鈉(NaOH+NaI)伸進瓶底後加入，加蓋，上下充分混合，而後靜置。此時水樣中的溶解氧會與錳離子發生反應而沉澱，待沉澱完全後，再上下混合 1 次。當晚運回實驗室，隔天進行比色測定溶氧量(Pai *et al*., 1993)。

採得之水樣，當場測量溫度、溶氧量及溶氧飽和度。另外過濾水樣 1000 ml，取得葉綠素甲樣本後後放入乾冰筒，攜回實驗室分析。

3.2 現場分析方法如下：

3.2.1 溫度(NIEA W217.51A)：

以 DO 儀(Rinko-PR，ARO-PR)測量水溫，該儀器的溫度精準度可達小數第 2 位，測量時要避開陽光直射。

3.2.2a 溶氧及溶氧飽和度(OCA W401.50C) (Pai, 1993)：

將水樣出水管伸入溶氧瓶底部，緩緩裝滿水樣，勿讓氣泡介入，取 0.5 ml 氯化錳($MnCl_2$)伸進瓶底後才加入，再取 0.5 ml 鹼性的碘化鈉(NaOH+NaI)伸進瓶底後加入，加蓋，上下充分混合，而後靜置。此時水樣中的溶解氧會與錳離子發生反應而沉澱，待沉澱完全後，再上下混合 1 次。之後在水中用臘膜將水封入瓶蓋上方空間再蓋上塑膠蓋，常溫避光保存。

3.2.2b 溶氧(儀器測量法 NIEA W455.52C)：

以 Rinko-PR 品牌的溶氧儀(型號 ARO-PR)攜帶式溶氧儀測定水樣中的溶氧量。將溶氧電極放入水樣中至少 1 分鐘，待水溫測量數值穩定後，再記錄溶氧量。該儀器的溫度精準度可達小數第 2 位，提高了溫度及溶氧兩者數據之可靠度。

3.2.3 透明度 (沙奇盤深度) (NIEA E220.51C)：

現場以沙奇盤(Secchi Disk)測量之。透明度，亦稱「可見度」，是指光線能夠穿透水之程度。本方法係利用直徑 20~30 cm 之白色圓盤，又稱沙奇盤(Secchi Disk)，沉入水中，量測其可見距離，即為水體之透明度，又稱沙奇透明度(Secchi transparency)。

3.2.4 葉綠素甲：

定量 1000 ml 水樣，加入 5 至 6 滴飽和碳酸鎂溶液，以防葉綠素甲(chlorophyll a)分解成脫鎂葉綠素(pheophytin)，以 47mm 網格濾紙(Millipore)過濾之。將濾紙向內折疊整齊置入封口袋中，再放入有乾冰之冰筒保存。

3.2.5 溫鹽記錄器(CTD)


以 SBE 19plus 多功能水質監測器(記錄溫度、鹽度、溶氧、葉綠素甲)施放，在施放前，讓儀器與表水平衡約 5 分鐘的時間，於測站 12、18、20、21、22、23、24、T1、T2、T3 以每下 1 公尺平衡至少 1 秒的速度放入海中，此時儀器會自動記錄溫、鹽等值，返航後再從監測器將資料下載出來。

3.3實驗室分析

3.3.1 鹽度(NIEA W447.20C)：

以廠牌 Autosal 8400B 之鹽度儀測量海水與 I.A.P.S.O.標準海水導電度之比值，回歸求得鹽度(鹽度計事先以標準海水校正)。

本實驗室於 97 年 4 月參加物質質量委員會(CCQM-P111)之鹽度互校實驗，使用上述鹽度儀測量該會提供之 2 瓶盲樣鹽度，測量結果為 34.9684±0.004，之後該會公佈標準值為 34.9672±0.0021(下圖箭頭所指實線即為該數，而 IMGC 即為 Institute of Marine Geology and Chemistry 為本實驗室代碼)，本實驗室的結果在國際 22 間實驗室之中為精、準確度最高之單位(下圖)。



3.3.2 水之氫離子活性指數(酸鹼值, pH, 比色法)：

以比色法測量之，使用 Varian Cary 50 比色槽具有恆溫功能之分光光度計，波長設為 434、578、730nm 量測海水吸光值，再加入 60 μL m-cresol purple 指示劑使之顯色後，再量測吸光值，並代入以下公式得到 pH 值。

$$A_1/A_2 = \frac{A_{578}(D+S) - A_{578}(S) - [A_{730}(D+S) - A_{730}(S)]}{A_{434}(D+S) - A_{434}(S) - [A_{730}(D+S) - A_{730}(S)]}$$

$$(A_1/A_2)_{corr} = A_1/A_2 - V[0.125 - 0.147(A_1/A_2)]$$

$$pH = pK_2 + \log\left[\frac{(A_1/A_2)_{corr} - 0.00691}{2.222 - (A_1/A_2)_{corr} \times 0.1331}\right]$$

3.3.3 溶氧及溶氧飽和度

將上述固氧後的溶氧瓶先放入恆溫槽恆溫至 25 °C，再加入硫酸(H2SO4)溶液，此時沉澱物溶解，樣水呈黃棕色，再以分光光度計波長 466 nm 測定其吸光值(Pai et al., 1993; Labasque et al, 2004)。以碘酸鉀(KIO3)配製 0.1 mN，0.2mN，0.4 mN，0.6 mN，0.8 mN 5 種濃度做為標準曲線，換算樣本溶氧量。

以下列式子計算飽和溶氧量(Chen, 1981)：

$$\ln DO(mg/l)=(-1268.9782+36063.19/(°K)+220.1832\times\ln(°K)-0.351299\times(°K)+S\times(6.229\times10\text{-}3\text{-}3.5912/(°K))+3.44\times10\text{-}6\times S2)\times1.43$$

再以溶氧量除以飽和溶氧量即為溶氧飽和度。

3.3.4 營養鹽：

水樣攜回實驗室後，以孔徑 0.45 μm (Whatman，Nylon membrane Filters)濾紙過濾後，分析下列項目：

3.3.4.1 硝酸鹽(NO_3^-)(NIEA W436.52C)：

Cadmium reduction method+azo dye colorimetric method。水樣先與氯化銨混合，然後通過一活化鎘管，將水中 NO_3^- 還原成 NO_2^-，通過分析儀器 O·I·Analytical FS3100，自動上機比色。分析儀器於波長 543 nm 處槽測其吸收值。扣除 NO_2^- 濃度後，即可得 NO_3^- 濃度。

3.3.4.2 亞硝酸鹽(NO_2^-)(NIEA W436.52C)：

azo dye colorimetric method。水樣先加入酸性磺銨試劑，使 NO_2^- 與酸性磺銨試劑生成對重磺銨離子。再與鹽酸奈乙二銨試劑反應，生成粉紅色之偶氮染料，以 O·I·Analytical FS3100 分光光度計於波長 543 nm 處，以 1 cm 長之比色槽測其吸收值，再由莫耳吸光係數求得濃度。

3.3.4.3 磷酸鹽(PO_4^{-3})(NIEA W463.50B)：

Ascorbic acid reduction-colorimetric method。水樣加入酸性銻鉬試劑，使 PO_4^{-3} 與鉬酸銨反應，生成黃色磷鉬複合物。再加入抗壞血酸，藉由酸性銻鉬中的銻離子催化，使之還原成藍色磷銻鉬複合物。於波長 880 nm 處，以 5 cm 長之比色槽測其吸收值，再由莫耳吸光係數求得濃度。

3.3.4.4 矽酸鹽(SiO2) (NIEA W450.50B)：

Ascorbic acid/oxalate reduction-colorimetric method。水樣加入酸性鉬酸銨試劑，生成黃色矽鉬複合物，再加入抗壞血酸還原成藍色矽鉬複合物，整個呈色反應於恆溫槽 35℃ 中進行。於波長 810 nm 處，以 1 cm 長之流動比色槽測其吸收值，再由莫耳吸光係數求得濃度。

上述 NO_3^- 以 O·I·Analytical FS3100 進行自動分析，另外為取得 PO_4^{-3} 較低的偵測下限濃度，因此在 PO_4^{-3} 顯色後，改以手動方式用 5 cm 比色槽比色之，SiO_2 則以 trident-223 型流程板自動上機比色，該系統由台灣大學海洋所白書禎教授所研發。硝酸鹽的精確度約為±0.035 μmol/kg，亞硝酸鹽約為±0.02μmol/kg，磷酸鹽約為±0.01 μmol/kg，矽酸鹽約為±0.1 μmol/kg。

3.3.5 葉綠素甲(NIEA E509.01C)：

回到實驗室後，於黑暗的室內將濾紙置入包上鋁箔紙的離心管，加 90%的丙酮 10 ml 於離心管內，然後利用震盪器震盪 20 分鐘後，放入冷藏櫃內冷藏 1 小時，再取出離心管放在試管混合攪拌器上，攪拌 2 分鐘後，放入冷藏櫃內冷藏 24 小時，次日取出離心管放置離心機內，以 3000 rpm 速度離心 15 分鐘後，取出離心管，將離心管上層澄清液放入螢光儀內(Varian)測量，記錄其螢光值。以葉綠素甲配製標準品濃度之標準曲線，根據公式換算樣品的葉綠素甲濃度。

3.3.6 濁度(NIEA W219.52C)：

以 Nephelometric method 濁度計測定之。

3.3.7 基礎生產力(溶氧法)之測定：

於岸邊完成固氧之樣本，當晚運回實驗室，隔天進行比色測定溶氧量。實驗步驟如下: 上述固氧後的溶氧瓶先放入恆溫槽恆溫至 25 °C，再加入硫酸(H_2SO_4)溶液，此時沉澱物溶解，樣水呈黃棕色，再以分光光度計波長 466nm 測定其吸光值(Pai *et al*., 1993; Labasque *et al*., 2004)。以碘酸鉀(KIO_3)配製 0.1 mN，0.2 mN，0.4 mN，0.6mN，0.8mN 5 種濃度做為標準曲線，換算樣本溶氧量。並以下列方式計算基礎生產力(primary productivity)：

(明瓶溶氧量－暗瓶溶氧量)÷138×106　　單位：mmolC/m^3/day

3.3.8 總殘餘氧化劑濃度(NIEA W453.20B)

將水樣出水管伸入溶氧瓶底部，緩緩裝滿水樣，勿讓氣泡介入，取 0.5 ml 緩衝試劑($CH_3COOH+CH_3COONa$)伸進瓶底後才加入，再取 0.5 ml 鹼性的碘化鉀(NaOH+KI)伸進瓶底後加入，加蓋，上下充分混合，而後靜置。此時水樣中的殘餘氧化劑會將碘離子(I^-)氧化為溶解碘分子(I_2)及三碘錯離子(I_3^-)。之後以塑膠蓋裝滿水後再行封蓋。

將此溶氧瓶攜回實驗室，以恆溫槽恆溫至 25 °C，再以分光光度計波長 353nm 測定其吸光值(Pai *et al*., 2002)，換算為總殘餘氧化劑濃度相對於海水餘氯濃度(mg/L as Cl_2)。

3.4 品保及品管

品管措施是實驗室維持分析品管的重要工作，其目的在於監測分析過程的可靠性，發覺及控制實驗中可能產生之誤差。為求加強品保及品管，本計畫資深研究人員王冰潔於 87 年參加 ISO14001 之訓練，順利取得環境管理顧問師之資格，有助於提升本計畫之品管及品保。

評估誤差大小及分析過程之可信度，可利用精密度及準確度兩個參數。精密度係指重覆分析一均勻樣品時，分析結果之再現性(reproducibility)，通常以標準偏差表示之；準確度係指分析結果與真實值接近之程度，通常以相對誤差表示之。

3.4.1 重覆分析(Duplicate Analysis)

重覆分析的目的在監測實驗室分析的再現性，建立分析數據的準確度，對於相同基質或相同濃度的樣品，通常每分析 10 個樣品，至少應有 1 個樣品執行重覆分析。

$$PRD(\%) = \frac{|D_1 - D_2|}{(D_1 + D_2)/2} \times 100$$

D_1=第 1 次測值； D_2=第 2 次測值

對同一樣品重覆分析 2 次，分別得到 D_1 和 D_2 二測量值，依下式計算相對百分偏差 RPD (Relative percent difference)：

實驗室應每年建立可接受極限，若重覆分析差異落在極限以外，則此分析值視為不可靠，應立即採取修正措施，並重新分析該批次所有樣品，一般對於濃度比偵測下限大 5 倍的樣品而言，其允許差異範圍為±20 %。

3.4.2 標準添加分析(Standard addition analysis)

標準添加之目的，在於獲知樣品中基質對於待測物質，或分析方法可能造成之干擾，建立分析數據的準確性。通常將樣品分為 2 份，一份直接依步驟分析，另一份則添加適當已知量濃度(添加量為樣品濃度的 50~150 %)之標準品後再分析，由回收率來

管制基質的干擾。對相同基質或同一濃度範圍內的樣品，通常每 20 個樣品應同時分析添加標準品之樣品。若每月分析之樣品少於 20 個，則每月至少應做 1 次添加分析。

$$回收率(\%) = \frac{SSR - SR}{SA} \times 100$$

SSR=添加標準品後之測定濃度；SR=樣品之濃度；SA=添加於樣品中之濃度回收率須落於 75~125 %之範圍內方可接受，否則應重新分析。若樣品濃度低於儀器偵測下限，則計算回收率時，SR 以 0 表示。

3.4.3 標準參考樣品分析

參考樣品係指從製造標準品之單位(如 NBS, ERA)購進之標準參考樣品(不同於製備檢量線之標準樣品)，其組成均經世界許多一流實驗室之分析比對，可視為相當可信之標準參考值(Certified value)。標準參考樣品的基質應與欲分析樣品者相似，如此可比較基質效應所造成的影響。實驗室內至少每個月應分析一參考樣品，並將其分析日期、結果、回收率記載於記錄簿內。

$$回收率(\%) = \frac{測量值}{真實值} \times 100$$

回收率應落於 80~120 %之範圍內，否則當日分析之結果皆視為不可靠，應重新分析。

3.4.4 方法偵測極限

準備試劑水，試劑水中不得有待測物或其他物之干擾，於試劑水中加入待測物，並重覆分析 7 次。計算 7 次之標準偏差，取 3 倍之標準偏差即為分析方法之偵測極限。

所有採樣及處理過程並依海科中心水質分析品保/品管手冊(陳等，1991a; 陳，1998)之要求，防範各種可能的污染，以確保分析之準確度。本計畫所得之海水分析數據，較相同海域水質監測計畫之鹽度、pH 及溶氧量均多出小數點以下 1 位(李等，1995)。

四、目前研究成果

國科會於執行「全球環流研究」時，在貓鼻頭南方有一南北向測線(PR-21,沿著 120° 43' E)，此測線離台灣南岸最近之測站所取得之水文及水質資料(劉和白，1992; 劉等，1992; 陳等，1993a~c, 1995a, 1996, 1997)，可作為第三核能發電廠附近海域諸測站遠方之最佳背景值。

水文與水質化學分析部份為「第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查」整體計畫中最基礎的一部份，因其中所涵蓋之水文(包括溫度及鹽度)與水質化學(包括 pH 值、溶氧量、營養鹽、濁度及透明度)兩大部份中之各項因子，均直接或間接影響著海域之生態組成與平衡。因此，分析水文及水質化學在時間和空間之分佈情形，並與過去的調查相比較，可供瞭解第三核能發電廠運轉前後，第三核能發電廠附近海域水文與水質化學因子的變化傾向，及其對環境的影響。本調查除了接續從 68 年開始之定期調查工作，將歷年來之各項資料做一初步的整合之外，並分析葉綠素甲與基礎生產力，將之與水文及水質化學因子做相關性分析，藉以瞭解該海域水文、水質化學因子間，及其與葉綠素甲之互動情形。

為了要瞭解第三核能發電廠運轉對附近海域所造成的影響，本研究將 7 個測站分為兩大類，一為離第三核能發電廠較遠的測站(測站 14、16、18、20；87 年 7 月以後為測站 12、18、20、21)，稱之為對照測線；另一為接近第三核能發電廠進出水口的測站(測站 22、23、24)，稱之為實驗測線，此兩類之水文與水質資料可加以比較。

4.1 110年1月~111年12月的結果

從 110 年 1 月開始，採樣日期是 110 年 2 月 26 日(110 年第 1 次)、5 月 14 日(110 年第 2 次) 、8 月 17 日(110 年第 3 次)、11 月 5 日(110 年第 4 次) 、111 年 2 月 16 日(111 年第 1 次)、5 月 5 日(111 年第 2 次) 、8 月 12 日(111 年第 3 次)、11 月 17 日(111 年第 4 次)，表 2-1 為此 8 次水樣現場及實驗室分析之結果。

4.1.1 水溫

測站 24 距離溫排水口最近，可以監測溫排水排入海洋後之溫度狀況。現場量測水溫資料顯示，110 年第 1、2 次測站 24 的水溫 24.0、29.2°C 高於對照測站 22.8±0.3、27.8±0.2、而第 3、4 次則是與對照測站相近甚或還略低，分別是 29.1、26.2 °C 對應 29.1±0.4、27.2±0.4 °C。111 年 4 次調查亦是互有高低，其中第 1、2 次 24 站與背景測水溫接近，差值在 0.5°C 以內，而第 3、4 次則是高出 1.5 及 0.8°C。

而扣除可能受溫排水影響的第 24 站後，110 年第 1 次調查的表水水溫平均為 23.1±0.6℃，低於歷年同月之水溫平均 24.3±1.1℃，為歷年來第 2 低的二月份水溫。而第 2、3 次分別為 27.9±0.3°C、29.3±0.5°C，則與歷年 27.6±1.0°C、29.1±0.8°C、相當。第 4 次平均水溫為 27.3±0.3 °C，比歷年同月之平均水溫 26.0±1.1 高了 1.3±1.1°C，為從 75 年來調查之次高平均值。第 111 年 4 次調查，平均水溫分別為 25.3±0.3°C、27.3±0.2°C、30.5±0.4°C、26.5±0.4°C，其中第 1、3 之高出歷年平均水溫約 1°C，其餘 2 季則水溫相當。

從衛星資料來看，本海域 110 年 2 月 26 日的水溫落在 24℃等溫線之內，5 月 14 日則落在 29℃之內，8 月 17 日、11 月 5 日分別落在 30、28℃之內；111 年 2 月 16 日的水溫落在 25℃等溫線之內，5 月 5 日則落在 28℃之內，8 月 12 日、11 月 17 日分別落在 30、28℃之內，顯示本現場調查資料與衛星資料相吻合(圖 2-2)，而且灣內的溫度略低於灣外之溫度。

位於出水口的測站(#24)在 110 年第 1 次時，水溫較其他測站略高外，其 pH、溶氧量最低，而營養鹽則是最高(圖 2-3)，此現象是由溫排水引起？或是有冷水從西邊而來？若是由前者而來，由於此處表水的來源是抽取 22 站底層水而來，因此其水文、水質參數應與 22 站底層水相近，除了溫度之外。比較 24 站表水與 22 站的底水，發現兩者鹽度相近，pH、溶氧量略低，但營養鹽略高，因此不排除是由 22 站底水而來所造成的較高值。此現象在過去的調查亦曾出現過。

但會不會有另一可能，是由台灣海峽輸送來的呢?利用國科會海洋資料庫(ODB Hidy Viewer^{pro})互動式海洋資料查詢與展示平台，查詢採樣日(2 月 26 日)的海流狀況，發現此時在南灣西南側有一渦流，其在順時針旋轉過程中，極有可能將北方較冷、營養鹽較高的海水帶過來南灣。

上述現象在 108、109 年第 1 次調查都曾出現；台灣海峽的海流在冬天時因受東北季風壓制無法順利北上，轉而南下繞經南灣。因此南灣海域雖位在台灣的最南端，但也會受到台灣海峽的水影響，但以有限的資料來看，此現象規模不大並且僅限在冬天。111 年同季節，則 24 站表水無較異常之訊號，此時海流也沒觀察到渦流。

由美國國家氣候預報中心(NOAA)發佈的聖嬰/反聖嬰期發生時間表(表 2-2)來看，海洋聖嬰指數(ONI)於 109 年 8 月至 111 年 10 月進入反聖嬰期，時間長達 2 年多。自本計畫執行以來此是第 2 長時間的反聖嬰時期，上一次最長的反聖嬰時期在 1998-2001，延續了 2 年半之久。Wu(2013)的文章指出，聖嬰的影響在西北太平洋是不固定的，端視它是在 PDO 的暖相或是冷相：在 PDO 暖相時，聖嬰與季風強弱的年際關係不明顯，而 PDO 冷相時，聖嬰現象與冬天的季風的強弱關係明顯。

110、111 年度 8 次的採樣時間皆處在反聖嬰期；而大氣和海洋研究聯合研究所(JISAO)所公佈的太平洋十年期振盪指數(PDO)則於 108 年 10 月之後至 111 年 11 月皆為負值。觀察水溫距平值(當月測值-歷年月平均值)除了第 110 年第 1 次及 111 年第 3 次為負值外，其餘 6 次皆為正，大致符合 PDO 為冷相時，西北太平洋海域水溫偏高之預期。由 75 年 7 月至 111 年 11 月本海域長達 36 年溫度距平值(當月測值-歷年月平均值)與 ONI、PDO 之變化(圖 2-4)可以看見，本海域的溫度距平值早期大都偏低，

而於 87 年之後則大都偏高，似乎呼應了海洋暖化的現象；79~84 年的聖嬰/正 PDO 對應的是距平低值，而 99~103 年的反聖嬰/負 PDO 則對應了溫度距平高值，然而並非所有的大尺度海洋溫度距平高低值都對應著本海域應有的溫度變化，因此本海域溫度的變化不僅反應了全球海溫上升的趨勢，可能也受到海洋大尺度事件如 ONI、PDO 振盪的影響，變化因子較為複雜。

4.1.1.1 CTD 資料

110 年第 1 次水層的水溫變化，以 T3 站為例，表水水溫為 22 °C，至 12-15 公尺水溫即下降至 19 °C，在此季節(冬季) 低溫水能抬升至如此淺層較為少見；上段也提及本次表水水溫為歷年來第 2 低的二月份水溫。第 2 次表水溫度為 27.7 °C，至 35 公尺深水溫為 26.8 °C 變化不大，斜溫層出現在 35-50 公尺間，50 公尺以下水溫為 22 °C。本海域夏季水層之溫度大多有斜溫層出現，表水與水深 80~100 公尺的溫度可達 7~8 ℃(28.7 ℃相對 21℃)以上之差值，110 年第 3 次亦有相似情形。第 4 次 T3 表水溫度為 26.6 °C，至 90 公尺深水溫為 22 °C，溫度隨深度緩降，變化並不大。

111 年第 1 次水層的水溫變化，以 T3 站為例，表水水溫為 25 °C，至 50 公尺水溫僅降至 23.5 °C，混合層的深度高達 50 公尺以上，此現象與去年同季的水溫分佈完全不同類型；第 2 次表水溫度為 26.8 °C，至 80 公尺深水溫為降為 25 °C 變化不大，斜溫層尚未發展。第 3 次時斜溫層已生成，表水與水深 80 公尺的溫度可達 8 ℃以上之差值(29.8 ℃相對 21℃)，與去年同季相似。第 4 次 T3 表水溫度為 26.2 °C，至 90 公尺深水溫為 20 °C，溫度隨深度緩降，變化並不大。(圖 2-5)

沿測線 24-T1-12-T2-T3 觀察，並未有高溫聚集現象，顯示溫排水之擴散效果良好，溫排水影響的深度大約在 3~5 公尺。

溫排水擴散的範圍不大，大都在出水口 24 站附近及南灣之西南側。與南灣緯度相近之大亞灣核電站，受溫排水影響之地區亦為核電站附近、大亞灣之西南側；2002 年受影響面積為大亞灣之 3%，2003 年則為 7% (Wang et al., 2011)。就深度來看，3 m 深的水層幾乎就看不到溫排水的影響。長期水溫記錄顯示本海域常有湧升現象。由 82 年統計至今各季的水質資料，發現 1-3 月的發生湧升的情形最少見，也可能是因為冬季時，在厚達 70-80 公尺的整個水層中都是性質上下如一的混合層，因此即使有下層水湧升現象也與上層水質相似而無法偵測到。

海洋靠近陸棚邊緣的地區常有海水湧升的現象。除了洋流撞上大陸斜坡及陸

棚引起湧升流之外，在陸棚東側較深海水湧升到表層的現象，通常是風沿著東海岸朝北吹拂一段時間後，在表層海水之艾克曼傳輸(Ekman transport)，因而在該海域表面形成幅散區，導致較深海水湧升到近岸表層。在陸棚西側則北風會引起湧升流。

除了上述時間、空間尺度較大的例子之外，原能會委託中研院所進行歷年海潮流調查顯示(蘇等，1980~1991)，第三核能發電廠附近海域內海流之流況極為複雜，可以說隨日、隨時都在改變。台大范光龍教授也指出第三核能發電廠附近海域具有相當強的海水湧升現象，而且當大潮時期前後幾天，海域內沿岸會發生海水水溫短期突降現象：當第三核能發電廠附近海域大潮時期大退潮末至小漲潮間，西半部海域會形成逆時針氣旋式渦漩(cyclonic eddy)。氣旋式渦旋會導致湧升流，使第三核能發電廠附近西半部海域產生海水水溫突降 4~5 ℃，而其東半部海域海水水溫的影響則端視潮汐鋒面(tidal front)及氣旋式渦漩所抬升冷水的強弱決定。理論上，范教授認為第三核能發電廠附近海域海水水溫下降，應以西半部靠近反氣旋渦漩中心海域最為顯著，而第三核能發電廠附近海域的東半部具有較寬廣、且較淺的大陸棚區域，冷水入侵的強度應被減弱。但事實上由范教授歷年來資料顯示，水溫的下降卻是東半部海域之降幅最大，這種現象經由多年收集的現象資料以及潮流模式驗證，發現順時針反氣旋式渦漩及半日潮潮波和全日潮潮波傳遞方向的不一致性，造成第三核能發電廠附近海域東半部大陸棚海水水溫突降，而其中以反氣旋式渦漩扮演的角色最為重要(Lee *et al.*, 1998)。本計畫子 1 則認為此處的冷水湧升與內潮有極大關係，該內潮由恆春海脊處所引發。本計畫早期雖未作連續觀測，但也或多或少觀測到了冷水湧升現象。設置在排水口外的溫度長時間的記錄器時有記錄到冷水入侵情形，詳細資料見下節。

4.1.1.2 長期水溫觀測

將溫度記錄器分別綁在出水口右側離岸約10~20公尺，水深3、9公尺以及貓鼻頭水深9公尺之珊瑚處，記錄時間為109年11月8日至110年2月21日、2月22日至5月5日、5月6日至8月14日、8月15日至11月3日、11月4日至111年2月9日、2月10日至5月4日、5月5日至8月3日、8月5日至11月11日，共8段，水溫在水深3、9公尺之振盪現象仍持續發生(圖2-6)；第1段時間記錄到的3公尺平均水溫為25.3±1.5 ℃，較9公尺深的平均水溫24.4±1.6 ℃，高約0.9 ℃；第2段3公尺平均水溫為26.6±1.3 ℃，較9公尺深

的平均水溫25.2±1.4 ℃，高了1.4 ℃。這兩段之水溫記錄期間並無颱風發生，水溫並無較大的振盪幅度。第3、4段3公尺水深之平均水溫分別為28.0±2.1、29.7±1.1 ℃，較9公尺深的平均水溫25.6±2.0、28.5±1.0 ℃，高約2.4、1.2 ℃，夏季時(第3段)兩深度的水溫差距較大。

110年有5個颱風發佈警報，分別是彩雲(6/3~6/4)、烟花(7/21~7/24)、盧碧(8/4~8/5)、璨樹(9/10~9/13) 、圓規(10/10~10/12)，其中僅璨樹為強烈颱風，其餘均是輕度等級。但璨樹颱風帶來的溫降並不大，反而是烟花颱風過後溫度下降約8 ℃，而且水溫每天持續下降將近12天，之後加上盧碧颱接棒4天的降溫，整個海域在7月下旬、8月上旬表現出較低海溫的現象(續圖2-6)。111年有3個颱風發佈警報，分別是軒嵐諾(9/2~9/4)、梅花(9/11~9/13)、尼莎(10/15~10/16)，其中軒嵐諾為強烈颱風，其他兩個是中度等級。記錄的水溫在軒嵐諾颱風以及梅花颱風時皆有降低現象，但幅度並不大，主要是颱風路徑並不經過南灣海域。

111年颱風襲來台灣創下了史上最晚發布警報的紀錄；檢查南灣海域102-111年7/15-8/15同時間的出水口3公尺深的水溫，111年相較102-109年在前半個月有偏低情形，而後半個月溫度反而較過去為高；而去年(110年)在7月下旬、8月上旬則有持續降溫12天的現象(圖2-7)。

第三核能發電廠附近海域底層水有冷水入侵的現象在本研究子計畫1、洪(2011)、Lee *et al.* (1999) 及Jan and Chen (2009) 均有所發現，然而該研究顯示冷水出現的頻率幾乎是一天一次，與本研究觀測結果不盡相同。可能原因在於Lee *et al.* 所設置的觀測點在第三核能發電廠附近海域的東側，深度在45公尺。由於漲潮及退潮的水位變化，使得冷水可能每天可湧升至45公尺；本研究設置的點近排水口，但較淺，約在10公尺，推測冷水入侵無法到達10公尺，或是發生的頻率較低，大約是在大潮前後才會發生。但也有非大潮時觀測到冷水湧升的現象，冷水湧升的機制不僅只是單純的潮汐漲退所引起，內潮、渦漩、黑潮擺盪，甚至浮力效應皆可能引發冷水湧升。

4.1.2 鹽度

由過去的水文調查指出，台灣西南海域以及南海北部之上層海水，在夏季時係高溫、低鹽之南海表層水，入秋後逐漸為高溫、高鹽的黑潮水所取代(朱，1963; Fan and Yu, 1981; Fan, 1982; Wang, 1986)，而第三核能發電廠附近海域主要是黑潮水、南海的中鹽水及低鹽沿岸水之混合水團。110年第1次表水鹽度平均34.440±0.018，略

低於歷年平均鹽度34.460±0.320；第2次表水鹽度平均33.990±0.012，低於歷年平均34.174±0.256；第3次表水鹽度平均33.532±0.102，低於歷年平均33.690±0.452；第4次表水鹽度平均33.965±0.035，亦是低於歷年平均34.221±0.314。總結來看，110年4次採樣的表水鹽度皆低於歷年平均值，第1次差值僅低0.02，逐步擴大差距至0.184、0.158至0.256。111年第1~4次表水鹽度平均34.426±0.078、33.946±0.010、33.517±0.042、33.800±0.042，亦都低於歷年當季平均鹽度。

Durack 等人(2012)研究指出，全球暖化將造成水圈循環加強，從過去50年(1950-2000)的資料顯示，蒸發大於降雨的海域，鹽度變高，降雨大於蒸發的海域，海水鹽度變得較低，而南海海域在過去50年即屬於後者之變化。本海域在99~102年PDO冷相頻頻觀察到低於歷史記錄的鹽度，而在這兩年(110、111年)亦處於反聖嬰期及PDO冷相，也是觀察到較低鹽度的現象，顯示本海域的鹽度變化與PDO變化有明顯的正相關。

一般而言，海流在往北流經台灣東南海域時，會有一支流進入南海北域，此支流向西流入南海北域之後再繞回台灣墾丁南部海域，才沿著台灣東部往北繼續流動；在聖嬰時期，此支流繞入南海北部並不深(梁，2002)；又聖嬰時期，南海湧升現象減弱，與外界交換變弱(Chao *et al*. 1996)，導致黑潮水流入南海的規模變小，黑潮水與南海水交換也變少，推論此時核三海域能保有較明顯黑潮水的性質，而反聖嬰年時則相反，可能量測到較低鹽水 (Chen et al., 2010)；換言之，在第三核能發電廠附近海域的鹽度訊號，正可以反應此處南海水與西菲律賓海水(黑潮水)交換規模的大小。對照往年鹽度資料，當鹽度訊號偏高，顯示西菲律賓海水性質較高，除季節因素之外，大多適逢聖嬰現象時間。第三核能發電廠附近海域附近受台灣本地複雜的氣候、海底地形因素以及近年來全球氣溫日漸升高影響，對於此海域的衝擊，必須詳細且全面的探討，才能更確認此處水文性質變動的真正原因。

4.1.3 pH

110年第1次調查結果顯示，pH介於7.922~8.024之間，平均7.999±0.025；第2次介於7.968~8.059之間，平均8.045±0.022；第3次介於8.019~8.082之間，平均8.066±0.015；第4次介於8.025~8.082之間，平均8.061±0.017；111年第1次調查pH介於8.025~8.074之間，平均8.060±0.013；第2次介於8.023~8.056之間，平均8.049±0.007；第3次介於7.948~8.082之間，平均8.062±0.029；第4次介於7.936~8.048之間，平均8.031±0.023。pH值均符合海保署107年2月13日所公佈的海域環境分類及

海洋品質標準第5條規定「甲類海域的水體標準：氫離子濃度指數應在7.5~8.5之間」。由平均值來看，此區pH比WOCE的pH資料8.27±0.05 (表2-3)略低。

4.1.4 溶氧量及溶氧飽和度

110 年第 1 次調查結果顯示，溶氧量介於 5.71~6.51 mg/l 之間，平均 6.30±0.20 mg/l；第 2 次介於 5.89~6.52 mg/l 之間，平均 6.33±0.12 mg/l；第 3 次介於 6.14~6.41 mg/l 之間，平均 6.33±0.07 mg/l；第 4 次介於 5.87~6.37 mg/l 之間，平均 6.19±0.15 mg/l；111 年第 1 次調查溶氧量介於 6.10~6.31 mg/l 之間，平均 6.24±0.06 mg/l；第 2 次介於 6.24~6.46 mg/l 之間，平均 6.40±0.06 mg/l；第 3 次介於 5.97~6.53 mg/l 之間，平均 6.40±0.11 mg/l；第 4 次介於 6.01~6.86 mg/l 之間，平均 6.72±0.18 mg/l。此 8 次調查結果，均符合海保署 107 年 2 月 13 所公佈的海域環境分類及海洋品質標準第 5 條「甲類海域之水質標準，溶氧量應在 5.0 mg/l 以上」之規定。

110 年第 1 次溶氧飽和度介於 76.7~94.3%之間，平均 89.1±4.1%；第 2 次介於 83.3~100.4%之間，平均 96.8±3.7%；第 3 次介於 91.0~101.7%之間，平均 98.3±2.4%；第 4 次介於 87.2~98.0%之間，平均 94.2±3.2%；111 年第 1 次溶氧飽和度介於 89.5~94.0%之間，平均 92.3±1.4%；第 2 次介於 93.0~98.5%之間，平均 97.4±1.1%；第 3 次介於 84.9~103.7%之間，平均 101.1±4.0%；第 4 次介於 84.5~103.3%之間，平均 100.4±3.9%。8 次的調查結果中以 110 年第 1 次的飽和度較低，該次水溫偏低，因此較低溶氧可能是較深層水湧升所致。

4.1.5 營養鹽

海水中之營養鹽主要有硝酸鹽、磷酸鹽和矽酸鹽，這些營養鹽是水中植物生長所不能或缺的化學物質。在一般大洋中，營養鹽主要來源為有機質之分解。在沿岸地區，營養鹽除了來自有機質分解之外，亦可能受溪流輸入帶有家庭、農業及工業廢水的影響。

4.1.5.1 硝酸鹽

海水中的無機氮，除氮氣之外一般以 NO_3^- 佔較大的比例，其為氮化物氧化之最終產物。NO_3^- 的來源主要為生物代謝物質之分解、氧化及陸源逕流之補給。其濃度隨著浮游植物及生物群落的活動狀況而變化，NO_3^- 的分佈情形不僅可以反映海洋生物活動的規律性，而且有助於瞭解水文及水系的混合情形。若海水中的 NO_3^- 過量聚積，將促使水體優養化，影響生物正常生長。海水中的 NO_2^- 來自河水的輸入，及海水中含氮物質氧化還原過程的中間產物，如 NO_3^- 的還原、有機物與氨的氧化等。這

些過程常需要微生物參與反應。

110年第1次 NO_3^- 含量介於1.53~7.34 μM之間，平均2.65±1.42 μM，本次觀察到較低溫水湧升之現象，將高濃度的水往淺層帶上來，因此濃度偏高；第2次 NO_3^- 含量介於0.17~3.80 μM之間，平均0.60±0.83 μM；第3次 NO_3^- 含量介於0.05~2.18 μM之間，平均0.10±0.13 μM；第4次 NO_3^- 含量介於0.15~1.81 μM之間，平均0.61±0.49 μM。111年第1次 NO_3^- 含量介於0.21~1.46 μM之間，平均0.63±0.35 μM；第2次 NO_3^- 含量介於0.28~1.86 μM之間，平均0.55±0.31 μM；第3次 NO_3^- 含量介於0.08~4.88 μM之間，平均0.48±0.48 μM；第4次 NO_3^- 含量介於0.24~7.49 μM之間，平均1.18±1.49 μM。

此一海域所含的硝酸鹽並不是很高，但仍稍高於WOCE測站的硝酸鹽含量(表2-3)。由過去的資料可知，在24站表水常出現硝酸鹽高值，該高值甚至比其來源水22站10m還要高，因此推測該高值並非單純由22站10m而來，由102年第2次資料顯示，高值乃下層水湧升所致。

4.1.5.2 亞硝酸鹽

通常海水中 NO_2^- 的自然濃度很低，是為海洋植物的營養鹽之一。當濃度過高、異常或變化過劇時，常為海洋生態環境惡化之表徵。110年第1次 NO_2^- 含量介於0.11~0.15 μM之間，平均0.13±0.01 μM；第2次 NO_2^- 含量介於小於0.02~0.07 μM之間，平均0.03±0.01 μM；第3次 NO_2^- 含量介於小於0.02~0.21 μM之間，平均0.10±0.04 μM；第4次 NO_2^- 含量介於0.02~0.13 μM之間，平均0.06±0.03 μM。111年第1次 NO_2^- 含量介於小於0.02~0.07 μM之間，平均0.02±0.02 μM；第2次 NO_2^- 含量介於小於0.02~0.07 μM之間，平均0.02±0.02 μM；第3次 NO_2^- 含量介於小於0.02~0.06 μM之間，平均0.02±0.01 μM；第4次 NO_2^- 含量介於小於0.02~0.06 μM之間，平均0.02±0.01 μM (統計時，將小於0.02的數字以0.01計算)。

4.1.5.3 磷酸鹽

近岸海水中 PO_4^{-3} 多來自河川陸水所輸入，因此，河口及沿岸水域常有含磷量過高的現象。磷為浮游植物生長繁殖不可或缺的必要元素，但水中含磷量過高，則常導致赤潮的發生。張(1991)認為，海水中的活性磷在0.15 μM以下，才能避免於赤潮的發生。顯然，磷酸鹽可以作為水體優養化的指標之一。據研究指出，大陸大部份海區的活性磷含量，春、夏兩季小於0.11 μM，秋冬兩季則介於0.03至0.22 μM之

間。在各別河口和海灣，活性磷含量有時可達0.64 μM (張，1991)。

110年第1次調查 PO_4^{-3} 含量介於0.19~0.58 μM之間，平均0.09±0.10 μM；第2次調查 PO_4^{-3} 含量介於0.02~0.34 μM之間，平均0.02±0.07 μM；第3次調查 PO_4^{-3} 含量介於小於0.02~0.20 μM之間，平均0.02±0.04 μM；第4次調查 PO_4^{-3} 含量介於小於0.02~0.16 μM之間，平均0.02±0.04 μM。111年第1次調查 PO_4^{-3} 含量小於介於0.02~0.09 μM之間，平均0.04±0.03 μM；第2次調查 PO_4^{-3} 含量介於0.03~0.13 μM之間，平均0.05±0.02 μM；第3次調查 PO_4^{-3} 含量介於小於0.03~0.37 μM之間，平均0.07±0.07 μM；第4次調查 PO_4^{-3} 含量介於小於0.02~0.49 μM之間，平均0.13±0.09 μM。

調查結果顯示此海域的磷酸鹽含量較WOCE測站為高(表2-3)，可能是湧升水將下層高磷酸鹽的水往上帶。另外，陳等人(1991b)之研究曾指出，在墾丁國家公園內各聚落之污水排水道含有高量的營養鹽，污水並且直接排入海域，也可能是第三核能發電廠附近海域營養鹽略高原因之一。但88年之後墾丁地區已設置了污水處理場，營養鹽的陸上來源理應降低。

浮游植物死亡後，其有機體經由氧化可釋出營養鹽氮及磷於水中，在海水中兩者並以16：1的關係存在(Redfield *et al.*, 1963)。反過來說，水中之營養鹽若有16份的氮及1份的磷，最適合浮游植物生長，當氮與磷的比值高於16時，顯示水體的氮太多，因此磷成為浮游植物生長之限制因子。反之，則氮成為浮游植物生長之限制因子。圖

2-8為89年至今88次調查資料之氮與磷比值圖，圖上顯示，氮與磷的比值大都落在斜率小於16之下，由此可知，此一海域浮游植物的限制因子為氮，與南海北部相同 (Lui and Chen, 2011)，既然此一海域對氮較為敏感，因此對氮污染的途徑應該特別注意。氮進入海洋之主要來源有四種，分別是雨水、海鳥糞便、大氣固氮作用以及肥料，其中僅肥料的流入可由人為來控制，因此對於陸上是否有肥料流入此海岸應特別注意。與大亞灣相比，該處原亦為氮限制，但近年來已變成磷限制 (Wang et al., 2011)。110年第1次氮磷濃度較高，但仍在斜率16線上，顯示該營養鹽來自植浮的分解，並非另有污染源。

4.1.5.4 *矽酸鹽*

SiO_2 在自然界中分佈極為廣泛，是多數岩石、土壤和灰塵的主要成份。岩石的

風化和土壤的流失等，使幾乎所有的天然水中，都含有溶解性SiO_2，但SiO_2在海水中的濃度要比河水中低得多。SiO_2為矽藻生長所必需之重要元素之一，而矽藻又是牡礪的主要食物。據黃(1988)指出，牡礪以濾食海水中之浮游植物為生，其消化管內90%以上，是由35種矽藻所組成的，因此，海水中SiO_2的含量可能間接影響牡礪之生長。

天然水中的矽，主要來自矽酸鹽與鋁矽酸鹽礦物的水解，絕大多數正常天然水中SiO_2的含量，高於與石英平衡時的含量，而低於與無定形SiO_2平衡時的含量，大部份是介於16至500 μM 之間。表層海水遠低於此值，則與生物的吸收作用有關(陳，1992)。

110年第1次SiO_2介於3.26~9.60 μM之間，平均4.30±1.56 μM；第2次介於1.99~5.69 μM之間，平均2.75±0.81 μM；第3次介於0.56~2.57 μM之間，平均1.57±0.39 μM；第4次介於1.47~3.32 μM之間，平均2.02±0.49 μM。111年第1次SiO_2介於1.30~2.92 μM之間，平均2.01±0.48 μM；第2次介於2.18~3.93 μM之間，平均2.48±0.34 μM；第3次介於2.11~8.79 μM之間，平均3.09±1.44 μM；第4次介於2.52~10.8 μM之間，平均3.39±1.71 μM。

4.1.6葉綠素甲與基礎生產力

浮游植物為海洋中最重要之初級生產者。其藉由光合作用，將無機碳轉化為有機碳，許多浮游動物及濾食性生物便是賴其為生。由於浮游植物均含有葉綠素甲，因此，經由海水中葉綠素甲含量之分析，可供瞭解海域之浮游植物量。而浮游植物量之變化，可直接反應出該海域生態環境是否受到污染而惡化。

110 年第 1 次葉綠素甲介於 0.10~0.26 μg/l 之間，平均 0.19±0.04 μg/l；第 2 次介於 0.06~0.32 μg/l 之間，平均 0.13±0.06 μg/l；第 3 次介於 0.05~0.34 μg/l 之間，平均 0.15±0.08 μg/l；第 4 次介於 0.12~0.27 μg/l 之間，平均 0.19±0.04 μg/l。111 第 1 次葉綠素甲介於 0.04~0.11 μg/l 之間，平均 0.08±0.02 μg/l；第 2 次介於 0.05~0.19 μg/l 之間，平均 0.12±0.04 μg/l；第 3 次介於 0.04~0.26 μg/l 之間，平均 0.09±0.05 μg/l；第 4 次介於 0.05~0.17 μg/l 之間，平均 0.10±0.03 μg/l。8 次調查營養鹽的濃度雖然有高低，但葉綠素甲的濃度卻不相上下。本海域葉綠素甲含量較台西外海 (經濟部工業局，1996a)

及台南外海 (經濟部工業局，1996b)為低。

海洋中之基礎生產力，通常指在一定水域內，某一段時間植物性浮游生物利用無機溶解性鹽類，製造有機化合物的產量。因此，基礎生產力可視為日光、水溫、海洋化學組成等條件控制下，「光合作用」進行之程度；亦可視為植物性浮游生物的生產量。影響浮游植物的分佈之控制因素極為複雜，如溫度、光線、水流速度、營養鹽之供應等，皆會影響浮游植物的生長。基礎生產力之測量方法有許多種，大多數係基於光合作用公式。此外，測量水中所含葉綠素濃度，或根據某段時間內，水中溶氧量之增減，亦可作為有機化合物生產量之估計。

110 年第 1 次基礎生產力介於小於 0.3～2.67 mmolC/m^3/day 之間；第 2 次為 0.46～3.90 mmolC/m^3/day；第 3 次為 0.6～4.06 mmolC/m^3/day；第 4 次為 0.49～2.89 mmolC/m^3/day。本年度第 1 次的水溫為歷年第 2 低，第 4 次為歷年第 2 高，但兩者在基礎生產力上並無太大的差別。111 年第 1 次基礎生產力介於小於 0.3～2.83 mmolC/m^3/day 之間；第 2 次為 0.46～3.90 mmolC/m^3/day；小於第 3 次為 0.3～9.85 mmolC/m^3/day；第 4 次為小於 0.3～1.69 mmolC/m^3/day。此區的基礎生產力較台灣東北角黑潮水來得高些(大都小於 1 mmolC/m^3/day，呂朝城，1995)，但與陸棚水(≒1～12mmolC/m^3/day)、湧升黑潮水(≒0.5～8 mmolC/m^3/day)大致相當。

4.1.7 濁度及透明度

濁度表示海水的混濁程度，亦表示海水的透光性質。水中的濁度是由懸浮物質如黏土、粉砂、微生物及浮游動植物所造成的。在暴風雨過後，近岸海水之濁度會大幅增加，而在近岸施工亦會對附近海水的濁度造成相當程度的影響。測站22透明度在110年第2、3季雖僅8m，較其他測站低，但因本測站靠近岸邊，底深僅約10來公尺，故而此數字應算正常。第三核能發電廠附近海域海水的濁度低且變化小，顯示海水中的懸浮顆粒或有機質含量少，而使得此一海域，海水常年清徹見底，水層的透明度大都在8公尺以上。

4.1.8 總殘餘氧化劑濃度

工業上為了達到管線中用水的消毒殺菌之目的，常添加氧化劑，其中以氯氣(Cl_2)/次氯酸(HClO)較廣泛使用；日常民生用水，也常使用氯氣等氧化劑來達到除臭消毒之目的，但這些殘餘氧化劑排放之後，對環境將造成衝擊，故需加以監測。

傳統上認為檢測殘餘氯出來即為殘餘氯含量，但根據台大海研所白書禎教授(Pai *et al.*, 2002)等調查研究顯示，餘氯進入海水後，會衍生複雜的物種，如 Cl_2、ClO^-、Br_2、BrO^-、NH_2Cl、NH_2Br…等，檢測難以區分這些物種，故不宜以殘餘氯稱之，應以總殘餘氧化劑(total residual oxidant，TRO)統稱，表示海水的殘餘氧化能力。但為了便於瞭解，檢測出的數據再將之換算成相等於餘氯濃度(mg/l as Cl_2)(表 2-1)。

110 年第 1 次總餘氯濃度介於 0.06~0.14 mg/l 之間，平均為 0.09±0.02mg/l；第 2 次介於 0.08~0.17 mg/l 之間，平均為 0.11±0.02 mg/l；第 3 次介於 0.04~0.10 mg/l 之間，平均為 0.06±0.01 mg/l；第 4 次介於 0.05~0.10 mg/l 之間，平均為 0.07±0.01 mg/l。111 年第 1 次總餘氯濃度介於 0.05~0.08 mg/l 之間，平均為 0.06±0.01mg/l；第 2 次介於 0.03~0.08 mg/l 之間，平均為 0.05±0.01 mg/l；第 3 次介於 0.04~0.06 mg/l 之間，平均為 0.05±0.01 mg/l；第 4 次介於 0.03~0.09 mg/l 之間，平均為 0.06±0.01 mg/l。根據墾丁國家公園管理處提供的資料，在南灣及石牛溪附近設有南灣污水處理廠及墾丁污水處理廠，處理後污水之入海處分別接近 22 站與 20 站，總餘氯含量可能受到處理過後之民生用水排放影響而偏高，但結果顯示此兩站並無特別高值。

4.2 歷年來的結果(下文所提的附圖皆在光碟片中)

4.2.1 溫度

4.2.1.1 月份的變化

本調查從 68 年至今(111 年 12 月)已有 43 年了，由於第 1 年至第 8 年的數據報導是水層的平均值，即 0~10 m 或是 0~25 m 的平均值，因此第 8 年後的數據也必須具有相同的深度才能比較。經過比較及整合，目前 7 站中有 4 站(14、20、22、24)的深度可以與前 8 年對應。相同月份中，14 站水溫高低差為 3.7 ℃，出現在 8 月；20 站水溫高低差為 4.8 ℃，出現在 1 月；22 站水溫高低差為 5.5 ℃，也是出現在 1 月；24 站水溫高低差可達 6.4 ℃，出現在 8 月。由此資料顯示，24 站的水溫變化相當的大。理論上，24 站是溫水排放口，它的溫度應該會高於其他測站，但若第三核能發電廠發電機組不運轉，則它的水溫應該與臨近的測站相近。也就是說，24 站的水溫只會大於或等於其他測站。但在 71 年 10 月、75 年 3 月、95 年 4 月、98 年 5 月、99 年 11 月、101 年 2 月、5 月以及 102 年 5 月卻觀察到水溫略低於其他測站，24 站並非是每次調查最高溫的測站。原因可能

有 3：

1.早年測站較多，採樣日數在 3 天左右，因此不同天的海象若相差太大，水溫拿來互相比較就有問題。

2.採樣時適逢發電機組進行維修沒有運轉，24 站表現自然水體之水溫。

3.取水口(~6 m)之水溫低於表水溫度。

但是利用平均值的角度來看，可以將上述的效應減弱。附圖 2-1 是運轉前後此 4 站的平均溫度變化圖，可以看出 24 站各月份平均溫度在運轉前與其他站相近，而 14 站溫度較低，是因為其取 0~25 m 的平均值，而其他站則取 0~10 m 為平均值。運轉後 24 站較其他 2 站(只比較 20 及 22 站相同深度之平均值)高出 0.7~2.2 °C，差值最小出現在 4 月，最大出現在 12 月。

附圖 2-2 也可以清楚看到 14、20、22 站各月的平均水溫在運轉前、後並沒有多大的差異，然而第 24 站的水溫在運轉後明顯比運轉前高。因此第三核能發電廠的運轉改變了 24 站的水溫，其他 3 站則沒有受到明顯影響。

除了這四站外，16、18、19、23 站的調查時間也已很長，然而由於採樣深度前後有所改變，因此拿來比較第三核能發電廠運轉前後的水溫改變，可能產生若干的誤解。例如早先 18 站的採樣深度是 0~50 m，在 82 年 11 月之後則僅採至 0～25 m，不同深度的平均值來比較，可能會產生早期水溫較低(0~50 m)，而後期水溫變高(0~25 m)的結論，其實這是採樣深度不同所造成的。由於已累積了多年的資料相當寶貴，我們還是將這些資料拿來比對，但是採樣深度前後的差異必需先被考慮。附圖 2-3 是 16、18、19、23 站與 24 站在第三核能發電廠運轉前後的比較情形，結果大致與附圖 2-2 相似，也就是 16、18、19、23 站的水溫在運轉前、後並沒有多大的差異，然而第 24 站的水溫在運轉後明顯比運轉前高。因此第三核能發電廠的運轉改變了 24 站的水溫，上述的 14、20、22 站沒有受到影響，此處提到的 16、18、19、23 站也沒有受到影響。

4.2.1.2 年度之變化

由 75 年 7 月至 111 年 12 月的溫度資料(附圖 2-4)看來，夏季及秋季之溫度較春季及冬季來得高，溫度變化呈規律性，天候及季節為主要影響因子，溫排水主要影響 24 站表水，對於深度 3 m 及 10 m 之影響較小。將 22 站及 24 站從 75

年至今(111 年 12 月)的表水水溫取 sin 曲線(附圖 2-5)，可以發現 22 站的水溫呈現規律變化，最高溫約 29 °C，最低溫約在 22~24 °C，此值應可代表第三核能發電廠附近海域一整年水溫的溫度範圍。然而 24 站的表水因為受到溫排水的影響，水溫的年變化，在早期(75~80 年)最高溫達到 32 °C，低溫由 26.5 °C 增加到 27 °C，有逐年增加趨勢；80~89 年最高溫則往下降至 30 °C，最低溫也逐年下降至 26 °C，與第三核能發電廠附近海域水溫分佈範圍相近。近期(89-111 年)由於溫排水的水溫控制比早期來的好，以及核能發電廠機組進行維修，溫排水量減少，相對地造成溫升不大，溫升情形似乎不再發生。但 98、99 年兩個夏季的水溫較過往幾年來得高些，水溫出現往上爬的趨勢。22 站最低溫從 22 °C 增加至 24 °C，有逐年增加之勢，可能是全球氣候變遷溫升所造成。

4.2.1.3 空間變化

a.由水平面來看

從 75 年以後，資料均有分層的報導。將 24 站與 22 站 0，3，10 m 來比較，可以看到兩站表水的溫差分佈在-1.2~6.7 °C 之間，平均 2.2 °C，3 m 的溫差分佈在-3.1~6.4 °C 之間，平均 1.1 °C，10 m 的溫差分佈在-3.0~5.3 °C 之間，平均 0.3 °C (附圖 2-6)。較高的溫差發生在早期，近年來溫差較低。若近一步將 24 站與較遠的 18 站相較，也可以看到類似溫差的結果。再將 22 站與 18 站相較，可以發現兩者之間並沒有太大的溫度差異，因此可以說，24 站的水溫不僅與較遠的 18 不同，也與較近的 22 站不同。亦即溫排水的影響主要只及至 24 站左右，並未明顯擴散至較遠端的 18 站，也未明顯擴散至較近端的 22 站。

b.由垂直面來看

將 24 站水溫與 22 站水溫之間來比較，可以看到 24 站因為溫排水的增溫，在不同深度變化的情形。整個來看，可以將溫差隨深度之變化分成 3 類，一是上下水層沒有太大的溫度差異，如 75 年 7 月、 75 年 10 月、91 年 5 月、101 年 2 月、5 月，當時發電機組維修中，因此 24 站並沒有溫度梯度出現。第 2 類，上下水層溫度梯度高達 4 °C 左右，如 80 年 3 月， 80 年 11 月，不僅表水溫度差值達 4 °C，較深的水層如 3 m 及 10 m 也上升到 4 °C。顯示此 2 次的溫排水不僅從表層擴散，也往垂直方向擴散。所幸，從 75 年 7 月至 111 年 12 月共 148 次的調查中僅有 2 次這種現象。第 3 類，也就是最普遍的 1 類，即是有一斜溫層的存在。

溫排水排入海域造成海水表層溫度的升高，但不擴及底層(10 m)，底層溫度的表現與 22 站相同。

C .與遠方測站比較

國科會於執行「全球環流研究」時，在貓鼻頭南方有一南北向測線(PR-21, 沿著 120° 43' E)，此測線離台灣南岸最近之測站所取得之水文及水質資料(劉和白，1992; 劉等，1992; 陳等，1993a~c, 1995a, 1996, 1997)，可作為第三核能發電廠附近海域諸測站遠方之背景值。

經過整理與比較，WOCE 航次中並非每月都有資料，目前僅有 5 個月份，另外其資料點取表水後，下一資料點即取 50 甚或 100 m 了，因此只能取表水的資料來與第三核能發電廠附近海域的水相比。附圖 2-7 是將 WOCE 5 次表水水溫與第三核能發電廠附近海域於 75 年至今表水溫度平均值相比的情形。由圖可以很明顯看出，WOCE 航次的數據除一月份之外，均較除 24 測站之外測站的平均值高。

也許有人會質疑上述的比較是用 75 年至今的平均值，那麼如果用近 5 年的平均值來比較會是如何呢？在 4.2.1.2 節中曾提到，近年來 24 站的水溫有逐年下降的趨勢，因此如果附圖 2-7 以近 5 年的平均值來表示的話，預期地可以看到 24 站的線會往下壓一些，24 站的值與 WOCE 各站的值趨於接近。因此不管用長期資料 22 年來看，或用 5 年來看，第三核能發電廠附近海域的水溫並沒有高於「遠方」的測站，反而較低。有可能是因為灣內湧升流帶來冷水所造成。

4.2.2 鹽度

75 年 7 月至 111 年 12 月的鹽度資料(附圖 2-8)看來，92 年第 1、2 次及 96 年第 1、2 次的鹽度比 89 年之後來得高些，這些時間點大致上多發生在聖嬰時期之後，而 97 年 3、4 次、100 年第 1 次以及 101 年第 1、3 次屬於典型南海水，時間則為反聖嬰年之後。Chao (1996)指出，聖嬰時期南海的特徵是所有循環流動及湧升的速率均降低。因此為了維持南海本身平衡，跟外界交換的速率會減緩，所以經呂宋海峽與黑潮交換速率也勢必要降低。梁文德 (2002)指出黑潮水終年會由巴士海峽入侵至南海北部，在南海北部順時針方向繞轉 1 圈後進入台灣海峽，或另有分支轉出巴士海峽進入黑台灣東岸海域。但在聖嬰時期時，此入侵南

海北部的深度變小。如此一來，在聖嬰時期進到南灣的黑潮水勢必因與南海水有較少的混合，而保留較多原有黑潮水的性質。91 年 5 月~92 年 3 月、95 年 9 月~96 年 1 月、98 年 6 月~99 年 4 月、104 年 3 月~105 年 5 月、107 年 10 月~106 年 6 月以及 108 年 11 月~109 年 3 月是聖嬰年，在此海域觀察到高鹽的現象，105 年 2 月的鹽度甚至是歷年同季的最高值。97 年 1~4 次呈現鹽度遞減、以及 101 年鹽度偏低的情形，也反應了反聖嬰年過後在此海域觀察到低鹽的現象(同 90 年第 3 次)，南灣的鹽度似乎正好記錄到這樣大尺度的海洋事件。

歷年之鹽度大致呈季節性變化。即夏季的鹽度低，冬季的鹽度高(97 年除外)，而春秋 2 季的鹽度居中，與此一地區鹽度之季節性變化原則相符合。

4.2.3 pH、溶氧量及營養鹽

75 年 7 月至 111 年 12 月的 pH 值資料(附圖 2-9)皆符合環保署所公佈的甲類海域的水體標準。pH 值隨著的時間有變低的現象，似乎反應著全球海洋因二氧化碳含量增加而趨向酸化之現象。

75 年 7 月至 111 年 12 月的溶氧量顯示，季節性變化並不明顯，但是隱約可看出，冬季時具有較高的溶氧量。測站 24 表水及水深 3 m 深的海水，大部份都具有較低的溶氧量，應是與此處的水溫較高有關，其他測站彼此間的變化則不明顯。歷年來附近海域的溶氧量，都符合環保署所公佈我國甲類海域之水質標準。歷年來溶氧飽和度大部份都介於 90 至 110 %之間，而且測站彼此間亦沒有明顯之變化(附圖 2-10)。

歷年來 NO_3^-、NO_2^- 測值並無明顯的季節性變化，亦無一致的規律性可循(附圖 2-11, 2-12)；但是有湧升的地方，其 NO_3^- 含量偏高；歷年來 PO_4^{-3} 含量大都小於 1μM(附圖 2-13)，顯示此一海域磷酸鹽的污染並不嚴重，尚不致對附近海域生態構成威脅。SiO_2 的濃度，往年來均有一些突出之高值出現，近年來則明顯較過去為低(附圖 2-14)。歷年來此一海域葉綠素甲的變化並不明顯，其中幾次有較高的葉綠素甲測值，都在夏季(5~8 月)出現(附圖 2-15)。水體的濁度大多小於 1.00 NTU，可見度均大於 8 m 以上，並無異常現象。

五、結論

第三核能發電廠附近海域水溫的變化，主要受天候、季節性以及大尺度海洋事件如颱風、聖嬰、反聖嬰，以及太平洋十年期振盪的影響。110、111 年第 1~4 次海水的溫、鹽值顯示屬於西菲律賓海水以及南海水的混合水，但季節性變化不大，偏向南海水。110 年第 1 次的海水表溫為歷年次低，然而第 4 次則為歷年次高。111 年的鹽度則都比歷年平均值低。


回顧本海域溫、鹽之變化與ONI/PDO指數之間，在早期時，大致呈現PDO暖相時，水溫偏低，然而後期反而呈現水溫偏高；本海域水溫的變化似乎主要反應海溫上升的趨勢，而與PDO相關性較為多變。本海域在99~102年PDO冷相頻頻觀察到低於歷史記錄的鹽度，而在本年度(110、111年)也是觀察到較低鹽度的現象，也正逢歷時2年多的PDO冷相，顯示本海域的鹽度變化與PDO變化有明顯的正相關。

海域的 pH 值介於7.922至8.082之間，符合海保署所公佈海域環境分類及海洋環境品質標準第5條「甲類海域之水質標準，氫離子濃度指數應在7.5~8.5之間」之規定。溶氧量亦符合海保署「甲類海域之水質標準，溶氧量應在5.0 mg/l以上」之規定。

營養鹽資料顯示，此海域目前大多沒有受到有機質的污染，110及111年在西側的表水有較高值營養鹽現象，可能與南灣西南側有順時針渦流，將台灣海峽較高值的營養鹽帶入有關。由N/P比值顯示，此海域浮游植物之生長限制因子為N，因此對N的污染途徑應該特別注意。此海域之葉綠素甲測值偏低，屬於低生產力之海域。整體而言，第三核能發電廠附近海域之水文與水質化學受溫排水的影響並不明顯，海域之水文與水質皆符合我國甲類海域的水質標準。


六、附表與附圖

表2- 1　民國110年第1次~111年第4次水文暨水質化學資料



110年第1次(110年2月26日採樣)


測站	深度	採樣時間	溫度 ℃	鹽度 (autosal)	pH total ion	DO mg/l	DO %	透明度 m	NO_3^- μmol/l	NO_2^- μmol/l	PO_4^{-3} μmol/l	SiO_2 μmol/l	chl.a μg/l	TRO mg/l	濁度 NTU
12	0	08:00	22.3	34.417	8.008	6.39	89.8		2.16	0.13	0.21	3.65	0.19	0.08	0.24
	3	08:06	22.2	34.411	8.005	6.33	88.8	20	2.34	0.13	0.21	3.95	0.23	0.09	0.34
	10	08:18	22.1	34.410	8.006	6.33	88.7		1.84	0.13	0.22	3.99	0.22	0.08	0.23
	25	08:25	22.0	34.410	8.005	6.31	88.2		2.05	0.14	0.26	4.08	0.23	0.11	0.22
18	0	09:17	22.8	34.472	8.013	6.40	90.8		2.40	0.13	0.22	3.69	0.23	0.08	0.29
	3	09:22	22.7	34.427	8.012	6.34	89.7		2.13	0.12	0.22	3.65	0.26	0.08	0.16
	10	09:29	22.5	34.434	7.999	6.29	88.7	19	2.57	0.13	0.26	4.12	0.23	0.10	0.17
	25	09:36	22.5	34.435	7.992	6.23	87.9		2.76	0.13	0.26	4.30	0.19	0.09	0.24
	50	09:45	19.7	34.465	7.923	5.72	76.7		7.34	0.13	0.58	9.60	0.12	0.11	0.19
20	0	11:07	23.0	34.437	8.000	6.36	90.6		2.09	0.12	0.29	3.78	0.22	0.07	0.26
	3	11:12	23.2	34.425	8.013	6.43	91.8	10	1.68	0.12	0.19	3.39	0.20	0.07	0.25
	10	11:20	22.9	34.429	8.002	6.36	90.3		1.96	0.11	0.20	3.73	0.16	0.07	0.2
21	0	10:12	22.9	34.441	8.002	6.43	91.3		2.63	0.15	0.23	3.86	0.18	0.08	0.13
	3	10:18	23.2	34.426	8.005	6.33	90.4	17	2.30	0.13	0.24	3.91	0.21	0.09	0.16
	10	10:25	22.0	34.439	7.983	6.14	85.9		3.48	0.13	0.31	5.17	0.19	0.08	0.25
	25	10:34	19.9	34.472	7.922	5.71	76.9		6.86	0.12	0.55	8.95	0.10	0.08	0.17
22	0	11:52	24.0	34.439	8.008	6.51	94.3		2.16	0.11	0.20	3.43	0.20	0.06	0.3
	3	11:58	23.2	34.424	8.018	6.41	91.6	9	1.78	0.11	0.22	3.43	0.21	0.06	0.34
	10	12:06	22.8	34.435	8.001	6.41	90.9		2.50	0.12	0.25	4.17	0.19	0.07	0.33
23	0	12:26	23.7	34.436	8.018	6.47	93.2		1.80	0.11	0.20	3.26	0.16	0.06	0.2
	3	12:31	23.4	34.424	8.022	6.42	92.0	14	1.77	0.12	0.21	3.47	0.23	0.14	0.15
	10	12:39	22.8	34.430	8.009	6.37	90.4		2.15	0.12	0.24	3.95	0.22	0.12	0.21
24	0	07:20	24.0	34.439	7.988	6.10	88.4		3.34	0.15	0.28	4.43	0.24	0.08	0.3
	3	07:25	23.4	34.429	7.994	6.16	88.3	16	2.66	0.13	0.27	4.30	0.13	0.08	0.2
	10	07:37	22.7	34.413	8.024	6.44	91.2		1.53	0.11	0.20	3.26	0.11	0.08	0.23
最小值			19.7	34.410	7.922	5.71	76.7	9	1.53	0.11	0.19	3.26	0.10	0.06	0.13
最大值			24.0	34.472	8.024	6.51	94.3	20	7.34	0.15	0.58	9.60	0.26	0.14	0.34
平均值			22.6	34.433	7.999	6.30	89.1	15.0	2.65	0.13	0.26	4.30	0.19	0.09	0.23
偏差值			1.0	0.017	0.025	0.20	4.1	4.2	1.42	0.01	0.10	1.56	0.04	0.02	0.06
海保署甲類海域水質標準值			-		7.5~8.5	5.0以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-



110/2/26(五)後壁湖
(農曆1月15日)


潮時	潮高(cm)
1:06	-65
6:57	1
11:03	-22
18:14	62

續表2- 1　民國110年第1次~111年第4次水文暨水質化學資料



110年第2次(110年5月14日採樣)

測站	深度	採樣時間	溫度 ℃	鹽度 (autosal)	pH total ion	DO mg/l	DO %	透明度 m	NO_3^- μmol/l	NO_2^- μmol/l	PO_4^{-3} μmol/l	SiO_2 μmol/l	chl.a μg/l	TRO mg/l	濁度 NTU
12	0	08:01	27.6	33.976	8.053	6.34	97.3		0.21	0.02	0.04	2.59	0.09	0.12	0.33
	3	08:07	27.6	33.970	8.053	6.37	97.8	18	0.20	0.02	0.02	2.76	0.10	0.11	0.31
	10	08:23	27.4	33.965	8.052	6.38	97.7		0.22	0.02	0.05	2.59	0.07	0.11	0.15
	25	08:31	25.7	34.154	8.026	6.22	92.6		1.13	0.05	0.13	3.63	0.22	0.12	0.17
18	0	09:31	27.8	33.975	8.054	6.33	97.6		0.43	0.02	0.05	2.68	0.07	0.11	0.21
	3	09:38	27.6	33.952	8.055	6.36	97.7		0.27	0.02	0.03	2.68	0.09	0.11	0.12
	10	09:46	27.3	33.974	8.056	6.41	98.0	15	0.26	<0.02	0.02	2.42	0.14	0.10	0.17
	25	09:55	23.7	34.420	7.992	6.14	88.4		2.37	0.03	0.23	4.40	0.23	0.12	0.24
	50	10:08	22.7	34.498	7.968	5.89	83.3		3.80	0.07	0.34	5.69	0.18	0.13	0.13
20	0	11:28	28.2	33.995	8.056	6.30	97.7		0.21	0.02	0.04	2.42	0.07	0.09	0.16
	3	11:43	28.2	33.951	8.057	6.32	98.0	16	0.18	0.02	0.03	2.42	0.07	0.10	0.14
	10	11:51	27.5	33.986	8.051	6.38	97.9		0.25	0.03	0.05	2.68	0.13	0.08	0.22
21	0	10:45	27.7	34.002	8.055	6.37	98.0		0.55	0.03	0.02	2.16	0.06	0.08	0.12
	3	10:57	27.7	33.977	8.057	6.38	98.1	16	0.25	0.02	0.03	2.25	0.07	0.10	0.15
	10	11:03	27.8	33.981	8.050	6.36	97.9		0.25	<0.02	0.03	2.25	0.14	0.09	0.12
	25	11:12	26.2	34.198	8.026	6.32	94.9		1.29	0.03	0.13	3.54	0.32	0.10	0.17
22	0	12:37	27.8	33.999	8.055	6.38	98.4		0.77	0.02	0.03	2.16	0.13	0.08	0.16
	3	12:42	27.6	33.981	8.052	6.45	99.0	8	0.31	0.02	0.05	1.99	0.15	0.08	0.27
	10	12:54	27.6	33.990	8.094?	7.51?	115?		0.46	0.05	0.09	2.42	0.13	0.11	0.21
23	0	13:07	28.2	33.992	8.059	6.42	99.6		0.18	0.02	0.04	2.42	0.13	0.08	0.15
	3	13:13	28.0	33.969	8.058	6.42	99.2	16	0.17	0.03	0.04	2.25	0.09	0.08	0.1
	10	13:21	27.8	33.975	8.058	6.52	100.4		0.23	0.03	0.05	2.25	0.15	0.09	0.14
24	0	07:12	29.2	34.032	8.047	6.23	98.1		0.56	0.05	0.13	2.59	0.16	0.17	0.7
	3	07:24	27.7	33.968	8.055	6.37	98.0	14	0.28	<0.02	0.04	2.51	0.09	0.14	0.18
	10	07:34	27.5	33.969	8.044	6.35	97.3		0.22	0.03	0.04	3.11	0.09	0.15	0.12
最小值			22.7	33.951	7.968	5.89	83.3	8	0.17	<0.02	0.02	1.99	0.06	0.08	0.10
最大值			29.2	34.498	8.059	6.52	100.4	18	3.80	0.07	0.34	5.69	0.32	0.17	0.70
平均值			27.3	34.034	8.045	6.33	96.8	14.7	0.60	0.03	0.07	2.75	0.13	0.11	0.20
偏差值			1.4	0.140	0.022	0.12	3.7	3.2	0.83	0.01	0.07	0.81	0.06	0.02	0.12
海保署甲類海域水質標準值			-		7.5~8.5	5.0以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-




110/5/14(五)後壁湖
(農曆4月3日)

潮時	潮高(cm)
0:30	-14
7:02	56
15:05	-50
20:56	7


ps.測站22透明度雖僅8m，較其他測站低，但因本測站靠近岸邊，底深僅約10來米，故而此數字應算正常

續表2- 1　民國110年第1次~111年第4次水文暨水質化學資料



110年第3次(110年8月17日採樣)

測站	深度	採樣時間	溫度 ℃	鹽度 (autosal)	pH total ion	DO mg/l	DO %	透明度 m	NO_3^- μmol/l	NO_2^- μmol/l	PO_4^{-3} μmol/l	SiO_2 μmol/l	chl.a μg/l	TRO mg/l	濁度 NTU
12	0	08:01	28.8	33.522	8.074	6.31	98.6		0.11	0.12	0.02	0.74	0.11	0.05	0.42
	3	08:25	28.6	33.569	8.075	6.33	98.6	20	0.17	0.05	<0.02	0.56	0.07	0.06	0.22
	10	08:12	28.5	33.614	8.072	6.33	98.5		0.23	0.05	0.02	1.66	0.09	0.05	0.22
	25	08:20	26.9	34.027	8.048	6.29	95.5		0.80	0.11	0.08	1.88	0.25	0.07	0.31
18	0	09:13	29.2	33.543	8.080	6.38	100.3		0.34	0.09	0.03	1.37	0.06	0.05	0.34
	3	09:52	28.8	33.659	8.073	6.36	99.5		0.19	0.10	0.02	1.33	0.11	0.05	0.17
	10	09:45	28.0	33.831	8.063	6.36	98.2	20	0.25	0.12	0.06	1.55	0.20	0.05	0.35
	25	09:38	27.1	34.036	8.051	6.32	96.3		0.61	0.08	0.05	1.77	0.26	0.07	0.29
	50	09:22	25.4	34.338	8.019	6.14	91.0		2.18	0.17	0.20	2.57	0.25	0.10	0.62
20	0	10:53	29.6	33.529	8.071	6.25	98.9		0.42	0.10	0.04	1.55	0.12	0.05	0.60
	3	11:03	28.9	33.597	8.074	6.34	99.3	12	0.22	0.09	0.03	1.47	0.12	0.04	0.41
	10	10:58	28.4	33.767	8.070	6.36	98.8		0.21	0.15	0.06	1.58	0.19	0.05	0.23
21	0	10:17	28.8	33.717	8.073	6.41	100.3		0.31	0.11	0.04	1.44	0.12	0.07	0.23
	3	10:33	28.3	33.783	8.070	6.39	99.1	18	0.23	0.07	0.04	1.47	0.15	0.06	0.22
	10	10:28	27.1	34.047	8.053	6.35	96.7		0.75	0.12	0.11	1.80	0.19	0.06	0.27
	25	10:22	26.4	34.175	8.041	6.31	95.0		1.17	0.21	0.12	2.06	0.25	0.09	0.35
22	0	11:25	29.9	33.441	8.079	6.40	101.7		0.40	0.11	0.03	1.51	0.09	0.04	0.23
	3	11:39	29.3	33.369	8.077	6.37	100.3	8	0.26	0.15	0.03	1.66	0.14	0.05	0.47
	9	11:34	29.2	33.420	8.024?	6.57?	103?		0.14	0.04	0.02	1.47	0.25	0.04	0.76
23	0	11:46	29.7	33.438	8.082	6.40	101.4		0.05	0.09	<0.02	1.47	0.06	0.04	0.18
	3	11:57	28.8	33.498	8.071	6.34	99.1	15	0.15	0.05	0.03	1.55	0.13	0.04	0.23
	10	11:50	28.2	34.107	8.045	6.14	95.3		1.01	0.16	0.10	2.13	0.34	0.05	0.39
24	0	07:48	29.1	33.502	8.068	6.35	99.6		1.10	0.13	0.06	1.62	0.07	0.05	0.40
	3	07:46	28.8	33.475	8.078	6.39	99.8	20	0.29	<0.02	0.02	1.55	0.05	0.07	0.20
	10	07:41	28.2	33.653	8.069	6.35	98.3		0.36	0.03	0.05	1.58	0.17	0.06	0.22
最小值			25.4	33.369	8.019	6.14	91.0	8	0.05	<0.02	<0.02	0.56	0.05	0.04	0.17
最大值			29.9	34.338	8.082	6.41	101.7	20	2.18	0.21	0.20	2.57	0.34	0.10	0.76
平均值			28.4	33.706	8.066	6.33	98.3	16.1	0.48	0.10	0.05	1.57	0.15	0.06	0.33
偏差值			1.1	0.270	0.015	0.07	2.4	4.7	0.48	0.05	0.04	0.39	0.08	0.01	0.15
海保署甲類海域水質標準值			-		7.5~8.5	5.0以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-




110/8/17(二)後壁湖
(農曆7月10日)

潮時	潮高(cm)
1:06	60
9:48	-33


ps.測站22透明度雖僅8m，較其他測站低，但因本測站靠近岸邊，底深僅約10來米，故而此數字應算正常

續表2-1　民國110年第1次~111年第4次水文暨水質化學資料



110年第4次(110年11月5日採樣)

測站	深度	採樣時間	溫度 ℃	鹽度 (autosal)	pH total ion	DO mg/l	DO %	透明度 m	NO_3^- μmol/l	NO_2^- μmol/l	PO_4^{-3} μmol/l	SiO_2 μmol/l	chl.a μg/l	TRO mg/l	濁度 NTU
12	0	08:10	26.7	34.000	8.061	6.22	94.1	12	0.41	0.06	0.05	1.95	0.27	0.08	0.33
	3	08:36	26.4	34.070	8.050	6.06	91.2		0.56	0.10	0.06	2.23	0.25	0.10	0.45
	10	08:29	25.6	34.158	8.027	5.87	87.3		1.51	0.13	0.15	3.12	0.17	0.10	0.38
	25	08:16	25.5	34.147	8.025	5.88	87.2		1.81	0.09	0.16	3.32	0.12	0.08	0.48
18	0	09:26	27.2	33.932	8.079	6.32	96.4	12	0.22	0.02	0.03	1.59	0.20	0.05	0.35
	3	09:55	27.4	33.947	8.074	6.27	96.0		0.20	0.03	0.02	1.71	0.24	0.06	0.54
	10	09:50	27.4	33.936	8.076	6.28	96.1		0.18	0.03	0.00	1.71	0.18	0.06	0.34
	25	09:39	26.8	34.003	8.055	6.14	93.1		0.59	0.06	0.12	2.07	0.23	0.07	0.4
	50	09:32	26.5	34.025	8.048	6.08	91.7		0.88	0.06	0.09	2.43	0.19	0.07	0.35
20	0	11:07	27.5	33.954	8.080	6.34	97.2	12	0.18	0.02	0.02	1.51	0.17	0.07	0.38
	3	11:20	27.5	33.947	8.082	6.35	97.3		0.15	0.02	<0.02	1.55	0.19	0.06	0.31
	10	11:12	27.2	33.962	8.059	6.17	94.1		0.41	0.04	0.03	1.95	0.17	0.06	0.27
21	0	10:27	27.5	33.929	8.080	6.34	97.2	12	0.32	0.02	0.02	1.59	0.16	0.06	0.32
	3	10:47	27.9	33.918	8.079	6.35	98.0		0.18	0.03	0.02	1.55	0.13	0.05	0.35
	10	10:40	27.8	33.926	8.080	6.33	97.5		0.24	0.02	0.04	1.47	0.17	0.06	0.28
	25	10:35	27.1	34.021	8.060	6.13	93.3		0.59	0.10	0.04	1.87	0.23	0.09	0.52
22	0	11:48	27.6	34.012	8.063	6.30	96.8	9	0.57	0.05	0.07	1.91	0.17	0.07	0.28
	3	11:59	27.5	34.002	8.063	6.23	95.5		0.52	0.05	0.05	2.03	0.23	0.06	0.35
	9	11:52	27.0	34.013	8.037	6.06	92.1		1.15	0.06	0.09	2.55	0.19	0.07	0.8
23	0	12:13	27.4	33.962	8.077	6.37	97.4	10	0.22	0.04	0.03	1.63	0.17	0.05	0.29
	3	12:26	27.6	33.960	8.063	6.30	96.8		0.25	0.03	0.02	1.67	0.23	0.07	0.37
	10	12:18	27.4	33.971	8.060	6.30	96.4		0.34	0.04	0.03	1.79	0.23	0.06	0.33
24	0	07:32	26.2	34.046	8.050	6.09	91.4	16	1.64	0.11	0.08	2.39	0.13	0.09	0.29
	3	07:40	26.2	34.059	8.048	6.01	90.2		1.17	0.07	0.10	2.55	0.17	0.08	0.29
	10	07:39	26.2	34.051	8.051	6.06	90.9		0.86	0.07	0.11	2.35	0.14	0.07	0.33
最小值			25.5	33.918	8.025	5.87	87.2	9	0.15	0.02	<0.02	1.47	0.12	0.05	0.27
最大值			27.9	34.158	8.082	6.37	98.0	16	1.81	0.13	0.16	3.32	0.27	0.10	0.80
平均值			27.0	33.998	8.061	6.19	94.2	11.9	0.61	0.06	0.02	2.02	0.19	0.07	0.38
偏差值			0.7	0.065	0.017	0.15	3.2	2.2	0.49	0.03	0.04	0.49	0.04	0.01	0.11
海保署甲類海域水質標準值			-		7.5~8.5	5.0以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-




日期

110/11/5(二)後壁湖
(農曆10月1日)


潮時	潮高(cm)
0:39	-57
6:55	26
11:50	-25
18:03	63

續表2- 1　民國110年第1次~111年第4次水文暨水質化學資料



111年第1次(111年2月16日採樣)


測站	深度	採樣時間	溫度 ℃	鹽度 (autosal)	pH total ion	DO mg/l	DO %	透明度 m	NO_3^- μmol/l	NO_2^- μmol/l	PO_4^{-3} μmol/l	SiO_2 μmol/l	chl.a μg/l	TRO mg/l	濁度 NTU
12	0	08:03	25.2	34.461	8.063	6.23	92.1		0.83	0.02	0.05	1.99	0.08	0.07	0.15
	3	08:18	25.4	34.439	8.065	6.23	92.4	22	0.49	<0.02	0.06	1.82	0.11	0.06	0.20
	10	08:14	25.3	34.448	8.063	6.22	92.1		0.54	0.03	0.04	1.93	0.08	0.06	0.11
	25	08:09	25.1	34.442	8.060	6.17	91.1		0.68	0.02	0.06	2.16	0.09	0.06	0.16
18	0	09:12	25.6	34.490	8.070	6.29	93.5		0.45	<0.02	0.02	1.59	0.09	0.06	0.20
	3	09:30	25.6	34.468	8.070	6.27	93.2		0.28	<0.02	0.02	1.53	0.08	0.07	0.13
	10	09:26	25.5	34.464	8.071	6.26	93.1	24	0.33	<0.02	0.02	1.64	0.09	0.06	0.20
	25	09:21	25.5	34.450	8.068	6.25	92.8		0.44	<0.02	0.03	1.76	0.05	0.05	0.17
	50	09:15	25.0	34.323	8.051	6.19	91.2		0.53	0.03	0.05	2.28	0.09	0.07	0.27
20	0	10:41	25.3	34.371	8.055	6.29	93.1		0.48	0.02	0.05	2.22	0.07	0.06	0.20
	3	10:50	25.2	34.354	8.058	6.26	92.6	16	0.44	0.02	0.05	2.05	0.10	0.06	0.20
	10	10:45	25.0	34.293	8.049	6.25	92.0		0.52	0.02	0.06	2.45	0.04	0.07	0.22
21	0	10:02	25.5	34.513	8.073	6.30	93.7		0.21	<0.02	<0.02	1.30	0.05	0.05	0.16
	3	10:17	25.5	34.490	8.074	6.31	93.8	23	0.43	<0.02	0.02	1.30	0.06	0.06	0.12
	10	10:11	25.6	34.492	8.074	6.30	93.7		0.52	<0.02	0.02	1.47	0.07	0.06	0.14
	25	10:06	25.6	34.496	8.074	6.27	93.3		0.38	0.03	<0.02	1.70	0.07	0.05	0.22
22	0	11:20	24.9	34.284	8.039	6.27	92.1		1.07	0.03	0.09	2.63	0.10	0.07	0.30
	3	11:28	24.8	34.201	8.025	6.11	89.7	10	0.89	0.07	0.08	2.57	0.11	0.06	0.32
	9	11:23	24.8	34.420	8.046	6.16	90.4		1.42	0.05	0.09	2.86	0.10	0.07	0.26
23	0	11:40	25.6	34.482	8.071	6.30	93.8		0.32	0.03	0.02	1.64	0.08	0.05	0.32
	3	11:49	25.6	34.460	8.068	6.28	93.5	18	0.41	0.02	0.05	1.53	0.08	0.07	0.28
	10	11:44	25.6	34.455	8.069	6.31	94.0		0.38	<0.02	0.03	1.82	0.08	0.06	0.16
24	0	07:45	24.8	34.426	8.051	6.18	90.8		1.46	0.06	0.07	2.45	0.11	0.08	0.22
	3	07:40	24.8	34.417	8.052	6.12	89.9	21	1.14	0.03	0.06	2.92	0.06	0.08	0.19
	10	07:34	24.8	34.419	8.051	6.10	89.5		1.13	0.03	0.08	2.51	0.07	0.08	0.18
最小值			24.8	34.201	8.025	6.10	89.5	10	0.21	<0.02	<0.02	1.30	0.04	0.05	0.11
最大值			25.6	34.513	8.074	6.31	94.0	24	1.46	0.07	0.09	2.92	0.11	0.08	0.32
平均值			25.3	34.422	8.060	6.24	92.3	19.1	0.63	0.02	0.04	2.01	0.08	0.06	0.20
偏差值			0.3	0.077	0.013	0.06	1.4	4.9	0.35	0.02	0.03	0.48	0.02	0.01	0.06
海保署甲類海域水質標準值			-		7.5~8.5	5.0以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-



111/2/16(三)後壁湖
(農曆1月16日)


潮時	潮高(cm)
1:32	-70
7:16	-3
11:35	-31
18:32	61

續表2- 1　民國110年第1次~111年第4次水文暨水質化學資料



111年第2次(111年5月5日採樣)


測站	深度	採樣時間	溫度 ℃	鹽度 (autosal)	pH total ion	DO mg/l	DO %	透明度 m	NO_3^- μmol/l	NO_2^- μmol/l	PO_4^{-3} μmol/l	SiO_2 μmol/l	chl.a μg/l	TRO mg/l	濁度 NTU
12	0	08:12	27.02	33.940	8.050	6.41	97.5		0.40	<0.02	0.03	2.29	0.19	0.06	0.26
	3	08:29	26.99	33.939	8.050	6.38	96.9	16	0.31	<0.02	0.03	2.67	0.10	0.08	0.16
	10	08:23	26.96	33.941	8.049	6.39	97.1		0.45	0.02	0.07	2.35	0.14	0.07	0.15
	25	08:19	26.86	33.956	8.047	6.37	96.6		0.56	<0.02	0.06	2.46	0.17	0.07	0.14
18	0	09:22	27.15	33.951	8.054	6.43	97.9		0.31	<0.02	0.03	2.29	0.12	0.06	0.14
	3	09:43	27.31	33.931	8.055	6.43	98.3		0.28	<0.02	0.03	2.29	0.07	0.07	0.19
	10	09:38	27.12	33.943	8.056	6.43	98.0	16	0.36	<0.02	0.03	2.40	0.15	0.06	0.39
	25	09:31	26.89	33.958	8.050	6.38	96.8		0.52	0.04	0.04	2.46	0.11	0.06	0.17
	50	09:25	25.79	34.090	8.023	6.24	93.0		1.86	0.06	0.13	3.93	0.07	0.07	0.18
20	0	10:56	27.28	33.948	8.056	6.45	98.5		0.50	0.03	0.03	2.35	0.10	0.04	0.15
	3	11:04	27.18	33.936	8.051	6.46	98.4	12	0.39	0.02	0.03	2.62	0.14	0.04	0.14
	10	10:59	27.13	33.968	8.041	6.33	96.5		0.52	0.03	0.04	2.57	0.17	0.05	0.19
21	0	10:13	27.09	33.961	8.054	6.46	98.3		0.39	<0.02	0.04	2.29	0.13	0.05	0.21
	3	10:27	27.02	33.978	8.051	6.45	98.1	12	0.39	<0.02	0.04	2.46	0.15	0.04	0.23
	10	10:22	26.84	33.999	8.048	6.41	97.2		0.62	<0.02	0.06	2.73	0.13	0.04	0.22
	25	10:17	26.70	34.020	8.043	6.37	96.3		0.88	0.02	0.06	2.73	0.15	0.05	0.13
22	0	11:31	27.49	33.946	8.056	6.40	98.2		0.40	0.02	0.09	2.24	0.14	0.04	0.12
	3	11:38	27.28	33.938	8.055	6.42	98.0	8	0.76	<0.02	0.07	2.29	0.12	0.04	0.14
	9	11:34	27.30	33.955	8.043	6.35	97.0		0.62	0.02	0.04	2.24	0.09	0.05	0.39
23	0	11:49	27.59	33.930	8.055	6.40	98.2		0.62	0.02	0.04	2.18	0.07	0.03	0.16
	3	11:57	27.28	33.940	8.042	6.38	97.4	16	0.52	<0.02	0.04	2.67	0.12	0.04	0.17
	10	11:52	27.11	33.960	8.050	6.41	97.7		0.81	0.07	0.03	2.35	0.05	0.04	0.14
24	0	07:58	27.18	33.928	8.054	6.41	97.7		0.42	<0.02	0.03	2.29	0.14	0.05	0.16
	3	07:55	27.22	33.915	8.052	6.37	97.2	18	0.45	<0.02	0.05	2.40	0.07	0.06	0.19
	10	07:48	27.17	33.916	8.046	6.39	97.4		0.48	0.02	0.07	2.40	0.05	0.06	0.16
最小值			25.8	33.915	8.023	6.24	93.0	8	0.28	<0.02	0.03	2.18	0.05	0.03	0.12
最大值			27.6	34.090	8.056	6.46	98.5	18	1.86	0.07	0.13	3.93	0.19	0.08	0.39
平均值			27.1	33.956	8.049	6.40	97.4	14.0	0.55	0.02	0.05	2.48	0.12	0.05	0.19
偏差值			0.3	0.037	0.007	0.05	1.1	3.5	0.31	0.02	0.02	0.34	0.04	0.01	0.07
海保署甲類海域水質標準值			-		7.5~8.5	5.0以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-



111/5/5(四)後壁湖
(農曆4月5日)


潮時	潮高(cm)
01:11	-12
08:20	59
16:34	-46
22:32	-5

續表2- 1　民國110年第1次~111年第4次水文暨水質化學資料



111年第3次(111年8月12日採樣)

測站	深度	採樣時間	溫度 ℃	鹽度 (autosal)	pH total ion	DO mg/l	DO %	透明度 m	NO_3^- μmol/l	NO_2^- μmol/l	PO_4^{-3} μmol/l	SiO_2 μmol/l	chl.a μg/l	TRO mg/l	濁度 NTU
12	0	07:58	29.9	33.511	8.075	6.43	102.2		0.20	<0.02	0.06	2.62	0.06	0.05	0.33
	3	08:14	30.0	33.517	8.076	6.44	102.6		0.15	<0.02	0.04	2.50	0.07	0.06	0.3
	8*	08:03	29.8	33.510	8.071	6.42	101.9	16	0.17	0.02	0.03	2.50	0.04	0.05	0.17
	10	08:08	28.7	33.663	8.052	6.47	101.0		0.59	0.02	0.06	3.52	0.13	0.04	0.22
	25	08:03	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
18	0	09:07	30.4	33.492	8.082	6.41	102.7		0.10	<0.02	0.04	2.16	0.05	0.05	0.42
	3	09:34	30.0	33.502	8.080	6.47	103.0		0.08	<0.02	0.03	2.39	0.06	0.05	0.38
	10	09:30	29.3	33.573	8.066	6.44	101.4	16	0.58	0.02	0.05	3.07	0.11	0.05	0.15
	25	09:24	27.4	33.798	8.038	6.42	98.2		1.34	0.03	0.11	4.26	0.26	0.05	0.31
	50	09:19	23.0	34.269	7.948	5.97	84.9		4.88	0.06	0.37	8.79	0.14	0.06	0.55
20	0	10:43	30.8	33.506	8.072	6.34	102.3		0.22	0.02	0.04	2.39	0.05	0.05	0.68
	3	10:52	29.4	33.589	8.060	6.40	101.0	8	0.73	0.03	0.06	2.73	0.09	0.06	0.59
	10	10:48	29.0	33.648	8.052	6.37	99.8		0.78	0.03	0.08	3.13	0.10	0.05	0.47
21	0	10:02	30.3	33.542	8.080	6.46	103.5		0.19	0.02	0.04	2.50	0.08	0.04	0.25
	3	10:16	29.6	33.562	8.073	6.51	103.0	16	0.21	<0.02	0.05	2.73	0.10	0.04	0.23
	10	10:12	28.8	33.658	8.065	6.51	101.9		0.38	0.02	0.06	2.90	0.13	0.06	0.27
	25	10:08	26.2	33.942	8.009	6.30	94.6		2.73	0.04	0.20	5.79	0.16	0.05	0.27
22	0	11:18	30.6	33.515	8.076	6.40	103.0		0.19	<0.02	0.04	2.22	0.05	0.05	0.41
	3	11:26	30.3	33.503	8.077	6.45	103.2	7	0.15	<0.02	0.04	2.39	0.07	0.05	0.62
	9	11:21	29.8	33.531	8.074	6.45	102.5		0.20	<0.02	0.05	2.50	0.09	0.05	0.56
23	0	11:38	31.1	33.534	8.075	6.38	103.4		0.15	0.02	0.05	2.50	0.06	0.06	0.19
	3	11:46	30.1	33.508	8.073	6.48	103.3	14	0.11	<0.02	0.04	2.11	0.09	0.04	0.11
	10	11:42	29.8	33.532	8.073	6.53	103.7		0.30	0.02	0.06	2.79	0.08	0.05	0.38
24	0	07:43	31.7	33.534	8.065	6.24	102.1		0.57	0.02	0.06	2.84	0.07	0.05	0.29
	3	07:39	30.5	33.511	8.072	6.33	101.7	14	0.37	0.03	0.05	2.67	0.05	0.05	0.24
	10	07:36	29.8	33.519	8.075	6.38	101.3		0.30	<0.02	0.03	2.79	0.07	0.04	0.17
最小值			23.0	33.492	7.948	5.97	84.9	7	0.08	<0.02	0.03	2.11	0.04	0.04	0.11
最大值			31.7	34.269	8.082	6.53	103.7	16	4.88	0.06	0.37	8.79	0.26	0.06	0.68
平均值			29.4	33.602	8.062	6.40	101.1	12.5	0.64	0.02	0.07	3.09	0.09	0.05	0.34
偏差值			1.8	0.177	0.029	0.11	4.0	4.0	1.06	0.01	0.07	1.44	0.05	0.01	0.16
海保署甲類海域水質標準值			-		7.5~8.5	5.0以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-




日期

111/8/12(五)後壁湖
(農曆7月15日)

潮時	潮高(cm)
6:10	93
14:02	-69
19:52	14


*:進行數據之品管查核時，發現12站25公尺深的水文、水質參數不符之現象，經交叉比對後，判斷應是現場採樣有誤，因而調整該樣品深度為8公尺深。

續表2- 1　民國110年第1次~111年第4次水文暨水質化學資料



111第4次(111年11月17日採樣)

測站	深度	採樣時間	溫度 ℃	鹽度 (autosal)	pH total ion	DO mg/l	DO %	透明度 m	NO_3^- μmol/l	NO_2^- μmol/l	PO_4^{-3} μmol/l	SiO_2 μmol/l	chl.a μg/l	TRO mg/l	濁度 NTU
12	0	07:43	27.3	33.806	8.036	6.71	102.3		0.91	<0.02	0.22	2.74	0.07	0.04	0.18
	3	08:00	26.3	33.789	8.042	6.86	102.9	18	0.44	<0.02	0.12	2.52	0.10	0.05	0.28
	10	07:55	26.0	33.822	8.039	6.81	101.8		0.57	<0.02	0.10	2.91	0.12	0.06	0.19
	25	07:49	25.9	33.850	8.038	6.83	101.8		0.57	<0.02	0.10	2.52	0.15	0.07	0.28
18	0	08:55	26.3	33.747	8.047	6.83	102.6		0.25	<0.02	0.08	2.63	0.07	0.06	0.22
	3	09:21	26.2	33.819	8.039	6.80	101.9		0.67	<0.02	0.10	2.96	0.11	0.05	0.24
	10	09:16	25.8	33.883	8.030	6.74	100.3	18	1.26	0.02	0.14	3.41	0.14	0.06	0.24
	25	09:10	25.0	33.952	8.014	6.62	97.3		2.35	0.03	0.19	4.57	0.17	0.07	0.21
	50	09:02	22.4	34.198	7.936	6.01	84.5		7.49	0.04	0.49	10.8	0.10	0.07	0.43
20	0	10:37	26.1	33.847	8.039	6.84	102.3		1.18	0.02	0.14	3.02	0.11	0.06	0.29
	3	10:46	26.2	33.839	8.038	6.82	102.2	15	1.00	0.02	0.12	2.85	0.11	0.05	0.28
	10	10:41	26.2	33.840	8.036	6.80	101.8		1.00	0.02	0.12	2.91	0.11	0.05	0.33
21	0	10:00	26.1	33.850	8.038	6.83	102.2		0.86	0.02	0.11	3.13	0.12	0.06	0.33
	3	10:14	25.7	33.852	8.033	6.72	99.9	12	1.19	<0.02	0.13	3.57	0.10	0.05	0.20
	10	10:09	24.8	33.971	8.010	6.55	96.0		2.64	0.06	0.21	4.96	0.14	0.08	0.49
	25	10:03	24.1	33.980	8.009	6.59	95.3		2.78	0.06	0.23	5.02	0.16	0.09	0.30
22	0	11:13	26.7	33.774	8.036	6.73	101.7		0.69	<0.02	0.08	2.79	0.05	0.05	0.27
	3	11:22	26.5	33.761	8.044	6.81	102.5	9	0.53	<0.02	0.07	2.74	0.06	0.05	0.27
	9	11:18	26.1	33.848	8.030	6.75	101.0		0.87	<0.02	0.10	3.07	0.11	0.06	0.40
23	0	11:37	26.5	33.779	8.048	6.86	103.3		0.28	<0.02	0.07	2.74	0.05	0.04	0.27
	3	11:46	26.5	33.777	8.047	6.86	103.2	15	0.24	<0.02	0.05	2.57	0.07	0.03	0.23
	10	11:40	26.3	33.810	8.031	6.70	100.6		0.45	0.02	0.08	2.63	0.08	0.04	0.23
24	0	07:16	28.1	33.806	8.026	6.49	100.3		0.54	0.02	0.09	2.63	0.09	0.06	0.23
	3	07:26	26.4	33.785	8.044	6.77	101.7	16	0.29	<0.02	0.06	2.52	0.08	0.06	0.33
	10	07:19	26.1	33.792	8.044	6.79	101.5		0.36	<0.02	0.11	2.57	0.07	0.06	0.40
最小值			22.4	33.747	7.936	6.01	84.5	9	0.24	<0.02	0.05	2.52	0.05	0.03	0.18
最大值			28.1	34.198	8.048	6.86	103.3	18	7.49	0.06	0.49	10.8	0.17	0.09	0.49
平均值			26.0	33.847	8.031	6.72	100.4	14.7	1.18	0.02	0.13	3.39	0.10	0.06	0.28
偏差值			1.1	0.095	0.023	0.18	3.9	3.3	1.49	0.01	0.09	1.71	0.03	0.01	0.08
海保署甲類海域水質標準值			-		7.5~8.5	5.0以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-




111/11/17(四)後壁湖
(農曆10月24日)

潮時	潮高(cm)
8:10	-42

表2-2 聖嬰年及反聖嬰年開始及結束時間(上網時間: 110年12月10日止)
民國68年至104年於Niño3.4區域(5°N-5°S, 120°-170°W)海水表面溫度對比表；
若該移動平均月水溫比多個30年中值(multiple centered 30-year)的海水表面平均溫度，高於0.5℃且連續5次，則此期間為聖嬰現象年，以紅字標示；若低於0.5℃連續5次，為反聖嬰現象年，以藍字註記。

Year	DJF	JFM	FMA	MAM	AMJ	MJJ	JJA	JAS	ASO	SON	OND	NDJ
68	0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	0.6
69	0.6	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0	0.1	0.1	0
70	-0.2	-0.4	-0.4	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	0
71	0	0.1	0.2	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.5	1.9	2.1	2.1
72	2.1	1.8	1.5	1.2	1	0.7	0.3	0	-0.3	-0.6	-0.8	-0.8
73	-0.5	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.2	-0.3	-0.6	-0.9	-1.1
74	-0.9	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.2	-0.3
75	-0.4	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0	0.2	0.4	0.7	0.9	1	1.1
76	1.1	1.2	1.1	1	0.9	1.1	1.4	1.6	1.6	1.4	1.2	1.1
77	0.8	0.5	0.1	-0.3	-0.8	-1.2	-1.2	-1.1	-1.2	-1.4	-1.7	-1.8
78	-1.6	-1.4	-1.1	-0.9	-0.6	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1
79	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4
80	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	1.2	1.4
81	1.6	1.5	1.4	1.2	1	0.8	0.5	0.2	0	-0.1	-0.1	0
82	0.2	0.3	0.5	0.7	0.8	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
83	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.9	1
84	0.9	0.7	0.5	0.3	0.2	0	-0.2	-0.5	-0.7	-0.9	-1	-0.9
85	-0.9	-0.7	-0.6	-0.4	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5
86	-0.5	-0.4	-0.2	0.1	0.6	1	1.4	1.7	2	2.2	2.3	2.3
87	2.1	1.8	1.4	1	0.5	-0.1	-0.7	-1	-1.2	-1.2	-1.3	-1.4
88	-1.4	-1.2	-1	-0.9	-0.9	-1	-1	-1	-1.1	-1.2	-1.4	-1.6
89	-1.6	-1.4	-1.1	-0.9	-0.7	-0.7	-0.6	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8
90	-0.7	-0.6	-0.5	-0.3	-0.2	-0.1	0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3
91	-0.2	-0.1	0.1	0.2	0.4	0.7	0.8	0.9	1	1.2	1.3	1.1
92	0.9	0.6	0.4	0	-0.2	-0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4
93	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
94	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.2	0.1	0	0	-0.1	-0.4	-0.7
95	-0.7	-0.6	-0.4	-0.2	0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	0.9	1
96	0.7	0.3	0	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.6	-0.8	-1.1	-1.2	-1.3
97	-1.4	-1.3	-1.1	-0.9	-0.7	-0.5	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.5	-0.7
98	-0.8	-0.7	-0.4	-0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	1	1.2	1.3
99	1.3	1.1	0.8	0.5	0	-0.4	-0.8	-1.1	-1.3	-1.4	-1.3	-1.4
100	-1.3	-1.1	-0.8	-0.6	-0.3	-0.2	-0.3	-0.5	-0.7	-0.9	-0.9	-0.8
101	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.2	-0.2
102	-0.4	-0.5	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3
103	-0.5	-0.6	-0.4	-0.2	0	0	0	0	0.2	0.4	0.6	0.6
104	0.5	0.4	0.5	0.7	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.2	2.3
105	2.2	2	1.6	1.1	0.6	0.1	-0.3	-0.6	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7
106	-0.3	-0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.2	-0.1	-0.4	-0.7	-0.9	-1.0
107	-0.9	-0.8	-0.6	-0.4	-0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.7	0.9	0.8
108	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.3	0.1	0.1	0.3	0.5	0.5
109	0.5	0.6	0.5	0.3	0	-0.2	-0.4	-0.6	-0.9	-1.2	-1.3	-1.2
110	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.5	-0.4	-0.4	-0.5	-0.7	-0.8	-1.0	-1.0
111	-1.0	-0.9	-1.0	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8					



WOCE PR-20,
PR-21 stations

表2-3 WOCE PR-20, PR-21 測線上海研一號(OR-I)、海研三號及KEEP-MASS 測站之水質資料
(資料按月份排列)

		位置	T	S	pH	DO	NO_3^-	NO_2^-	PO_4^{3-}	SiO_2
	日期		℃			mg/l	----------	----------	μM	----------
ORIII-1347-Stn.1	2009/3/2	21°48.043'N, 120°51.088'E	26.2	34.45	8.10	-	-	0.05	0.06	0.02
OR204-Stn.18	1989/4/10	21°58'N, 120°41'E	26.8	34.04	8.42	6.89	<0.1	-	<0.3	<1
OR204-Stn.19	1989/4/10	21°56'N, 120°32'E	26.7	34.00	8.40	7.12	<0.1	-	<0.3	<1
OR316-Stn.4	1992/5/8	21°45'36"N, 120°30'00"E	28.6	34.11	8.26	-	-	-	-	-
OR387-Stn.3	1994/5/21	21°53'05"N, 121°00'10"E	27.5	34.47	8.26	-	0.08	<1	0.12	<1
OR287-Stn.102	1991/7/11	21°44'06"N, 120°43'12" E	29.4	34.14	8.25	-	-	-	-	-
OR287-Stn.103	1991/7/11	21°34'06"N, 120°43'12"E	29.5	34.17	8.26	-	-	-	-	-
KEEP-MASS-Stn.3	1992/7/12	21°54'12"N, 121°09'24"E	28.8	34.10	8.25	-	-	-	-	-
OR462-Stn.707	1996/9/12	21°33'01"N, 119°57'50"E	29.0	34.08	8.25	6.51	<0.05	0.04	<0.05	1.7
OR403-Stn.101	1994/10/5	21°53'49"N, 120°43'14"E	28.4	34.04	8.27	6.12	0.05	0.02	0.1	1.5
OR403-Stn.102	1994/10/5	21°44'09"N, 120°43'05"E	28.4	34.05	8.26	6.07	0.05	0.03	-	1.5
OR369-Stn.108	1993/10/9	20°44'N, 120°42'E	27.2	34.64	8.27	-	<0.1	0.04	<0.1	3
OR434-Stn.21G	1995/10/26	22°04'50"N, 120°10'13"E	27.9	-	-	-	<0.05	<0.05	-	-
OR508-Stn.b3	1997/11/15	21°45'31"N, 120°07'06" E	27.4	34.57	8.28	-	<0.07	<0.04	<0.05	1.4
OR262-Stn.10	1990/11/20	21°20'00"N, 120°56'00"E	27.0	34.36	8.26	6.56	<0.1	<0.1	<0.1	1
OR262-Stn.11	1990/11/20	21°44'00"N, 120°41'00"E	27.4	34.40	8.27	-	<0.1	<0.1	<0.1	0.4
平均值			27.9±1.0	34.24±0.22	8.27±0.07	6.55±0.41	0.06±0.02	0.04±0.01	0.09±0.03	1.32±0.90

WOCE: World Ocean Circulation Experiment 全球環流實驗, 為國科會執行計畫之一.
KEEP-MASS: Kuroshio Edge Exchange Processes-Marginal Sea Studies Cruise




圖 2-1　研究區域暨採樣位置圖。





圖2-2 110年第1次~111年第4次採樣時衛星資料取得之海水表面溫度分佈圖。



(續)圖2-2 110年第1次~111年第4次採樣時衛星資料取得之海水表面溫度分佈圖。





圖2-3　110及111年第1次第三核能發電廠附近海域表水溫度、鹽度、pH、溶氧飽和度、營養鹽以及葉綠素甲等值圖



續圖2-3 110及111年第1次第三核能發電廠附近海域表水溫度、鹽度、pH、溶氧飽和度、營養鹽以及葉綠素甲等值圖




圖2-4 75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域溫度距平值(當月測值-歷年月平均值)與ONI, PDO之變化圖





圖2-5 110~111年共8次第三核能發電廠附近海域溫度隨深度之變化圖



續圖2-5 110~111年共8次第三核能發電廠附近海域溫度隨深度之變化圖







圖2-6 長時間溫度記錄與預報潮高記錄圖




續圖2-6 長時間溫度記錄與預報潮高記錄圖




續圖2-6 長時間溫度記錄與預報潮高記錄圖




續圖2-6 長時間溫度記錄與預報潮高記錄圖




續圖2-6 長時間溫度記錄與預報潮高記錄圖



續圖2-6 長時間溫度記錄與預報潮高記錄圖



續圖2-6 長時間溫度記錄與預報潮高記錄圖



續圖2-6 長時間溫度記錄與預報潮高記錄圖




圖2-7 南灣海域102-111年7/15-8/15同時間的出水口3公尺深的水溫比較




圖2-8 89年至111年11月共92次調查之N/P比值圖

(貳-乙)、低放貯存場附近海域之水文及水質化學

一、計畫目的與緣起

近年來，由於我國人口增加，工業突飛猛進，致使都市與工業消耗電量日趨增加。台灣電力股份有限公司為配合國家之經濟建設，工業開發以及維護國民生活水準，陸續在 68~74 年間於台灣北部及南部興建核能發電一、二、三廠。在核能發電廠正常運轉期間，必然有少量放射性廢棄物產生。行政院原子能委員會在台灣本島陸地有限，人口密集的情形下，選擇人口稀少，地質結構良好，且具有天然屏障的離島〝蘭嶼〞，於 67 年動工興建， 70 年完成低放射性廢棄物貯存場。107 年 6 月 19 日更名為低放貯存場。

低階放射性廢棄物是由核能電廠、農業、工業與學術研究機構所產生，其中核能電廠在運轉過程中所進行的維護及除污作業會產生受放射性物質污染的廢樹脂、濃縮液、廢棄的零組件、設備、或是淨化水所產生的殘渣以及維修人員的衣物、手套、工具等，是低階放射性廢棄物的主要來源。為使低放核種安定、容易操作、減容減量，低放射性廢棄物的管理上，採行了減少產生、減容固化、安全貯存、妥善處置的策略。

由於蘭嶼地區天候高溫、潮濕、多鹽，且貯存場已經啟用三十餘年，早期貯放的放射性廢棄物桶外表已有油漆剝落或鏽蝕，少數廢棄物桶並有固化不良的情形。針對鏽蝕問題，貯存場於 85 年 4 月起不再對外接收貯存廢棄物桶時，並積極進行檢整重裝作業。85 年 12 月至 86 年 10 月間先進行試驗性檢整重裝作業，將 600 桶廢棄物檢整後，重新盛裝於容器內。96 年 9 月台電公司完成檢整重裝作業之發包程序，並於 96 年 12 月 13 日展開正式的檢整重裝工作，於 100 年 11 月底，完成全數檢整重裝回貯作業。目前在貯存場共回貯 100,277 桶低放射性廢棄物，並於 101 年 6 月完成場區復原工作，恢復原先蘭嶼貯存場的靜態貯存狀態。

行政院原子能委員會放射性待處理物料管理處(現已改名為放射性物料管理局)，為顧及放射性廢棄物在搬運及貯存期間對附近海域生態環境的影響，於 72 年 7 月開始委託環科會進行長期調查研究工作。該會也已先後完成第 1 年至第 10 年度調查研究報告。由這些調查研究報告，顯示到目前為止，低放貯存場運作對該地區附近海域生態未有明顯影響；該海域之生物體含放射性物質量也仍在環境背景變動範圍內，並未對附近居民構成威脅。但該會為顧及海域生態及放射性物質累積於生物體之調查必須長期研究瞭解；另鑑於低放貯存場附近海域生態環境多年來調查結果已趨相當穩定，為節省調查研究經費與人力，78 年度起將動物性浮游生物與潮間帶

底棲生物調查合併；全年調查 3 航次(冬季受當地惡劣氣候影響故刪除)；目的除繼續瞭解該貯存場附近海域生態系之平衡狀況，及生物群社的消長關係及這些生物群社(包括沈積物)可能累積放射性物質對該環境之影響外，調查結果將繼續作為該貯存場運作對附近海域生態監測之基本資料。由於多年來發覺環境背景穩定，因此自 82 年 7 月起僅保留海水水質、水文及放射性物質之監測，委由國立中山大學每年進行 2 次調查研究。85 年 7 月起改由台灣電力股份有限公司資助，仍延續此項調查並變更為每年 4 次(陳等, 2020)，日後若查覺放射性物質測量超出環境背景變動範圍時，將再行恢復全面性之調查。

二、文獻回顧

因為 1 公斤的鈾 -235 可產生相當於 260 萬公斤煤所產生的能量，因此就核燃料而言，單位能量所需的採礦和運輸成本是非常低的。鈾分裂所產生的廢棄物重量，僅佔煤燃燒所產生的廢棄物重量的 1×10^{-7}。在 89 年，即使世界上所需的能量均由核分裂來供應，它們所產生的廢棄物重量，也只有 3650 公噸，而且它們可以裝置於邊長小於 10 公尺的立方容器內。雖然，大量使用核能發電廠可以減少經由電力工業所產生的廢棄物，但大眾最擔憂的還是放射性廢棄物處置的問題。

在生物圈中，各區域之生物相均在適應於各該環境因子之條件下生存。在其生態系中，各種生物間的能量流程(energy flow)或營養階(trophic level)，均維持恆定而構成自然平衡的現象，但這種平衡的現象受非生物環境之影響至鉅。非生物環境之變化，常可使原來的生態系的平衡破壞而形成另一種新的生態系。

在增進人類福祉之前題下，我們不但需要探查及開發，而且還要維護可供人類直接或間接利用的生物及非生物資源，換句話說就是要調查並維護最有利於人類生存的生態系。

本研究由蘇仲卿等(1984~1989)、洪楚璋等(1990~1993)、陳鎮東和鍾玉嘉(1994, 1995b, 1996)及陳等(1997~2021)至今已有 38 年的調查結果，大致的研究結論為：沿岸地區受陸源影響，鹽度偏低、營養鹽有偏高之勢，其餘如 pH、溶氧量大致符合甲類海域水質標準。

三、研究方法與進度說明

採樣點位置沿襲蘇仲卿等(1984~1989)、洪楚璋等(1990~1993)、陳鎮東和鍾玉嘉(1994, 1995b, 1996)及陳等(1997~2008)之調查研究，如圖 2-9 所示。於貯存場附近選取 3 個採樣站(由北向南依序為排水口 1、2、3)；專用碼頭內、外各設一測站(依序

為測站 4、5)外；另於人口較多之漁人村岸邊設一採樣站(測站 6)，共設立 6 個採樣站，僅採取岸邊之表層海水。各站經緯度分別是排水口 1(121.593572, 22.003578°)、排水口 2(121.593977, 22.004339°)、排水口 3(121.594748, 22.006901°)、專用碼頭內(121.581325, 22.004316°)、專用碼頭外(121.580858, 22.004311°)、漁人村(121.542601, 22.025791°)。

採樣日期為 110 年 1 月 23 日、110 年 5 月 6 日、110 年 8 月 25 日、110 年 11 月 7 日、111 年 3 月 3 日、111 年 5 月 19 日、111 年 8 月 16 日、111 年 11 月 15 日，依照計畫書所規定每隔 2 至 4 個月採樣 1 次，符合進度要求。

現場分析方法及實驗室分析方法與第三核能發電廠之水文及水質化學相同。測量項目分別有溫度、鹽度、pH、DO(mg/l) 、DO(%)、葉綠素甲、NO_3^-、NO_2^-、PO_4^{-3}、SiO_2 等項。

四、目前研究結果

4.1水文及水質近況

圖 2-10 為蘭嶼南方 15 海浬處(21°45'N)之流速(向北為正，向南為負)測定。研究結果顯示，由於黑潮之緣故，此處主要流向為朝北，因此蘭嶼之海洋污染物全朝北輸送。但因迴流及小環流之影響，蘭嶼附近亦有出現南向流之可能(Chen *et al.*, 1994, 1995)，這些水文及水質資料(陳等人，1993a~c, 1995a, 1996, 1997；Chen et al., 2021)，可作為其下游蘭嶼諸測站之最佳背景值。

水文與水質化學調查部份為〝第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查〞計畫中最基礎的一部份，因其中所涵蓋之水文(溫度、鹽度及溶氧)與水質化學(pH 值及營養鹽)兩部份中之各項因子，均直接或間接影響著海域之生態組成與平衡。因此，分析水文及水質化學在時間和空間之分佈情形，並與過去的調查相比較，可供瞭解放射性待處理物料存放前後，低放貯存場附近海域水文與水質化學因子的變化傾向，及其對環境的影響。本年度之研究除了接續從 72 年來之定期調查工作之外，我們亦將歷年來之各項資料做進一初步的整合，藉以瞭解該海域水文、水質化學因子間之互動情形。調查結果如表 2-4。

110 年第 1 次水溫介於 24.1～24.8 °C 之間，平均 24.4±0.3 °C，高於歷年同月之平均水溫 23.9±1.1 °C；第 2 次介於 27.7～29.0 °C 之間，平均 28.3±0.5 °C，高於歷年同月之平均水溫 27.9±1.2 °C；第 3 次介於 30.2～31.0 °C 之間，平均 30.5±0.3 °C，高於歷年同月之平均水溫 29.6±1.1 °C；第 4 次介於 27.8～28.5 °C 之間，平均 28.1±0.3

℃，高於歷年同月之平均水溫 26.7±1.1 ℃。111 年第 1 次水溫介於 24.8～25.7 ℃之間，平均 25.1±0.4 ℃，低於歷年同月之平均水溫 25.4±1.2 ℃；第 2 次水溫介於 26.7～27.4 ℃之間，平均 27.1±0.2 ℃，亦低於歷年同月之平均水溫 27.8 ±1.2℃；第 3 次水溫介於 30.8～33.0 ℃之間，平均 31.6±0.8 ℃，高於歷年同月之平均水溫 29.7 ±1.2℃；第 4 次水溫介於 26.5～27.6 ℃之間，平均 27.0±0.4 ℃，略高於歷年同月之平均水溫 26.7 ±1.1℃。8 次的現場水溫平均值與衛星水溫相當(圖 2-11)。

由美國國家氣候預報中心(NOAA)發佈的聖嬰/反聖嬰期發生時間表(表 2-2)來看，海洋聖嬰指數(ONI) 109 年 8 月至 111 年 10 月進入反聖嬰期，時間長達 2 年多。而大氣和海洋研究聯合研究所(JISAO)所公佈的太平洋十年期振盪指數(PDO)則於 108 年 10 月之後至 111 年 11 月均為負值。經統計結果發現此 8 次調查水溫距平值 (當月測值-歷年月平均值)分別為 0.5±0.6 ℃、0.5±0.9 ℃、0.8±0.7 ℃、1.4±0.7 ℃、 -0.3±0.7 ℃、-0.8±0.8 ℃、1.9±1.0 ℃、0.3±0.7 ℃。本海域這 8 次水溫調查有 6 次較歷年為高，是否與海洋 PDO 正處於冷相，而冷相時通常西北太平洋(本海域)水溫會變高有關，或因水樣取得自岸邊淺水受氣溫的影響較大，均有可能。

110 年第 1 次鹽度介於 33.161~34.402 之間，平均 34.007±0.494，較歷年平均值 33.233±2.068 高了 0.774±2.260；第 2 次介於 33.853~34.362 之間，平均 34.158±0.216，高於歷年平均值 33.732±1.163；第 3 次介於 33.444~34.126 之間，平均 33.900±0.288，高於歷年平均值 33.343±1.854；第 4 次介於 31.578~34.227 之間，平均 33.323±1.146，略低於歷年平均值 33.781±1.071。111 年第 1 次鹽度介於 32.731~34.550 之間，平均 34.032±0.787，高於歷年平均值 33.885±1.592；第 2 次鹽度介於 30.957~33.947 之間，平均 32.565±1.153，低於歷年平均值 33.680±1.184；第 3 次鹽度介於 32.531~34.096 之間，平均 33.732±0.555，高於歷年平均值 33.361±1.816，並於碼頭內、外觀測到較低的鹽度；第 4 次鹽度介於 30.825~33.674 之間，平均 32.431±1.209，低於歷年平均值 33.719±1.110；其中漁人村較其他測站的鹽度低了約 2.3 個單位，顯示有極多的淡水輸入。

110 年第 1 次 pH 值介於 8.017~8.171 之間，平均 8.105±0.057，pH 較高的碼頭內、外測站，其溶氧飽和度也相對較高，顯示這幾處的光合作用較為旺盛，將二氧化碳利用掉而釋出溶解氧氣，並提高了 pH；第 2 次介於 8.051~8.219 之間，平均 8.141±0.078；第 3 次介於 8.062~8.269 之間，平均 8.159±0.085，其中漁人村的 pH 值較其他測站來得高，其溶氧飽和程度亦高於其他測站；第 4 次介於 8.018~8.106 之間，平均 8.057±0.033，各站之間差別不大。111 年第 1 次 pH 值介於 8.018~8.070 之

間，平均 8.049±0.021；第 2 次 pH 值介於 7.980~8.036 之間，平均 8.019±0.020，排水口 3 的 pH、溶氧飽和度都偏低；第 3 次 pH 值介於 8.082~8.262 之間，平均 8.176±0.072，碼頭內外溶氧飽和度偏低；第 4 次 pH 值介於 7.997~8.155 之間，平均 8.075±0.055，其中碼頭內 pH 值 7.997 為各站中最低。各測站的 pH 值皆符合海保署 107 年 2 月 13 日所公佈「海域環境分類及海洋環境品質標準」所規範甲類(適用於一級水產用水、游泳)海域水體之標準(pH 介於 7.5~8.5 之間)。

110 年第 1 次溶氧量介於 6.69~7.94 mg/l 之間，平均 7.39±0.51 mg/l；溶氧飽和度介於 97~117 %之間，平均 107±7.7 %；第 2 次溶氧量介於 6.28~7.33 mg/l 之間，平均 6.85±0.43 mg/l；溶氧飽和度介於 97.0~115 %之間，平均 107±7.3 %；第 3 次溶氧量介於 5.94~8.32 mg/l 之間，平均 6.94±0.86 mg/l；溶氧飽和度介於 95~135 %之間，平均 112±14.2 %；第 4 次溶氧量介於 6.10~7.29 mg/l 之間，平均 6.59±0.37 mg/l；溶氧飽和度介於 94.8~113 %之間，平均 102±5.7 %。111 年第 1 次溶氧量介於 6.30~6.75 mg/l 之間，平均 7.45±0.16 mg/l；溶氧飽和度介於 93~101 %之間，平均 95±2.9 %；第 2 次溶氧量介於 5.87~6.24 mg/l 之間，平均 6.11±0.14 mg/l；溶氧飽和度介於 95~101 %之間，平均 98±2.3 %；第 3 次溶氧量介於 7.83~9.33 mg/l 之間，平均 8.50±0.54 mg/l；溶氧飽和度介於 106~126 %之間，平均 116±7.9 %；第 4 次溶氧量介於 6.48~8.31 mg/l 之間，平均 7.25±0.66 mg/l；溶氧飽和度介於 98~125 %之間，平均 109±9.5 %。各測站的溶氧量皆符合海保署 107 年 2 月 13 日所公佈「海域環境分類及海洋環境品質標準」所規範甲類(適用於一級水產用水、游泳)海域水體之標準(溶氧量大於 5 mg/l)。

海水中營養鹽主要有硝酸鹽(NO_3^-)、磷酸鹽(PO_4^{-3})和矽酸鹽(SiO_2)，是水中植物生長所不能或缺的化學物質。在一般大洋中，營養鹽主要來源為有機質之分解。在沿岸地區，營養鹽除了來自有機質分解之外，亦可能受溪流輸入帶有家庭、農業及工業廢水的影響。

110 年 NO_3^- 、 NO_2^- 、 PO_4^{-3} 、 SiO_2 第 1 次平均值分別為 1.21±0.39 μM、0.09±0.01 μM、0.17±0.05 μM、4.16±2.17 μM；第 2 次平均值分別為 0.94±0.16 μM、0.05±0.01 μM、0.15±0.04 μM、3.66±1.49 μM；第 3 次平均值分別為 0.83±0.20 μM、0.06±0.03 μM、0.09±0.03 μM、2.28±1.26 μM；第 4 次平均值分別為 0.70±0.32 μM、0.05±0.02 μM、0.16±0.17 μM、6.12±5.59 μM。111 年第 1 次平均值分別為 1.16±0.45 μM、0.04±0.01 μM、0.13±0.10 μM、6.33±6.34 μM；第 2 次平均值分別為 2.29±0.94 μM、0.06±0.02 μM、0.20±0.12 μM、14.36±10.85 μM；第 3 次平均值分別為

1.16±0.86 μM、0.05±0.02 μM、0.15±0.12 μM、5.21±5.00 μM；第 4 次平均值分別為 2.44±1.32 μM、0.04±0.01 μM、0.25±0.16 μM、12.86±9.05 μM。漁人村的營養鹽濃度大多較其他測站高。

111 年第 2 次在碼頭內、外測站觀測到不僅鹽度較低，溶氧量也較低，而 SiO_2 則偏高，此現象與 108 年第 2 次類似。因為碼頭內、外兩測站附近並無固定污染源且與大洋相接，過去往往較能代表本海域的背景值。猜測此次可能受到雨水的影響，將陸源物質沖入此處，而強勁的往北海流將碼頭的水封鎖住，因而陸上物質進入此處後，並無法快速稀釋掉。此現象將持續追蹤，看看是否為特殊現象或已成常態。

110 年葉綠素甲第 1 次介於 0.07~0.95 μg/l 之間，平均 0.40±0.35 μg/l，漁人村的葉綠素甲濃度仍然最高；第 2 次介於 0.03~0.18μg/l 之間，平均 0.10±0.05 μg/l；第 3 次介於 0.05~0.75 μg/l 之間，平均 0.22±0.24 μg/l。漁人村葉綠素甲較其他測站高，其 pH、溶氧飽和度也偏高，因此高的葉綠素甲反映有較高的光合作用；第 4 次介於 0.06~0.29μg/l 之間，平均 0.16±0.09 μg/l。111 年葉綠素甲第 1 次介於 0.05~0.18 μg/l 之間，平均 0.10±0.05 μg/l；第 2 次介於 0.03~0.12 μg/l 之間，平均 0.09±0.03 μg/l；第 3 次介於 0.02~0.19 μg/l 之間，平均 0.09±0.06 μg/l；第 4 次介於 0.04~0.18 μg/l 之間，平均 0.10±0.05 μg/l，漁人村的葉綠素甲濃度仍然最高。

因歷年實驗數據顯示排水口的溶氧飽和度普遍高於碼頭內、外的測站，在 110 年第 3 次採樣時增採位於排水口 1 附近「潮池」。該潮池藻類繁生，推測此潮池的水可能隨著潮汐被帶入海濱進而影響此處海水的化學參數。實驗結果如下，水溫為 30.4°C，鹽度為 0.152，pH 值為 9.822，溶氧飽和度為 170%，溶氧量為 12.7mg/l；NO_3^- 、 NO_2^- 、 PO_4^{-3} 、SiO_2 營養鹽濃度分別為 1.52 μM、0.09 μM、0.06 μM、33.8μM。由鹽度結果可知此潮池雖然位於岸邊，但並無受到海水之交換，而屬於淡水，其溶氧飽和度極高，顯示光合作用非常旺盛，將二氧化碳利用掉而釋出溶解氧氣，並提高了 pH。營養鹽除了 SiO_2 高於其他站位十倍外，其餘皆無太大差異。

4.2營養鹽來源

將硝酸鹽及磷酸鹽對鹽度作圖，發現兩者約略有負相關(圖 2-12)，亦即鹽度低時，營養鹽含量較高，顯示淡水為此處營養鹽的主要輸入源。近岸海水長期受到陸水稀釋，因此鹽度偏低，而且營養鹽偏高。

天然水中的矽主要來自矽酸鹽與鋁矽酸鹽礦物的水解，絕大多數正常天然水中 SiO_2 的含量，均高於與石英平衡時的含量，而低於與無定形 SiO_2 平衡時的含量，大部份是介於 1~30 mg/l (16~500 μM)之間。表層海水遠低於這個值，則與生物的吸收作用有關(陳，1992)。低放貯存場附近海域 6 個測站 SiO_2 平均值為 18.5 μM，遠高於 WOCE-PR20 測線第 6 站附近的測值。由於此處表層 SiO_2 含量遠高於外海表水之值，因此我們假設此 6 個測站 SiO_2 的來源，大都是礦物風化而來的物質；生物之吸收、分解僅佔一小部份。將 SiO_2 對鹽度作圖，發現兩者有相當程度的負相關(圖 2-12)，因此 SiO_2 的含量多時，顯示陸源量多。浮游植物死亡後，其有機體經由氧化可釋出營養鹽氮及磷於水中，在海水中兩者並以 16：1 的關係存在(Redfield *et al.*, 1963)。也就是說，水中之營養鹽若有 16 份的氮及 1 份的磷，最適合浮游植物生長，當氮與磷的比值高於 16 時，顯示水體的氮太多，因此磷成為浮游植物生長之限制因子。反之，則氮成為浮游植物生長之限制因子。圖 2-13 為從 72 年 7 月至今調查資料之氮與磷比值圖，圖上顯示，氮與磷的比值相當零亂，顯示營養鹽的來源相當複雜。該比值以落在斜率小於 16 之下者居多，由此可知，此一海域浮游植物的限制因子為氮。既然此一海域對氮較為敏感，因此對氮污染的途逕應該特別注意。氮進入海洋之主要來源有 4 種，分別是雨水、海鳥糞便、大氣固氮作用以及肥料。此區年雨量 2656 公釐極高，因此由雨水將島上有機物質或是污染物質帶入近岸海水，可能是近岸海域營養物質之主要來源，應加以重視。

4.3水文及水質之年變化 (下文所提的附圖皆在光碟片中)

本項調查計畫前 10 年(72 年 7 月~82 年 6 月)是由中央研究院國際環境科學委員會中國委員會所執行，當時水文及水質資料是以研究船或船隻出海取得，取得不同深度(如 0、3、6、9、15 及 25 公尺，視現場實際深度而定)的水樣，然而研究報告的數據並無詳述水樣之水深，因此一個測站僅發表一個數字極有可能是取整個水層平均值的方式發表。如此一來，這些以往的數據在與 82 年 6 月以後僅在岸邊取得表水之數據來做比較可能不太妥當。然而為了瞭解此區海域長久以來水文及水質變化的情形，2 組數據(82 年 6 月之前及之後)還是拿來擺在一起，暫且不考慮採樣深度不同所造成的差異。

由 72 年 7 月至今之水溫大致呈季節性變化(附圖 2-16)，年平均值為 27.8℃。將 6 測站溫度平均後取 sin 之變化(附圖 2-17a)，可以看到早期(73 年~78 年)溫度變化的幅度較大，高低溫差約 8 ℃左右，之後幅度變化趨小，到了最近幾年似乎看到最高溫有往上的現象。由於早期溫度的報導是測站水層(0~25 公尺)的平均值， 82 年 6 月之後則是表水溫度，因此長年來水溫的改變可能並非事實，而只是採樣水層不同所

造成。但從 82 年 6 月起至今做 sin 曲線，顯示這幾年的表水高溫亦有往上的現象(附圖 2-17b)。季溫度以夏季最高(平均 29.2±1.1℃)，而冬季最低(平均 23.9±1.7℃)，春、秋兩季居中，分別是 27.0±1.9℃及 27.5±1.5℃。同季節採樣，各站溫度相差最大約 1℃左右，乃是所採樣位置近岸邊，水深極淺，水溫變化容易受氣溫改變而改變。蘭嶼貯存場附近海域各測站歷年的平均水溫約為 26.9±2.3℃，與 WOCE PR-20 測站 5、6、7 站(21°49'N, 121°30' E 附近)8 次量測水溫的平均值 27.9±0.7℃(陳等人，1993a, b, c, 1995a, 1996, 1997)略低，主要是因為 WOCE PR-20 採樣日期僅限於 5~10 月，而無秋、冬數據，因而平均水溫較高於蘭嶼貯存場附近海域。

在一般大洋中，鹽度之季節性變化並不明顯。但是在蘭嶼貯存場附近海域，由於受到黑潮水(高鹽度)、南海水(低鹽度)及淡水流入的影響，因此，在不同季節的隨機採樣中，鹽度可能有很大的變化。由長年來的資料分析，鹽度的季節性變化並不明顯，反而是每次各測站彼此間的差異性較大，尤其排水口 1~3 及漁人村常常有較低值出現(附圖 2-18)，顯示這些地方淡水流入量很大。歷次的調查中常有鹽度的低值，尤其 85 年 7 月在排水口 1 取得鹽度僅 0.26，近乎淡水的水樣；95 年 9 月於排水口 1、2、3 取得鹽度分別為 3.35、4.12、13.17。此一現象乃是採樣位置受到不同程度之陸水影響所致。各測站的平均鹽度為 33.22±2.48，較外海的平均鹽度 34.37 低了近 1.15 單位，顯示近岸海水(岸邊海水)長期受到陸水稀釋，而且變化也較大。

一般而言，夏季時，由於藻類光合作用旺盛，用掉 CO_2，因此水中 CO_2 減少，而使得水體的 pH 值上升；反之，冬季之光合作用較弱，水中減少的 CO_2 不若夏天來得多，水體中的 CO_2 多，將使得 pH 值降低。因此若僅考慮生物作用，水體中的 pH 通常是夏天高，冬天低。上述狀況若要成立，必須是水中藻類的量夠多，以引起 pH 值可察覺之變化。然而，此 6 測站 pH 值之季節性變化並不突顯(附圖 2-19)，可能是水體的藻類含量較低所致。此推論可由蘭嶼貯存場附近海域葉綠素甲含量偏低得到旁證。蘭嶼貯存場附近海域海水的平均 pH 值約為 8.08±0.16，明顯低於外海的平均 pH 值 8.26。造成蘭嶼貯存場附近海域海水具較低 pH 值的原因，可能與陸源水的排放有關，此一推論可由近岸海水的鹽度大都低於外海海水加以印證。

在不考慮生物作用的情況下，海水中的溶氧量應呈季節性變化，亦即夏天溫度高時，溶氧量較低，冬天溫度低時，溶氧量較高。從 72 年 7 月至今溶氧量的平均值為 6.74±0.55 mg/l，季節性變化並不明顯(附圖 2-20)。此應是岸邊取樣，受到陸源水之影響，以及風浪攪動帶入氧氣，進而影響海水中的溶氧量。因此溶氧量的變化與季節無關，也與生物作用無關。

溶氧飽和度(DO，%)是以某水溫下，水體所含溶氧值與理論值之百分比，因此當以 DO(%)表示時，已將溫度對溶氧量的效應扣除。水體中若 DO(%)大於 100 %，可能是藻類光合作用旺盛，釋出多量的氧，也有可能是強風大浪帶入大量氧氣所致(附圖 2-21)；反之，則有可能是呼吸作用旺盛，耗掉氧氣，或是水層成層、滯留，氧氣交換不易。72 年 7 月至今 DO(%)介於 76.8~169% 之間，平均 102 ±8.09 %，變化頗大，顯示近岸海水表面的溶氧飽和度並非常年累月保持在飽和左右，亦即陸源水之輸入以及風浪的大小，均控制岸邊海水的溶氧變化。

72 年 7 月至今不僅各測站彼此間營養鹽的差異頗大，季節性的變化也很大，並沒有明顯的規律性。除了 82 年 10 月、84 年 9 月、84 年 11 月硝酸鹽的含量大多在偵測下限以下(<0.11 μM 或<0.16 μM)，其餘調查的時間硝酸鹽都有很高含量，其中以漁人村的含量最高(平均 3.01±4.58 μM，偵測下限以下之值以 0 計算)，排水口 1、2 分別次之(平均 2.73±6.23 及 1.80±2.18 μM，偵測下限以下之值以 0 計算) (附圖 2-22)。此乃取得的水樣含有尚未受到海水完全稀釋的淡水，而此淡水中又含有高量的硝酸鹽。

亞硝酸鹽的情形和硝酸鹽相類似，除了 82 年 10 月、83 年 4 月、84 年 9 月、85 年 1 月、87 年 10 月、88 年 11 月及 95 年 3 月亞硝酸鹽的含量大多在偵測下限以下(<0.01 μM 或<0.16 μM 或<0.02 μM)，其餘各調查時間皆可偵測到亞硝酸鹽(附圖 2-23)，顯示海域有些許有機質的殘存，以致於屬於還原性的亞硝酸鹽能夠存在於表水之中。

由附圖 2-24 可看出，蘭嶼貯存場附近海域的磷酸鹽含量，在 87 年第三季後差異不大，季節性的變化也很小。自 72 年 7 月至今以排水口 1 及漁人村的平均值最高(平均 0.37±0.87、0.55±0.78 μM)，排水口 1 的平均值偏高，是因為 85 年 7 月的高值造成，而漁人村則是常態性的磷酸鹽有較高現象。

附圖 2-25 顯示，蘭嶼貯存場附近海域有較高的矽酸鹽含量，其中又以 85 年 7 月排水口 1 的含量最高，近岸海域有如此高的矽酸鹽含量，應是由陸水所提供。自 72 年 7 月至今以排水口 1、2，及漁人村的平均值最高(平均分別為 31.1±79.2 μM、18.6±35.2 μM，及 19.7±24.9 μM)，再顯示此地方有陸源水的流入。

蘭嶼貯存場附近海域 6 個測站營養鹽的平均含量，皆比蘭嶼南部外海 WOCE PR-20 測線上測站 6 的平均值高許多，顯示此 6 站或多或少受到陸源物質的影響。

4.4 與 WOCE 資料比較

本區海域與 WOCE 資料中之溫度、鹽度、pH 相比較(附圖 2-26~28)，其中溫度與 WOCE 相同月份的調查相近，而鹽度及 pH 偏低，主要是陸源水輸入本海域所造成。

五、結論

調查結果顯示，海域之水溫主要受天候及季節性變化的影響。鹽度無季節性變化，反而是各站的變異較大，顯示陸源水對近岸海域的鹽度有某種程度的影響，其中漁人村的鹽度偏低，此乃陸源水大量流入海域所致。pH 及溶氧量都符合海保署(原中央主管為環保署，於 107 年 4 月 27 日由行政院公告更改為海保署)107 年 2 月 13 日所公佈「海域環境分類及海洋環境品質標準」所規範甲類(適用於一級水產用水、游泳)海域水體之標準。較高 pH 的測站，往往伴隨較高的溶氧量，顯示本海域有較旺盛的光合作用。各測站的營養鹽(硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽)均較外海來得高，此乃近岸海水長期受到含有高量營養鹽陸源水流入之故。

排放口 1-3 為貯存場之 3 條雨水排放渠道，並未設置閘門。雨水過多會自渠道口排出 (貯存場每月會取樣分析排放口附近沙、土樣，如有排水，亦會取水樣。近一年來，砂、土、水樣核種分析結果均小於儀器最小可測值)。

六、附表與附圖

表2-4　低放貯存場附近海域民國110年第1次~111年第4次水文暨水質化學資料

110年第1次(110年1月23日)

測站	採樣時間	溫度	鹽度	pH, 25℃	DO	DO	NO_3^-	NO_2^-	PO_4^{-3}	SiO_2	chl.a
		℃		total ion	mg/l	%	μM	μM	μM	μM	μg/l
排水口1	10:20	24.1	34.402	8.114	7.31	106	1.58	0.10	0.15	2.39	0.23
排水口2	10:49	24.4	34.208	8.155	7.92	115	1.37	0.09	0.14	2.43	0.81
排水口3	11:17	24.8	34.353	8.171	7.94	117	0.71	0.07	0.14	2.52	0.17
碼頭內	11:37	24.2	34.118	8.017	6.73	98	0.93	0.10	0.14	6.21	0.07
碼頭外	11:51	24.3	34.352	8.040	6.69	97	1.23	0.11	0.13	2.43	0.10
漁人村	09:36	24.7	33.161	8.123	7.61	111	1.78	0.10	0.27	7.17	0.95
漁人村Repeat	09:43	24.3	33.455	8.113	7.51	109	0.89	0.08	0.19	5.95	0.47
最小值		24.1	33.161	8.017	6.69	97	0.71	0.07	0.13	2.39	0.07
最大值		24.8	34.402	8.171	7.94	117	1.78	0.11	0.27	7.17	0.95
平均值		24.4	34.007	8.105	7.39	107	1.21	0.09	0.17	4.16	0.40
偏差值		0.3	0.494	0.057	0.51	7.7	0.39	0.01	0.05	2.17	0.35

110年第2次(110年5月6日)

測站	採樣時間	溫度	鹽度	pH, 25℃	DO	DO	NO_3^-	NO_2^-	PO_4^{-3}	SiO_2	chl.a
		℃		total ion	mg/l	%	μM	μM	μM	μM	μg/l
排水口1	10:35	28.2	34.132	8.195	7.09	110	0.64	0.04	0.10	3.80	0.08
排水口2	10:19	28.4	34.338	8.174	7.09	110	0.96	0.04	0.11	1.82	0.08
排水口3	09:38	27.7	34.302	8.078	6.55	101	0.96	0.06	0.13	2.42	0.07
碼頭內	11:16	28.0	34.249	8.051	6.40	99	0.92	0.05	0.17	4.57	0.08
碼頭外	11:02	27.9	34.362	8.051	6.28	97	0.86	0.04	0.13	2.33	0.03
漁人村	11:39	28.9	33.869	8.219	7.33	115	1.08	0.06	0.18	5.09	0.17
漁人村Repeat	11:45	29.0	33.853	8.217	7.21	113	1.15	0.07	0.19	5.61	0.18
最小值		27.7	33.853	8.051	6.28	97	0.64	0.04	0.10	1.82	0.03
最大值		29.0	34.362	8.219	7.33	115	1.15	0.07	0.19	5.61	0.18
平均值		28.3	34.158	8.141	6.85	107	0.94	0.05	0.15	3.66	0.10
偏差值		0.5	0.216	0.078	0.43	7.3	0.16	0.01	0.04	1.49	0.05

續表2-4　低放貯存場附近海域民國110年第1次~111年第4次水文暨水質化學資料

110年第3次(110年8月25日)

測站	採樣時間	溫度	鹽度	pH, 25℃	DO	DO	NO_3^-	NO_2^-	PO_4^{-3}	SiO_2	chl.a
		℃		total ion	mg/l	%	μM	μM	μM	μM	μg/l
排水口1	09:42	30.3	34.115	8.155	6.92	111	0.99	0.11	0.09	1.00	0.14
排水口2	09:22	30.4	34.126	8.178	7.23	116	0.55	0.04	0.05	0.96	0.18
排水口3	09:01	30.4	34.035	8.123	6.58	106	1.07	0.08	0.07	1.55	0.14
碼頭內	10:16	30.5	34.017	8.063	5.99	97	0.71	0.04	0.07	2.46	0.05
碼頭外	10:27	30.2	34.036	8.062	5.94	95	0.67	0.04	0.07	2.10	0.09
漁人村	10:53	31	33.444	8.269	8.32	135	1.02	0.05	0.12	4.11	0.19
漁人村Repeat	11:01	30.9	33.525	8.263	7.59	123	0.77	0.05	0.15	3.78	0.75
排水口1潮池	09:51	30.4	0.152	9.822	24.8	170	1.52	0.09	0.06	33.8	2.46
最小值		30.2	33.444	8.062	5.94	95	0.55	0.04	0.05	0.96	0.05
最大值		31.0	34.126	8.269	8.32	135	1.07	0.11	0.15	4.11	0.75
平均值		30.5	33.900	8.159	6.94	112	0.83	0.06	0.09	2.28	0.22
偏差值		0.3	0.288	0.085	0.86	14.2	0.20	0.03	0.03	1.26	0.24

110年第4次(110年11月7日)

測站	採樣時間	溫度	鹽度	pH, 25℃	DO	DO	NO_3^-	NO_2^-	PO_4^{-3}	SiO_2	chl.a
		℃		total ion	mg/l	%	μM	μM	μM	μM	μg/l
排水口1	08:32	28.1	33.950	8.106	7.29	113	0.70	0.06	0.03	2.19	0.14
排水口2	08:18	28.2	34.035	8.063	6.65	103	0.55	0.04	0.06	2.11	0.29
排水口3	08:00	28.2	33.857	8.041	6.63	103	0.64	0.03	0.06	4.20	0.14
碼頭內	09:04	28.4	33.879	8.053	6.10	95	0.55	0.05	0.11	5.04	0.06
碼頭外	08:52	28.5	34.227	8.091	6.31	99	0.24	0.03	0.03	1.15	0.06
漁人村	07:12	27.8	31.578	8.018	6.56	100	1.15	0.08	0.42	14.49	0.22
漁人村Repeat	07:18	27.8	31.737	8.026	6.61	101	1.09	0.08	0.37	13.65	0.25
最小值		27.8	31.578	8.018	6.10	95	0.24	0.03	0.03	1.15	0.06
最大值		28.5	34.227	8.106	7.29	113	1.15	0.08	0.42	14.5	0.29
平均值		28.1	33.323	8.057	6.59	102	0.70	0.05	0.16	6.12	0.16
偏差值		0.3	1.146	0.033	0.37	5.7	0.32	0.02	0.17	5.59	0.09

續表2-4　低放貯存場附近海域民國110年第1次~111年第4次水文暨水質化學資料

111年第1次(111年3月3日)

測站	採樣時間	溫度	鹽度	pH, 25℃	DO	DO	NO_3^-	NO_2^-	PO_4^{-3}	SiO_2	chl.a
		℃		total ion	mg/l	%	μM	μM	μM	μM	μg/l
排水口1	18:32	25.1	34.550	8.056	6.30	93	1.61	0.05	0.05	1.76	0.08
排水口2	18:15	24.8	34.526	8.048	6.42	95	0.87	0.04	0.06	1.53	0.14
排水口3	18:00	24.9	34.541	8.056	6.44	95	0.81	0.03	0.08	1.93	0.08
碼頭內	17:43	25.5	34.374	8.070	6.75	101	0.84	0.05	0.08	5.00	0.06
碼頭外	17:36	25.7	34.449	8.070	6.58	98	0.74	0.04	0.08	3.38	0.05
漁人村	19:08	24.8	32.731	8.018	6.32	93	1.81	0.05	0.31	16.84	0.12
漁人村Repeat	19:17	25.0	33.053	8.024	6.38	94	1.45	0.04	0.24	13.90	0.18
最小值		24.8	32.731	8.018	6.30	93	0.74	0.03	0.05	1.53	0.05
最大值		25.7	34.550	8.070	6.75	101	1.81	0.05	0.31	16.84	0.18
平均值		25.1	34.032	8.049	6.45	95	1.16	0.04	0.13	6.33	0.10
偏差值		0.4	0.787	0.021	0.16	2.9	0.45	0.01	0.10	6.34	0.05

111年第2次(111年5月19日)

測站	採樣時間	溫度	鹽度	pH, 25℃	DO	DO	NO_3^-	NO_2^-	PO_4^{-3}	SiO_2	chl.a
		℃		total ion	mg/l	%	μM	μM	μM	μM	μg/l
排水口1	07:31	27.0	33.947	8.021	6.19	100	1.24	0.04	0.10	2.24	0.12
排水口2	07:13	26.9	33.879	8.009	6.20	99	1.17	0.04	0.09	2.02	0.08
排水口3	06:53	26.7	33.312	7.980	6.03	97	3.35	0.05	0.16	11.82	0.06
碼頭內	07:57	27.0	30.957	8.036	5.87	95	2.12	0.05	0.18	29.14	0.03
碼頭外	07:49	27.1	31.732	8.030	6.01	97	1.82	0.09	0.15	27.82	0.08
漁人村	08:20	27.4	32.094	8.031	6.24	101	3.10	0.08	0.36	13.52	0.12
漁人村Repeat	08:27	27.3	32.033	8.029	6.21	100	3.22	0.09	0.37	13.96	0.11
最小值		26.7	30.957	7.980	5.87	95	1.17	0.04	0.09	2.02	0.03
最大值		27.4	33.947	8.036	6.24	101	3.35	0.09	0.37	29.14	0.12
平均值		27.1	32.565	8.019	6.11	98	2.29	0.06	0.20	14.36	0.09
偏差值		0.2	1.153	0.020	0.14	2.3	0.94	0.02	0.12	10.85	0.03

111年第3次(111年8月16日)

測站	採樣時間	溫度	鹽度	pH, 25℃	DO	DO	NO_3^-	NO_2^-	PO_4^{-3}	SiO_2	chl.a
		℃		total ion	mg/l	%	μM	μM	μM	μM	μg/l
排水口1	11:04	31.1	33.929	8.198	9.33	126	0.69	0.05	0.10	3.07	0.13
排水口2	10:42	31.7	34.023	8.170	8.82	120	0.41	0.05	0.09	2.28	0.08
排水口3	10:18	30.8	33.986	8.167	8.23	110	1.15	0.05	0.12	3.58	0.09
碼頭內	11:58	32.0	33.979	8.082	8.04	110	1.26	0.04	0.11	3.98	0.03
碼頭外	11:45	31.1	34.096	8.092	7.83	106	0.97	0.04	0.09	2.22	0.02
漁人村	12:39	31.5	33.577	8.258	8.32	113	0.64	0.08	0.15	5.05	0.10
漁人村Repeat	12:52	33.0	32.531	8.262	8.93	125	3.00	0.08	0.41	16.33	0.19
最小值		30.8	32.531	8.082	7.83	106	0.41	0.04	0.09	2.22	0.02
最大值		33.0	34.096	8.262	9.33	126	3.00	0.08	0.41	16.33	0.19
平均值		31.6	33.732	8.176	8.50	116	1.16	0.05	0.15	5.21	0.09
偏差值		0.8	0.555	0.072	0.54	7.9	0.86	0.02	0.12	5.00	0.06

111年第4次(111年11月15日)

測站	採樣時間	溫度	鹽度	pH, 25℃	DO	DO	NO_3^-	NO_2^-	PO_4^{-3}	SiO_2	chl.a
		℃		total ion	mg/l	%	μM	μM	μM	μM	μg/l
排水口1	10:42	26.7	32.891	8.155	8.31	125	1.86	0.04	0.13	10.51	0.11
排水口2	10:20	26.7	33.613	8.077	7.33	111	1.00	0.03	0.12	2.52	0.06
排水口3	09:56	26.5	33.674	8.051	7.01	106	0.86	0.02	0.12	2.18	0.07
碼頭內	11:26	27.2	31.809	7.997	6.49	98	2.92	0.05	0.23	25.34	0.08
碼頭外	11:01	27.6	33.236	8.024	6.48	99	2.30	0.03	0.17	9.68	0.04
漁人村	11:55	27.3	30.825	8.112	7.68	115	3.82	0.06	0.48	19.46	0.18
漁人村Repeat	12:06	27.1	30.967	8.109	7.46	112	4.30	0.06	0.48	20.29	0.16
最小值		26.5	30.825	7.997	6.48	98	0.86	0.02	0.12	2.18	0.04
最大值		27.6	33.674	8.155	8.31	125	4.30	0.06	0.48	25.34	0.18
平均值		27.0	32.431	8.075	7.25	109	2.44	0.04	0.25	12.86	0.10
偏差值		0.4	1.219	0.055	0.66	9.5	1.32	0.01	0.16	9.05	0.05




圖 2-9 研究區域暨採樣點位置圖




圖2-10　在蘭嶼附近1000 公尺以淺之流速分佈斷面圖。(引用Chen *et al*., 2021)





圖2-11 110年第1次~ 111年第4次於低放貯存場附近海域採樣時之衛星海表水溫分佈圖。



續圖2-11 110年第1次~ 111年第4次於低放貯存場附近海域採樣時之衛星海表水溫分佈圖。




圖2-12 低放貯存場附近海域72年7月~111年11月硝酸鹽、磷酸鹽以及矽酸鹽分別對鹽度作圖








圖2-13 低放貯存場附近海域72年7月~111年11月N/P比值圖







附圖2-1 電廠運轉前(a)及運轉後(b)四測站水層水溫在各月份的平均值,
其中14站為0～25公尺平均值, 其他為0-10公尺平均值











附圖2-2 四個測站在電廠運轉前、後各月份的平均值。
(其中14站為0～25公尺平均值, 其他為0-10公尺平均值)


運轉前時間: 68年7月～73年4月
運轉後時間: 73年5月～111年12月




附圖2-3 24站水溫在電廠運轉前後與16、18、19、23站比較




附圖2-4 75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域溫度變化圖







附圖2-5 測站22與24表水水溫之sin 曲線變化圖




附圖2-6 測站24、22、18之間的水溫差距




附圖 2-7 第三核能發電廠附近海域 7 站表水各月份的平均值 (75年至今)與WOCE測站比較




附圖2-8 75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域鹽度變化圖




附圖2-9 75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域pH變化圖




附圖2-10 75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域溶氧飽和度變化圖




附圖2-11 75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域硝酸鹽變化圖




附圖2-12 75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域亞硝酸鹽變化圖




附圖2-13 75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域磷酸鹽變化圖




附圖2-14　75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域矽酸鹽變化圖




附圖2-15 75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域葉綠素甲變化圖




附圖2-16 低放貯存場附近海域72年7月~111年11月溫度之變化圖




附圖2-17 低放貯存場附近海域72 年7月～ 111年11月各測站溫度平均值與sin曲線變化圖




附圖2-18 低放貯存場附近海域72年7月~111年11月鹽度之變化圖



附圖2-19 低放貯存場附近海域72年7月~111年11月pH之變化圖



附圖2-20 低放貯存場附近海域72年7月~111年11月溶氧量之變化圖



附圖2-21 低放貯存場附近海域72年7月~111年11月溶氧飽和度之變化圖





圖2-22 低放貯存場附近海域72年7月~111年11月硝酸鹽之變化圖



附圖2-23 低放貯存場附近海域72年7月~111年11月亞硝酸鹽之變化圖







圖2-24 低放貯存場附近海域72年7月~111年11月磷酸鹽之變化圖




附圖2-25 低放貯存場附近海域72年7月~111年11月矽酸鹽之變化圖



附圖2-26 低放貯存場附近海域6測站表水溫度在各月份的平均值(72年至今)及與WOCE測站比較



附圖2-27 低放貯存場附近海域6測站表水鹽度在各月份的平均值(72年至今)及與WOCE測站比較附2-22



附圖2-28 低放貯存場附近海域6測站表水pH在各月份的平均值(72年至今)及與WOCE測站比較

參、植物性及動物性浮游生物調查

一、計畫目的與緣起

浮游生物在水域環境中是扮演著初級生產者，以及初級或次級消費者的角色，它們是海洋生態系中能量傳遞環的起始者。太陽能經由植物性浮游生物(浮游藻)的光合作用，捕捉來自宇宙的能量，轉為自身的能量並生長，然後再被動物性浮游生物捕食，將能量傳遞至高一階的營養階層。所以浮游藻的豐沛與否，會影響以它們為食之草食性浮游動物之出現和分佈；動物性浮游生物數量的變動亦會間接影響以它為食的高一階海洋生物的生長和活存。此外，動物性浮游生物本身不僅為許多魚蝦類的餌料，同時其組成中亦包含著魚蝦貝類的浮游幼生，因而由其數量的多寡亦可窺附近海域生物資源之榮枯。

本計畫仍延續過去在此海域設定之長期監測站，進行浮游生物之種類組成，豐度和密度的季節變化等海洋生態背景資料之收集及監測工作。此外，並配合同步採集之水質及水文資料，分析其與此海域浮游生物間的相關性。

二、文獻回顧

核電廠的運轉對浮游生物的影響，包括水溫的升高、強氧化劑(氯)的使用、法規許可下之放射性物質的排放及汲取的機械傷害等四方面。

溫度的升高對植物性浮游生物的影響，根據 Perissinotto 和 Wooldridge (1989)的研究報告指出在核電廠附近水域會因溫排水排放造成植物性浮游生物的減少及葉綠素 a 的下降。Briand (1975)的研究報告亦指出在出水口的植物性浮游性生物密度較入水口少 41.7%，且當環境的溫度上升愈多，植物性浮游生物的死亡率也愈高，同時入出水口的溫度差(Δt)愈大，植物性浮游生物的死亡率也愈高。此外，藻類的死亡也因藻種而異，一般而言，矽藻的死亡率會高於甲藻。然而，在環境溫度較低的季節裡，溫排水有促使植物性浮游生物生長的功用。這些現象在 Reetz (1982, in 閻 1995)對美國密蘇里河上的 Cooper 和 Fort Calhoun 二座電廠電廠所作的研究中，亦發現在夏季普遍存在出水口處之葉綠

素 a 較入水口少 12~17%，而冬季則呈現增 7%的情形。此外，他亦發現出水口的水溫高於 32°C 時，植物性浮游生物的光合作用便受到抑制，當然植物性浮游生物在高溫停留的時間愈長，光合作用的抑制率便愈高。除了微藻密度的變化外，藻種組成亦會發生改變。廣東大亞灣核電廠附近海域在 1982~2005 年夏季的研究中，發現當水溫高於 35°C 或與對照測站的溫差達到 3.7°C 以上時，甲藻類便明顯增加，此外，優勢藻種亦由營運前的角刺藻屬(矽藻類)轉變為海線藻屬(矽藻類)和角藻屬(甲藻類)(Li *et al.*, 2011)。

溫度對動物性浮游生物的影響，一般認為通過冷卻系統的動物性浮游生物會有很高的死亡率(Huh, 1980; Evan *et al*., 1986)。這些動物性浮游生物的死亡率不僅在不同的研究、不同的電廠變化很大(3~40%的死亡率)，即使是同一個核電廠在不同時間的研究亦有很大的變化，如韓國 Kori 電廠，研究者估計其動物性浮游生物的死亡率在 36~78%之間(Huh, 1980)。

餘氯對植物性浮游生物的生長及光合作用速率皆會有影響，造成出水口處之光合作用速率較進水口下降 7% (Hamilton *et al.*, 1976)，過去研究中亦指出在美國加州沿岸的 San Onofre 核電廠的研究中，水中餘氯含量在 24 小時內由 0.10 mol/L 下降至 0.005 mol/L，便會造成 14%光合作用速率的下降(Eppley *et al*., 1976)，而在美國明尼蘇達州 Allen S. King 電廠，餘氯達 320 μg/L，即會使光合作用速率下降 50% (Brook & Baker, 1972)。

水中餘氯同樣會使動物性浮游生物致死。Chardy (1989)研究美國馬里蘭州的 Chesapeake 海灣中的橈腳類，發現餘氯為 0.5 mol/L 時，即造成橈腳類的大量死亡。

汲取機械力對植物性浮游生物的影響小，反而因汲取造成水中營養鹽的充份混和，而有助於植物性浮游生物對營養鹽的利用，促進其生長(Reetz, 1982 in 閻 1995)。但是汲取機械力對動物性浮游生物而言，會造成極大的傷害。從 Carpenter 等人(1974)及 Evans 等人(1986)，分別對美國長島 Millstone Point 及 Donald C. Cook 核電廠所做的研究，發現這些機械應力對動物性浮游生物會造成高達 70%以上的死亡率。

至於放射性物質對浮游生物的影響，到目前為止尚未有文獻記載。

綜合以上文獻的回顧得知，核電廠的運轉對浮游生物而言，無論是溫度的昇高、餘氯的存在以及汲取的機械應力，大多具有負面的影響，然而在氣溫較低的季節裡，適當的溫排水以及機械應力可能有助於浮游生物生長的。

三、研究方法與進度說明

在第三核能發電廠附近海域的 8 個監測站，如圖 3-1 所示的 12、14、18、20、21、22、23、24 等測站，除測站 14 外，本計劃皆與水質和水文調查同步進行動物性浮游生物及植物性浮游生物的採集調查工作，將測站 18、20、21 做為對照測站(距出水口分別約 3、6 和 8 公里)，與接近第三核能發電廠入出水口的測站(測站 22、23、24)做為監測測站進行分析比較，此外，測站 14 和 12(距出水口分別約 1 和 2 公里)則依海流調查計劃的結果，設定作為監測溫排水擴散之對照測站。其詳細的採集方法如下：

3.1 植物性浮游生物

自 96 年度起，植物性浮游生物亦修正以環保署公告之分析方法實施，然而為兼顧與歷史資料的比對及連貫性，同時採用新舊兩種方法進行分析，詳細步驟分述如下。

3.1.1 環保署公告之分析方法－沈澱法 (NIEA E505.50C)

在每一測站以塑膠廣口瓶採取表層 1 公升的海水，滴入 Lugol's solution 數滴固定後，攜回實驗室經 24 小時充分沈澱後，抽取底部 100 毫升的沈澱液，再進行二次沈澱，之後以倒立顯微鏡進行鑑種，計數各種藻類單位水體積中之細胞數(密度，cells/l)以及其數量百分比等分析工作。

3.1.2 原分析方法－過濾濃縮法

在每一測站以採水器採取表層 20 公升的海水，經 55 μm 的濾網過濾後，濃縮成 70-100 毫升，並以 Lugol's solution 數滴固定後，置於褐色塑膠瓶中，攜

回實驗室進行鑑種，並計數各種藻類單位水體積中之細胞數(密度，cells/l)以及其數量百分比等分析工作。

3.2 動物性浮游生物

本研究中動物性浮游生物檢測方法自民國 94 年起，依照環保署於民國 93 年 2 月 19 日公告之海洋浮游動物檢測法（NIEA E701.20C）修正進行。以北太平洋標準網(NORPAC，網口直徑 45 公分、網長 180 公分、網目 330 μm)在每一個監測站分別進行水平及垂直拖網各二次，網口裝置流量計以估算流經網口之實際水量。採得之樣品，以 5%中性福馬林溶液固定保存攜回實驗室中，再以分樣器(Plankton divider)取得適當的子樣品，進行濕重(Wet wt., g/1000 m^3)，乾重(Dry wt., g/1000 m^3)，排水容積量(Displacement vol., ml/1000 m^3)及沉澱量(Settling vol., ml/1000 m^3)等生物量(Biomass)以及雜質含量(Impurity)之測定。此外，並將樣品置於立體解剖顯微鏡下分類計數，在民國 93 年以前計數項目分為 24 大類，然而自民國 94 年起則依環保署公告之方法增列為 34 大類，分別為(1)夜光蟲(*Noctiluca*)，(2)有孔蟲(Foraminifera)，(3)放射蟲(Radiolaria)，(4)水母(Medusa)，(5)管水母(Siphonophore)，(6)櫛水母(Ctenophora)，(7)枝角類(Cladocera)，(8)橈足類幼生(Copepoda nauplius)，(9)哲水蚤(Calanoida)，(10)劍水蚤(Cyclopoida)，(11)猛水蚤(Harpacticoida)，(12)端腳類(Amphipoda)，(13)大眼幼生(Crab megalopa)，(14)蟹幼生(Crab larvae)，(15)蝦幼生(Shrimp larvae)，(16)糠蝦類(Mysidacea)，(17)磷蝦類(Euphausiacea)，(18)櫻蝦類(Sergestidae)，(19)螢蝦類(Luciferinae)，(20)其他十足類(Other Decapoda)，(21)介形類(Ostracoda)，(22)翼足類(Pteropoda)，(23)異足類(Heteropoda)，(24)頭足類幼生(Cephalopoda larvae)，(25)二枚貝(Bivalvia)，(26)毛顎類(Chaetognatha)，(27)有尾類(Appendicularia)，(28)海樽類(Thaliacae)，(29)多毛類(Polychaeta)，(30)藤壺幼生(Barnacle nauplius)，(31)棘皮動物幼生(Echinodermata larvae)，(32)魚卵(Fish eggs)，(33)仔魚(Fish larvae)以及(34)其他類(Others)等。為求得更準確的種類組成，計數個體數也由民國 93 年以前的至少 1,000 個，自民國 94 年起增加為至少計數 2,000 個，分類計數後，估算各大類及全部總合的豐度(Abundance, ind./m^3)，以及各大類的出現百分率(Occurence, %)。

四、目前研究成果

此次報告包括四次採樣的調查結果，日期分別為 110 年 2 月 26 日、5 月 14 日、8 月 17 日和 11 月 5 日，111 年 2 月 16 日、5 月 5 日、8 月 12 日和 11 月 17 日。表 3-1~16 為植物性浮游生物之種類組成，密度及數量百分比的分析結果，表 3-17~32 為動物性浮游生物之各大類豐度、出現百分率及生物量的調查分析結果。以北太平洋標準網拖網所得動物性浮游生物標本中的雜質含量在季節及測站間的變動範圍很大。110 年第 1 次為 1.2~15.7%，第 2 次介於 1.8~18.3%，第 3 次介於 2.3~34.3%，第 4 次介於 1.9~34.2%，111 年第 1 次為 0.3~37.9%，第 2 次介於 0.0~20.0%，第 3 次介於 2.4~33.0%，第 4 次介於 3.9~32.5%。由於雜質含量的多寡會造成其他量測動物性浮游生物生物量的方法，如乾重、濕重、沉澱量及排水容積量等測定的誤差，因此為求準確性，在歷年動物性浮游生物變化趨勢上皆採用豐度來作比較(表 3-17~32)。

4.1 入出水口及其擴散測站的豐度差異與多樣性分析

4.1.1 植物性浮游生物-環保署公告之沈澱法

民國 110 年第 1 次調查所記錄到植物性浮游生物的種類共有 14 屬 19 種，總平均密度為 49 cells/l，入水口高於出水口測站(60 比 20 cells/l)，且無離出水口愈遠密度遞減或增的現象(表 3-1，圖 3-2)。入出水口測站(22 和 24 測站)和擴散測站(距岸依序為 24、14、12 測站)的植物性浮游生物之優勢度指數(Simpson's Dominance Index)、均勻度指數(Evenness) 和歧異度指數(Shannon-Weiner Index)，在 22 測站(入水口)呈現最低的優勢度，最高的歧異度和較低的均勻度，其他測站因密度和種類較少，致三項指數相近 (表 3-1)。

民國 110 年第 2 次調查所記錄到植物性浮游生物的種類共有 9 屬 12 種，總平均密度為 39 cells/l，入水口高於出水口測站(40 比 25 cells/l)，擴散測站有向外增加的趨勢(表 3-2，圖 3-2)。植物性浮游生物的優勢度指數(Simpson's Dominance Index)為出水口測站較高(0.3750 比 0.6800)，歧異度指數(Shannon-Weiner Index) 和均勻度指數(Evenness)則為入水口高於出水口測站(分別為

1.0397 比 0.5004，0.9464 比 0.7219)，擴散測站之優勢度有向外遞減趨勢以 24 測站最高，歧異度和均勻度則是呈向外遞增趨勢，以 12 測站較高(表 3-2)。

民國 110 年第 3 次調查所記錄到植物性浮游生物的種類共有 10 屬 13 種，總平均密度為 83 cells/l，入水口低於出水口測站(60 比 100 cells/l)，擴散測站無明顯增加或減少的趨勢(表 3-3，圖 3-2)。植物性浮游生物的優勢度指數(Simpson's Dominance Index) 和均勻度指數(Evenness)為入出水口測站相近，歧異度指數(Shannon-Weiner Index)則為入水口低於出水口測站(為 1.2425 比 1.6094)，擴散測站之優勢度、歧異度和均勻度則無明顯遞增或遞減趨勢，優勢度為 14 測站較高，歧異度和均勻度均以 12 測站較高(表 3-3)。

民國 110 年第 4 次調查所記錄到植物性浮游生物的種類共有 10 屬 18 種，總平均密度為 581 cells/l，入水口等於出水口測站(550 cells/l)，無離出水口愈遠豐度遞增或遞減之現象(表 3-4，圖 3-2)。植物性浮游生物的優勢度指數(Simpson's Dominance Index)為入水口測站較高(0.2205 比 0.1762)，歧異度指數(Shannon-Weiner Index)則為入水口低於出水口測站(1.7431 比 2.0620)，均勻度指數(Evenness)為入出水口測站相近，擴散測站之優勢度、歧異度和均勻度則無明顯遞增或遞減趨勢，優勢度為 14 測站較高，歧異度和均勻度均以 24 測站較高(表 3-4)。

民國 111 年第 1 次調查採樣後，沉澱法樣品因冰箱毀損造成測站 12、18、23 和 24 的樣本失效，其餘 14、20、21 和 22 沉澱法樣本所記錄到植物性浮游生物的種類共有 19 屬 26 種，總平均密度為 21 cells/l (表 3-5，圖 3-3)。植物性浮游生物的優勢度指數(Simpson's Dominance Index)以 21 測站的 0.1856 最高，20 測站的 0.0944 最低，歧異度指數(Shannon-Weiner Index)則以 21 測站的 1.8582 最低，20 測站的 2.5325 最高，均勻度指數(Evenness)以入出水口測站的 0.9386 最高，21 測站的 0.8936 最低 (表 3-5)。

民國 111 年第 2 次調查所記錄到植物性浮游生物的種類共有 31 屬 55 種，總平均密度為 678 cells/l，入水口(1,730 cells/l)高於出水口測站(370 cells/l)，離出水口愈遠豐度遞增之現象(表 3-6，圖 3-3)。植物性浮游生物的優勢度指數

(Simpson's Dominance Index)為入水口低於出水口測站(0.0874 比 0.1118)，歧異度指數(Shannon-Weiner Index)則為入水口高於出水口測站(2.8923 比 2.5715)，均勻度指數(Evenness)為入出水口測站相近，擴散測站之優勢度、歧異度和均勻度則無明顯遞增或遞減趨勢，優勢度為 14 測站較高，歧異度以 12 測站較高，均勻度出水口測站和兩個擴散測站相近(表 3-6)。

民國 111 年第 3 次調查所記錄到植物性浮游生物的種類共有 27 屬 45 種，總平均密度為 685 cells/l，入水口(890 cells/l)相近於出水口測站(810 cells/l)，無離出水口愈遠豐度遞增或遞減之現象(表 3-7，圖 3-3)。植物性浮游生物的優勢度指數(Simpson's Dominance Index)為入水口高於出水口測站(0.1312 比 0.1004)，歧異度指數(Shannon-Weiner Index)為入出水口測站相近，均勻度指數(Evenness)為入水口低於出水口測站(0.8330 比 0.8788)，擴散測站之均勻度有向外遞增至 12 測站的趨勢，優勢度為出水口測站和兩個擴散測站相近，歧異度以出水口測站較高(表 3-7)。

民國 111 年第 4 次調查所記錄到植物性浮游生物的種類共 19 屬 32 種，總平均密度為 187cells/l，入水口(160 cells/l)相近於出水口測站(140 cells/l)，無離出水口愈遠豐度遞增或遞減之現象(表 3-8，圖 3-3)。植物性浮游生物的優勢度指數(Simpson's Dominance Index)為入水口低於出水口測站(0.0938 比 0.1327)，歧異度指數(Shannon-Weiner Index)為入水口高於出水口測站(2.4260 比 2.1066)，，均勻度指數(Evenness)為入出水口測站相近，擴散測站之優勢度、歧異度和均勻度則無明顯遞增或遞減趨勢，優勢度為 14 測站較高，歧異度和均勻度以 12 測站較高(表 3-8)。

4.1.2 植物性浮游生物-原過濾濃縮法分析

民國 110 年第 1 次調查所記錄到植物性浮游生物的種類共有 16 屬 30 種，總平均密度為 123 cells/l，入水口高於出水口測站(175 比 90 cells/l)，無離出水口愈遠密度遞增或遞減的現象(表 3-9，圖 3-4)。植物性浮游生物的優勢度指數(Simpson's Dominance Index) 和均勻度指數(Evenness)均為入水口低於出水口測站(分別為 0.1118 比 0.1296，0.8940 比 0.9603)，歧異度指數(Shannon-Weiner

Index)則為入水口高於出水口測站(為 2.4209 比 2.1100)，擴散測站之均勻度有 24 測站向外遞減至 12 測站趨勢，優勢度則為 14 測站較高，歧異度以 12 測站較高 (表 3-9)。

民國 110 年第 2 次調查所記錄到植物性浮游生物的種類共有 13 屬 19 種，總平均密度為 107 cells/l，入水口高於出水口測站(140 比 65 cells/l)，擴散測站有向外增加的趨勢(表 3-10，圖 3-4)。植物性浮游生物的優勢度指數(Simpson's Dominance Index) 和均勻度指數(Evenness)均為入水口低於出水口測站(分別為 0.1403 比 0.1716，0.8964 比 0.9479)，歧異度指數(Shannon-Weiner Index)則為入水口高於出水口測站(為 2.1495 比 1.8446)，擴散測站之優勢度、歧異度和均勻度則無明顯遞增或遞減趨勢，優勢度為 14 測站較高，歧異度以 12 測站較高和均勻度以 24 測站較高(表 3-10)。

民國 110 年第 3 次調查所記錄到植物性浮游生物的種類共有 11 屬 16 種，總平均密度為 130 cells/l，入水口高於出水口測站(155 比 115 cells/l)，無離出水口愈遠密度遞增或遞減的現象(表 3-11，圖 3-4)。植物性浮游生物的優勢度指數(Simpson's Dominance Index) 為入水口高於出水口測站(分別為 0.1634 比 0.1531)， 歧異度指數(Shannon-Weiner Index)和均勻度指數(Evenness)皆為入水口低於出水口測站(依序分別為 1.9520 比 2.0138，0.8884 比 0.9165)，擴散測站無明顯增加或減少的趨勢，優勢度以 14 測站較高，歧異度以 24 測站較高和均勻度以 12 測站較高 (表 3-11)。

民國 110 年第 4 次調查所記錄到植物性浮游生物的種類共有 17 屬 29 種，總平均密度為 1,035 cells/l，入水口相似於出水口測站(1,310 比 1,295 cells/l)，有離出水口愈遠豐度遞減的現象(表 3-12，圖 3-4)。植物性浮游生物的優勢度指數(Simpson's Dominance Index) 為入水口高於出水口測站(分別為 0.2522 比 0.1657)，歧異度指數(Shannon-Weiner Index)和均勻度指數(Evenness)皆為入水口低於出水口測站(依序分別為 1.7615 比 2.0886，0.6868 比 0.7914)，擴散測站無明顯增加或減少的趨勢，優勢度以 14 測站較高，歧異度和均勻度同以 24 測站較高(表 3-12)。

民國 111 年第 1 次調查所記錄到植物性浮游生物的種類共有 33 屬 60 種，總平均密度為 67 cells/l，入水口高於出水口測站(100 比 51 cells/l)，無離出水口愈遠豐度遞減的現象(表 3-13，圖 3-5)。植物性浮游生物的優勢度指數(Simpson's Dominance Index) 和均勻度指數(Evenness) 為入出水口測站相近，歧異度指數(Shannon-Weiner Index)為入水口高於出水口測站(分別為 2.8789 比 2.5958)，擴散測站無明顯增加或減少的趨勢，優勢度以出水口測站較高，歧異度和均勻度同以 14 測站較高(表 3-13)。

民國 111 年第 2 次調查所記錄到植物性浮游生物的種類共有 15 屬 31 種，總平均密度為 1,250 cells/l，入水口高於出水口測站(1,595 比 920 cells/l)，無離出水口愈遠豐度增加或遞減的現象(表 3-14，圖 3-5)。植物性浮游生物的優勢度指數(Simpson's Dominance Index)、歧異度指數(Shannon-Weiner Index)和均勻度指數(Evenness)為入出水口測站相近，擴散測站無明顯增加或減少的趨勢，優勢度以 14 測站較高，歧異度以 12 測站較高，均勻度以出水口測站較高(表 3-14)。

民國 111 年第 3 次調查所記錄到植物性浮游生物的種類共有 31 屬 57 種，總平均密度為 1,403 cells/l，入水口高於出水口測站(2,765 比 1,250 cells/l)，無離出水口愈遠豐度增加或遞減的現象(表 3-15，圖 3-5)。植物性浮游生物的優勢度指數(Simpson's Dominance Index)為入水口低於出水口測站(分別為 0.1751 比 0.1944)、歧異度指數(Shannon-Weiner Index)為入水口高於出水口測站(分別為 2.4835 比 2.3054)和均勻度指數(Evenness)為入出水口測站相近，擴散測站無明顯增加或減少的趨勢，優勢度以出水口測站較高，歧異度和均勻度以 14 測站較高(表 3-15)。

民國 111 年第 4 次調查所記錄到植物性浮游生物的種類共有 37 屬 68 種，總平均密度為 427 cells/l，入水口低於出水口測站(85 比 400 cells/l)，無離出水口愈遠豐度增加或遞減的現象(表 3-16，圖 3-5)。植物性浮游生物的優勢度指數(Simpson's Dominance Index)為入水口高於出水口測站(分別為 0.1280 比 0.0978)、歧異度指數(Shannon-Weiner Index)為入水口低於出水口測站(分別為 2.2316 比 2.8453)和均勻度指數(Evenness)為為入水口高於出水口測站(分別為 0.9307 比 0.8286)，擴散測站無明顯增加或減少的趨勢，優勢度以 14 測站較高，歧異度和均勻度以 12 測站較高(表 3-16)。

4.1.3 動物性浮游生物

民國 110 年第 1 次調查(2 月)測站間動物性浮游生物水平採樣豐度為入水口低於出水口測站(192 比 1,326 個/m^3)，有離出水口愈遠豐度遞減的現象；垂直採樣豐度同為入水口豐度低於出水口測站(724 比 1,539 個/m^3)，但無離出水口愈遠豐度遞減的情形(圖 3-6) (表 3-17~18)。

民國 110 年第 2 次調查(5 月)測站間動物性浮游生物水平採樣豐度為入水口相似於出水口測站 (518 比 464 個/m^3)，無離出水口愈遠豐度遞增的情形；垂直採樣的入水口豐度相近於出水口測站(1,058 比 1,038 個/m^3)，亦無離出水口愈遠豐度遞增的現象(圖 3-6) (表 3-19~20)。

民國 110 年第 3 次調查(8 月)測站間動物性浮游生物水平採樣豐度為入水口相似於出水口測站(1,074 比 954 個/m^3)，有離出水口愈遠豐度遞減的情形；垂直採樣為入水口豐度低於出水口測站(1,193 比 2,378 個/m^3)，無離出水口愈遠豐度遞減的現象(圖 3-6) (表 3-21~22)。

民國 110 年第 4 次調查(11 月)測站間動物性浮游生物水平採樣豐度為入水口稍低於出水口測站(105 比 195 個/m^3)，無離出水口愈遠豐度遞減的情形；垂直採樣同為入水口豐度低於出水口測站(425 比 1,341 個/m^3)，有離出水口愈遠豐度遞減的現象(圖 3-6) (表 3-23~24)。

民國 111 年第 1 次調查(2 月)測站間動物性浮游生物水平採樣豐度為入水口高於出水口測站(288 比 241 個/m^3)，有離出水口愈遠豐度遞減的情形；垂直採樣同為入水口豐度高於出水口測站(592 比 392 個/m^3)，無離出水口愈遠豐度遞減的現象(圖 3-7) (表 3-25~26)。

民國 111 年第 2 次調查(5 月)測站間動物性浮游生物水平採樣豐度為入水口低於出水口測站(279 比 457 個/m^3)，有離出水口愈遠豐度遞減的情形；垂直採樣同為入水口豐度低於出水口測站(479 比 1,636 個/m^3)，有離出水口愈遠豐度遞減的現象(圖 3-7) (表 3-27~28)。

民國 111 年第 3 次調查(8 月)測站間動物性浮游生物水平採樣豐度為入水口高於出水口測站(108 比 76 個/m^3)，無離出水口愈遠豐度遞減的情形；垂直採樣為入水口豐度低於出水口測站(347 比 553 個/m^3)，有離出水口愈遠豐度遞減的現象(圖 3-7) (表 3-29~30)。

民國 111 年第 4 次調查(11 月)測站間動物性浮游生物水平採樣豐度為入水口高於出水口測站(534 比 443 個/m^3)，無離出水口愈遠豐度遞減或遞增的情形；垂直採樣同為入水口豐度高於出水口測站(1,139 比 620 個/m^3)，有離出水口愈遠豐度遞增的現象(圖 3-7) (表 3-31~32)。

4.2 對照與監測測站結果比較與群聚相似度分析

本小節之統計分析為使各季節樣本數相同，去除各月份(季節)因樣本數差異所造成的誤差，每年取四季次各八站共 32 組之採樣數據，進行相似度計算及群聚分析。

4.2.1 植物性浮游生物-環保署公告之沈澱法

民國 110 年植物性浮游生物四次調查的平均密度，在第 1 和 4 次為對照測站高於監測測站，第 2 和 3 次則反之(四次依序為 77 比 40、28 比 52、67 比 90、670 比 570 個/m^3) (表 3-33)。進一步以 PRIMER 軟體進行群聚分析，且經由 ANOSIM 檢驗(Global R= 0.699，$p<0.01$)檢驗分群後，從樹狀圖(圖 3-8)可看出月份分群明顯，大致可分成 2 月群、5&8 月群、11 月群三群，各月對照和監測測站藻種組成並無顯著差異，其中 11 月藻種組成有顯著較多的旋鏈角刺藻(*Chaetoceros curvisetus*)和並基角刺藻(*Chaetoceros decipiens*)，集中成一群，而 5&8 月則是有顯著比例較高的紅海束毛藻(*Trichodesmium erythraeum*)，2 月獨有新月筒柱藻(*Cylindrotheca closterium*)。

民國 111 年植物性浮游生物四次調查的平均密度除第 1 次有四個測站樣本無效不列入討論外，第 2、3 和 4 次均為對照測站低於監測測站 (第 2~4 次依序為 630 比 790、677 比 847、103 比 187 個/m^3) (表 3-33)。進一步以 PRIMER 軟體進行群聚分析，且經由 ANOSIM 檢驗(Global R= 0.731，$p<0.01$)檢驗分群後，

從樹狀圖(圖 3-9)可看出月份分群明顯，大致可分成 2 月群、5&8 月群、11 月群三群，各月對照和監測測站藻種組成並無顯著差異，其中 11 月藻種組成有較多的斯托幾內亞藻 (*Guinardia striata)* 和柔弱幾內亞藻 (*Guinardia delicatula*)，而 5&8 月則是有較高的斯托幾內亞藻和丹麥細柱藻(*Leptocylindrus danicus)*，2 月則是有較多的菱形藻(*Nitzschia* spp.)和多甲藻(*Protoperidinium* spp.)。

4.2.2 植物性浮游生物-原過濾濃縮法分析

民國 110 年四次調查的平均密度為對照測站低於監測測站(四次依序為 82 比 132、63 比 143、117 比 147、972 比 1,175 個/m^3) (表 3-33)。進一步以 PRIMER 軟體進行群聚分析，且經由 ANOSIM 檢驗(Global R= 0.895，$p<0.01$)檢驗分群後，從樹狀圖(圖 3-10)可看出月份分群明顯，分成 2 月群、5&8 月群、11 月群三群，各月對照和監測測站藻種組成並無顯著差異，各群的優勢藻種不同，11 月藻種組成有顯著較多的旋鏈角刺藻(*Chaetoceros curvisetus*)，5&8 月則是有顯著比例較高的紅海束毛藻(*Trichodesmium erythraeum*)和少量的旋鏈角刺藻(*Chaetoceros curvisetus*)，而 2 月藻種最多，但優勢藻屬不明顯。

民國 111 年植物性浮游生物四次調查的平均密度均為對照測站低於監測測站 (第 1~4 次依序為 66 比 80、1,190 比 1,340、1,137 比 1,738、202 比 688 個/m^3) (表 3-33)。進一步以 PRIMER 軟體進行群聚分析，且經由 ANOSIM 檢驗(Global R= 0.713，$p<0.01$)檢驗分群後，從樹狀圖(圖 3-11)可看出月份分群明顯，大致可分成 2 月群、5 月群、8 月群、11 月群四群，各月對照和監測測站藻種組成並無顯著差異，其中 2 月藻種組成同時有較多的並基角刺藻(*Chaetoceros decipiens)*和小輻桿藻(*Bacteriastrum minus)*，5 月同時有較高的並基角刺藻和紅海束毛藻(*Trichodesmium erythraeum*)，8 月同時有較多的小輻桿藻(*Bacteriastrum minus*)和長輻桿藻(*Bacteriastrum elongatum*)，11 月同時有較多的並基角刺藻和長輻桿藻(*Bacteriastrum elongatum*)。

4.2.3 動物性浮游生物

民國 110 年四次調查動物性浮游生物水平採樣的平均豐度皆為對照測站低於監測測站 (四次依序為 359 比 580、400 比 506、298 比 923、216 比 225 個

/m^3)，垂直採樣四次同為對照測站的平均豐度較低(999 比 1,460、536 比 1,054、1,051 比 2,006、423 比 739 個/m^3)(表 3-34)。進一步將 110 年四次各八站共 32 組水平採樣的結果，以 PRIMER 軟體進行 34 大類動物性浮游生物的群聚分析，且經由 ANOSIM 檢驗(Global R= 0.649，p<0.01)檢驗分群後，從樹狀圖(圖 3-12)可看出月份分群，與植物性浮游生物分群相似，除分成 2 月群、5&8 月群和 11 月群外，8 月的監測測站(22、23 和 24 測站)則自成一群，但未達顯著差異，2 月群組成以哲水蚤最豐，劍水蚤次之，5&8 月群組成以夜光蟲最豐，11 月群組成以夜光蟲和哲水蚤最豐，8 月監測測站組成以哲水蚤最豐，夜光蟲次之。

民國 111 年四次調查動物性浮游生物水平採樣的平均豐度除第 3 次採樣相近外，第 1、2 和 4 次皆為對照測站低於監測測站 (四次依序為 206 比 232、345 比 402、136 比 135、460 比 494 個/m^3)，垂直採樣四次皆為對照測站的平均豐度較低(420 比 585、751 比 1,117、281 比 429、775 比 885 個/m^3)(表 3-34)。進一步將 111 年四次各八站共 32 組水平採樣的結果，以 PRIMER 軟體進行 34 大類動物性浮游生物的群聚分析，且經由 ANOSIM 檢驗(Global R= 0.831，p<0.01)檢驗分群後，從樹狀圖(圖 3-13)可明顯看出有依月份分成四群，僅在 11 月對照(18、20 和 21 測站)和監測測站(22、23 和 24 測站)藻種組成有區分開的結果，但未達顯著差異，2 月組成以哲水蚤最豐，5 月同時以夜光蟲和哲水蚤最豐，8 月以哲水蚤和劍水蚤最豐，11 月組成以夜光蟲最豐，11 月的監測站有對照測站未採得的藤壺幼生，因此被區分成不同群。

綜合前面三節的描述，110-111 年八次採樣中，植物性和動物性浮游生物的總平均豐(密)度值多呈現對照測站低於監測測站。植物性浮游生物的分析中，過濾濃縮法較沉澱法採集更多的海水，因此能蒐集到較多的藻種數，有利群聚分析的分群。而動物性浮游生物為比較 34 大類組成，雖群聚分析中的相似度較植物性浮游生物為高，仍然呈現明顯的月份(季節)的差異。因此，110-111 年影響南灣海域植物性和動物性浮游生物組成分群的主因，以季節為主。

4.3 浮游生物的優勢大類

4.3.1 植物性浮游生物

民國 110 年採樣調查中，兩種分析方法(沉澱法和過濾濃縮法)各季次的最優勢藻屬相似，沉澱法第 1 和 4 次為角刺藻屬(*Chaetoceros* spp.)，第 2 和 3 次為束毛藻屬 (*Trichodesmium* spp.)，濃縮法第 1、3 和 4 次為角刺藻屬，第 2 次。而 111 年兩種分析方法各季最優勢藻屬完全不同，沉澱法第 1 次為菱形藻(*Nitzschia* spp.)，第 2 至 4 次為幾內亞藻屬(*Guinardia* spp.)，過濾濃縮法第 1、2 和 4 次為角刺藻屬，第 3 次為輻桿藻屬(*Bacteriastrum* spp.) (表 3-1~16，圖 3-2~5)。比較兩年同次(同月)採樣之最優勢藻屬大多不同，呈現明顯的年間差異。

4.3.2 動物性浮游生物

民國 110 年水平和垂直採樣的大類組成上，第 1 次調查以橈足類中的哲水蚤為最優勢大類(佔 41.1%)，其他出現較多的大類包括橈足類中的劍水蚤(佔 18.0%)，夜光蟲(佔 10.3%) (表 3-17~18，圖 3-14)；第 2 次調查的最優勢大類為夜光蟲(佔 42.4%)，其他出現較多的大類包括哲水蚤(佔 28.4%)，劍水蚤(佔 12.4%) (表 3-19~20，圖 3-15)；第 3 次調查的最優勢大類為哲水蚤(佔 29.3%)，其他出現較多的大類包括夜光蟲(佔 28.0%)，劍水蚤(佔 14.3%)，有尾類(佔 10.6%) (表 3-21~22，圖 3-16)；第 4 次調查的最優勢大類為哲水蚤(佔 37.0%)，其次為夜光蟲(佔 17.6%)，劍水蚤(佔 12.9%) (表 3-23~24，圖 3-17)。民國 111 年的第 1 次調查以橈足類中的哲水蚤為最優勢大類(佔 39.9%)，其他出現較多的大類包括橈足類中的劍水蚤(佔 11.7%) (表 3-25~26，圖 3-18)；第 2 次調查的最優勢大類為哲水蚤 (佔 36.3%)，其他出現較多的大類包括夜光蟲(佔 17.2%)，劍水蚤(佔 15.6%) (表 3-27~28，圖 3-19)；第 3 次調查的最優勢大類為哲水蚤(佔 29.4%)，其次為劍水蚤(佔 18.4%) (表 3-29~30，圖 3-20)；第 4 次調查的最優勢大類為哲水蚤(佔 34.7%)，其次為夜光蟲(佔 28.7%)，劍水蚤(佔 11.3%) (表 3-31~32，圖 3-21)。其餘大類多未達 10%。由兩年結果來看，除 110 年第 2 次調查以夜光蟲為最優勢大類外，其餘七次的調查均以橈足類中的哲水蚤為最優勢，此與其他海域調查所得優勢大類以哲水蚤和夜光蟲的結果相似。

4.4 各測站蝦幼生豐度之比較

八次入出水口測站的調查結果顯示潛在經濟價值的蝦幼生(蝦幼生、磷蝦、

櫻蝦及其他十足類豐度合併為蝦幼生)之水平採樣豐度，多為出水口測站較高或相近(入比出水口測站八次依序為 2.0 比 8.2、5.4 比 1.6、8.8 比 8.2、1.8 比 3.7、3.6 比 5.8、13.2 比 15.0、1.4 比 1.7、6.6 比 6.1 個/m^3)；垂直採樣豐度同水平採樣多為入水口豐度低於出水口測站(18.1 比 31.8、5.6 比 9.8、11.7 比 29.3、16.5 比 25.9、14.2 比 15.5、21.0 比 36.7、6.4 比 10.5、13.8 比 5.6 個/m^3) (圖 3-22~29)。

八次對照和監測測站之水平採樣中，平均豐度互有高低(9.6 比 4.6、0.8 比 3.7、10.6 比 7.7、3.4 比 3.9、4.4 比 5.0、14.3 比 13.2、1.6 比 2.8、1.9 比 6.2 個/m^3)，垂直採樣多為對照低於監測的結果 (33.8 比 29.1、3.8 比 7.1、60.9 比 25.4、7.9 比 15.8、9.8 比 14.2、26.8 比 36.9、4.2 比 7.4、4.6 比 9.7 個/m^3)(表 3-35)。從季次來看，110 年以 2 月(冬季)採樣的豐度最高，111 年為 5 月(春季)。

4.5 各測站蟹幼生豐度之比較

八次調查結果顯示潛在經濟價值的蟹幼生(大眼幼生與蟹幼生合併為蟹幼生)之水平採樣多為入水口豐度高於出水口測站(1.1 比 0.4、2.3 比 0.5、10.2 比 7.3、1.2 比 0.7、5.0 比 0.6、2.3 比 2.6、1.4 比 2.3、0.6 比 1.8 個/m^3)；垂直採樣之入出水口測站豐度多為出水口較高(1.3 比 3.8、12.4 比 5.5、23.5 比 38.7、5.3 比 30.7、8.0 比 3.9、3.1 比 9.4、2.2 比 21.0、13.8 比 5.6 個/m^3) (圖 3-22~29)。

八次對照和監測測站水平採樣中，對照測站與監測測站互有高低(0.7 比 0.8、2.0 比 1.6、13.0 比 8.4、0.9 比 2.7、1.6 比 2.9、5.0 比 3.7、4.8 比 3.7、1.6 比 1.2 個/m^3)，垂直採樣同為對照測站與監測測站互有高低 (2.5 比 3.2、0.8 比 8.0、60.9 比 25.4、3.7 比 14.5、3.0 比 10.4、10.4 比 9.0、12.9 比 11.4、4.1 比 2.1 個/m^3) (表 3-35)。從季次來看，兩年均以 8 月(夏季)採樣的豐度最高。

4.6 各測站魚卵豐度之比較

另一類具有潛在經濟價值的魚卵，在八次水平採樣豐度多以入水口低於出水口測站 (4.3 比 0.9、3.5 比 8.7、17.2 比 269.7、0.9 比 0.9、0.4 比 0.8、1.3 比 5.4、5.5 比 14.5、0.6 比 10.1 個/m^3)；垂直採樣豐度同為多以入水口豐度低於出水口測站(0.9 比 4.5、2.1 比 12.7、14.0 比 159.6、2.3 比 5.9、0.5 比 0.0、1.9 比 3.9、4.7 比 81.0、0.0 比 4.9 個/m^3) (圖 3-22~29)。

八次對照和監測測站水平採樣中，對照測站平均豐度多低於監測測站(0.8 比 1.9、3.2 比 6.4、4.8 比 102.5、1.8 比 3.4、0.6 比 0.6、12.4 比 3.4、2.7 比 11.0、0.4 比 5.8 個/m^3)，垂直採樣與水平採樣結果相同多為監測測站較高 (0.4 比 5.7、2.0 比 8.0、5.9 比 65.0、2.4 比 3.2、0.4 比 0.3、10.0 比 3.0、1.2 比 30.5、0.5 比 1.8 個/m^3)(表 3-35)。從季次來看，兩年均以 8 月(夏季)採樣的豐度最高。

4.7 各測站仔魚豐度之比較

八次水平採樣豐度為入水口和出水口測站互有高低(0.53 比 1.02、0.17 比 0.14、0.53 比 0.11、0.09 比 0.16、0.36 比 0.81、0.12 比 0.32、0.07 比 0.15、0.49 比 0.45 個/m^3)；垂直採樣豐度亦為入和出水口測站互有高低(1.13 比 0.85、1.16 比 0.98、1.82 比 3.60、0.58 比 2.33、3.49 比 2.62、0.95 比 2.96、0.35 比 1.05、2.22 比 2.33 個/m^3) (圖 3-22~29)。

八次對照和監測測站水平採樣中，對照測站的平均豐度多低於監測測站(0.16 比 0.53、0.18 比 0.20、0.37 比 0.64、0.10 比 0.20、0.49 比 0.62、0.33 比 0.20、0.19 比 0.10、0.40 比 0.83 個/m^3)，垂直採樣均為對照測站的平均豐度低於監測測站 (0.77 比 1.18、0.69 比 1.18、1.85 比 5.21、0.51 比 1.69、1.23 比 2.95、1.24 比 2.59、0.65 比 0.83、0.75 比 2.53 個/m^3) (表 3-35)。從季次來看，110 年以 8 月(夏季)採樣的豐度最高，111 年則以 11 月(秋季)最高。

綜合上述經濟性幼生，110-111 年八次的調查中，蝦幼生和蟹幼生的水平和垂直採樣各季次之對照和監測測站豐度互有高低，魚卵及仔魚的水平和垂直採樣八季次多以監測測站豐度較高。且 110-111 年八季次的採樣中，蟹幼生和魚卵均在同年第 3 次(夏季)採樣有最高的總平均豐度(表 3-35)。

4.8 歷年浮游生物豐/密度的變化

將民國 85 年至 111 年，本海域歷年來浮游動物(ZP)、浮游植物(PP)、蟹幼生(C-lar)、蝦幼生(S-lar)、魚卵(F-egg)、和仔魚(F-lar)等 6 項主要浮游生物豐度值經對數轉換後，進行 One-way ANOVA 的檢定，用以比較各季之年間差異(表 3-36)。結果顯示所有的豐度值在各季別中皆呈現顯著的年間差異($p<0.001$)。將

這些浮游生物豐度值再經由 Duncan's 多變距分析後，結果如表 3-37~38，近五年冬季航次中，108 年有顯著最高的仔魚豐度，111 年(今年)魚卵豐度偏低；春季航次中，107 年有最高的動物性浮游生物豐度；夏季航次中，108 年植物性浮游生物密度偏低，109 年魚卵豐度偏低；秋季航次中，近五年的各項浮游生物豐度測值無明顯的年間差異。

4.8.1 歷年(96 至 111 年)植物性浮游生物(沈澱法)的密度變化

自民國 96 年的調查以來發現，以沉澱法分析之植物性浮游生物四季總平均密度值範圍在 181~5,800 cells/間，以第 3 次的密度最高，第 1 季最低(表 3-39)。本期八次採樣的測值僅 110 年第 4 次(581 cells/l)高於歷年同次平均(388cells/l)及 111 年第 2 次(678 cells/l)高於歷年同次平均(597cells/l)(表 3-17&23)。就十六年的數據看來，過濾濃縮法與沈澱法所觀察的植物性浮游生物之高峯期皆在第 3 次(7~9 月)採樣(表 3-39&圖 3-30)。

4.8.2 歷年植物性浮游生物(濃縮法)的密度變化

歷年第三核能發電廠附近海域植物性浮游生物的調查中發現，第 3 次為密度較高的季節(平均密度值為 5,197 cells/l)，而第 1 次為密度較低的季節(362 cells/l)。與此歷年季節變動趨勢不同的年份及季節分別有民國 88 及 99 年的第 1 次，民國 89、92、95、100、105 及 108 年的第 2 次，及 110 年(去年)的第 4 次皆為該年度植物性浮游生物密度最高的季節。民國 90 年 1 月發生阿瑪斯號漏油事件(鵝鑾鼻東方海面)後，可能加上聖嬰年的反覆出現，造成植物性浮游生物密度的季節變化較不明顯，且有持續偏低的情形，在 91 年第 1 次(1 月)出現歷年最低值 25 cells/l。此情形持續至 101 年為止，僅分別在民國 93 及 96 年的第 4 季出現密度值高於或相近 2,000 cells/l 的高峯。自 102 年第 2 次開始，植物性浮游生物密度出現季節性劇烈震盪的情形，在 103 年第 3 次(8 月)密度高達 77,163 cells/l，為歷年之最高值(表 3-37~38&圖 3-30)。

本期八次採樣在 111 年第 2 次高於歷年同次平均值外，其餘七次採樣測值均低於歷年同次平均值(表 3-33、39&30)。

4.8.3 環保署公告之沈澱法與原過濾濃縮法分析結果的比較

十六年以來以沉澱法和過濾法同步分析植物性浮游生物的密度，在前五年均呈現原過濾濃縮法所計數到的密度值較高，但自 100 年第 4 次採樣開始即呈現沉澱法較高密度的情形，到了 101 和 102 年的上半年更呈現沉澱法所計數到的密度值明顯較高，其間主要優勢種類並不完全相同，在 103~104 年則多為濃縮法較高，到了 105 年至今又回到均為濃縮法密度較高的情形。有鑑於兩種方法所得的密度值及種類數仍存有差異，為保持歷年數據比對的一致性，往後仍以原過濾濃縮法所得結果進行各項歷年的比較及統計，並同步與沈澱法的分析結果做交叉比對。

4.8.4 歷年動物性浮游生物的豐度變化

歷年第三核能發電廠附近海域的動物性浮游生物之四季總平均豐度值變動範圍在 622~1,089 個/m^3 間，以第 2 次的豐度值最高，第 4 次最低(表 3-39)。每年最高和最低豐度值的出現季別並不一致。在民國 86、87、90、97、100、104、105、107、109~111 年的第 4 季，民國 88、89、96 及 99 年的第 3 次，民國 91、93、98 年、101 至 103 年及 106 年的第 1 次，民國 92、94、95 及 108 年的第 2 次皆為該年的低峯期。歷年來，動物性浮游生物的豐度有約三年一次的高峯週期（民國 86、89、92、95 及 98 年），豐度值高於 1,000 個/m^3 的季別依年別而異，在民國 86、92 和 97 年為第 1 次，民國 87 和 89 年在第 2 次，民國 95 和 98 年則是出現在第 3 次，但自 98 年後年年出現高峯，且常在第 2 或 3 次出現高豐度值(均高於 1,000 個/m^3) (圖 3-31)。

本期八次採樣 110 年在第 1 和 3 次及 111 年第 4 次高於歷年同次平均值，其餘五次採樣則低於歷年同季平均豐度(表 3-34、39&圖 3-31)。

4.8.5 歷年蝦幼生的豐度變化

歷年第三核能發電廠附近海域經濟性蝦幼生的豐度之四季總平均豐度值變動範圍在 11.8~17.8 個/m^3 間，以第 2 和 3 次的豐度值較高，第 4 次最低(表 3-39)。在民國 91 年以前有每兩年出現在一次高豐度的週期變化，之後此高峯

週期並未持續，轉為季節變化較不明顯的情形，至 97 年後才每年接連出現明顯的第 2 和 3 次高峯並呈現明顯的季節變化；近年的季節性震盪有趨緩的情形(圖 3-32)。

本期八次採樣僅在 110 年第 1 次和 111 年第 2 次高於歷年同次平均值，其餘六次採樣平均豐度皆較低(表 3-35、39&圖 3-32)。總而言之，蝦幼生延續 97 年來出現年年有季節高峯的情形，110 年的高豐期為第 3 次採樣，111 年則在第 2 次採樣(圖 3-32)。

4.8.6 歷年蟹幼生的豐度變化

歷年第三核能發電廠附近海域經濟性蟹幼生的豐度之四季總平均豐度值變動範圍在 2.5~11.0 個/m^3 間，以第 3 次的豐度值最高，第 1 和 4 季較低(表 3-39)。在民國 97 年以前有每六年出現在第 3 次採樣會有高豐度的週期變化，其後此高峯頻率年年出現，但於 105 和 108 年季節變化較不明顯 (圖 3-33)。

本期八次採樣在 110 年第 3 和 4 次及 111 年第 1 和 4 次高於歷年同次平均值，其餘四次低於歷年同季平均值表(3-35、39&圖 3-33)。總而言之，直至 107 年，蟹幼生有延續 97 年來出現年年有季節高值的情形，110 和 111 年(今年)高峯期同為第 3 次採樣 (圖 3-33)。

4.8.7 歷年魚卵的豐度變化

由歷年第三核能發電廠附近海域魚卵的豐度之四季總平均豐度值變動範圍在 6.4~22.4 個/m^3 間，以第 3 次最高，而第 4 次最低(表 3-39)。歷年來除 86 年第 1 次採樣有大量卵頭鸚哥魚魚卵的豐度高值外，每年均呈現第 2 或 3 次高，第 1 和 4 次低的季節變動(圖 3-34)。

本期八次採樣僅在 111 年第 3 次高於歷年同季平均值，其餘七次採樣均低於歷年同季平均豐度 (表 3-35、39&圖 3-34)。綜合上述，多年來的季節變動仍維持在相同的範圍內，但 107-108 年的高峯期均未明顯超過歷年的總平均值 13.8 個/m^3，此結果在 109 年後有回復之情形(圖 3-34)。

4.8.8 歷年仔魚的豐度變化

由歷年第三核能發電廠附近海域仔魚的豐度之四季總平均豐度值變動範圍在 0.6~1.7 個/m^3 間，以第 2~3 次較高，而第 4 次最低(表 3-39)。在民國 88~91 年期間，仔魚高峰期並不明顯，但自 97 年後有明顯的季節震盪(圖 3-35)。

本期八次採樣僅在 110 年第 3 次和 111 年第 4 次高於歷年同次平均值，其餘六次採樣相近或低於歷年同次平均豐度(表 3-35、39&圖 3-35)。綜合上述，多年來仔魚豐度的季節變動仍維持在相同的範圍內，且幾乎每年的高峯期都高於歷年總平均值(1.23 個/m^3) (圖 3-35)。

4.9 同季節浮游生物之年間變化

歷年第 1 次(1-3 月) 動物性浮游生物和蝦幼生豐度顯著最高值於民國 100 年出現，植物性浮游生物為 88 年，魚卵在 86 年(出現大量的卵頭鸚哥魚魚卵)，仔魚為 108 年，蟹幼生為 102 年。採樣出現顯著低值的年份在動物性浮游生物為 90 年，植物性浮游生物為 91 年，魚卵為 111 年，仔魚及蟹幼生為 89 年，蝦幼生為 104 年 (表 3-37)。

歷年第 2 次(4-6 月)的年間差異，動物性浮游生物顯著高值出現在民國 107 年，植物性浮游生物及魚卵為 106 年，仔魚及蝦幼生為 101 年，蟹幼生為 97 年。至於各大類第 2 次採樣的顯著低值多發生在民國 90 及 92 年，動物性及植物性浮游生物與蟹幼生為 90 年，魚卵是 99 年，仔魚及蝦幼生是 92 年(表 3-37)。

歷年第 3 次(7-9 月) 動物性浮游生物和蝦幼生的顯著高值出現在民國 98 年，植物性浮游生物和仔魚為 103 年，魚卵為 99 年，蟹幼生為 85 年。而第 3 次的顯著低值多出現在民國 88 年，包括動物性浮游生物、蟹幼生和蝦幼生。植物性浮游生物的密度顯著低值則在 108 年，魚卵為 109 年，仔魚為 95 年(表 3-38)。

歷年第 4 次(10-12 月) 動物性浮游生物和蝦幼生的顯著高值出現在 102 年，植物性浮游生物為 104 年，魚卵為 85 年，仔魚為 97 年，蟹幼生為 95 年。至於

第 4 次有明顯偏低的情形，動物性浮游生物及蝦幼生發生在 90 年，植物性浮游生物在 100 年，魚卵在 102 年，仔魚及蟹幼生在 88 年(表 3-38)。

總而言之，本海域的動物性及植物性浮游生物的豐度變化，除了有自然四季更迭的律動外，更有大尺度的年間變動。

4.10 電廠運轉及停機大修時浮游生物豐/密度和種類組成之差異

由分析電廠停機大修及運轉時各項浮游生物數值和種類組成之差異，並分三組將受溫排水影響出水口最近的 24 測站，離入水口最近的 22 測站，和其他測站為 12、14、18、20、21 和 23 等六個測站做比較。

從浮游生物的豐/密度來看，過去第 1 次採樣(1~3 月)僅一次電廠停機大修，第 3 次(7~9 月)採樣未遇到停機大修，數據過少無法統計分析，因此僅以 t-test 分別比較第 2 次和第 4 次水平採樣，所得之浮游生物、蝦蟹幼生和魚卵及仔魚之總平均豐/密度於電廠停機大修和運轉時，在入出水口測站和南灣其餘六站間是否有顯著差異。結果顯示(表 3-40) 僅在出水口測站(測站 24)以濃縮法分析之植物性浮游生物的第 4 次密度和蟹幼生的第 2 次採樣豐度有顯著電廠停機(1,386±1,847 cells/l 和 2.25±3.12 ind./m^3)高於運轉(323±397 cells/l 和 0.36±0.47 ind./m^3)的情況，而入水口和其他測站總平均值則無顯著差異。由此推測電廠停機有可能使蟹幼生豐度和大細胞(≧55 μm)的植物性浮游生物密度增加。

種類組成上，進一步以 nMDS 分析出水口測站(測站 24)的歷史資料進行以沉澱法、過濾濃縮法之植物性浮游生物和動物性浮游生物等種類組成上的統計比較，結果未發現電廠停機大修或運轉時種類組成有顯著的分群差異(圖 3-36)。

此外，排水量減少與浮游生物豐(密)度之分析，依大修起始日與採樣日間的日數作為排水量減少的變因，分季別進行比較。初步結果得知每年第 2 次和第 4 次採樣，均呈現入出水口和其餘六測站的浮游植物密度和浮游動物豐度，與運轉期的總平均值沒有明顯差異，而且並未隨著停機天數越長，而有升高或下降的趨勢(圖 3-37)。

五、結論

110-111 年八次採樣的結果，顯示南灣海域植物性浮游生物密度和動物性浮游生物豐度多以監測站較對照站為高。在種類組成上，本海域植物性和動物性浮游生物組成呈現季節分群。與過去歷年同次平均值相比，沉澱法和濃縮法分析之密度趨勢相似，但因 110 和 111 年為反聖嬰期，浮游生物測值均較歷年同次平均值為低,僅植物性浮游生物沉澱法 110 年第 4 次採樣(581 cells/l)和 111 年第 2 次(678cells/l)和濃縮法 111 年第 2 次(1,250 cells/l) 密度高於歷年同次平均值(沉澱法 181、597、5,800 和 388 cells/l，濃縮法 362、1,037、5,197 和 1,214 cells/l)，以及動物性浮游生物豐度在 110 年第 1、3 次 (1,003 和 1,041 ind./m^3) 和 111 年第 4 次(688 ind./m^3)較歷年同次平均值(各次依序為 870、1,089、914 和 622 ind./m^3)為高。從過去出水口測站的植物性和動物性浮游生物種類統計分群結果顯示，在電廠停機或運轉間的組成差異並不顯著。

六、附表及附圖

表3-1 民國110年2月26日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/1)及種類組成-環保署公告之沈澱法

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Species				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
矽藻類																	
Bacteriastrum comosum 平凡輻桿藻	10	0	0	3.3	5.8	4.35	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Bacteriastrum delicatulum 優美輻桿藻	0	10	0	3.3	5.8	4.35	0	10	10	6.7	5.8	16.67	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros decipiens 並基角刺藻	0	10	0	3.3	5.8	4.35	10	0	0	3.3	5.8	8.33	0	10	5.0	7.1	25.00
Chaetoceros lorenzianum 洛氏角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	10	3.3	5.8	8.33	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros pendulum 搖動角刺藻	0	10	0	3.3	5.8	4.35	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Coscinodiscus spp. 圓篩藻	0	0	10	3.3	5.8	4.35	10	0	0	3.3	5.8	8.33	0	0	0.0	0.0	0.00
Cylindrotheca closterium 新月筒柱藻	10	0	0	3.3	5.8	4.35	20	10	0	10.0	10.0	25.00	10	0	5.0	7.1	25.00
Guinardia delicatula 柔弱幾內亞藻	10	0	10	6.7	5.8	8.70	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Guinardia striata 斯托根管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	5.0	7.1	25.00
Hemiaulus sinensis 中華半管藻	0	0	10	3.3	5.8	4.35	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Lauderia annulata 北方勞德藻	0	10	0	3.3	5.8	4.35	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Navicula spp. 舟形藻	10	0	10	6.7	5.8	8.70	10	10	0	6.7	5.8	16.67	0	0	0.0	0.0	0.00
Nitzschia sp. 菱形藻	0	10	0	3.3	5.8	4.35	10	0	0	3.3	5.8	8.33	0	0	0.0	0.0	0.00
Odontella sinensis 中華盒形藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	5.0	7.1	25.00
Proboscia alata 翼鼻狀藻	10	0	0	3.3	5.8	4.35	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Rhizosolenia styliformis 筆尖型根管藻	0	0	10	3.3	5.8	4.35	0	10	0	3.3	5.8	8.33	0	0	0.0	0.0	0.00
Stephanophxis nipponica 日本冠蓋藻	0	10	0	3.3	5.8	4.35	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Stephanopyxis palmeriana 掌狀冠蓋藻	0	40	0	13.3	23.1	17.39	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Thalassionema nitzschioides 菱形海線藻	30	0	0	10.0	17.3	13.04	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
總　合	80	100	50	76.7	25.2	100	60	40	20	40.0	20.0	100	20	20	20.0	0.0	100
Species NO. 種類數	6	7	5	16			5	4	2	8			2	2	4		
Simpson's Dominance Index優勢種指數	0.2188	0.2200	0.2000	0.0851			0.2222	0.2500	0.5000	0.1528			0.5000	0.5000	0.2500		
Shannon-Weiner Index歧異度指數	1.6675	1.7481	1.6094	2.6306			1.5607	1.3863	0.6931	1.9792			0.6931	0.6931	1.3863		
Evenness 均勻度指數	0.9306	0.8983	1.0000	0.9488			0.9697	1.0000	1.0000	0.9518			1.0000	1.0000	1.0000		

表3-2 民國110年5月14日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-環保署公告之沈澱法

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Species				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
矽藻類																	
Bacteriastrum delicatulum 優美輻桿藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	20	0	0	6.7	11.5	12.90	0	10	5.0	7.1	14.29
Chaetoceros curvisetus 旋鏈角刺藻	0	10	0	3.3	5.8	11.76	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	5.0	7.1	14.29
Chaetoceros decipiens 並基角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	30	0	10.0	17.3	19.35	0	10	5.0	7.1	14.29
Coscinodiscus spp. 圓篩藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	5	1.7	2.9	3.23	0	0	0.0	0.0	0.00
Ditylum brightwellii 布氏雙尾藻	0	5	0	1.7	2.9	5.88	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Guinardia delicatula 柔弱幾內亞藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	0	3.3	5.8	6.45	0	0	0.0	0.0	0.00
Guinardia striata 斯托幾內亞藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	0	3.3	5.8	6.45	0	0	0.0	0.0	0.00
Navicula spp. 舟形藻	0	0	10	3.3	5.8	11.76	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Rhizosolenia setigera 剛毛根管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	0	3.3	5.8	6.45	0	0	0.0	0.0	0.00
Rhizosolenia styliformis 筆尖型根管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	0	3.3	5.8	6.45	0	0	0.0	0.0	0.00
Thalassionema frauenfeldii 伏恩海線藻	10	0	0	3.3	5.8	11.76	10	10	0	6.7	5.8	12.90	0	10	5.0	7.1	14.29
藍綠藻類																	
Trichodesmium erythraeum 紅海束毛藻	20	10	20	16.7	5.8	58.82	0	20	20	13.3	11.5	25.81	20	10	15.0	7.1	42.86
總　合	30	25	30	28.3	2.9	100	40	90	25	51.7	34.0	100	30	40	35.0	7.1	100
Species NO. 種類數	2	3	2	5			3	6	2	9			2	4	5		
Simpson's Dominance Index優勢種指數	0.5556	0.3600	0.5556	0.3910			0.3750	0.2099	0.6800	0.1550			0.5556	0.2500	0.2653		
Shannon-Weiner Index歧異度指數	0.6365	1.0549	0.6365	1.2341			1.0397	1.6770	0.5004	2.0139			0.6365	1.3863	1.4751		
Evenness均勻度指數	0.9183	0.9602	0.9183	0.7668			0.9464	0.9359	0.7219	0.9166			0.9183	1.0000	0.9165		

表3-3 民國110年8月17日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/1)及種類組成-環保署公告之沈澱法

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Species				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
矽藻類																	
Bacteriastrum delicatulum 優美輻桿藻	10	10	0	6.7	5.8	10.00	0	10	10	6.7	5.8	7.41	20	0	10.0	14.1	10.53
Chaetoceros curvisetus 旋鏈角刺藻	10	0	0	3.3	5.8	5.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	20	10.0	14.1	10.53
Chaetoceros decipiens 並基角刺藻	10	20	0	10.0	10.0	15.00	0	30	20	16.7	15.3	18.52	30	20	25.0	7.1	26.32
Coscinodiscus spp. 圓篩藻	10	0	10	6.7	5.8	10.00	0	0	10	3.3	5.8	3.70	0	10	5.0	7.1	5.26
Ditylum brightwellii 布氏雙尾藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	0	3.3	5.8	3.70	10	0	5.0	7.1	5.26
Guinardia delicatula 柔弱幾內亞藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	0	3.3	5.8	3.70	0	0	0.0	0.0	0.00
Guinardia striata 斯托根管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	10	6.7	5.8	7.41	0	0	0.0	0.0	0.00
Navicula spp. 舟形藻	0	0	10	3.3	5.8	5.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Rhizosolenia setigera 剛毛根管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	0	3.3	5.8	3.70	0	0	0.0	0.0	0.00
Rhizosolenia styliformis 筆尖型根管藻	0	20	10	10.0	10.0	15.00	0	10	0	3.3	5.8	3.70	0	10	5.0	7.1	5.26
Thalassionema frauenfeldii 伏恩海線藻	10	0	0	3.3	5.8	5.00	10	10	0	6.7	5.8	7.41	0	10	5.0	7.1	5.26
渦鞭毛藻類		0															
Ceratium spp. 角藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	10	3.3	5.8	3.70	0	10	5.0	7.1	5.26
藍綠藻類																	
Trichodesmium erythraeum 紅海束毛藻	10	30	30	23.3	11.5	35.00	30	30	40	33.3	5.8	37.04	30	20	25.0	7.1	26.32
總 合	60	80	60	66.7	11.5	100	60	110	100	90.0	26.5	100	90	100	95.0	7.1	100
Species NO. 種類數	6	4	4	8			4	7	6	11			4	7	9		
Simpson's Dominance Index優勢種指數	0.1667	0.2813	0.3333	0.1950			0.3333	0.1901	0.2400	0.1962			0.2840	0.1600	0.1745		
Shannon-Weiner Index歧異度指數	1.7918	1.3209	1.2425	1.8465			1.2425	1.7987	1.6094	1.9910			1.3108	1.8867	1.9514		
Evenness 均勻度指數	1.0000	0.9528	0.8962	0.8880			0.8962	0.9243	0.8982	0.8303			0.9455	0.9696	0.8881		

表3-4 民國110年11月5日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/1)及種類組成-環保署公告之沈澱法

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Species				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
矽藻類																	
Asterionella japonica 日本星桿藻	30	50	20	33.3	15.3	5.49	50	20	30	33.3	15.3	5.85	60	30	45.0	21.2	8.04
Bellerochea malleus 錘狀中鼓藻	20	0	0	6.7	11.5	1.10	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros affinis 窄隙角刺藻	70	40	0	36.7	35.1	6.04	0	0	20	6.7	11.5	1.17	40	50	45.0	7.1	8.04
Chaetoceros atlanticus 大西洋角刺藻	20	0	0	6.7	11.5	1.10	0	20	20	13.3	11.5	2.34	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros coarctatus 密聚角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	20	0	10.0	14.1	1.79
Chaetoceros compressus 扁面角刺藻	0	10	0	3.3	5.8	0.55	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros curvisetus 旋鏈角刺藻	210	120	140	156.7	47.3	25.82	200	220	190	203.3	15.3	35.67	250	170	210.0	56.6	37.50
Chaetoceros decipiens 並基角刺藻	220	220	160	200.0	34.6	32.97	130	170	90	130.0	40.0	22.81	90	110	100.0	14.1	17.86
Chaetoceros pendulum 搖動角刺藻	30	0	40	23.3	20.8	3.85	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Coscinodiscus spp. 圓篩藻	10	20	0	10.0	10.0	1.65	20	10	20	16.7	5.8	2.92	0	10	5.0	7.1	0.89
Ditylum brightwellii 布氏雙尾藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	20	10.0	14.1	1.79
Guinardia delicatula 柔弱幾內亞藻	0	0	10	3.3	5.8	0.55	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Guinardia striata 斯托根管藻	30	0	30	20.0	17.3	3.30	40	20	40	33.3	11.5	5.85	20	30	25.0	7.1	4.46
Hemiaulus sinensis 中華半管藻	20	20	0	13.3	11.5	2.20	0	20	30	16.7	15.3	2.92	10	0	5.0	7.1	0.89
Rhizosolenia setigera 剛毛根管藻	0	10	0	3.3	5.8	0.55	0	0	0	0.0	0.0	0.00	20	0	10.0	14.1	1.79
Rhizosolenia styliformis 筆尖型根管藻	100	30	30	53.3	40.4	8.79	60	50	40	50.0	10.0	8.77	30	50	40.0	14.1	7.14
Thalassionema nitzschioides 菱形海線藻	0	0	30	10.0	17.3	1.65	10	10	20	13.3	5.8	2.34	0	20	10.0	14.1	1.79
藍綠藻類																	
Trichodesmium erythraeum 紅海束毛藻	20	30	30	26.7	5.8	4.40	40	70	50	53.3	15.3	9.36	60	30	45.0	21.2	8.04
總 合	780	550	490	606.7	153.1	82	550	610	550	570.0	34.6	77	600	520	560.0	56.6	80
Species NO. 種類數	12	10	9	16			8	10	11	11			10	10	13		
Simpson's Dominance Index優勢種指數	0.1838	0.2304	0.2120	0.1956			0.2205	0.2325	0.1762	0.2055			0.2267	0.1834	0.2004		
Shannon-Weiner Index歧異度指數	1.9975	1.8114	1.8220	2.0375			1.7431	1.7604	2.0620	1.9063			1.8485	1.9648	1.9823		
Evenness 均勻度指數	0.8039	0.7867	0.8292	0.7349			0.8382	0.7645	0.8599	0.7950			0.8028	0.8533	0.7729		

表3-5 民國111年2月16日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-環保署公告之沈澱法

Station	18S	20S	21S	Mean	S.D.	%	22S	23S	24S	Mean	S.D.	%	14S	12S	Mean	S.D.	%
Species																	
矽藻類																	
Asterolampra marylandica 南方星芒藻		0	0	0.0	0.0	0.00	0			0.0	0.00		1		1.0		4.55
Bacteriastrum delicatulum 優美輻桿藻		2	0	1.0	1.4	4.55	0			0.0	0.00		0		0.0		0.00
Bacteriastrum minus 小輻桿藻		1	0	0.5	0.7	2.27	3			3.0	15.79		0		0.0		0.00
Cerataulina bergonii 古柏角管藻		1	0	0.5	0.7	2.27	0			0.0	0.00		0		0.0		0.00
Chaetoceros atlanticus 大西洋角刺藻		0	0	0.0	0.0	0.00	1			1.0	5.26		0		0.0		0.00
Chaetoceros compressus 扁面角刺藻		1	0	0.5	0.7	2.27	0			0.0	0.00		0		0.0		0.00
Chaetoceros lorenzianus 洛氏角刺藻		0	0	0.0	0.0	0.00	3			3.0	15.79		0		0.0		0.00
Chaetoceros messanense 短刺角刺藻	樣	1	0	0.5	0.7	2.27	0	樣	樣	0.0	0.00		0	樣	0.0		0.00
Coscinodiscus spp. 圓篩藻		0	0	0.0	0.0	0.00	0			0.0	0.00		3		3.0		13.64
Ditylum brightwellii 布氏雙尾藻	品	1	1	1.0	0.0	4.55	0	品	品	0.0	0.00		0	品	0.0		0.00
Fragilaria spp. 脆桿藻		2	0	1.0	1.4	4.55	1			1.0	5.26		0		0.0		0.00
Guinardia striata 斯托幾內亞藻	失	0	0	0.0	0.0	0.00	3	失	失	3.0	15.79		0	失	0.0		0.00
Hemiaulus hauckii 霍克半管藻		0	0	0.0	0.0	0.00	1			1.0	5.26		0		0.0		0.00
Leptocylindrus danicus 丹麥細柱藻	效	0	1	0.5	0.7	2.27	0	效	效	0.0	0.00		1	效	1.0		4.55
Nitzschia spp. 菱形藻		4	6	5.0	1.4	22.73	3			3.0	15.79		4		4.0		18.18
Pleurosigma normanii 中斜紋藻		1	3	2.0	1.4	9.09	0			0.0	0.00		5		5.0		22.73
Pleurosigma spp. 斜紋藻		4	0	2.0	2.8	9.09	0			0.0	0.00		1		1.0		4.55
Proboscia alata 翼鼻狀藻=異根管藻		1	0	0.5	0.7	2.27	1			1.0	5.26		0		0.0		0.00
Rhizosolenia stigerae 剛毛根管藻		0	1	0.5	0.7	2.27	0			0.0	0.00		0		0.0		0.00
Rhizosolenia styliformis 筆尖形根管藻		0	0	0.0	0.0	0.00	0			0.0	0.00		1		1.0		4.55
Thalassionema frauenfeldii 伏恩海線藻		1	0	0.5	0.7	2.27	0			0.0	0.00		1		1.0		4.55
渦鞭毛藻類																	
Gymodinium sp. 裸甲藻		0	1	0.5	0.7	2.27	1			1.0	5.26		1		1.0		4.55
Protoperidinium spp. 多甲藻		1	3	2.0	1.4	9.09	1			1.0	5.26		1		1.0		4.55
藍綠藻類																	
Trichodesmium erythraeum 紅海束毛藻		3	0	1.5	2.1	6.82	0			0.0	0.00		2		2.0		9.09
Trichodesmium sp. 束毛藻		1	3	2.0	1.4	9.09	0			0.0	0.00		1		1.0		4.55
綠藻類																	
Crucigenia sp. 十字藻		0	0	0.0	0.0	0.00	1			1.0	5.26		0		0.0		0.00
總　合		25	19	22.0	4.2	100	19			19.0	100		22		22.0		100
Species NO. 種類數		15	8	18			11			11			12		12		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數		0.0944	0.1856	0.1002			0.1191						0.1281				
Shannon-Weiner Index 歧異度指數		2.5325	1.8582	2.5873			2.2506						2.2604				
Evenness 均勻度指數		0.9352	0.8936	0.8952			0.9386						0.9096				

表3-6 民國111年5月5日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-環保署公告之沈澱法

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Species				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
矽藻類																	
Bacillaria paradoxa 奇異棍形藻	0	0	10	3.3	5.8	0.53	0	0	10	3.3	5.8	0.42	0	60	30.0	42.4	5.17
Bacteriastrum comosum 平凡輻桿藻	10	0	0	3.3	5.8	0.53	0	10	0	3.3	5.8	0.42	0	10	5.0	7.1	0.86
Bacteriastrum delicatulum 優美輻桿藻	0	10	20	10.0	10.0	1.59	20	0	0	6.7	11.5	0.84	0	0	0.0	0.0	0.00
Bacteriastrum elongatum 長輻桿藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	0	3.3	5.8	0.42	10	20	15.0	7.1	2.59
Bacteriastrum minus 小輻桿藻	0	30	30	20.0	17.3	3.17	250	0	10	86.7	141.5	10.97	10	10	10.0	0.0	1.72
Bellerochea malleus 錘狀中鼓藻	0	10	0	3.3	5.8	0.53	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Cerataulina bergonii 古柏角管藻	10	20	0	10.0	10.0	1.59	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	5.0	7.1	0.86
Chaetoceros affinis 窄隙角刺藻	0	10	10	6.7	5.8	1.06	0	0	0	0.0	0.0	0.00	20	10	15.0	7.1	2.59
Chaetoceros atlanticus 大西洋角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	0	3.3	5.8	0.42	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros compressus 扁面角刺藻	0	0	20	6.7	11.5	1.06	10	0	10	6.7	5.8	0.84	10	10	10.0	0.0	1.72
Chaetoceros danicus 丹麥角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	0	3.3	5.8	0.42	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros decipiens 並基角刺藻	10	40	60	36.7	25.2	5.82	50	10	10	23.3	23.1	2.95	0	10	5.0	7.1	0.86
Chaetoceros dichaeta 雙刺角刺藻	10	0	0	3.3	5.8	0.53	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros lorenzianus 洛氏角刺藻	10	0	0	3.3	5.8	0.53	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	30	15.0	21.2	2.59
Chaetoceros messanense 短刺角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	0	3.3	5.8	0.42	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros pendulus 搖動角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	0	3.3	5.8	0.42	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros spp. 角刺藻	0	0	20	6.7	11.5	1.06	0	10	0	3.3	5.8	0.42	10	0	5.0	7.1	0.86
Corethron hystrix 小環毛藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	40	0	0	13.3	23.1	1.69	0	10	5.0	7.1	0.86
Coscinodiscus spp. 圓篩藻	0	0	10	3.3	5.8	0.53	20	30	0	16.7	15.3	2.11	0	0	0.0	0.0	0.00
Cyclotella sp. 小環藻	0	0	10	3.3	5.8	0.53	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Cylindrotheca closterium 新月筒柱藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	10	3.3	5.8	0.42	0	0	0.0	0.0	0.00
Dactyliosolen fragilissimus 脆指管藻	0	20	0	6.7	11.5	1.06	10	30	0	13.3	15.3	1.69	30	20	25.0	7.1	4.31
Eucampia zodiacus 短角彎角藻	20	30	50	33.3	15.3	5.29	30	20	10	20.0	10.0	2.53	10	40	25.0	21.2	4.31
Fragilaria spp. 脆桿藻	40	40	20	33.3	11.5	5.29	0	0	10	3.3	5.8	0.42	10	0	5.0	7.1	0.86
Guinardia delicatula 柔弱幾內亞藻	60	40	0	33.3	30.6	5.29	80	20	0	33.3	41.6	4.22	30	40	35.0	7.1	6.03
Guinardia striata 斯托幾內亞藻	30	130	160	106.7	68.1	16.93	80	10	30	40.0	36.1	5.06	30	30	30.0	0.0	5.17
Hemiaulus hauckii 霍克半管藻	0	10	70	26.7	37.9	4.23	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	5.0	7.1	0.86
Hemiaulus indicus 印度半管藻	0	10	0	3.3	5.8	0.53	20	0	0	6.7	11.5	0.84	0	0	0.0	0.0	0.00
Hemiaulus sinensis 中華半管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	0	3.3	5.8	0.42	0	0	0.0	0.0	0.00
Lauderia annulata 北方勞德藻	0	20	80	33.3	41.6	5.29	340	10	100	150.0	170.6	18.99	0	0	0.0	0.0	0.00
Leptocylindrus danicus 丹麥細柱藻	30	20	20	23.3	5.8	3.70	120	20	20	53.3	57.7	6.75	10	50	30.0	28.3	5.17
Leptocylindrus minimus 微小細柱藻	0	20	50	23.3	25.2	3.70	20	30	0	16.7	15.3	2.11	10	10	10.0	0.0	1.72
Licmophora abbreviata 短紋楔形藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	20	10.0	10.0	1.27	0	10	5.0	7.1	0.86
Melosira sp. 直鏈藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	20	0	0	6.7	11.5	0.84	0	0	0.0	0.0	0.00
Nitzschia lanceolata 披針菱形藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	5.0	7.1	0.86
Nitzschia longissima 長菱形藻	0	10	0	3.3	5.8	0.53	20	0	30	16.7	15.3	2.11	0	40	20.0	28.3	3.45
Nitzschia palea 谷皮菱形藻	0	10	30	13.3	15.3	2.12	20	0	10	10.0	10.0	1.27	0	0	0.0	0.0	0.00
Nitzschia spp. 菱形藻	60	20	80	53.3	30.6	8.47	50	20	10	26.7	20.8	3.38	30	30	30.0	0.0	5.17
Odontella aurita 長耳盒形藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	0	3.3	5.8	0.42	0	0	0.0	0.0	0.00
Pleurosigma normanii 中斜紋藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	0	3.3	5.8	0.42	0	0	0.0	0.0	0.00
Pleurosigma spp. 斜紋藻	20	40	0	20.0	20.0	3.17	80	0	30	36.7	40.4	4.64	0	0	0.0	0.0	0.00
Proboscia alata 翼鼻狀藻=異根管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	0	3.3	5.8	0.42	20	0	10.0	14.1	1.72
Rhizosolenia calcar-avis 距端根管藻	10	0	0	3.3	5.8	0.53	30	0	0	10.0	17.3	1.27	10	0	5.0	7.1	0.86
Rhizosolenia setigera 剛毛根管藻	10	0	10	6.7	5.8	1.06	20	0	10	10.0	10.0	1.27	10	10	10.0	0.0	1.72
Rhizosolenia spp. 根管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	5.0	7.1	0.86
Rhizosolenia styliformis 筆尖形根管藻	10	10	50	23.3	23.1	3.70	10	20	0	10.0	10.0	1.27	0	0	0.0	0.0	0.00
Stephanopyxis palmeriana 掌狀冠蓋藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	20	0	0	6.7	11.5	0.84	0	0	0.0	0.0	0.00
Streptotheca indica 印度扭鞘藻	0	0	10	3.3	5.8	0.53	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Thalassionema frauenfeldii 伏恩海線藻	0	10	10	6.7	5.8	1.06	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	30	15.0	21.2	2.59
Thalassionema nitzschioides 菱形海線藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	0	3.3	5.8	0.42	0	0	0.0	0.0	0.00
渦鞭毛藻類																	
Ceratium macroceros 長角角藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	20	10.0	14.1	1.72
Gymodinium sp. 裸甲藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	80	0	20	33.3	41.6	4.22	0	40	20.0	28.3	3.45
Prorocentrum compressum 扁型原甲藻	0	10	0	3.3	5.8	0.53	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Protoperidinium spp. 多甲藻	0	0	10	3.3	5.8	0.53	40	0	0	13.3	23.1	1.69	0	0	0.0	0.0	0.00
藍綠藻類																	
Trichodesmium erythraeum 紅海束毛藻	30	110	0	46.7	56.9	7.41	170	0	20	63.3	92.9	8.02	160	160	160.0	0.0	27.59
總　合	370	680	840	630.0	239.0	100	1,730	270	370	790.0	815.6	100	440	720	580.0	198.0	100
Species NO. 種類數	16	24	23	36			34	16	18	42			19	25	31		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.0957	0.0878	0.0836	0.0658			0.0874	0.0754	0.1118	0.0736			0.1612	0.0849	0.1018		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	2.5378	2.7958	2.7681	3.0717			2.8923	2.6729	2.5715	3.0893			2.4133	2.8505	2.8897		
Evenness 均勻度指數	0.9153	0.8797	0.8828	0.8572			0.8202	0.9640	0.8897	0.8265			0.8196	0.8856	0.8415		

表3-7 民國111年8月12日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/1)及種類組成-環保署公告之沈澱法

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Species				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
矽藻類																	
Asterionella japonica 日本星桿藻	0	10	0	3.3	5.8	0.49	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Bacillaria paradoxa 奇異棍形藻	0	20	30	16.7	15.3	2.46	30	20	0	16.7	15.3	1.97	0	0	0.0	0.0	0.00
Bacteriastrum comosum 平凡輻桿藻	0	20	10	10.0	10.0	1.48	0	40	0	13.3	23.1	1.57	0	20	10.0	14.1	2.20
Bacteriastrum delicatulum 優美輻桿藻	0	100	10	36.7	55.1	5.42	40	10	50	33.3	20.8	3.94	0	0	0.0	0.0	0.00
Bacteriastrum elongatum 長輻桿藻	20	30	0	16.7	15.3	2.46	50	10	20	26.7	20.8	3.15	0	0	0.0	0.0	0.00
Bacteriastrum minus 小輻桿藻	10	280	10	100.0	155.9	14.78	80	60	140	93.3	41.6	11.02	40	30	35.0	7.1	7.69
Bellerochea malleus 錘狀中鼓藻	0	10	0	3.3	5.8	0.49	20	0	0	6.7	11.5	0.79	0	0	0.0	0.0	0.00
Cerataulina bergonii 古柏角管藻	10	0	0	3.3	5.8	0.49	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	10	10.0	0.0	2.20
Chaetoceros affinis 窄隙角刺藻	0	40	0	13.3	23.1	1.97	50	0	40	30.0	26.5	3.54	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros compressus 扁面角刺藻	0	10	10	6.7	5.8	0.99	0	10	20	10.0	10.0	1.18	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros curvisetus 旋鏈角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	0	3.3	5.8	0.39	10	0	5.0	7.1	1.10
Chaetoceros danicus 丹麥角刺藻	10	0	0	3.3	5.8	0.49	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	5.0	7.1	1.10
Chaetoceros decipiens 並基角刺藻	30	60	30	40.0	17.3	5.91	70	30	50	50.0	20.0	5.91	40	30	35.0	7.1	7.69
Chaetoceros lorenzianus 洛氏角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	5.0	7.1	1.10
Chaetoceros spp. 角刺藻	0	30	0	10.0	17.3	1.48	10	10	20	13.3	5.8	1.57	0	0	0.0	0.0	0.00
Corethron hystrix 小環毛藻	10	20	10	13.3	5.8	1.97	0	0	40	13.3	23.1	1.57	0	20	10.0	14.1	2.20
Cyclotella sp. 小環藻	0	70	0	23.3	40.4	3.45	0	10	0	3.3	5.8	0.39	0	0	0.0	0.0	0.00
Cylindrotheca closterium 新月筒柱藻	0	20	0	6.7	11.5	0.99	0	10	0	3.3	5.8	0.39	0	0	0.0	0.0	0.00
Dactyliosolen fragilissimus 脆指管藻	20	0	0	6.7	11.5	0.99	20	20	0	13.3	11.5	1.57	40	40	40.0	0.0	8.79
Eucampia zodiacus 短角彎角藻	0	30	10	13.3	15.3	1.97	0	20	20	13.3	11.5	1.57	10	10	10.0	0.0	2.20
Fragilaria spp. 脆桿藻	20	10	0	10.0	10.0	1.48	20	0	50	23.3	25.2	2.76	0	0	0.0	0.0	0.00
Guinardia delicatula 柔弱幾內亞藻	90	70	0	53.3	47.3	7.88	280	10	160	150.0	135.3	17.72	60	90	75.0	21.2	16.48
Guinardia striata 斯托幾內亞藻	20	300	190	170.0	141.1	25.12	20	350	60	143.3	180.1	16.93	60	70	65.0	7.1	14.29
Hemiaulus hauckii 霍克半管藻	0	20	10	10.0	10.0	1.48	30	20	0	16.7	15.3	1.97	0	0	0.0	0.0	0.00
Hemiaulus indicus 印度半管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	30	0	0	10.0	17.3	1.18	0	0	0.0	0.0	0.00
Hemiaulus sinensis 中華半管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	20	20	20.0	0.0	4.40
Lauderia annulata 北方勞德藻	0	30	0	10.0	17.3	1.48	20	80	20	40.0	34.6	4.72	0	0	0.0	0.0	0.00
Leptocylindrus danicus 丹麥細柱藻	40	10	20	23.3	15.3	3.45	40	50	60	50.0	10.0	5.91	30	70	50.0	28.3	10.99
Leptocylindrus minimus 微小細柱藻	20	10	0	10.0	10.0	1.48	0	0	10	3.3	5.8	0.39	10	20	15.0	7.1	3.30
Licmophora abbreviata 短紋楔形藻	0	0	10	3.3	5.8	0.49	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Melosira sp. 直鏈藻	0	30	0	10.0	17.3	1.48	20	20	20	20.0	0.0	2.36	0	0	0.0	0.0	0.00
Nitzschia lanceolata 披針菱形藻	0	0	10	3.3	5.8	0.49	20	0	10	10.0	10.0	1.18	0	0	0.0	0.0	0.00
Nitzschia longissima 長菱形藻	0	20	0	6.7	11.5	0.99	0	20	0	6.7	11.5	0.79	0	0	0.0	0.0	0.00
Nitzschia palea 谷皮菱形藻	0	10	0	3.3	5.8	0.49	10	10	10	10.0	0.0	1.18	0	0	0.0	0.0	0.00
Nitzschia spp. 菱形藻	0	10	0	3.3	5.8	0.49	0	0	0	0.0	0.0	0.00	20	40	30.0	14.1	6.59
Odontella aurita 長耳盒形藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	0	3.3	5.8	0.39	0	0	0.0	0.0	0.00
Pleurosigma spp. 斜紋藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	5.0	7.1	1.10
Rhizosolenia calcar-avis 距端根管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	20	0	6.7	11.5	0.79	0	0	0.0	0.0	0.00
Rhizosolenia spp. 根管藻	20	0	0	6.7	11.5	0.99	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	40	20.0	28.3	4.40
Rhizosolenia styliformis 筆尖形根管藻	20	0	0	6.7	11.5	0.99	0	10	0	3.3	5.8	0.39	0	20	10.0	14.1	2.20
Streptotheca indica 印度扭鞘藻	0	0	10	3.3	5.8	0.49	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
渦鞭毛藻類																	
Gymodinium sp. 裸甲藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	0	3.3	5.8	0.39	0	0	0.0	0.0	0.00
Noctiluca scintillans 夜光藻	0	10	0	3.3	5.8	0.49	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Protoperidinium spp. 多甲藻	0	10	20	10.0	10.0	1.48	0	0	10	3.3	5.8	0.39	0	0	0.0	0.0	0.00
藍綠藻類																	
Trichodesmium sp. 束毛藻	10	0	0	3.3	5.8	0.49	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
總　合	350	1,290	390	676.7	531.5	100	890	840	810	846.7	40.4	100	370	540	455.0	120.2	100
Species NO. 種類數	15	28	15	37			22	22	19	33			14	16	19		
Simpson's Dominance Index優勢種指數	0.1135	0.1210	0.2610	0.1050			0.1312	0.2001	0.1004	0.0894			0.1045	0.0919	0.0914		
Shannon-Weiner Index歧異度指數	2.4605	2.6373	1.9890	2.8611			2.5748	2.3068	2.5875	2.8509			2.4162	2.5598	2.6104		
Evenness均勻度指數	0.9086	0.7915	0.7345	0.7924			0.8330	0.7463	0.8788	0.8153			0.9155	0.9232	0.8866		

表3-8 民國111年11月17日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-環保署公告之沈澱法

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Species				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
矽藻類																	
Bacillaria paradoxa 奇異棍形藻	0	0	10	3.3	5.8	3.23	10	20	0	10.0	10.0	5.36	0	0	0.0	0.0	0.00
Bacteriastrum comosum 平凡輻桿藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	5.0	7.1	4.00
Bacteriastrum delicatulum 優美輻桿藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	0	3.3	5.8	1.79	0	0	0.0	0.0	0.00
Bacteriastrum elongatum 長輻桿藻	10	0	0	3.3	5.8	3.23	20	0	0	6.7	11.5	3.57	10	0	5.0	7.1	4.00
Bacteriastrum spp. 輻桿藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	20	6.7	11.5	3.57	0	0	0.0	0.0	0.00
Bellerochea malleus 錘狀中鼓藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	5.0	7.1	4.00
Chaetoceros affinis 窄隙角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	20	30	16.7	15.3	8.93	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros curvisetus 旋鏈角刺藻	0	0	10	3.3	5.8	3.23	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	10	10.0	0.0	8.00
Chaetoceros danicum 丹麥角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	5.0	7.1	4.00
Chaetoceros decipiens 並基角刺藻	0	0	20	6.7	11.5	6.45	0	10	0	3.3	5.8	1.79	40	10	25.0	21.2	20.00
Chaetoceros lorenzianus 洛氏角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	5.0	7.1	4.00
Chaetoceros pendulus 搖動角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	0	3.3	5.8	1.79	0	0	0.0	0.0	0.00
Corethron hystrix 小環毛藻	0	0	10	3.3	5.8	3.23	10	10	10	10.0	0.0	5.36	0	0	0.0	0.0	0.00
Cyclotella sp. 小環藻	0	0	20	6.7	11.5	6.45	10	20	20	16.7	5.8	8.93	0	0	0.0	0.0	0.00
Dactyliosolen fragilissimus 脆指管藻	0	0	10	3.3	5.8	3.23	0	10	10	6.7	5.8	3.57	0	20	10.0	14.1	8.00
Eucampia zodiacus 短角彎角藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	5.0	7.1	4.00
Guinardia delicatula 柔弱幾內亞藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	30	20	20.0	10.0	10.71	10	10	10.0	0.0	8.00
Guinardia striata 斯托幾內亞藻	10	0	60	23.3	32.1	22.58	10	30	0	13.3	15.3	7.14	0	10	5.0	7.1	4.00
Lauderia annulata 北方勞德藻	0	0	10	3.3	5.8	3.23	20	20	10	16.7	5.8	8.93	0	0	0.0	0.0	0.00
Leptocylindrus danicus 丹麥細柱藻	0	0	10	3.3	5.8	3.23	10	20	0	10.0	10.0	5.36	0	0	0.0	0.0	0.00
Leptocylindrus minimus 微小細柱藻	0	0	10	3.3	5.8	3.23	10	20	0	10.0	10.0	5.36	0	0	0.0	0.0	0.00
Melosira nummuloides 擬銀幣直鏈藻	0	0	20	6.7	11.5	6.45	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Melosira sp. 直鏈藻	0	0	30	10.0	17.3	9.68	0	10	10	6.7	5.8	3.57	0	10	5.0	7.1	4.00
Nitzschia lanceolata 披針菱形藻	0	0	20	6.7	11.5	6.45	20	0	10	10.0	10.0	5.36	0	0	0.0	0.0	0.00
Nitzschia palea 谷皮菱形藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	20	0	6.7	11.5	3.57	0	0	0.0	0.0	0.00
Nitzschia spp. 菱形藻	0	0	10	3.3	5.8	3.23	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	5.0	7.1	4.00
Pleurosigma spp. 斜紋藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	10	10.0	0.0	8.00
Rhizosolenia styliformis 筆尖根管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	20	0	0	6.7	11.5	3.57	10	0	5.0	7.1	4.00
Skeletonema costatum 中肋骨條藻	0	10	0	3.3	5.8	3.23	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	20	10.0	14.1	8.00
Thalassionema frauenfeldii 伏恩海線藻	0	0	10	3.3	5.8	3.23	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
渦鞭毛藻類																	
Ceratium spp. 角藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	0	3.3	5.8	1.79	0	0	0.0	0.0	0.00
Protoperidinium spp. 多甲藻	20	0	0	6.7	11.5	6.45	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
總　合	40	10	260	103.3	136.5	100	160	260	140	186.7	64.3	100	110	140	125.0	21.2	100
Species NO. 種類數	3	1	15	18			12	15	9	20			8	12	16		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.3750	1.0000	0.1036	0.0926			0.0938	0.0769	0.1327	0.0638			0.1901	0.0918	0.0880		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	1.0397	0.0000	2.5046	2.6647			2.4260	2.6313	2.1066	2.8605			1.8938	2.4410	2.6197		
Evenness 均勻度指數	0.9464		0.9249	0.9219			0.9763	0.9717	0.9587	0.9548			0.9107	0.9823	0.9449		

表3-9 民國110年2月26日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/1)及種類組成-原過濾濃縮法

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Species				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
矽藻類																	
Bacteriastrum comosum 平凡輻桿藻	5	0	10	5.0	5.0	6.12	0	5	0	1.7	2.9	1.27	0	10	5.0	7.1	2.90
Bacteriastrum delicatulum 優美輻桿藻	0	0	5	1.7	2.9	2.04	5	5	10	6.7	2.9	5.06	20	10	15.0	7.1	8.70
Bellerochea malleus 錘狀中鼓藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	15	0	6.7	7.6	5.06	40	0	20.0	28.3	11.59
Chaetoceros affinis 窄隙角刺藻	5	0	0	1.7	2.9	2.04	10	0	5	5.0	5.0	3.80	0	5	2.5	3.5	1.45
Chaetoceros atlanticus 大西洋角刺藻	0	0	5	1.7	2.9	2.04	5	0	10	5.0	5.0	3.80	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros coarctatus 密聚角刺藻	0	0	5	1.7	2.9	2.04	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros compressus 扁面角刺藻	0	5	5	3.3	2.9	4.08	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros curvisetus 旋鏈角刺藻	0	10	0	3.3	5.8	4.08	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros decipiens 並基角刺藻	15	10	10	11.7	2.9	14.29	30	25	0	18.3	16.1	13.92	50	15	32.5	24.7	18.84
Chaetoceros laevis 平滑角刺藻	0	0	5	1.7	2.9	2.04	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros lorenzianum 洛氏角刺藻	0	10	0	3.3	5.8	4.08	30	5	15	16.7	12.6	12.66	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros pendulum 搖動角刺藻	0	5	0	1.7	2.9	2.04	15	0	0	5.0	8.7	3.80	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros pseudocurvisetus 擬灣角刺藻	0	5	0	1.7	2.9	2.04	0	5	0	1.7	2.9	1.27	0	0	0.0	0.0	0.00
Coscinodiscus spp. 圓篩藻	5	5	5	5.0	0.0	6.12	30	5	0	11.7	16.1	8.86	10	35	22.5	17.7	13.04
Cylindrotheca closterium 新月筒柱藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	0	10	5.0	5.0	3.80	30	5	17.5	17.7	10.14
Guinardia delicatula 柔弱幾內亞藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	5	5.0	5.0	3.80	0	0	0.0	0.0	0.00
Guinardia striata 斯托幾內亞藻	5	10	0	5.0	5.0	6.12	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	10	10.0	0.0	5.80
Hemiaulus sinensis 中華半管藻	0	5	5	3.3	2.9	4.08	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Lauderia annulata 北方勞德藻	20	5	0	8.3	10.4	10.20	5	0	0	1.7	2.9	1.27	0	0	0.0	0.0	0.00
Navicula spp. 舟形藻	0	0	5	1.7	2.9	2.04	5	5	0	3.3	2.9	2.53	0	5	2.5	3.5	1.45
Nitzschia sp. 菱形藻	0	5	5	3.3	2.9	4.08	10	5	15	10.0	5.0	7.59	10	5	7.5	3.5	4.35
Proboscia alata 翼鼻狀藻=異根管藻	0	10	5	5.0	5.0	6.12	0	25	0	8.3	14.4	6.33	20	35	27.5	10.6	15.94
Rhizosolenia calcar-avis 距端根管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	5	1.7	2.9	1.27	0	0	0.0	0.0	0.00
Rhizosolenia setigera 剛毛根管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	5.0	7.1	2.90
Rhizosolenia styliformis 筆尖型根管藻	5	0	5	3.3	2.9	4.08	0	15	15	10.0	8.7	7.59	0	0	0.0	0.0	0.00
Stephanophxis nipponica 日本冠蓋藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	0	0	1.7	2.9	1.27	0	0	0.0	0.0	0.00
Thalassionema frauenfeldii 伏恩海毛藻	5	0	10	5.0	5.0	6.12	0	10	0	3.3	5.8	2.53	0	0	0.0	0.0	0.00
Thalassionema nitzschioides 菱形海線藻	5	0	5	3.3	2.9	4.08	5	0	0	1.7	2.9	1.27	0	0	0.0	0.0	0.00
渦鞭毛藻類																	
Ceratium spp. 角藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	0	1.7	2.9	1.27	0	0	0.0	0.0	0.00
Protoperidinium spp. 多甲藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	5.0	7.1	2.90
總　合	70	85	90	82	10	100	175	130	90	132	43	100	200	145	173	39	100
Species NO. 種類數	9	12	15	22			15	13	9	22			9	11	13		
Simpson's Dominance Index優勢種指數	0.1633	0.0934	0.0741	0.0646			0.1118	0.1183	0.1296	0.0735			0.1550	0.1510	0.1174		
Shannon-Weiner Index歧異度指數	2.0076	2.4255	2.6593	2.9153			2.4209	2.3322	2.1100	2.8136			2.0127	2.1230	2.2993		
Evenness 均勻度指數	0.9137	0.9761	0.9820	0.9431			0.8940	0.9093	0.9603	0.9102			0.9160	0.8854	0.8964		

表3-10 民國110年5月14日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/1)及種類組成-原過濾濃縮法

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Species				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
矽藻類																	
Bacteriastrum comosum 平凡輻桿藻	5	0	0	1.7	2.9	2.63	0	0	5	1.7	2.9	1.16	0	5	2.5	3.5	2.13
Bacteriastrum delicatulum 優美輻桿藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	25	0	10.0	13.2	6.98	0	5	2.5	3.5	2.13
Chaetoceros affinis 窄隙角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	0	3.3	5.8	2.33	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros curvisetus 旋鏈角刺藻	10	5	0	5.0	5.0	7.89	15	15	15	15.0	0.0	10.47	5	0	2.5	3.5	2.13
Chaetoceros decipiens 並基角刺藻	10	5	5	6.7	2.9	10.53	10	45	15	23.3	18.9	16.28	15	30	22.5	10.6	19.15
Chaetoceros lorenzianum 洛氏角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	2.5	3.5	2.13
Coscinodiscus spp. 圓篩藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	5	10	6.7	2.9	4.65	0	0	0.0	0.0	0.00
Guinardia delicatula 柔弱幾內亞藻	0	5	0	1.7	2.9	2.63	5	15	5	8.3	5.8	5.81	5	0	2.5	3.5	2.13
Guinardia striata 斯托幾內亞藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	0	2.5	3.5	2.13
Helicotheca tamesis 泰唔士旋鞘藻	5	0	0	1.7	2.9	2.63	5	0	0	1.7	2.9	1.16	0	30	15.0	21.2	12.77
Lauderia annulata 北方勞德藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	10	0	5.0	5.0	3.49	0	0	0.0	0.0	0.00
Navicula spp. 舟形藻	0	0	5	1.7	2.9	2.63	0	5	0	1.7	2.9	1.16	0	0	0.0	0.0	0.00
Nitzschia sp. 菱形藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	10	6.7	5.8	4.65	0	0	0.0	0.0	0.00
Proboscia alata 翼鼻狀藻=異根管藻	15	5	15	11.7	5.8	18.42	20	10	0	10.0	10.0	6.98	0	0	0.0	0.0	0.00
Rhizosolenia styliformis 筆尖型根管藻	5	0	0	1.7	2.9	2.63	10	0	0	3.3	5.8	2.33	5	25	15.0	14.1	12.77
Thalassionema frauenfeldii 伏恩海線藻	10	0	0	3.3	5.8	5.26	30	25	0	18.3	16.1	12.79	0	10	5.0	7.1	4.26
Thalassionema nitzschioides 菱形海線藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	0	2.5	3.5	2.13
渦鞭毛藻類																	
Ceratium spp. 角藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	2.5	3.5	2.13
藍綠藻類																	
Trichodesmium erythraeum 紅海束毛藻	15	35	35	28.3	11.5	44.74	30	50	5	28.3	22.5	19.77	55	25	40.0	21.2	34.04
總 合	75	55	60	63	10	100	140	225	65	143	80	100	95	140	118	32	100
Species NO. 種類數	8	5	4	10			11	12	7	15			7	9	13		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.1467	0.4380	0.4167	0.2576			0.1403	0.1319	0.1716	0.1130			0.3740	0.1658	0.1906		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	1.9913	1.1596	1.0751	1.7425			2.1495	2.2282	1.8446	2.3849			1.3827	1.9400	1.9986		
Evenness 均勻度指數	0.9576	0.7205	0.7755	0.7568			0.8964	0.8967	0.9479	0.8807			0.7106	0.8829	0.7792		

表3-11 民國110年8月17日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/1)及種類組成-原過濾濃縮法

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Species				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
矽藻類																	
Bacteriastrum comosum 平凡輻桿藻	5	0	0	1.7	2.9	1.43	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Bacteriastrum delicatulum 優美輻桿藻	0	5	5	3.3	2.9	2.86	10	20	5	11.7	7.6	7.95	5	10	7.5	3.5	6.00
Chaetoceros affinis 窄隙角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	0	1.7	2.9	1.14	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros curvisetus 旋鏈角刺藻	0	20	10	10.0	10.0	8.57	5	5	10	6.7	2.9	4.55	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros decipiens 並基角刺藻	40	25	20	28.3	10.4	24.29	30	30	25	28.3	2.9	19.32	30	20	25.0	7.1	20.00
Coscinodiscus spp. 圓篩藻	5	0	15	6.7	7.6	5.71	10	10	10	10.0	0.0	6.82	0	0	0.0	0.0	0.00
Guinardia delicatula 柔弱幾內亞藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	5	5.0	5.0	3.41	5	0	2.5	3.5	2.00
Helicotheca tamesis 泰唔士旋鞘藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	5.0	7.1	4.00
Navicula spp. 舟形藻	0	0	5	1.7	2.9	1.43	0	5	0	1.7	2.9	1.14	0	0	0.0	0.0	0.00
Proboscia alata 翼鼻狀藻=異根管藻	0	5	0	1.7	2.9	1.43	25	15	0	13.3	12.6	9.09	0	0	0.0	0.0	0.00
Rhizosolenia setigera 剛毛根管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	0	0	1.7	2.9	1.14	0	0	0.0	0.0	0.00
Rhizosolenia stolefothii 斯托根管藻	20	0	5	8.3	10.4	7.14	5	0	10	5.0	5.0	3.41	5	10	7.5	3.5	6.00
Rhizosolenia styliformis 筆尖型根管藻	5	0	0	1.7	2.9	1.43	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	25	15.0	14.1	12.00
Thalassiothrix frauenfeldii 伏恩海毛藻	20	25	15	20.0	5.0	17.14	35	30	20	28.3	7.6	19.32	10	20	15.0	7.1	12.00
渦鞭毛藻類																	
Ceratium spp. 角藻	0	10	0	3.3	5.8	2.86	0	0	5	1.7	2.9	1.14	0	5	2.5	3.5	2.00
藍綠藻類																	
Trichodesmium erythraeum 紅海束毛藻	35	20	35	30.0	8.7	25.71	30	40	25	31.7	7.6	21.59	55	35	45.0	14.1	36.00
總 合	130	110	110	117	12	100	155	170	115	147	28	100	115	135	125	14	100
Species NO. 種類數	7	7	8	12			9	10	9	13			7	8	9		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.2189	0.1818	0.1860	0.1727			0.1634	0.1488	0.1531	0.1454			0.3119	0.1632	0.2080		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	1.6678	1.7924	1.8572	2.0038			1.9520	2.0631	2.0138	2.1430			1.4610	1.9285	1.8214		
Evenness 均勻度指數	0.8571	0.9211	0.8931	0.8064			0.8884	0.8960	0.9165	0.8355			0.7508	0.9274	0.8290		

表3-12 民國110年11月5日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-原過濾濃縮法

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Species				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
矽藻類																	
Asterionella japonica 日本星桿藻	35	80	45	53.3	23.6	5.49	55	30	100	61.7	35.5	5.25	50	60	55.0	7.1	5.98
Bellerochea malleus 錘狀中鼓藻	10	0	0	3.3	5.8	0.34	20	0	0	6.7	11.5	0.57	0	0	0.0	0.0	0.00
Cerataulina bicornis 緊密角管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	30	10.0	17.3	0.85	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros affinis 窄隙角刺藻	55	200	65	106.7	81.0	10.98	90	105	225	140.0	74.0	11.91	120	80	100.0	28.3	10.87
Chaetoceros atlanticus 大西洋角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	25	12.5	17.7	1.36
Chaetoceros coarctatus 密聚角刺藻	10	0	20	10.0	10.0	1.03	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros compressus 扁面角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	30	10.0	17.3	0.85	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros curvisetus 旋鏈角刺藻	405	345	375	375.0	30.0	38.59	450	315	330	365.0	74.0	31.06	555	360	457.5	137.9	49.73
Chaetoceros decipiens 並基角刺藻	235	190	290	238.3	50.1	24.53	455	240	305	333.3	110.3	28.37	135	95	115.0	28.3	12.50
Chaetoceros laevis 平滑角刺藻	0	30	0	10.0	17.3	1.03	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	2.5	3.5	0.27
Chaetoceros pendulum 搖動角刺藻	45	35	0	26.7	23.6	2.74	0	0	0	0.0	0.0	0.00	40	25	32.5	10.6	3.53
Coscinodiscus spp. 圓篩藻	20	0	0	6.7	11.5	0.69	0	15	5	6.7	7.6	0.57	30	0	15.0	21.2	1.63
Cylindrotheca closterium 新月筒柱藻	0	0	20	6.7	11.5	0.69	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Ditylum brightwellii 布氏雙尾藻	0	0	20	6.7	11.5	0.69	0	15	20	11.7	10.4	0.99	10	0	5.0	7.1	0.54
Eucampia zodiacus 短角彎角藻	0	25	0	8.3	14.4	0.86	15	15	0	10.0	8.7	0.85	0	0	0.0	0.0	0.00
Guinardia delicatula 柔弱幾內亞藻	0	15	0	5.0	8.7	0.51	35	0	30	21.7	18.9	1.84	0	0	0.0	0.0	0.00
Guinardia striata 斯托根管藻	20	0	0	6.7	11.5	0.69	20	0	20	13.3	11.5	1.13	0	5	2.5	3.5	0.27
Hemiaulus hauckii 霍克半管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	5.0	7.1	0.54
Hemiaulus indicus 印度半管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	15	5.0	8.7	0.43	0	0	0.0	0.0	0.00
Hemiaulus sinensis 中華半管藻	20	0	25	15.0	13.2	1.54	15	45	60	40.0	22.9	3.40	0	15	7.5	10.6	0.82
Lauderia annulata 北方勞德藻	0	0	15	5.0	8.7	0.51	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Rhizosolenia calcar-avis 距端根管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	25	0	12.5	17.7	1.36
Rhizosolenia setigera 剛毛根管藻	0	15	0	5.0	8.7	0.51	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Rhizosolenia styliformis 筆尖型根管藻	40	30	25	31.7	7.6	3.26	30	50	55	45.0	13.2	3.83	55	45	50.0	7.1	5.43
Skeletonema costatum 條骨藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	15	0	8.3	7.6	0.71	0	0	0.0	0.0	0.00
Thalassionema nitzschioides 菱形海線藻	20	0	35	18.3	17.6	1.89	25	30	0	18.3	16.1	1.56	0	15	7.5	10.6	0.82
Trieres chinensis 中華盒形藻	0	25	0	8.3	14.4	0.86	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
渦鞭毛藻類												0.00					0.00
Ceratium macroceros 長角角藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	2.5	3.5	0.27
藍綠藻類												0.00					0.00
Trichodesmium erythraeum 紅海束毛藻	20	35	20	25.0	8.7	2.57	90	45	70	68.3	22.5	5.82	45	30	37.5	10.6	4.08
總 合	935	1,025	955	971.7	47.3	100	1,310	920	1,295	1,175.0	221.0	100	1,065	775	920.0	205.1	100
Species NO. 種類數	13	12	12	21			13	12	14	18			10	14	17		
Simpson's Dominance Index優勢種指數	0.2623	0.1975	0.2580	0.2279			0.2522	0.2092	0.1657	0.2011			0.3098	0.2554	0.2850		
Shannon-Weiner Index歧異度指數	1.7882	1.9390	1.7568	1.9711			1.7615	1.9104	2.0886	2.0081			1.6335	1.8651	1.7910		
Evenness 均勻度指數	0.6972	0.7803	0.7070	0.6474			0.6868	0.7688	0.7914	0.6947			0.7094	0.7067	0.6321		

表3-13 民國111年2月16日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/1)及種類組成-原過濾濃縮法

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Species				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
矽藻類																	
Asterionella japonica 日本星桿藻	2	0	0	0.7	1.2	1.02	1	0	0	0.3	0.6	0.41	1	0	0.5	0.7	1.00
Asterolampra marylandica 南方星芒藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	1	0.5	0.7	1.00
Bacteriastrum comosum 平凡輻桿藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	2	0	0.7	1.2	0.83	0	0	0.0	0.0	0.00
Bacteriastrum delicatulum 優美輻桿藻	0	1	3	1.3	1.5	2.03	0	2	3	1.7	1.5	2.07	1	0	0.5	0.7	1.00
Bacteriastrum elongatum 長輻桿藻	0	4	0	1.3	2.3	2.03	0	0	0	0.0	0.0	0.00	2	0	1.0	1.4	2.00
Bacteriastrum minus 小輻桿藻	9	6	1	5.3	4.0	8.12	6	15	4	8.3	5.9	10.37	3	3	3.0	0.0	6.00
Biddulphia spp. 盒形藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	1	0.5	0.7	1.00
Cerataulina bergonii 古柏角管藻	0	2	1	1.0	1.0	1.52	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros affinis 窄隙角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	1	0	3	1.3	1.5	1.66	1	0	0.5	0.7	1.00
Chaetoceros atlanticus 大西洋角刺藻	4	2	1	2.3	1.5	3.55	0	4	2	2.0	2.0	2.49	1	2	1.5	0.7	3.00
Chaetoceros coarctatus 密聚角刺藻	1	1	0	0.7	0.6	1.02	0	3	0	1.0	1.7	1.24	0	1	0.5	0.7	1.00
Chaetoceros compressus 扁面角刺藻	6	2	2	3.3	2.3	5.08	6	0	1	2.3	3.2	2.90	2	2	2.0	0.0	4.00
Chaetoceros curvisetus 旋鏈角刺藻	0	1	0	0.3	0.6	0.51	0	0	0	0.0	0.0	0.00	1	0	0.5	0.7	1.00
Chaetoceros decipiens 並基角刺藻	19	6	1	8.7	9.3	13.20	4	23	12	13.0	9.5	16.18	3	7	5.0	2.8	10.00
Chaetoceros dichaeta 雙刺角刺藻	2	0	3	1.7	1.5	2.54	3	2	1	2.0	1.0	2.49	4	0	2.0	2.8	4.00
Chaetoceros diversus 異角角刺藻	0	0	1	0.3	0.6	0.51	2	0	0	0.7	1.2	0.83	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros lorenzianus 洛氏角刺藻	2	12	9	7.7	5.1	11.68	27	3	0	10.0	14.8	12.45	4	1	2.5	2.1	5.00
Chaetoceros messanense 短刺角刺藻	1	0	1	0.7	0.6	1.02	1	0	1	0.7	0.6	0.83	3	1	2.0	1.4	4.00
Chaetoceros pendulus 搖動角刺藻	0	0	2	0.7	1.2	1.02	0	2	2	1.3	1.2	1.66	4	3	3.5	0.7	7.00
Chaetoceros spp. 角刺藻	2	1	3	2.0	1.0	3.05	1	2	2	1.7	0.6	2.07	3	2	2.5	0.7	5.00
Corethron hystrix 小環毛藻	1	0	0	0.3	0.6	0.51	0	1	0	0.3	0.6	0.41	0	0	0.0	0.0	0.00
Coscinodiscus spp. 圓篩藻	0	1	1	0.7	0.6	1.02	2	0	0	0.7	1.2	0.83	2	1	1.5	0.7	3.00
Dactyliosolen fragilissimus 脆指管藻	2	1	0	1.0	1.0	1.52	1	1	1	1.0	0.0	1.24	0	0	0.0	0.0	0.00
Ditylum brightwellii 布氏雙尾藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	1	0.5	0.7	1.00
Eucampia zodiacus 短角彎角藻	2	0	0	0.7	1.2	1.02	1	1	0	0.7	0.6	0.83	0	0	0.0	0.0	0.00
Fragilaria spp. 脆桿藻	0	0	1	0.3	0.6	0.51	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Guinardia striata 斯托幾內亞藻	1	0	1	0.7	0.6	1.02	4	1	0	1.7	2.1	2.07	0	0	0.0	0.0	0.00
Helicotheca tamesis 泰唔士旋鞘藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	1	0	0	0.3	0.6	0.41	0	0	0.0	0.0	0.00
Hemiaulus hauckii 霍克半管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	1	0	1	0.7	0.6	0.83	0	1	0.5	0.7	1.00
Hemiaulus indicus 印度半管藻	0	1	2	1.0	1.0	1.52	1	1	0	0.7	0.6	0.83	0	0	0.0	0.0	0.00
Hemiaulus sinensis 中華半管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	1	0	0	0.3	0.6	0.41	0	0	0.0	0.0	0.00
Lauderia annulata 北方勞德藻	2	1	2	1.7	0.6	2.54	1	4	6	3.7	2.5	4.56	1	2	1.5	0.7	3.00
Leptocylindrus danicus 丹參細柱藻	0	0	1	0.3	0.6	0.51	0	1	0	0.3	0.6	0.41	0	1	0.5	0.7	1.00
Licmophora abbreviata 短紋楔形藻	1	0	0	0.3	0.6	0.51	0	1	0	0.3	0.6	0.41	0	0	0.0	0.0	0.00
Nitzschia lanceolata 披針菱形藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	1	0	0.3	0.6	0.41	0	1	0.5	0.7	1.00
Nitzschia spp. 菱形藻	2	8	3	4.3	3.2	6.60	5	4	3	4.0	1.0	4.98	2	3	2.5	0.7	5.00
Pleurosigma normanii 中舟紋藻	0	0	3	1.0	1.7	1.52	0	0	0	0.0	0.0	0.00	1	0	0.5	0.7	1.00
Pleurosigma spp. 舟紋藻	1	4	0	1.7	2.1	2.54	0	0	0	0.0	0.0	0.00	1	1	1.0	0.0	2.00
Proboscia alata 翼鼻狀藻=異根管藻	0	0	3	1.0	1.7	1.52	1	0	1	0.7	0.6	0.83	1	1	1.0	0.0	2.00
Rhizosolenia calcar-avis 距端根管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	1	0	0	0.3	0.6	0.41	1	0	0.5	0.7	1.00
Rhizosolenia imbricata 覆瓦根管藻	0	0	1	0.3	0.6	0.51	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Rhizosolenia stigerae 剛毛根管藻	0	5	2	2.3	2.5	3.55	2	0	0	0.7	1.2	0.83	0	0	0.0	0.0	0.00
Rhizosolenia styliformis 筆尖形根管藻	4	0	3	2.3	2.1	3.55	4	8	3	5.0	2.6	6.22	1	9	5.0	5.7	10.00
Skeletonema costatum 中肋骨條藻	0	1	0	0.3	0.6	0.51	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Stephanopyxis nipponica 日本冠蓋藻	1	0	0	0.3	0.6	0.51	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Stephanopyxis palmeriana 掌狀冠蓋藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	1	0	0	0.3	0.6	0.41	0	0	0.0	0.0	0.00
Streptotheca indica 印度扭鞘藻	2	0	0	0.7	1.2	1.02	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	1	0.5	0.7	1.00
Thalassionema frauenfeldii 伏思海線藻	0	1	0	0.3	0.6	0.51	4	0	3	2.3	2.1	2.90	1	1	1.0	0.0	2.00
Thalassionema nitzschioides 菱形海線藻	0	0	1	0.3	0.6	0.51	1	2	0	1.0	1.0	1.24	0	0	0.0	0.0	0.00
Trieres chinensis 中華盒形藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	2	0	0.7	1.2	0.83	0	0	0.0	0.0	0.00
渦鞭毛藻類																	
Ceratium extensum 長梭角藻	0	1	0	0.3	0.6	0.51	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Ceratium furca 長叉狀角藻	0	1	0	0.3	0.6	0.51	1	0	0	0.3	0.6	0.41	0	0	0.0	0.0	0.00
Ceratium macroceros 長角角藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	1	0	0.5	0.7	1.00
Ceratium spp. 角藻	0	0	1	0.3	0.6	0.51	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Gymodinium sp. 裸甲藻	0	0	2	0.7	1.2	1.02	3	0	0	1.0	1.7	1.24	3	0	1.5	2.1	3.00
Protoperidinium spp. 多甲藻	1	2	2	1.7	0.6	2.54	1	0	0	0.3	0.6	0.41	2	0	1.0	1.4	2.00
Pyrophacus horologicum 鍾扁甲藻	3	0	0	1.0	1.7	1.52	0	4	2	2.0	2.0	2.49	0	3	1.5	2.1	3.00
藍綠藻類																	
Trichodesmium erythraeum 紅海束毛藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	9	0	0	3.0	5.2	3.73	0	0	0.0	0.0	0.00
Trichodesmium sp. 束毛藻	0	4	0	1.3	2.3	2.03	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
綠藻類																	
Crucigenia sp. 十字藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	2	0	0	0.7	1.2	0.83	0	0	0.0	0.0	0.00
總　合	71	69	57	65.7	7.6	100	100	90	51	80.3	25.9	100	50	50	50.0	0.0	100
Species NO. 種類數	23	24	28	45			32	24	18	43			26	24	35		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.1117	0.0800	0.0569	0.0558			0.1022	0.1156	0.1011	0.0692			0.0504	0.0784	0.0488		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	2.6664	2.8112	3.1211	3.3022			2.8789	2.6348	2.5958	3.1398			3.1111	2.8695	3.2591		
Evenness 均勻度指數	0.8504	0.8846	0.9367	0.8675			0.8307	0.8291	0.8981	0.8348			0.9549	0.9029	0.9167		

表3-14 民國111年5月5日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/1)及種類組成-原過濾濃縮法

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Species				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
矽藻類																	
Asterionella japonica 日本星桿藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	0	0	1.7	2.9	0.12	0	0	0.0	0.0	0.00
Bacteriastrum comosum 平凡輻桿藻	30	5	15	16.7	12.6	1.40	5	5	0	3.3	2.9	0.25	0	5	2.5	3.5	0.21
Bacteriastrum delicatulum 優美輻桿藻	0	5	0	1.7	2.9	0.14	40	40	10	30.0	17.3	2.24	0	10	5.0	7.1	0.41
Bacteriastrum elongatum 長輻桿藻	20	20	30	23.3	5.8	1.96	60	50	15	41.7	23.6	3.11	20	40	30.0	14.1	2.49
Bacteriastrum minus 小輻桿藻	0	40	50	30.0	26.5	2.52	220	80	80	126.7	80.8	9.45	230	0	115.0	162.6	9.54
Bellerochea malleus 錘狀中鼓藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	5	3.3	2.9	0.25	0	0	0.0	0.0	0.00
Biddulphia spp. 盒形藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	5.0	7.1	0.41
Cerataulina bergonii 古柏角管藻	10	5	10	8.3	2.9	0.70	5	5	0	3.3	2.9	0.25	10	20	15.0	7.1	1.24
Chaetoceros affinis 窄隙角刺藻	10	15	15	13.3	2.9	1.12	20	5	0	8.3	10.4	0.62	5	45	25.0	28.3	2.07
Chaetoceros atlanticus 大西洋角刺藻	0	15	25	13.3	12.6	1.12	30	25	10	21.7	10.4	1.62	10	5	7.5	3.5	0.62
Chaetoceros coarctatus 密聚角刺藻	5	0	0	1.7	2.9	0.14	0	10	0	3.3	5.8	0.25	5	10	7.5	3.5	0.62
Chaetoceros compressus 扁面角刺藻	25	20	0	15.0	13.2	1.26	130	10	95	78.3	61.7	5.85	5	0	2.5	3.5	0.21
Chaetoceros curvisetus 旋鏈角刺藻	10	0	0	3.3	5.8	0.28	0	5	0	1.7	2.9	0.12	5	0	2.5	3.5	0.21
Chaetoceros danicus 丹麥角刺藻	15	20	25	20.0	5.0	1.68	10	0	10	6.7	5.8	0.50	5	0	2.5	3.5	0.21
Chaetoceros decipiens 並基角刺藻	145	170	160	158.3	12.6	13.31	235	250	130	205.0	65.4	15.30	280	55	167.5	159.1	13.90
Chaetoceros dichaeta 雙刺角刺藻	35	15	5	18.3	15.3	1.54	0	10	5	5.0	5.0	0.37	15	0	7.5	10.6	0.62
Chaetoceros diversus 異角角刺藻	30	5	5	13.3	14.4	1.12	15	0	0	5.0	8.7	0.37	0	5	2.5	3.5	0.21
Chaetoceros lorenzianus 洛氏角刺藻	100	85	110	98.3	12.6	8.26	0	0	5	1.7	2.9	0.12	0	85	42.5	60.1	3.53
Chaetoceros messanense 短刺角刺藻	0	15	5	6.7	7.6	0.56	0	10	5	5.0	5.0	0.37	15	15	15.0	0.0	1.24
Chaetoceros pendulus 搖動角刺藻	15	25	40	26.7	12.6	2.24	10	15	0	8.3	7.6	0.62	30	20	25.0	7.1	2.07
Chaetoceros spp. 角刺藻	0	15	40	18.3	20.2	1.54	10	40	25	25.0	15.0	1.87	5	0	2.5	3.5	0.21
Corethron hystrix 小環毛藻	5	20	20	15.0	8.7	1.26	10	0	20	10.0	10.0	0.75	10	5	7.5	3.5	0.62
Coscinodiscus spp. 圓篩藻	5	0	15	6.7	7.6	0.56	0	0	0	0.0	0.0	0.00	15	10	12.5	3.5	1.04
Cyclotella sp. 小環藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	5	5.0	5.0	0.37	0	0	0.0	0.0	0.00
Cylindrotheca closterium 新月筒柱藻	0	15	25	13.3	12.6	1.12	0	0	50	16.7	28.9	1.24	0	0	0.0	0.0	0.00
Dactyliosolen fragilissimus 脆指管藻	0	0	20	6.7	11.5	0.56	5	15	0	6.7	7.6	0.50	0	0	0.0	0.0	0.00
Ditylum brightwellii 布氏雙尾藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	0	3.3	5.8	0.25	0	0	0.0	0.0	0.00
Eucampia zodiacus 短角彎角藻	10	25	30	21.7	10.4	1.82	65	55	15	45.0	26.5	3.36	35	10	22.5	17.7	1.87
Fragilaria spp. 脆桿藻	15	0	5	6.7	7.6	0.56	15	10	15	13.3	2.9	1.00	10	5	7.5	3.5	0.62
Guinardia delicatula 柔弱幾內亞藻	15	25	25	21.7	5.8	1.82	15	30	15	20.0	8.7	1.49	10	10	10.0	0.0	0.83
Guinardia striata 斯托幾內亞藻	0	40	50	30.0	26.5	2.52	60	40	15	38.3	22.5	2.86	25	20	22.5	3.5	1.87
Helicotheca tamesis 泰唔士旋鞘藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	25	0	8.3	14.4	0.62	10	0	5.0	7.1	0.41
Hemiaulus hauckii 霍克半管藻	0	5	15	6.7	7.6	0.56	70	45	40	51.7	16.1	3.86	60	20	40.0	28.3	3.32
Hemiaulus indicus 印度半管藻	0	0	10	3.3	5.8	0.28	10	0	15	8.3	7.6	0.62	20	5	12.5	10.6	1.04
Hemiaulus sinensis 中華半管藻	10	5	15	10.0	5.0	0.84	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	2.5	3.5	0.21
Lauderia annulata 北方勞德藻	0	0	5	1.7	2.9	0.14	35	10	25	23.3	12.6	1.74	5	5	5.0	0.0	0.41
Leptocylindrus danicus 丹麥細柱藻	45	40	65	50.0	13.2	4.20	140	100	60	100.0	40.0	7.46	65	40	52.5	17.7	4.36
Leptocylindrus minimus 微小細柱藻	30	0	25	18.3	16.1	1.54	40	25	45	36.7	10.4	2.74	10	0	5.0	7.1	0.41
Licmophora abbreviata 短紋楔形藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	40	5	15.0	21.8	1.12	30	0	15.0	21.2	1.24
Melosira nummuloides 擬銀幣直鏈藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	10	0	5.0	5.0	0.37	0	0	0.0	0.0	0.00
Melosira sp. 直鏈藻	0	0	5	1.7	2.9	0.14	5	10	0	5.0	5.0	0.37	0	0	0.0	0.0	0.00
Nitzschia lanceolata 披針菱形藻	15	0	0	5.0	8.7	0.42	0	15	0	5.0	8.7	0.37	0	0	0.0	0.0	0.00
Nitzschia longissima 長菱形藻	40	0	0	13.3	23.1	1.12	5	0	0	1.7	2.9	0.12	0	5	2.5	3.5	0.21
Nitzschia palea 谷皮菱形藻	0	0	20	6.7	11.5	0.56	0	5	15	6.7	7.6	0.50	0	5	2.5	3.5	0.21
Nitzschia spp. 菱形藻	0	15	5	6.7	7.6	0.56	35	150	40	75.0	65.0	5.60	105	50	77.5	38.9	6.43
Odontella aurita 長耳盒形藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	10	0	5.0	5.0	0.37	0	0	0.0	0.0	0.00
Pleurosigma normanii 中斜紋藻	0	10	10	6.7	5.8	0.56	0	10	0	3.3	5.8	0.25	10	20	15.0	7.1	1.24
Pleurosigma spp. 斜紋藻	20	5	0	8.3	10.4	0.70	10	45	50	35.0	21.8	2.61	50	5	27.5	31.8	2.28
Proboscia alata 翼鼻狀藻=異根管藻	5	15	10	10.0	5.0	0.84	50	20	40	36.7	15.3	2.74	50	20	35.0	21.2	2.90
Rhizosolenia calcar-avis 距端根管藻	5	15	20	13.3	7.6	1.12	10	0	5	5.0	5.0	0.37	5	30	17.5	17.7	1.45
Rhizosolenia setigera 剛毛根管藻	25	15	25	21.7	5.8	1.82	30	5	20	18.3	12.6	1.37	30	10	20.0	14.1	1.66
Rhizosolenia spp. 根管藻	5	25	25	18.3	11.5	1.54	0	5	0	1.7	2.9	0.12	0	5	2.5	3.5	0.21
Rhizosolenia styliformis 筆尖形根管藻	65	70	60	65.0	5.0	5.46	80	95	25	66.7	36.9	4.98	30	55	42.5	17.7	3.53
Stephanopyxis nipponica 日本冠蓋藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	0	0	1.7	2.9	0.12	0	0	0.0	0.0	0.00
Stephanopyxis palmeriana 掌狀冠蓋藻	5	0	0	1.7	2.9	0.14	0	5	0	1.7	2.9	0.12	5	0	2.5	3.5	0.21
Streptotheca indica 印度扭鞘藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	0	1.7	2.9	0.12	10	5	7.5	3.5	0.62
Thalassionema frauenfeldii 伏恩海線藻	10	5	0	5.0	5.0	0.42	30	15	5	16.7	12.6	1.24	5	10	7.5	3.5	0.62
Thalassionema nitzschioides 菱形海線藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	5.0	7.1	0.41
Trieres chinensis 中華盒形藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	0	2.5	3.5	0.21
渦鞭毛藻類																	
Ceratium macroceros 長角角藻	5	0	0	1.7	2.9	0.14	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Ceratium spp. 角藻	0	5	0	1.7	2.9	0.14	0	5	0	1.7	2.9	0.12	5	0	2.5	3.5	0.21
Gymodinium sp. 裸甲藻	20	5	0	8.3	10.4	0.70	35	0	0	11.7	20.2	0.87	20	15	17.5	3.5	1.45
Noctiluca scintillans 夜光藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	20	0	10.0	14.1	0.83
Ornithocercus spp. 烏尾藻	0	5	0	1.7	2.9	0.14	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Protoperidinium oceanicum 海洋多甲藻	0	0	5	1.7	2.9	0.14	0	0	0	0.0	0.0	0.00	20	0	10.0	14.1	0.83
Protoperidinium pellucidum 透澈多甲藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	5.0	7.1	0.41
Protoperidinium spp. 多甲藻	15	0	5	6.7	7.6	0.56	5	25	0	10.0	13.2	0.75	10	0	5.0	7.1	0.41
藍綠藻類																	
Trichodesmium erythraeum 紅海束毛藻	165	245	420	276.7	130.4	23.25	15	90	0	35.0	48.2	2.61	190	130	160.0	42.4	13.28
Trichodesmium sp. 束毛藻	30	0	0	10.0	17.3	0.84	0	10	0	3.3	5.8	0.25	0	50	25.0	35.4	2.07
總　合	1,015	1,085	1,470	1,190.0	245.0	100	1,595	1,505	920	1,340.0	366.5	100	1,545	865	1,205.0	480.8	100
Species NO. 種類數	36	37	40	26			41	47	33	59			47	38	56		
Simpson's Dominance Index優勢種指數	0.0733	0.0956	0.1109	0.0897			0.0697	0.0621	0.0620	0.0572			0.0842	0.0604	0.0619		
Shannon-Weiner Index歧異度指數	3.0464	2.9176	2.9094	3.1178			3.0724	3.2364	3.0789	3.3273			3.0368	3.1588	3.2928		
Evenness 均勻度指數	0.8501	0.8080	0.7887	0.7816			0.8273	0.8406	0.8806	0.8160			0.7888	0.8684	0.8180		

表3-15 民國111年8月12日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/1)及種類組成-原過濾濃縮法

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Species				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
矽藻類																	
Asterionella japonica 日本星桿藻	30	5	15	16.7	12.6	1.47	20	5	0	8.3	10.4	0.48	25	5	15.0	14.1	1.15
Bacillaria paradoxa 奇異棍形藻	0	0	35	11.7	20.2	1.03	60	45	30	45.0	15.0	2.59	0	0	0.0	0.0	0.00
Bacteriastrum comosum 平凡輻桿藻	10	15	0	8.3	7.6	0.73	15	5	0	6.7	7.6	0.38	35	125	80.0	63.6	6.15
Bacteriastrum delicatulum 優美輻桿藻	20	25	110	51.7	50.6	4.55	35	95	50	60.0	31.2	3.45	25	70	47.5	31.8	3.65
Bacteriastrum elongatum 長輻桿藻	310	125	105	180.0	113.0	15.84	110	65	145	106.7	40.1	6.14	160	235	197.5	53.0	15.19
Bacteriastrum minus 小輻桿藻	250	105	240	198.3	81.0	17.45	1050	385	500	645.0	355.4	37.10	70	385	227.5	222.7	17.50
Bellerochea malleus 錘狀中鼓藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	15	0	5.0	8.7	0.29	0	0	0.0	0.0	0.00
Cerataulina bergonii 古柏角管藻	0	0	10	3.3	5.8	0.29	10	0	0	3.3	5.8	0.19	5	15	10.0	7.1	0.77
Chaetoceros affinis 窄隙角刺藻	50	10	85	48.3	37.5	4.25	340	145	120	201.7	120.5	11.60	5	25	15.0	14.1	1.15
Chaetoceros atlanticus 大西洋角刺藻	15	25	0	13.3	12.6	1.17	30	5	5	13.3	14.4	0.77	0	20	10.0	14.1	0.77
Chaetoceros coarctatus 密聚角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	0	2.5	3.5	0.19
Chaetoceros compressus 扁面角刺藻	30	30	15	25.0	8.7	2.20	10	40	30	26.7	15.3	1.53	40	40	40.0	0.0	3.08
Chaetoceros curvisetus 旋鏈角刺藻	30	15	15	20.0	8.7	1.76	20	5	20	15.0	8.7	0.86	40	15	27.5	17.7	2.12
Chaetoceros danicus 丹麥角刺藻	25	0	10	11.7	12.6	1.03	10	0	0	3.3	5.8	0.19	15	25	20.0	7.1	1.54
Chaetoceros decipiens 並基角刺藻	260	125	80	155.0	93.7	13.64	150	100	80	110.0	36.1	6.33	215	155	185.0	42.4	14.23
Chaetoceros dichaeta 雙刺角刺藻	0	0	5	1.7	2.9	0.15	10	0	5	5.0	5.0	0.29	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros diversus 異角角刺藻	0	5	0	1.7	2.9	0.15	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	0	2.5	3.5	0.19
Chaetoceros lorenzianus 洛氏角刺藻	125	35	0	53.3	64.5	4.69	0	0	0	0.0	0.0	0.00	50	90	70.0	28.3	5.38
Chaetoceros messanense 短刺角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	5.0	7.1	0.38
Chaetoceros pendulus 搖動角刺藻	0	0	5	1.7	2.9	0.15	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros spp. 角刺藻	35	15	50	33.3	17.6	2.93	130	15	0	48.3	71.1	2.78	15	15	15.0	0.0	1.15
Corethron hystrix 小環毛藻	10	10	5	8.3	2.9	0.73	150	10	10	56.7	80.8	3.26	0	0	0.0	0.0	0.00
Coscinodiscus spp. 圓篩藻	0	0	5	1.7	2.9	0.15	0	5	5	3.3	2.9	0.19	0	0	0.0	0.0	0.00
Cyclotella sp. 小環藻	0	0	15	5.0	8.7	0.44	0	0	15	5.0	8.7	0.29	0	0	0.0	0.0	0.00
Cylindrotheca closterium 新月筒柱藻	10	0	5	5.0	5.0	0.44	0	0	5	1.7	2.9	0.10	10	0	5.0	7.1	0.38
Dactyliosolen fragilissimus 脆指管藻	25	0	0	8.3	14.4	0.73	0	0	0	0.0	0.0	0.00	15	15	15.0	0.0	1.15
Ditylum brightwellii 布氏雙尾藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	0	3.3	5.8	0.19	0	0	0.0	0.0	0.00
Eucampia zodiacus 短角彎角藻	15	5	20	13.3	7.6	1.17	20	15	5	13.3	7.6	0.77	5	20	12.5	10.6	0.96
Fragilaria spp. 脆桿藻	15	0	5	6.7	7.6	0.59	0	5	10	5.0	5.0	0.29	0	0	0.0	0.0	0.00
Guinardia delicatula 柔弱幾內亞藻	20	0	30	16.7	15.3	1.47	70	5	45	40.0	32.8	2.30	25	50	37.5	17.7	2.88
Guinardia striata 斯托幾內亞藻	40	20	35	31.7	10.4	2.79	80	105	35	73.3	35.5	4.22	25	20	22.5	3.5	1.73
Hemiaulus hauckii 霍克半管藻	0	0	25	8.3	14.4	0.73	130	15	50	65.0	58.9	3.74	0	0	0.0	0.0	0.00
Hemiaulus indicus 印度半管藻	0	20	20	13.3	11.5	1.17	10	5	0	5.0	5.0	0.29	5	10	7.5	3.5	0.58
Hemiaulus sinensis 中華半管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	30	0	0	10.0	17.3	0.58	10	0	5.0	7.1	0.38
Lauderia annulata 北方勞德藻	0	0	25	8.3	14.4	0.73	0	5	0	1.7	2.9	0.10	30	0	15.0	21.2	1.15
Leptocylindrus danicus 丹麥細柱藻	75	15	40	43.3	30.1	3.81	30	5	15	16.7	12.6	0.96	35	65	50.0	21.2	3.85
Leptocylindrus minimus 微小細柱藻	40	5	5	16.7	20.2	1.47	10	0	5	5.0	5.0	0.29	5	20	12.5	10.6	0.96
Melosira sp. 直鏈藻	0	0	5	1.7	2.9	0.15	40	5	15	20.0	18.0	1.15	0	0	0.0	0.0	0.00
Nitzschia lanceolata 披針菱形藻	10	0	25	11.7	12.6	1.03	10	0	10	6.7	5.8	0.38	5	25	15.0	14.1	1.15
Nitzschia palea 谷皮菱形藻	0	0	10	3.3	5.8	0.29	10	10	0	6.7	5.8	0.38	0	0	0.0	0.0	0.00
Nitzschia spp. 菱形藻	80	10	0	30.0	43.6	2.64	10	25	10	15.0	8.7	0.86	15	100	57.5	60.1	4.42
Pleurosigma spp. 斜紋藻	15	5	0	6.7	7.6	0.59	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	0	2.5	3.5	0.19
Proboscia alata 翼鼻狀藻=異根管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	20	15.0	7.1	1.15
Rhizosolenia calcar-avis 距端根管藻	0	5	0	1.7	2.9	0.15	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	15	10.0	7.1	0.77
Rhizosolenia imbricata 覆瓦根管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	10	0	3.3	5.8	0.19	0	0	0.0	0.0	0.00
Rhizosolenia robusta 粗根管藻	0	0	5	1.7	2.9	0.15	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Rhizosolenia setigera 剛毛根管藻	5	0	10	5.0	5.0	0.44	10	0	0	3.3	5.8	0.19	0	0	0.0	0.0	0.00
Rhizosolenia spp. 根管藻	25	5	0	10.0	13.2	0.88	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	15	10.0	7.1	0.77
Rhizosolenia styliformis 筆尖形根管藻	60	10	15	28.3	27.5	2.49	50	20	5	25.0	22.9	1.44	15	40	27.5	17.7	2.12
Skeletonema costatum 中肋骨條藻	0	0	5	1.7	2.9	0.15	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Thalassiosira nordenskioeldii 諾氏海鏈	0	0	5	1.7	2.9	0.15	10	0	0	3.3	5.8	0.19	0	0	0.0	0.0	0.00
渦鞭毛藻類																	
Ceratium extensum 長梭角藻	5	0	0	1.7	2.9	0.15	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	2.5	3.5	0.19
Ornithocercus spp. 鳥尾藻	5	0	0	1.7	2.9	0.15	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Protoperidinium spp. 多甲藻	15	0	0	5.0	8.7	0.44	60	15	5	26.7	29.3	1.53	0	5	2.5	3.5	0.19
Pyrophacus horologicum 鍾扁甲藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	15	0	15	10.0	8.7	0.58	0	0	0.0	0.0	0.00
藍綠藻類																	
Trichodesmium erythraeum 紅海束毛藻	5	0	5	3.3	2.9	0.29	10	5	5	6.7	2.9	0.38	5	5	5.0	0.0	0.38
綠藻類																	
Crucigenia sp. 十字藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	10	0	0	3.3	5.8	0.19	0	0	0.0	0.0	0.00
總 合	1,665	645	1,100	1,136.7	511.0	100	2,765	1,200	1,250	1,738.3	889.5	100	940	1,660	1,300.0	509.1	100
Species NO. 種類數	32	24	36	48			35	31	28	43			33	31	37		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.0979	0.1152	0.0879	0.0873			0.1751	0.1458	0.1944	0.1677			0.1019	0.1022	0.0901		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	2.7702	2.5717	2.9155	2.9746			2.4835	2.4919	2.3054	2.5513			2.8072	2.7470	2.8637		
Evenness 均勻度指數	0.7993	0.8092	0.8136	0.7684			0.6985	0.7257	0.6918	0.6783			0.8029	0.7999	0.7931		

表3-16 民國111年11月17日第三核能發電廠附近海域之植物性浮游生物之密度(cells/l)及種類組成-原過濾濃縮法

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Species				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
矽藻類																	
Alexandrium tamarense 塔瑪藻	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	5	2.5	3.5	0.67
Bacillaria paradoxa 奇異棍形藻	0	0	5	1.7	2.9	0.8	0	25	10	11.7	12.6	1.7	0	0	0.0	0.0	0.00
Bacteriastrum comosum 平凡輻桿藻	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	5	15	10.0	7.1	2.68
Bacteriastrum delicatulum 優美輻桿藻	10	5	45	20.0	21.8	9.9	0	80	20	33.3	41.6	4.8	15	0	7.5	10.6	2.01
Bacteriastrum elongatum 長輻桿藻	10	5	25	13.3	10.4	6.6	5	145	40	63.3	72.9	9.2	15	30	22.5	10.6	6.04
Bacteriastrum minus 小輻桿藻	0	0	5	1.7	2.9	0.8	0	25	5	10.0	13.2	1.5	5	5	5.0	0.0	1.34
Bacteriastrum spp. 輻桿藻	0	0	10	3.3	5.8	1.7	0	165	20	61.7	90.0	9.0	15	25	20.0	7.1	5.37
Bellerochea malleus 錘狀中鼓藻	0	0	5	1.7	2.9	0.8	0	15	0	5.0	8.7	0.7	0	0	0.0	0.0	0.00
Biddulphia mobiliensis 活動盒形藻	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	10	5.0	7.1	1.34
Chaetoceros affinis 窄隙角刺藻	5	0	90	31.7	50.6	15.7	15	160	80	85.0	72.6	12.3	5	5	5.0	0.0	1.34
Chaetoceros atlanticus 大西洋角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	15	5	6.7	7.6	1.0	5	5	5.0	0.0	1.34
Chaetoceros compressus 扁面角刺藻	0	0	5	1.7	2.9	0.8	0	0	10	3.3	5.8	0.5	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros curvisetus 旋鏈角刺藻	5	5	10	6.7	2.9	3.3	0	40	5	15.0	21.8	2.2	0	10	5.0	7.1	1.34
Chaetoceros danicus 丹麥角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	5	5	3.3	2.9	0.5	0	10	5.0	7.1	1.34
Chaetoceros decipiens 並基角刺藻	25	5	70	33.3	33.3	16.5	20	185	75	93.3	84.0	13.6	80	85	82.5	3.5	22.15
Chaetoceros dichaeta 雙刺角刺藻	5	0	20	8.3	10.4	4.1	0	15	10	8.3	7.6	1.2	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros diversus 異角角刺藻	0	0	5	1.7	2.9	0.8	5	20	5	10.0	8.7	1.5	0	0	0.0	0.0	0.00
Chaetoceros lorenzianus 洛氏角刺藻	0	10	0	3.3	5.8	1.7	0	5	0	1.7	2.9	0.2	0	20	10.0	14.1	2.68
Chaetoceros messanensis 短刺角刺藻	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	10	15	8.3	7.6	1.2	0	15	7.5	10.6	2.01
Chaetoceros pendulus 搖動角刺藻	5	0	10	5.0	5.0	2.5	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	10	5.0	7.1	1.34
Chaetoceros spp. 角刺藻	5	0	10	5.0	5.0	2.5	0	35	5	13.3	18.9	1.9	15	10	12.5	3.5	3.36
Climacodium spp. 梯形藻	5	0	0	1.7	2.9	0.8	0	0	5	1.7	2.9	0.2	0	0	0.0	0.0	0.00
Corethron hystrix 小環毛藻	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	40	10	16.7	20.8	2.4	5	0	2.5	3.5	0.67
Coscinodiscus spp. 圓篩藻	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	20	0	6.7	11.5	1.0	5	5	5.0	0.0	1.34
Cyclotella sp. 小環藻	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	50	0	16.7	28.9	2.4	0	0	0.0	0.0	0.00
Cylindrotheca closterium 新月筒柱藻	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	5	2.5	3.5	0.67
Dactyliosolen fragilissimus 脆指管藻	0	0	10	3.3	5.8	1.7	0	30	0	10.0	17.3	1.5	0	0	0.0	0.0	0.00
Ditylum brightwellii 布氏雙尾藻	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	5	10	5.0	5.0	0.7	0	0	0.0	0.0	0.00
Eucampia zodiacus 短角彎角藻	0	0	10	3.3	5.8	1.7	0	50	0	16.7	28.9	2.4	0	15	7.5	10.6	2.01
Fragilaria spp. 脆桿藻	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	5	1.7	2.9	0.2	0	0	0.0	0.0	0.00
Guinardia delicatula 柔弱幾內亞藻	0	0	15	5.0	8.7	2.48	0	30	5	11.7	16.1	1.69	0	5	2.5	3.5	0.67
Guinardia striata 斯托幾內亞藻	5	5	15	8.3	5.8	4.13	5	10	5	6.7	2.9	0.97	10	10	10.0	0.0	2.68
Hemiaulus hauckii 霍克半管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	15	5	6.7	7.6	0.97	0	0	0.0	0.0	0.00
Hemiaulus sinensis 中華半管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	15	0	5.0	8.7	0.73	5	0	2.5	3.5	0.67
Lauderia annulata 北方勞德藻	0	0	10	3.3	5.8	1.65	10	35	5	16.7	16.1	2.42	0	0	0.0	0.0	0.00
Leptocylindrus danicus 丹麥細柱藻	0	0	10	3.3	5.8	1.65	5	20	0	8.3	10.4	1.21	0	5	2.5	3.5	0.67
Leptocylindrus minimus 微小細柱藻	0	0	15	5.0	8.7	2.48	0	35	0	11.7	20.2	1.69	0	0	0.0	0.0	0.00
Licmophora abbreviata 短紋楔形藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	85	15	50.0	49.5	13.42
Melosira sp. 直鏈藻	0	0	5	1.7	2.9	0.83	0	30	0	10.0	17.3	1.45	0	0	0.0	0.0	0.00
Nitzschia lanceolata 披針菱形藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	20	0	8.3	10.4	1.21	0	0	0.0	0.0	0.00
Nitzschia longissima 長菱形藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	5	3.3	2.9	0.48	0	0	0.0	0.0	0.00
Nitzschia palea 谷皮菱形藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	15	0	6.7	7.6	0.97	0	0	0.0	0.0	0.00
Nitzschia spp. 菱形藻	0	0	5	1.7	2.9	0.83	0	25	5	10.0	13.2	1.45	0	25	12.5	17.7	3.36
Pleurosigma normanii 中斜紋藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	2.5	3.5	0.67
Pleurosigma spp. 斜紋藻	0	0	5	1.7	2.9	0.83	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Proboscia alata 翼鼻狀藻=異根管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	0	1.7	2.9	0.24	0	5	2.5	3.5	0.67
Rhizosolenia bergonii 柏戈根管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	10	7.5	3.5	2.01
Rhizosolenia calcar-avis 距端根管藻	0	0	10	3.3	5.8	1.65	0	10	5	5.0	5.0	0.73	0	5	2.5	3.5	0.67
Rhizosolenia imbricata 覆瓦根管藻	0	0	5	1.7	2.9	0.83	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Rhizosolenia robusta 粗根管	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	20	0	6.7	11.5	0.97	0	0	0.0	0.0	0.00
Rhizosolenia setigera 剛毛根管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	25	5	11.7	11.5	1.69	0	0	0.0	0.0	0.00
Rhizosolenia spp. 根管藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	30	5	11.7	16.1	1.69	0	5	2.5	3.5	0.67
Rhizosolenia styliformis 筆尖根管藻	0	5	5	3.3	2.9	1.65	0	55	0	18.3	31.8	2.66	10	15	12.5	3.5	3.36
Skeletonema costatum 中肋骨條藻	0	0	5	1.7	2.9	0.83	0	15	0	5.0	8.7	0.73	5	0	2.5	3.5	0.67
Stephanopyxis palmeriana 掌狀冠蓋藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	2.5	3.5	0.67
Streptotheca indica 印度扭鞘藻	0	0	5	1.7	2.9	0.83	0	0	5	1.7	2.9	0.24	0	0	0.0	0.0	0.00
Thalassionema frauenfeldii 伏恩海線藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	5	0	5	3.3	2.9	0.48	0	0	0.0	0.0	0.00
Thalassiosira nordenskioeldii 諾氏海鏈藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	0	1.7	2.9	0.24	0	0	0.0	0.0	0.00
渦鞭毛藻類																	
Ceratium extensum 長梭角藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	2.5	3.5	0.67
Ceratium kofoidii 小角藻	5	0	0	1.7	2.9	0.83	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0.0	0.0	0.00
Ceratium spp. 角藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	0	1.7	2.9	0.24	0	0	0.0	0.0	0.00
Gymodinium sp. 裸甲藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	2.5	3.5	0.67
Noctiluca scintillans 夜光藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	20	10.0	14.1	2.68
Ornithocercus spp. 鳥尾藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	2.5	3.5	0.67
Protoperidinium oceanicum 海洋多甲藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	2.5	3.5	0.67
Pyrophacus horologicum 鍾扁甲藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	0	1.7	2.9	0.24	0	0	0.0	0.0	0.00
藍綠藻類																	
Trichodesmium erythraeum 紅海束毛藻	25	10	0	11.7	12.6	5.79	0	10	5	5.0	5.0	0.73	10	5	7.5	3.5	2.01
Trichodesmium sp. 束毛藻	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0	5	2.5	3.5	0.67
總　合	110	50	445	201.7	212.9	100	85	1,580	400	688.3	788.1	100	300	445	372.5	102.5	100
Species NO. 種類數	12	8	29	33			11	45	31	50			18	37	41		
Simpson's Dominance Index優勢種指數	0.1364	0.1400	0.0905	0.0796			0.1280	0.0559	0.0978	0.0605			0.1672	0.0630	0.0841		
Shannon-Weiner Index歧異度指數	2.2335	2.0253	2.8627	2.7975			2.2316	3.2874	2.8453	3.2989			2.2632	3.2270	3.0872		
Evenness 均勻度指數	0.8988	0.9740	0.8502	0.8001			0.9307	0.8636	0.8286	0.8433			0.7830	0.8937	0.8313		

表3-17 民國110年2月26日第三核能發電廠附近海域表層採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000m^3)及生物量

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Category				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
Noctiluca 夜光蟲	55,563	40,377	18,190	38,043	18,796	10.59	30,986	33,566	30,920	31,824	1,509	5.49	27,324	43,133	35,229	11,179	22.98
Foraminifera 有孔蟲	4,220	1,285	530	2,011	1,949	0.56	974	2,082	2,115	1,724	649	0.30	1,163	1,435	1,299	192	0.85
Radiolaria 放射蟲	791	486	92	456	350	0.13	28	356	934	439	459	0.08	0	345	173	244	0.11
Medusa 水母	20,429	22,595	8,631	17,218	7,515	4.79	6,377	13,137	37,010	18,842	16,093	3.25	7,849	7,069	7,459	552	4.87
Siphonophore 管水母	16,118	19,241	18,614	17,991	1,652	5.01	2,979	13,151	24,465	13,532	10,748	2.33	4,216	9,520	6,868	3,751	4.48
Ctenophora 櫛水母	149	164	92	135	38	0.04	0	0	1,168	389	674	0.07	0	0	0	0	0.00
Cladocera 枝角類	0	79	92	57	50	0.02	56	85	234	125	95	0.02	0	136	68	96	0.04
Copepoda nauplius 橈足類幼生	5,473	2,903	2,488	3,621	1,617	1.01	1,030	1,644	2,852	1,842	927	0.32	1,114	1,445	1,280	234	0.83
Calanoida 哲水蚤	151,499	231,448	91,848	158,265	70,045	44.07	77,108	92,801	728,105	299,338	371,406	51.61	63,887	30,826	47,357	23,378	30.89
Cyclopoida 劍水蚤	58,210	88,355	27,182	57,916	30,588	16.13	31,011	31,184	288,985	117,060	148,891	20.18	30,679	29,276	29,978	992	19.55
Harpacticoida 猛水蚤	52	0	0	17	30	0.00	0	0	0	0	0	0.00	30	0	15	21	0.01
Amphipoda 端腳類	1,310	6,157	1,342	2,936	2,789	0.82	807	2,559	4,783	2,717	1,993	0.47	583	625	604	30	0.39
Crab megalopa 大眼幼生	0	79	0	26	46	0.01	0	89	0	30	51	0.01	50	0	25	35	0.02
Crab larvae 蟹幼生	558	407	956	640	284	0.18	1,058	959	394	804	359	0.14	334	0	167	236	0.11
Shrimp larvae 蝦幼生	7,346	11,506	7,157	8,670	2,458	2.41	2,004	3,454	6,922	4,127	2,527	0.71	1,016	308	662	501	0.43
Mysidacea 糠蝦類	52	2,064	0	705	1,177	0.20	223	0	197	140	122	0.02	0	0	0	0	0.00
Euphausiacea 磷蝦類	52	1,072	0	375	604	0.10	0	43	430	158	237	0.03	50	34	42	11	0.03
Sergestidae 櫻蝦類	895	814	0	569	495	0.16	0	46	824	290	463	0.05	124	53	89	50	0.06
Luciferinae 螢蝦類	0	645	185	277	332	0.08	28	371	7,525	2,641	4,233	0.46	418	0	209	296	0.14
Other Decapoda 其他十足類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Ostracoda 介形類	1,719	6,634	3,001	3,784	2,549	1.05	1,336	934	11,912	4,728	6,226	0.82	1,016	330	673	485	0.44
Pteropoda 翼足類	1,927	1,890	1,139	1,652	445	0.46	1,587	2,602	8,680	4,289	3,836	0.74	739	394	567	244	0.37
Heteropoda 異足類	5,387	7,685	5,126	6,066	1,408	1.69	1,142	5,064	17,373	7,860	8,469	1.36	1,919	1,528	1,723	276	1.12
Cephalopoda larvae 頭足類幼生	0	0	0	0	0	0.00	0	0	467	156	270	0.03	15	0	7	11	0.00
Bivalvia 二枚貝幼生	305	327	115	249	117	0.07	28	310	1,057	465	532	0.08	160	87	124	51	0.08
Chaetognatha 毛顎類	18,309	19,613	7,342	15,088	6,740	4.20	13,639	4,130	116,196	44,655	62,138	7.70	7,450	2,997	5,223	3,148	3.41
Appendicularia 有尾類	19,263	11,818	5,693	12,258	6,796	3.41	12,194	6,126	6,725	8,348	3,344	1.44	6,155	9,578	7,867	2,421	5.13
Thaliacae 海樽類	3,910	5,696	4,714	4,773	894	1.33	2,004	3,526	5,397	3,642	1,700	0.63	1,545	3,036	2,290	1,054	1.49
Polychaeta 多毛類	2,638	6,008	1,844	3,497	2,211	0.97	390	2,770	17,323	6,828	9,167	1.18	2,701	896	1,799	1,277	1.17
Barnacle nauplius 藤壺幼生	156	327	0	161	164	0.04	0	0	234	78	135	0.01	15	34	24	14	0.02
Echinodermata larvae 棘皮動物幼生	447	164	92	234	188	0.07	111	132	0	81	71	0.01	124	231	178	75	0.12
Fish egg 魚卵	797	1,062	507	789	277	0.22	4,348	538	861	1,915	2,112	0.33	251	794	522	384	0.34
Fish larvae 仔稚魚	201	164	104	156	49	0.04	529	43	1,021	531	489	0.09	89	27	58	44	0.04
Other 其他	720	754	92	522	373	0.15	167	0	897	355	477	0.06	1,133	353	743	552	0.48
TOTAL	378,494	491,819	207,168	359,160	143,307	100.0	192,146	221,703	1,326,005	579,952	646,270	100.0	162,151	144,492	153,321	12,487	100.0
Biomass 生物量：																	
Wet wt. 濕重 (g/1000 m^3)	56.9	152.9	122.9	110.9	49.1		46.7	75.6	325.9	149.4	153.5		87.4	28.2	57.8	41.9	
Dry wt. 乾重 (g/1000 m^3)	3.0	9.3	2.9	5.1	3.7		2.0	3.4	28.0	11.1	14.6		2.0	1.5	1.7	0.4	
Displa. V. 排水容積量 (ml/1000 m^3)	56.7	160.0	149.5	122.1	56.8		41.8	94.4	252.1	129.4	109.4		82.6	23.7	53.2	41.7	
Settling V. 生物沉澱量 (ml/1000 m^3)	379.4	647.8	649.3	558.8	155.4		338.3	482.4	1901.0	907.3	863.6		503.3	200.8	352.0	213.9	
Impurity 雜質 (%)	1.2	3.9	4.0	3.0	1.6		6.9	2.7	5.3	5.0	2.1		4.9	1.8	3.3	2.2	
Species No. 種類數	29	31	26	32			26	27	30	32			29	26	31		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.2162	0.2678	0.2362	0.2406			0.2245	0.2277	0.3589	0.3185			0.2268	0.1881	0.1953		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	2.0167	1.9052	2.0045	1.9860			1.9407	1.9974	1.5232	1.6895			1.9354	2.0078	2.0092		
Evenness 均勻度指數	0.5989	0.5548	0.6153	0.5730			0.5957	0.6060	0.4478	0.4875			0.5748	0.6163	0.5851		

表3-18 民國110年2月26日第三核能發電廠附近海域垂直採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000m^3)及生物量

Station	18V	20V	21V				22V	23V	24V				14V	12V			
Category				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
Noctiluca 夜光蟲	77,025	45,072	30,294	50,797	23,886	5.09	33,897	116,261	91,891	80,683	42,310	5.53	865,377	106,365	485,871	536,702	17.53
Foraminifera 有孔蟲	9,818	6,452	4,923	7,065	2,504	0.71	11,079	8,892	8,187	9,386	1,508	0.64	49,611	25,558	37,584	17,008	1.36
Radiolaria 放射蟲	3,906	1,960	3,553	3,140	1,037	0.31	3,490	5,434	2,751	3,892	1,386	0.27	21,832	7,801	14,817	9,921	0.53
Medusa 水母	70,783	69,934	21,862	54,193	28,003	5.43	46,518	101,159	81,673	76,450	27,692	5.24	140,847	52,688	96,768	62,338	3.49
Siphonophore 管水母	17,595	15,611	9,636	14,281	4,143	1.43	5,870	80,659	52,397	46,309	37,765	3.17	154,529	18,863	86,696	95,930	3.13
Ctenophora 櫛水母	0	419	0	140	242	0.01	0	776	0	259	448	0.02	0	0	0	0	0.00
Cladocera 枝角類	283	283	0	189	164	0.02	0	776	0	259	448	0.02	0	699	349	494	0.01
Copepoda nauplius 橈足類幼生	36,748	27,513	7,965	24,075	14,696	2.41	14,868	20,041	13,034	15,981	3,634	1.09	37,010	21,075	29,043	11,268	1.05
Calanoida 哲水蚤	711,958	478,758	152,929	447,882	280,790	44.84	273,935	930,791	689,344	631,357	332,245	43.25	1,418,911	463,652	941,282	675,470	33.97
Cyclopoida 劍水蚤	288,418	153,944	46,630	162,997	121,148	16.32	121,953	392,322	274,297	262,857	135,547	18.00	809,363	213,196	511,279	421,553	18.45
Harpacticoida 猛水蚤	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	582	291	412	0.01
Amphipoda 端腳類	8,851	5,200	361	4,804	4,259	0.48	767	11,679	6,091	6,179	5,457	0.42	13,432	2,969	8,200	7,398	0.30
Crab megalopa 大眼幼生	0	0	0	0	0	0.00	0	776	0	259	448	0.02	1,497	0	749	1,059	0.03
Crab larvae 蟹幼生	2,160	4,905	437	2,501	2,254	0.25	1,340	3,599	3,799	2,912	1,366	0.20	6,238	1,688	3,963	3,217	0.14
Shrimp larvae 蝦幼生	47,948	40,569	2,469	30,329	24,407	3.04	14,163	31,756	26,657	24,192	9,051	1.66	21,957	11,003	16,480	7,745	0.59
Mysidacea 糠蝦類	3,989	838	0	1,609	2,103	0.16	1,234	1,870	524	1,209	673	0.08	0	699	349	494	0.01
Euphausiacea 磷蝦類	1,003	142	0	382	543	0.04	0	318	1,048	455	537	0.03	1,497	0	749	1,059	0.03
Sergestidae 櫻蝦類	4,579	4,203	361	3,048	2,334	0.31	3,913	5,434	4,126	4,491	823	0.31	6,238	990	3,614	3,711	0.13
Luciferinae 螢蝦類	3,706	844	361	1,637	1,808	0.16	2,935	7,621	6,222	5,593	2,406	0.38	22,331	4,192	13,261	12,826	0.48
Other Decapoda 其他十足類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Ostracoda 介形類	11,317	11,374	3,614	8,768	4,464	0.88	2,001	5,151	2,423	3,192	1,710	0.22	23,870	4,366	14,118	13,791	0.51
Pteropoda 翼足類	12,167	7,007	2,168	7,114	5,000	0.71	4,680	12,632	16,046	11,119	5,832	0.76	31,022	11,527	21,275	13,785	0.77
Heteropoda 異足類	20,038	14,852	2,108	12,333	9,227	1.23	2,001	22,688	22,727	15,805	11,955	1.08	71,110	12,401	41,755	41,514	1.51
Cephalopoda larvae 頭足類幼生	0	0	4,366	1,455	2,521	0.15	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Bivalvia 二枚貝幼生	2,289	0	0	763	1,322	0.08	361	2,329	3,668	2,119	1,663	0.15	0	2,096	1,048	1,482	0.04
Chaetognatha 毛顎類	41,705	50,346	18,700	36,917	16,357	3.70	38,277	64,076	39,952	47,435	14,435	3.25	248,926	58,626	153,776	134,562	5.55
Appendicularia 有尾類	114,258	94,773	25,777	78,269	46,492	7.84	115,343	146,711	113,701	125,252	18,602	8.58	191,373	177,275	184,324	9,968	6.65
Thaliacae 海樽類	16,321	20,177	3,915	13,471	8,497	1.35	4,724	39,483	23,186	22,464	17,391	1.54	65,829	16,418	41,123	34,939	1.48
Polychaeta 多毛類	48,998	22,346	3,764	25,036	22,737	2.51	14,675	84,188	42,900	47,254	34,960	3.24	48,113	15,544	31,829	23,030	1.15
Barnacle nauplius 藤壺幼生	720	980	437	712	272	0.07	361	2,329	851	1,181	1,024	0.08	291	2,387	1,339	1,482	0.05
Echinodermata larvae 棘皮動物幼生	2,466	1,258	437	1,387	1,021	0.14	2,212	1,552	2,751	2,172	600	0.15	5,073	4,250	4,662	582	0.17
Fish egg 魚卵	283	980	0	421	504	0.04	873	11,644	4,519	5,678	5,478	0.39	16,759	0	8,379	11,850	0.30
Fish larvae 仔稚魚	2,160	142	0	767	1,208	0.08	1,128	1,552	851	1,177	353	0.08	291	1,397	844	782	0.03
Other 其他	3,292	2,390	1,084	2,256	1,110	0.23	1,701	2,329	3,078	2,369	690	0.16	23,703	7,219	15,461	11,656	0.56
TOTAL	1,564,785	1,083,275	348,152	998,737	612,706	100.0	724,299	2,116,826	1,538,694	1,459,940	699,596	100.0	4,297,028	1,245,528	2,771,278	2,157,736	100.0
Biomass 生物量：																	
Wet wt. 濕重 (g/1000 m^3)	178.2	157.0	126.2	153.8	26.1		80.2	161.5	141.6	127.8	42.4		604.2	213.1	408.6	276.6	
Dry wt. 乾重 (g/1000 m^3)	10.7	10.4	1.5	7.5	5.2		2.9	7.3	6.6	5.6	2.4		34.4	8.3	21.4	18.4	
Displa. V. 排水容積量 (ml/1000 m^3)	228.9	168.2	268.0	221.7	50.3		123.4	141.1	117.9	127.5	12.1		432.5	756.8	594.7	229.4	
Settling V. 生物沉澱量 (ml/1000 m^3)	1579.0	1362.9	608.3	1183.4	509.6		812.6	1623.1	1061.0	1165.6	415.2		4873.7	1502.0	3187.9	2384.1	
Impurity 雜質 (%)	6.4	8.9	4.6	6.6	2.2		10.2	1.7	3.4	5.1	4.5		3.5	15.7	9.6	8.7	
Species No. 種類數	29	29	24	31			27	31	28	31			27	28	31		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.0636	0.2347	0.0257	0.0244			0.0043	0.2427	0.2480	0.2366			0.1938	0.2011	0.1909		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	1.3273	2.0402	1.0384	1.0016			0.5729	1.9885	1.9727	2.0079			2.0606	2.0816	2.0908		
Evenness 均勻度指數	0.3942	0.6059	0.3267	0.2917			0.1738	0.5791	0.5920	0.5847			0.6252	0.6247	0.6088		

表3-19 民國110年5月14日第三核能發電廠附近海域表層採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000m^3)及生物量

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Category				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
Noctiluca 夜光蟲	206,510	229,288	277,967	237,922	36,503	59.48	239,174	241,821	161,640	214,212	45,547	42.36	256,724	249,379	253,051	5,194	56.19
Foraminifera 有孔蟲	340	300	571	404	146	0.10	540	1,133	557	744	338	0.15	746	1,313	1,030	401	0.23
Radiolaria 放射蟲	1,644	553	1,798	1,331	679	0.33	1,681	1,013	652	1,116	522	0.22	2,790	2,011	2,400	551	0.53
Medusa 水母	5,115	2,794	1,815	3,241	1,695	0.81	4,337	2,483	3,892	3,571	968	0.71	5,837	2,537	4,187	2,333	0.93
Siphonophore 管水母	12,615	17,370	11,541	13,842	3,102	3.46	11,675	11,822	13,515	12,337	1,022	2.44	14,810	8,088	11,449	4,753	2.54
Ctenophora 櫛水母	95	153	56	102	49	0.03	465	159	374	333	157	0.07	287	146	217	100	0.05
Cladocera 枝角類	3,077	2,157	5,117	3,450	1,515	0.86	4,762	6,286	2,459	4,502	1,927	0.89	6,291	2,937	4,614	2,371	1.02
Copepoda nauplius 橈足類幼生	817	77	56	317	433	0.08	1,026	939	456	807	307	0.16	287	101	194	131	0.04
Calanoida 哲水蚤	98,062	69,667	77,352	81,694	14,687	20.42	96,083	128,592	193,337	139,337	49,510	27.55	134,288	59,736	97,012	52,716	21.54
Cyclopoida 劍水蚤	43,900	13,019	13,187	23,369	17,780	5.84	96,450	82,431	42,039	73,640	28,251	14.56	49,005	37,230	43,117	8,326	9.57
Harpacticoida 猛水蚤	85	110	385	193	166	0.05	255	154	361	257	104	0.05	57	44	51	9	0.01
Amphipoda 端腳類	541	410	759	570	177	0.14	1,621	786	906	1,104	451	0.22	499	146	323	250	0.07
Crab megalopa 大眼幼生	0	73	0	24	42	0.01	85	0	0	28	49	0.01	0	0	0	0	0.00
Crab larvae 蟹幼生	5,306	300	375	1,993	2,869	0.50	2,256	2,021	456	1,578	978	0.31	1,257	469	863	557	0.19
Shrimp larvae 蝦幼生	701	746	468	638	149	0.16	4,212	3,816	1,452	3,160	1,492	0.62	2,457	717	1,587	1,230	0.35
Mysidacea 糠蝦類	265	1,885	375	842	905	0.21	1,206	1,025	95	775	596	0.15	115	247	181	94	0.04
Euphausiacea 磷蝦類	0	0	0	0	0	0.00	180	0	0	60	104	0.01	0	0	0	0	0.00
Sergestidae 櫻蝦類	170	37	206	138	89	0.03	1,050	159	184	465	508	0.09	367	0	184	260	0.04
Luciferinae 螢蝦類	95	223	825	381	390	0.10	350	615	723	563	192	0.11	0	0	0	0	0.00
Other Decapoda 其他十足類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Ostracoda 介形類	531	792	262	528	265	0.13	890	233	557	560	328	0.11	0	0	0	0	0.00
Pteropoda 翼足類	351	1,119	600	690	392	0.17	720	1,076	995	931	187	0.18	597	514	555	59	0.12
Heteropoda 異足類	6,311	6,413	4,769	5,831	921	1.46	15,337	14,825	8,888	13,016	3,585	2.57	10,442	4,751	7,597	4,024	1.69
Cephalopoda larvae 頭足類幼生	95	37	56	63	30	0.02	370	148	273	264	111	0.05	155	0	77	110	0.02
Bivalvia 二枚貝幼生	446	822	225	498	302	0.12	635	467	545	549	84	0.11	1,412	178	795	873	0.18
Chaetognatha 毛顎類	2,635	2,218	6,319	3,724	2,257	0.93	15,696	6,178	9,534	10,469	4,828	2.07	1,791	1,675	1,733	82	0.38
Appendicularia 有尾類	10,468	6,415	6,662	7,849	2,272	1.96	6,598	11,928	6,606	8,377	3,075	1.66	14,156	9,096	11,626	3,577	2.58
Thaliacae 海樽類	3,907	2,381	2,763	3,017	794	0.75	1,556	1,839	1,115	1,503	365	0.30	2,216	1,681	1,948	378	0.43
Polychaeta 多毛類	1,307	929	627	954	341	0.24	2,246	3,223	931	2,133	1,150	0.42	712	596	654	82	0.15
Barnacle nauplius 藤壺幼生	95	37	0	44	48	0.01	85	233	178	165	75	0.03	155	0	77	110	0.02
Echinodermata larvae 棘皮動物幼生	1,433	789	5,418	2,547	2,507	0.64	2,656	1,703	2,539	2,299	520	0.45	2,021	1,998	2,009	16	0.45
Fish egg 魚卵	2,208	1,087	6,156	3,150	2,663	0.79	3,500	7,070	8,723	6,431	2,669	1.27	2,623	2,740	2,682	83	0.60
Fish larvae 仔稚魚	182	130	241	184	56	0.05	171	302	136	203	87	0.04	0	190	95	135	0.02
Other 其他	541	706	103	450	312	0.11	85	307	361	251	146	0.05	0	89	44	63	0.01
TOTAL	409,848	363,037	427,055	399,980	33,130	100.0	517,953	534,789	464,481	505,741	36,711	100.0	512,097	388,611	450,354	87,318	100.0
Biomass 生物量：																	
Wet wt. 濕重 (g/1000 m^3)	18.5	10.9	10.9	13.4	4.4		20.1	19.4	31.4	23.6	6.7		21.5	8.8	15.2	9.0	
Dry wt. 乾重 (g/1000 m^3)	1.1	0.5	0.7	0.8	0.3		1.5	2.5	3.1	2.4	0.8		1.3	0.7	1.0	0.4	
Displa. V. 排水容積量 (ml/1000 m^3)	28.5	9.4	69.2	35.7	30.6		41.0	54.4	33.7	43.0	10.5		50.6	30.1	40.4	14.5	
Settling V. 生物沉澱量 (ml/1000 m^3)	120.1	147.1	84.3	117.2	31.5		187.7	122.1	172.6	160.8	34.4		102.2	52.3	77.3	35.2	
Impurity 雜質 (%)	4.9	2.9	5.3	4.3	1.3		5.2	7.3	14.2	8.9	4.7		6.7	9.1	7.9	1.7	
Species No. 種類數	31	32	30	32			33	31	31	33			27	26	29		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.3250	0.4402	0.4593	0.4012			0.2852	0.2884	0.3049	0.2789			0.3317	0.4460	0.3732		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	1.5945	1.3383	1.3189	1.4477			1.7224	1.6779	1.5981	1.7006			1.5397	1.3062	1.4537		
Evenness 均勻度指數	0.4643	0.3861	0.3878	0.4177			0.4926	0.4886	0.4654	0.4864			0.4672	0.4009	0.4317		

表3-20 民國110年5月14日第三核能發電廠附近海域垂直採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000m^3)及生物量

Station	18V	20V	21V				22V	23V	24V				14V	12V			
Category				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
Noctiluca 夜光蟲	411,365	251,083	85,267	249,238	163,057	46.47	363,690	415,548	318,507	365,915	48,559	34.72	437,475	555,514	496,494	83,466	36.97
Foraminifera 有孔蟲	3,082	4,600	419	2,701	2,117	0.50	4,608	4,129	2,408	3,715	1,157	0.35	3,986	6,070	5,028	1,474	0.37
Radiolaria 放射蟲	1,644	2,635	419	1,566	1,110	0.29	2,944	3,827	1,666	2,812	1,086	0.27	9,628	4,331	6,980	3,746	0.52
Medusa 水母	16,233	5,021	2,952	8,069	7,146	1.50	18,700	8,937	8,520	12,053	5,761	1.14	14,331	10,883	12,607	2,438	0.94
Siphonophore 管水母	27,534	31,547	10,689	23,257	11,067	4.34	23,423	28,178	20,985	24,195	3,658	2.30	24,959	8,694	16,827	11,501	1.25
Ctenophora 櫛水母	0	0	419	140	242	0.03	223	931	228	461	408	0.04	403	419	411	11	0.03
Cladocera 枝角類	5,959	1,980	1,677	3,205	2,389	0.60	4,202	4,576	6,782	5,187	1,394	0.49	9,823	2,779	6,301	4,981	0.47
Copepoda nauplius 橈足類幼生	1,233	655	437	775	411	0.14	6,672	749	827	2,749	3,397	0.26	806	1,164	985	253	0.07
Calanoida 哲水蚤	259,929	137,401	57,339	151,556	102,034	28.26	287,036	244,102	366,712	299,283	62,215	28.40	592,172	338,708	465,440	179,226	34.65
Cyclopoida 劍水蚤	67,602	25,481	11,615	34,899	29,158	6.51	202,240	172,220	186,409	186,956	15,018	17.74	176,253	158,137	167,195	12,810	12.45
Harpacticoida 猛水蚤	2,877	2,464	1,677	2,339	610	0.44	3,533	3,147	1,796	2,826	912	0.27	3,209	2,484	2,847	513	0.21
Amphipoda 端腳類	2,671	982	437	1,363	1,165	0.25	1,881	3,581	1,953	2,472	962	0.23	1,194	2,515	1,855	934	0.14
Crab megalopa 大眼幼生	0	0	0	0	0	0.00	537	0	0	179	310	0.02	0	0	0	0	0.00
Crab larvae 蟹幼生	2,055	327	0	794	1,104	0.15	11,846	6,092	5,487	7,808	3,509	0.74	5,568	3,229	4,399	1,654	0.33
Shrimp larvae 蝦幼生	5,959	2,963	1,310	3,411	2,357	0.64	4,562	5,677	8,891	6,377	2,248	0.61	4,344	2,841	3,593	1,063	0.27
Mysidacea 糠蝦類	2,671	499	0	1,057	1,420	0.20	492	2,763	3,320	2,191	1,498	0.21	776	807	792	22	0.06
Euphausiacea 磷蝦類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Sergestidae 櫻蝦類	822	250	0	357	421	0.07	1,029	233	911	724	430	0.07	806	838	822	23	0.06
Luciferinae 螢蝦類	1,233	904	0	712	638	0.13	806	1,649	1,653	1,369	488	0.13	776	0	388	549	0.03
Other Decapoda 其他十足類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Ostracoda 介形類	1,438	655	437	843	527	0.16	2,819	850	228	1,299	1,352	0.12	2,732	2,934	2,833	143	0.21
Pteropoda 翼足類	1,644	1,403	0	1,016	888	0.19	2,504	2,530	1,282	2,105	713	0.20	1,985	4,968	3,477	2,109	0.26
Heteropoda 異足類	13,151	4,709	1,310	6,390	6,097	1.19	15,242	29,739	29,531	24,837	8,311	2.36	13,853	19,049	16,451	3,674	1.22
Cephalopoda larvae 頭足類幼生	0	327	0	109	189	0.02	446	0	0	149	257	0.01	0	0	0	0	0.00
Bivalvia 二枚貝幼生	3,288	250	437	1,325	1,703	0.25	2,104	2,115	1,666	1,962	256	0.19	1,567	776	1,172	559	0.09
Chaetognatha 毛顎類	6,370	4,538	2,096	4,335	2,144	0.81	14,178	17,547	14,235	15,320	1,929	1.45	27,572	9,362	18,467	12,877	1.37
Appendicularia 有尾類	30,411	20,101	11,859	20,790	9,295	3.88	51,333	38,670	47,554	45,852	6,501	4.35	64,996	73,759	69,377	6,197	5.17
Thaliacae 海樽類	5,137	2,729	856	2,907	2,146	0.54	7,198	3,927	2,936	4,687	2,230	0.44	7,479	6,101	6,790	974	0.51
Polychaeta 多毛類	8,014	5,333	2,934	5,427	2,541	1.01	11,640	12,065	8,807	10,837	1,771	1.03	6,732	3,229	4,981	2,477	0.37
Barnacle nauplius 藤壺幼生	411	0	1,677	696	874	0.13	537	2,631	456	1,208	1,233	0.11	1,582	2,841	2,212	890	0.16
Echinodermata larvae 棘皮動物幼生	5,959	2,901	2,550	3,803	1,875	0.71	8,181	8,824	6,711	7,905	1,083	0.75	10,420	6,334	8,377	2,889	0.62
Fish egg 魚卵	2,466	1,731	1,712	1,969	430	0.37	2,058	9,189	12,653	7,967	5,402	0.76	24,288	6,163	15,225	12,816	1.13
Fish larvae 仔稚魚	1,644	0	419	688	854	0.13	1,161	1,397	983	1,180	208	0.11	403	807	605	286	0.05
Other 其他	1,233	499	0	577	620	0.11	446	1,983	1,725	1,384	823	0.13	403	0	202	285	0.02
TOTAL	894,031	513,971	200,941	536,315	347,085	100.0	1,058,270	1,037,807	1,065,820	1,053,966	14,494	100.0	1,450,522	1,235,739	1,343,131	151,875	100.0
Biomass 生物量：																	
Wet wt. 濕重 (g/1000 m^3)	32.5	12.2	3.0	15.9	15.1		33.1	33.1	42.8	36.4	5.6		53.6	18.8	36.2	24.6	
Dry wt. 乾重 (g/1000 m^3)	2.1	1.3	0.4	1.3	0.8		2.5	3.1	6.3	4.0	2.0		5.1	2.5	3.8	1.8	
Displa. V. 排水容積量 (ml/1000 m^3)	82.2	377.4	855.8	438.5	390.4		357.3	144.8	218.0	240.0	108.0		441.9	513.9	477.9	50.9	
Settling V. 生物沉澱量 (ml/1000 m^3)	411.0	198.0	127.5	245.5	147.6		402.5	459.5	497.3	453.1	47.7		946.4	367.9	657.2	409.0	
Impurity 雜質 (%)	2.1	1.8	2.6	2.2	0.4		2.7	4.7	11.7	6.3	4.7		15.3	18.3	16.8	2.1	
Species No. 種類數	29	28	24	31			32	30	30	32			30	28	30		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.0762	0.3184	0.2369	0.1848			0.0413	0.2470	0.2421	0.2364			0.2758	0.2977	0.2758		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	1.1875	1.6356	1.7348	1.5145			1.1536	1.8634	1.8121	1.8640			1.7141	1.6118	1.6881		
Evenness 均勻度指數	0.3527	0.4908	0.5459	0.4410			0.3329	0.5479	0.5328	0.5379			0.5040	0.4837	0.4963		

表3-21 民國110年8月17日第三核能發電廠附近海域表層採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000m^3)及生物量

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Category				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
Noctiluca 夜光蟲	167,019	152,555	123,383	147,652	22,228	49.51	135,519	102,781	231,531	156,610	66,916	16.97	179,951	161,409	170,680	13,111	41.43
Foraminifera 有孔蟲	809	681	667	719	79	0.24	0	982	1,213	732	644	0.08	210	676	443	330	0.11
Radiolaria 放射蟲	341	225	493	353	134	0.12	907	434	2,791	1,377	1,247	0.15	276	723	500	316	0.12
Medusa 水母	1,493	528	348	790	616	0.26	7,159	5,299	4,285	5,581	1,458	0.60	9,684	2,910	6,297	4,790	1.53
Siphonophore 管水母	3,837	1,506	1,248	2,197	1,426	0.74	9,284	10,392	16,039	11,905	3,623	1.29	13,847	6,951	10,399	4,876	2.52
Ctenophora 櫛水母	47	150	90	96	52	0.03	706	228	1,071	669	423	0.07	1,081	518	800	398	0.19
Cladocera 枝角類	47	0	51	33	28	0.01	0	0	113	38	65	0.00	0	0	0	0	0.00
Copepoda nauplius 橈足類幼生	0	0	13	4	8	0.00	719	594	155	489	296	0.05	630	101	366	374	0.09
Calanoida 哲水蚤	43,774	97,970	36,963	59,569	33,430	19.97	654,736	361,901	255,309	423,982	206,823	45.95	66,359	117,662	92,010	36,277	22.33
Cyclopoida 劍水蚤	35,162	46,146	12,695	31,335	17,051	10.51	140,015	145,448	78,853	121,439	36,980	13.16	72,940	55,709	64,324	12,184	15.61
Harpacticoida 猛水蚤	0	151	0	50	87	0.02	356	228	155	247	102	0.03	132	158	145	18	0.04
Amphipoda 端腳類	676	980	602	753	200	0.25	706	68	268	347	326	0.04	757	316	536	312	0.13
Crab megalopa 大眼幼生	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Crab larvae 蟹幼生	4,830	33,839	335	13,001	18,185	4.36	10,247	7,629	7,276	8,384	1,623	0.91	2,883	5,559	4,221	1,892	1.02
Shrimp larvae 蝦幼生	2,351	28,513	387	10,417	15,702	3.49	8,799	6,098	8,231	7,709	1,424	0.84	3,296	2,120	2,708	832	0.66
Mysidacea 糠蝦類	235	9,769	204	3,403	5,513	1.14	2,972	6,396	5,867	5,079	1,843	0.55	132	608	370	337	0.09
Euphausiacea 磷蝦類	0	375	0	125	216	0.04	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Sergestidae 櫻蝦類	0	0	51	17	29	0.01	0	0	0	0	0	0.00	0	113	56	80	0.01
Luciferinae 螢蝦類	0	76	965	347	536	0.12	356	228	0	195	180	0.02	0	0	0	0	0.00
Other Decapoda 其他十足類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Ostracoda 介形類	0	75	0	25	43	0.01	894	205	465	521	348	0.06	276	0	138	195	0.03
Pteropoda 翼足類	674	150	551	458	274	0.15	1,069	1,782	4,665	2,505	1,904	0.27	973	2,009	1,491	733	0.36
Heteropoda 異足類	1,442	1,204	679	1,108	390	0.37	4,464	2,421	1,551	2,812	1,495	0.30	3,117	3,759	3,438	454	0.83
Cephalopoda larvae 頭足類幼生	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	66	113	90	33	0.02
Bivalvia 二枚貝幼生	96	0	64	53	49	0.02	0	228	0	76	132	0.01	0	0	0	0	0.00
Chaetognatha 毛顎類	2,012	8,380	2,432	4,275	3,561	1.43	53,639	28,138	21,538	34,439	16,953	3.73	6,131	4,882	5,507	883	1.34
Appendicularia 有尾類	6,084	25,782	6,257	12,708	11,323	4.26	11,685	32,707	38,257	27,550	14,017	2.99	13,764	13,568	13,666	139	3.32
Thaliacae 海樽類	5,021	2,556	643	2,740	2,195	0.92	10,514	1,644	648	4,269	5,431	0.46	26,267	5,236	15,751	14,871	3.82
Polychaeta 多毛類	241	150	102	164	71	0.06	1,425	1,485	3,101	2,004	951	0.22	2,246	542	1,394	1,205	0.34
Barnacle nauplius 藤壺幼生	0	151	26	59	81	0.02	538	68	155	254	250	0.03	1,381	2,413	1,897	729	0.46
Echinodermata larvae 棘皮動物幼生	333	680	345	453	197	0.15	0	754	268	341	382	0.04	847	1,004	925	111	0.22
Fish egg 魚卵	7,104	5,420	1,886	4,803	2,663	1.61	17,169	20,738	269,652	102,519	144,752	11.11	20,492	6,555	13,524	9,855	3.28
Fish larvae 仔稚魚	96	831	192	373	399	0.13	531	1,279	113	641	591	0.07	72	113	93	29	0.02
Other 其他	49	376	51	159	188	0.05	0	0	0	0	0	0.00	144	316	230	121	0.06
TOTAL	283,776	419,219	191,723	298,239	114,436	100.0	1,074,408	740,157	953,569	922,711	169,249	100.0	427,956	396,043	411,999	22,566	100.0
Biomass 生物量：																	
Wet wt. 濕重 (g/1000 m^3)	44.9	28.1	18.8	30.6	13.3		101.8	106.9	50.1	86.3	31.4		71.0	48.6	59.8	15.9	
Dry wt. 乾重 (g/1000 m^3)	1.4	2.2	1.1	1.6	0.6		9.2	6.7	3.2	6.3	3.0		7.5	2.1	4.8	3.8	
Displa. V. 排水容積量 (ml/1000 m^3)	65.4	28.3	58.1	50.6	19.7		144.1	121.3	88.1	117.8	28.2		453.4	66.3	259.8	273.7	
Settling V. 生物沉澱量 (ml/1000 m^3)	541.3	287.4	131.1	319.9	207.0		1155.5	730.7	291.6	725.9	432.0		2583.6	584.1	1583.8	1413.9	
Impurity 雜質 (%)	11.0	8.2	4.6	7.9	3.2		7.0	10.8	2.3	6.7	4.2		5.5	16.1	10.8	7.5	
Species No. 種類數	24	27	28	31			24	27	26	28			27	27	28		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.3876	0.2153	0.4572	0.3018			0.4075	0.3017	0.2201	0.2723			0.2390	0.2767	0.2508		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	1.4450	1.8878	1.2411	1.6837			1.3909	1.6391	1.7849	1.7144			1.8787	1.6829	1.8155		
Evenness 均勻度指數	0.4547	0.5728	0.3725	0.4903			0.4377	0.4973	0.5478	0.5145			0.5700	0.5106	0.5448		

表3-22 民國110年8月17日第三核能發電廠附近海域垂直採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000m^3)及生物量

Station	18V	20V	21V				22V	23V	24V				14V	12V			
Category				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
Noctiluca 夜光蟲	448,928	345,399	211,899	335,409	118,830	31.92	484,630	477,376	467,050	476,352	8,835	23.74	487,753	493,237	490,495	3,878	32.67
Foraminifera 有孔蟲	18,066	43,175	2,109	21,117	20,702	2.01	16,990	3,541	14,395	11,642	7,134	0.58	21,634	19,121	20,378	1,777	1.36
Radiolaria 放射蟲	1,019	3,773	6,504	3,765	2,742	0.36	8,226	1,060	6,161	5,149	3,689	0.26	2,090	2,466	2,278	266	0.15
Medusa 水母	25,558	6,707	6,409	12,891	10,971	1.23	21,718	65,767	57,377	48,288	23,389	2.41	30,574	112,076	71,325	57,631	4.75
Siphonophore 管水母	8,251	1,677	2,353	4,093	3,616	0.39	6,536	11,298	13,848	10,561	3,711	0.53	14,407	17,545	15,976	2,219	1.06
Ctenophora 櫛水母	403	0	419	274	237	0.03	0	2,144	806	983	1,083	0.05	1,634	1,701	1,667	47	0.11
Cladocera 枝角類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Copepoda nauplius 橈足類幼生	1,019	419	0	480	512	0.05	419	3,517	749	1,562	1,702	0.08	2,090	3,242	2,666	815	0.18
Calanoida 哲水蚤	280,097	212,521	115,354	202,657	82,813	19.29	276,235	1,028,131	752,958	685,775	380,424	34.18	267,168	314,471	290,820	33,449	19.37
Cyclopoida 劍水蚤	168,523	82,158	43,391	98,024	64,057	9.33	133,860	453,623	445,055	344,179	182,192	17.15	172,964	297,063	235,014	87,751	15.65
Harpacticoida 猛水蚤	1,114	0	676	597	561	0.06	0	4,264	1,986	2,083	2,134	0.10	1,995	1,621	1,808	265	0.12
Amphipoda 端腳類	3,058	419	0	1,159	1,658	0.11	1,074	1,060	1,180	1,105	66	0.06	1,728	4,863	3,296	2,217	0.22
Crab megalopa 大眼幼生	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Crab larvae 蟹幼生	175,090	7,126	419	60,878	98,967	5.79	23,513	14,141	38,664	25,439	12,375	1.27	29,301	18,093	23,697	7,925	1.58
Shrimp larvae 蝦幼生	33,477	4,611	0	12,696	18,144	1.21	11,711	21,778	27,292	20,260	7,901	1.01	14,627	11,667	13,147	2,093	0.88
Mysidacea 糠蝦類	70,392	2,096	838	24,442	39,799	2.33	2,423	9,154	12,840	8,139	5,282	0.41	5,263	4,646	4,955	436	0.33
Euphausiacea 磷蝦類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Sergestidae 櫻蝦類	308	0	0	103	178	0.01	0	699	1,986	895	1,008	0.04	361	308	335	38	0.02
Luciferinae 螢蝦類	0	1,677	0	559	968	0.05	0	361	0	120	209	0.01	0	0	0	0	0.00
Other Decapoda 其他十足類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Ostracoda 介形類	1,114	0	0	371	643	0.04	1,258	2,819	2,677	2,251	863	0.11	1,273	388	830	625	0.06
Pteropoda 翼足類	1,328	1,677	1,095	1,367	293	0.13	2,567	10,985	18,137	10,563	7,794	0.53	9,458	8,059	8,759	989	0.58
Heteropoda 異足類	4,291	1,677	2,434	2,801	1,345	0.27	6,248	18,477	21,678	15,468	8,143	0.77	3,991	10,525	7,258	4,620	0.48
Cephalopoda larvae 頭足類幼生	616	0	419	345	315	0.03	419	0	0	140	242	0.01	0	308	154	218	0.01
Bivalvia 二枚貝幼生	0	0	0	0	0	0.00	0	361	0	120	209	0.01	817	0	408	578	0.03
Chaetognatha 毛顎類	30,371	7,964	8,938	15,758	12,665	1.50	4,061	90,580	35,987	43,543	43,752	2.17	30,118	27,671	28,895	1,731	1.92
Appendicularia 有尾類	499,689	146,711	45,798	230,733	238,325	21.96	156,011	160,153	269,152	195,105	64,160	9.72	189,429	153,628	171,529	25,315	11.42
Thaliacae 海樽類	2,442	2,515	0	1,652	1,431	0.16	3,131	7,372	2,677	4,393	2,589	0.22	6,159	13,584	9,872	5,251	0.66
Polychaeta 多毛類	3,177	419	1,352	1,649	1,403	0.16	5,462	10,985	7,399	7,949	2,802	0.40	2,451	7,340	4,896	3,457	0.33
Barnacle nauplius 藤壺幼生	5,097	419	0	1,839	2,830	0.17	655	1,759	5,528	2,647	2,555	0.13	4,352	15,456	9,904	7,852	0.66
Echinodermata larvae 棘皮動物幼生	7,326	11,737	1,433	6,832	5,170	0.65	10,086	14,575	8,781	11,147	3,039	0.56	9,175	12,591	10,883	2,415	0.72
Fish egg 魚卵	8,251	5,868	3,705	5,941	2,274	0.57	13,951	21,513	159,551	65,005	81,967	3.24	106,757	28,002	67,380	55,688	4.49
Fish larvae 仔稚魚	4,386	838	338	1,854	2,207	0.18	1,821	10,214	3,599	5,211	4,423	0.26	2,545	1,701	2,123	597	0.14
Other 其他	925	419	338	561	318	0.05	0	1,060	0	353	612	0.02	0	1,393	696	985	0.05
TOTAL	1,804,319	892,001	456,223	1,050,848	687,943	100.0	1,193,007	2,448,768	2,377,514	2,006,430	705,345	100.0	1,420,115	1,582,768	1,501,442	115,013	100.0
Biomass 生物量：																	
Wet wt. 濕重 (g/1000 m^3)	74.8	38.6	15.2	42.8	30.0		40.8	211.2	113.8	121.9	85.5		374.0	126.1	250.1	175.3	
Dry wt. 乾重 (g/1000 m^3)	1.1	0.8	0.0	0.7	0.6		0.0	10.9	6.3	5.8	5.5		0.5	2.2	1.3	1.2	
Displa. V. 排水容積量 (ml/1000 m^3)	960.2	838.3	486.8	761.8	245.8		1120.0	596.2	777.3	831.2	266.0		1272.6	2129.0	1700.8	605.5	
Settling V. 生物沉澱量 (ml/1000 m^3)	953.1	461.1	185.2	533.1	389.0		522.7	1231.0	702.5	818.7	368.2		2176.0	1506.8	1841.4	473.2	
Impurity 雜質 (%)	10.3	20.9	15.9	15.7	5.3		2.9	16.5	10.7	10.0	6.8		34.3	8.3	21.3	18.4	
Species No. 種類數	28	24	21	29			24	29	26	30			27	28	29		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.0458	0.2450	0.0462	0.1632			0.0268	0.2554	0.1927	0.2147			0.1936	0.1877	0.1873		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	1.3442	1.7325	0.9860	1.8422			0.9466	1.7723	1.9803	1.9067			2.0268	2.0456	2.0627		
Evenness 均勻度指數	0.4034	0.5452	0.3239	0.5471			0.2979	0.5263	0.6078	0.5606			0.6150	0.6139	0.6126		

表3-23 民國110年11月5日第三核能發電廠附近海域表層採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000m^3)及生物量

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Category				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
Noctiluca 夜光蟲	60,266	63,749	49,840	57,952	7,238	26.81	45,346	62,887	45,677	51,303	10,033	22.82	58,643	70,155	64,399	8,140	39.10
Foraminifera 有孔蟲	5,610	4,529	8,862	6,333	2,255	2.93	6,528	779	4,547	3,951	2,920	1.76	3,840	4,711	4,276	616	2.60
Radiolaria 放射蟲	2,010	1,670	1,208	1,629	403	0.75	376	1,805	859	1,013	727	0.45	1,189	753	971	308	0.59
Medusa 水母	7,731	8,822	4,632	7,062	2,173	3.27	703	11,331	5,949	5,994	5,314	2.67	4,143	3,488	3,816	463	2.32
Siphonophore 管水母	7,950	12,948	8,847	9,915	2,664	4.59	1,658	15,643	5,247	7,516	7,264	3.34	5,361	4,756	5,059	428	3.07
Ctenophora 櫛水母	147	84	159	130	40	0.06	78	682	290	350	307	0.16	406	411	409	4	0.25
Cladocera 枝角類	397	151	80	209	166	0.10	68	0	23	30	35	0.01	92	256	174	116	0.11
Copepoda nauplius 橈足類幼生	0	0	80	27	46	0.01	128	87	166	127	39	0.06	25	13	19	8	0.01
Calanoida 哲水蚤	36,050	113,502	58,381	69,311	39,866	32.07	22,922	156,753	77,364	85,680	67,302	38.12	33,764	57,845	45,805	17,028	27.81
Cyclopoida 劍水蚤	17,554	44,772	14,040	25,455	16,821	11.78	12,303	61,747	22,895	32,315	26,033	14.38	10,147	12,186	11,167	1,442	6.78
Harpacticoida 猛水蚤	73	285	54	137	128	0.06	39	387	355	260	192	0.12	68	64	66	3	0.04
Amphipoda 端腳類	343	575	239	386	172	0.18	0	218	424	214	212	0.10	320	166	243	109	0.15
Crab megalopa 大眼幼生	0	28	0	9	16	0.00	0	97	189	95	94	0.04	12	0	6	9	0.00
Crab larvae 蟹幼生	1,635	486	610	910	631	0.42	1,201	6,111	540	2,617	3,044	1.16	388	361	374	19	0.23
Shrimp larvae 蝦幼生	3,499	4,813	1,006	3,106	1,933	1.44	1,749	5,758	3,112	3,539	2,038	1.57	2,240	5,603	3,922	2,377	2.38
Mysidacea 糠蝦類	0	787	0	262	455	0.12	0	1,452	663	705	727	0.31	111	127	119	11	0.07
Euphausiacea 磷蝦類	0	486	0	162	280	0.07	0	97	406	168	212	0.07	0	0	0	0	0.00
Sergestidae 櫻蝦類	0	262	13	92	148	0.04	48	348	148	181	153	0.08	74	103	88	21	0.05
Luciferinae 螢蝦類	23	374	80	159	188	0.07	49	402	549	333	257	0.15	25	39	32	10	0.02
Other Decapoda 其他十足類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Ostracoda 介形類	961	2,284	610	1,285	882	0.59	955	8,353	2,939	4,082	3,829	1.82	1,354	1,090	1,222	187	0.74
Pteropoda 翼足類	918	4,305	1,086	2,103	1,909	0.97	166	953	1,089	736	498	0.33	1,077	1,905	1,491	585	0.91
Heteropoda 異足類	2,723	4,517	1,075	2,772	1,722	1.28	986	2,879	2,669	2,178	1,038	0.97	2,451	1,180	1,815	899	1.10
Cephalopoda larvae 頭足類幼生	0	123	0	41	71	0.02	0	97	0	32	56	0.01	12	0	6	9	0.00
Bivalvia 二枚貝幼生	0	84	65	50	44	0.02	19	97	134	83	58	0.04	166	90	128	54	0.08
Chaetognatha 毛顎類	2,657	12,300	2,753	5,903	5,540	2.73	1,236	10,029	5,974	5,747	4,401	2.56	2,629	2,576	2,602	37	1.58
Appendicularia 有尾類	9,182	7,851	9,708	8,914	957	4.12	4,296	8,130	5,910	6,112	1,925	2.72	8,804	8,187	8,496	436	5.16
Thaliacae 海樽類	6,566	6,800	8,329	7,232	958	3.35	900	4,031	3,679	2,870	1,715	1.28	4,401	3,282	3,842	791	2.33
Polychaeta 多毛類	952	1,223	784	986	221	0.46	242	1,277	1,246	922	589	0.41	733	860	796	90	0.48
Barnacle nauplius 藤壺幼生	96	151	13	87	69	0.04	413	1,423	378	738	593	0.33	462	652	557	135	0.34
Echinodermata larvae 棘皮動物幼生	1,245	1,887	1,389	1,507	337	0.70	1,627	1,244	688	1,186	472	0.53	1,545	2,101	1,823	393	1.11
Fish egg 魚卵	1,785	2,290	1,328	1,801	481	0.83	914	8,299	900	3,371	4,267	1.50	683	1,049	866	258	0.53
Fish larvae 仔稚魚	46	179	67	97	71	0.04	87	368	157	204	146	0.09	0	230	115	163	0.07
Other 其他	96	123	133	117	19	0.05	88	281	46	138	125	0.06	25	13	19	8	0.01
TOTAL	170,517	302,436	175,470	216,141	74,775	100.0	105,124	374,043	195,210	224,792	136,878	100.0	145,190	184,253	164,721	27,622	100.0
Biomass 生物量：																	
Wet wt. 濕重 (g/1000 m^3)	39.7	78.4	24.7	47.6	27.7		6.1	88.5	58.8	51.1	41.8		24.7	12.2	18.4	8.8	
Dry wt. 乾重 (g/1000 m^3)	1.0	2.7	1.0	1.6	1.0		0.3	4.5	2.3	2.4	2.1		0.7	0.6	0.7	0.0	
Displa. V. 排水容積量 (ml/1000 m^3)	79.1	83.4	46.5	69.6	20.2		24.5	96.8	70.4	63.9	36.6		65.4	50.0	57.7	10.8	
Settling V. 生物沉澱量 (ml/1000 m^3)	318.6	420.8	257.2	332.2	82.7		37.1	638.7	421.9	365.9	304.7		281.6	96.3	189.0	131.1	
Impurity 雜質 (%)	16.1	15.1	12.7	14.6	1.7		13.6	11.4	5.5	10.1	4.2		8.3	16.5	12.4	5.8	
Species No. 種類數	26	32	29	33			28	32	32	33			31	30	32		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.1913	0.2138	0.2094	0.1969			0.2543	0.2368	0.2308	0.2229			0.2308	0.2534	0.2414		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	2.1338	2.0285	1.9995	2.0861			1.8603	1.9621	1.9977	2.0095			2.0075	1.8767	1.9440		
Evenness 均勻度指數	0.6549	0.5853	0.5938	0.5966			0.5583	0.5661	0.5764	0.5747			0.5846	0.5518	0.5609		

表3-24 民國110年11月5日第三核能發電廠附近海域垂直採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000m^3)及生物量

Station	18V	20V	21V				22V	23V	24V				14V	12V			
Category				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
Noctiluca 夜光蟲	74,590	47,407	53,969	58,655	14,185	13.87	75,931	61,115	141,885	92,977	42,999	12.59	133,551	90,810	112,180	30,223	17.08
Foraminifera 有孔蟲	24,176	37,925	2,183	21,428	18,029	5.07	20,782	39,642	12,252	24,225	14,016	3.28	41,233	20,790	31,012	14,456	4.72
Radiolaria 放射蟲	3,297	2,844	1,485	2,542	943	0.60	3,283	2,789	4,699	3,590	992	0.49	5,361	3,403	4,382	1,384	0.67
Medusa 水母	23,980	15,869	9,519	16,456	7,248	3.89	11,932	10,567	34,480	18,993	13,429	2.57	36,301	21,207	28,754	10,674	4.38
Siphonophore 管水母	18,068	12,326	4,279	11,558	6,927	2.73	3,114	5,812	19,280	9,402	8,661	1.27	15,191	5,183	10,187	7,076	1.55
Ctenophora 櫛水母	0	0	437	146	252	0.03	0	308	1,836	715	983	0.10	1,050	0	525	742	0.08
Cladocera 枝角類	269	0	1,048	439	544	0.10	0	925	0	308	534	0.04	1,672	0	836	1,182	0.13
Copepoda nauplius 橈足類幼生	0	0	0	0	0	0.00	723	0	388	370	362	0.05	283	0	142	200	0.02
Calanoida 哲水蚤	218,330	207,042	60,169	161,847	88,237	38.27	162,095	133,531	558,290	284,639	237,419	38.54	304,978	188,470	246,724	82,384	37.56
Cyclopoida 劍水蚤	96,718	52,247	15,020	54,662	40,902	12.93	53,173	68,306	245,472	122,317	106,923	16.56	59,629	46,774	53,202	9,090	8.10
Harpacticoida 猛水蚤	2,150	1,347	1,397	1,631	449	0.39	361	616	5,434	2,137	2,858	0.29	1,133	1,735	1,434	426	0.22
Amphipoda 端腳類	269	0	0	90	155	0.02	0	558	2,014	857	1,040	0.12	850	349	599	354	0.09
Crab megalopa 大眼幼生	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Crab larvae 蟹幼生	8,983	1,747	437	3,722	4,603	0.88	5,259	7,617	30,714	14,530	14,065	1.97	2,549	1,386	1,968	822	0.30
Shrimp larvae 蝦幼生	18,235	5,040	524	7,933	9,203	1.88	16,492	4,887	25,627	15,669	10,394	2.12	16,323	16,237	16,280	61	2.48
Mysidacea 糠蝦類	1,118	0	437	518	564	0.12	446	1,424	8,371	3,413	4,321	0.46	2,266	687	1,477	1,116	0.22
Euphausiacea 磷蝦類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	283	94	164	0.01	566	0	283	401	0.04
Sergestidae 櫻蝦類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Luciferinae 螢蝦類	1,089	0	0	363	629	0.09	223	0	1,552	592	839	0.08	2,211	349	1,280	1,316	0.19
Other Decapoda 其他十足類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Ostracoda 介形類	5,163	3,693	699	3,185	2,275	0.75	3,506	2,099	21,536	9,047	10,839	1.22	5,243	2,434	3,839	1,986	0.58
Pteropoda 翼足類	3,595	3,842	699	2,712	1,748	0.64	1,084	2,774	9,567	4,475	4,490	0.61	4,449	2,772	3,610	1,186	0.55
Heteropoda 異足類	6,071	4,292	1,659	4,007	2,220	0.95	5,897	3,772	11,864	7,178	4,195	0.97	6,459	3,842	5,151	1,850	0.78
Cephalopoda larvae 頭足類幼生	269	0	0	90	155	0.02	0	0	0	0	0	0.00	539	349	444	134	0.07
Bivalvia 二枚貝幼生	537	0	0	179	310	0.04	361	308	388	353	41	0.05	283	338	311	39	0.05
Chaetognatha 毛顎類	14,459	11,378	2,969	9,602	5,947	2.27	3,506	11,477	45,421	20,135	22,258	2.73	30,575	11,110	20,842	13,763	3.17
Appendicularia 有尾類	51,562	38,225	16,592	35,459	17,648	8.38	32,368	63,669	84,359	60,132	26,175	8.14	67,822	63,642	65,732	2,956	10.01
Thaliacae 海樽類	13,740	4,441	7,685	8,622	4,720	2.04	3,198	3,156	15,966	7,440	7,384	1.01	15,246	17,601	16,423	1,665	2.50
Polychaeta 多毛類	4,938	3,094	4,017	4,016	922	0.95	3,837	1,791	6,000	3,876	2,105	0.52	6,431	4,192	5,312	1,584	0.81
Barnacle nauplius 藤壺幼生	1,358	1,297	437	1,031	515	0.24	1,807	4,256	17,077	7,714	8,201	1.04	4,476	3,121	3,799	958	0.58
Echinodermata larvae 棘皮動物幼生	12,505	8,034	4,541	8,360	3,992	1.98	11,540	15,235	26,466	17,747	7,773	2.40	16,952	19,719	18,336	1,957	2.79
Fish egg 魚卵	1,641	2,595	2,969	2,402	685	0.57	2,253	1,482	5,864	3,200	2,339	0.43	511	676	594	117	0.09
Fish larvae 仔稚魚	537	998	0	512	500	0.12	584	2,158	2,329	1,690	962	0.23	0	1,397	699	988	0.11
Other 其他	806	998	437	747	285	0.18	1,084	0	1,343	809	712	0.11	283	699	491	294	0.07
TOTAL	608,455	466,680	193,606	422,914	210,859	100.0	424,840	450,274	1,340,757	738,624	521,618	100.0	784,417	529,274	656,845	180,413	100.0
Biomass 生物量：																	
Wet wt. 濕重 (g/1000 m^3)	80.8	34.2	17.1	44.0	33.0		13.5	28.8	294.4	112.2	157.9		154.0	98.4	126.2	39.3	
Dry wt. 乾重 (g/1000 m^3)	1.1	1.3	6.1	2.8	2.8		6.1	0.9	8.8	5.3	4.0		8.7	5.2	7.0	2.5	
Displa. V. 排水容積量 (ml/1000 m^3)	276.0	933.2	174.7	461.3	411.8		292.2	204.0	723.8	406.7	278.2		538.8	518.3	528.6	14.5	
Settling V. 生物沉澱量 (ml/1000 m^3)	568.6	399.2	165.9	377.9	202.2		269.9	506.4	1285.0	687.1	531.2		1176.4	484.5	830.5	489.2	
Impurity 雜質 (%)	2.3	1.9	4.2	2.8	1.2		13.5	9.1	25.0	15.9	8.2		34.2	2.3	18.2	22.6	
Species No. 種類數	28	22	24	29			26	26	29	30			30	27	31		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.0458	0.2362	0.0142	0.0965			0.0119	0.1604	0.2263	0.2031			0.2018	0.1859	0.1945		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	1.4447	2.0059	0.9230	1.7582			0.8418	2.2099	2.0644	2.1350			2.1359	2.1485	2.1513		
Evenness 均勻度指數	0.4336	0.6490	0.2904	0.5221			0.2584	0.6783	0.6131	0.6277			0.6280	0.6519	0.6265		

表3-25 民國111年2月16日第三核能發電廠附近海域表層採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000m^3)及生物量

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Category				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
Noctiluca 夜光蟲	28,448	33,873	23,495	28,605	5,191	13.90	68,789	24,833	22,690	38,771	26,019	16.72	20,474	18,070	19,272	1,700	15.00
Foraminifera 有孔蟲	8,419	7,435	2,450	6,101	3,201	2.97	26,407	10,560	6,452	14,473	10,537	6.24	4,789	4,084	4,437	499	3.45
Radiolaria 放射蟲	1,693	707	610	1,003	599	0.49	1,315	984	680	993	318	0.43	1,258	1,022	1,140	167	0.89
Medusa 水母	2,352	1,896	1,393	1,881	480	0.91	1,975	1,174	3,369	2,173	1,111	0.94	2,672	1,506	2,089	824	1.63
Siphonophore 管水母	7,222	5,511	3,251	5,328	1,992	2.59	10,082	5,341	5,282	6,902	2,754	2.98	5,898	2,677	4,287	2,278	3.34
Ctenophora 櫛水母	169	56	148	125	60	0.06	87	187	0	91	93	0.04	160	298	229	98	0.18
Cladocera 枝角類	3,225	1,425	1,368	2,006	1,056	0.97	972	2,110	4,336	2,473	1,711	1.07	2,747	1,633	2,190	788	1.70
Copepoda nauplius 橈足類幼生	1,046	364	439	616	374	0.30	698	405	567	557	147	0.24	833	630	731	144	0.57
Calanoida 哲水蚤	80,770	101,161	64,789	82,240	18,231	39.97	92,473	57,252	117,332	89,019	30,188	38.40	49,543	29,268	39,406	14,336	30.67
Cyclopoida 劍水蚤	23,744	29,054	15,368	22,722	6,900	11.04	38,906	20,983	28,736	29,542	8,988	12.74	24,546	20,835	22,691	2,624	17.66
Harpacticoida 猛水蚤	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Amphipoda 端腳類	265	1,046	142	485	490	0.24	729	1,048	869	882	160	0.38	406	173	290	165	0.23
Crab megalopa 大眼幼生	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Crab larvae 蟹幼生	2,248	2,495	22	1,588	1,362	0.77	4,966	2,951	637	2,851	2,166	1.23	588	241	415	246	0.32
Shrimp larvae 蝦幼生	4,869	5,117	1,189	3,725	2,200	1.81	3,277	4,627	5,695	4,533	1,211	1.96	3,468	1,154	2,311	1,637	1.80
Mysidacea 糠蝦類	569	3,605	22	1,398	1,930	0.68	679	628	841	716	111	0.31	176	103	140	52	0.11
Euphausiacea 磷蝦類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	49	16	28	0.01	0	0	0	0	0.00
Sergestidae 櫻蝦類	382	1,643	22	682	852	0.33	361	923	42	442	446	0.19	94	21	57	52	0.04
Luciferinae 螢蝦類	161	733	71	321	359	0.16	181	524	266	324	179	0.14	0	0	0	0	0.00
Other Decapoda 其他十足類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Ostracoda 介形類	1,267	2,512	1,219	1,666	733	0.81	1,464	1,175	1,226	1,289	154	0.56	207	158	183	35	0.14
Pteropoda 翼足類	2,929	1,225	938	1,697	1,077	0.82	1,994	717	2,151	1,621	786	0.70	896	772	834	88	0.65
Heteropoda 異足類	1,875	4,649	1,195	2,573	1,830	1.25	4,168	4,757	5,030	4,652	440	2.01	2,466	1,693	2,080	546	1.62
Cephalopoda larvae 頭足類幼生	0	56	0	19	33	0.01	0	144	42	62	74	0.03	0	0	0	0	0.00
Bivalvia 二枚貝幼生	48	46	0	31	27	0.02	0	91	49	47	46	0.02	0	44	22	31	0.02
Chaetognatha 毛顎類	4,088	7,196	1,872	4,386	2,674	2.13	5,490	3,862	9,612	6,321	2,964	2.73	1,883	1,301	1,592	412	1.24
Appendicularia 有尾類	20,862	9,921	12,600	14,461	5,703	7.03	11,857	11,863	12,105	11,942	141	5.15	12,893	9,229	11,061	2,591	8.61
Thaliacae 海樽類	35,201	11,836	13,649	20,229	12,998	9.83	8,437	6,631	10,550	8,539	1,962	3.68	16,231	7,587	11,909	6,113	9.27
Polychaeta 多毛類	378	651	548	526	138	0.26	1,146	1,298	287	910	545	0.39	160	318	239	111	0.19
Barnacle nauplius 藤壺幼生	152	0	49	67	77	0.03	0	187	189	125	109	0.05	113	21	67	66	0.05
Echinodermata larvae 棘皮動物幼生	226	56	71	118	94	0.06	131	91	505	242	228	0.10	368	253	311	81	0.24
Fish egg 魚卵	1,267	297	328	631	551	0.31	417	641	764	607	176	0.26	299	303	301	3	0.23
Fish larvae 仔稚魚	265	1,005	192	487	450	0.24	361	679	813	618	232	0.27	88	67	78	15	0.06
Other 其他	113	46	0	53	57	0.03	231	0	91	107	116	0.05	207	41	124	118	0.10
TOTAL	234,251	235,620	147,442	205,771	50,519	100.0	287,593	166,667	241,255	231,838	61,011	100.0	153,467	103,502	128,485	35,331	100.0
Biomass 生物量：																	
Wet wt. 濕重 (g/1000 m^3)	33.7	38.8	12.7	28.4	13.8		28.2	19.7	35.8	27.9	8.0		22.5	17.5	20.0	3.6	
Dry wt. 乾重 (g/1000 m^3)	1.1	2.7	0.9	1.6	1.0		5.4	1.1	2.3	2.9	2.2		0.8	1.4	1.1	0.4	
Displa. V. 排水容積量 (ml/1000 m^3)	53.2	64.1	47.2	54.8	8.6		45.6	46.1	69.2	53.6	13.5		68.8	33.0	50.9	25.3	
Settling V. 生物沉澱量 (ml/1000 m^3)	248.5	267.9	114.0	210.1	83.8		184.6	137.6	213.7	178.6	38.4		196.4	120.4	158.4	53.8	
Impurity 雜質 (%)	1.1	1.0	0.8	0.9	0.1		1.8	0.5	2.4	1.6	1.0		1.7	5.7	3.7	2.8	
Species No. 種類數	29	29	27	30			27	29	30	31			27	28	28		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.1782	0.2285	0.2466	0.2088			0.1923	0.1707	0.2685	0.2025			0.1700	0.1678	0.1675		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	2.1707	2.0666	1.8757	2.0949			2.0554	2.2772	1.9595	2.1183			2.1701	2.1489	2.1692		
Evenness 均勻度指數	0.6446	0.6137	0.5691	0.6159			0.6236	0.6763	0.5761	0.6169			0.6584	0.6449	0.6510		

表3-26 民國111年2月16日第三核能發電廠附近海域垂直採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000m^3)及生物量

Station	18V	20V	21V				22V	23V	24V				14V	12V			
Category				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
Noctiluca 夜光蟲	30,980	22,974	9,329	21,094	10,947	5.02	49,078	62,281	22,484	44,614	20,270	7.63	32,883	40,833	36,858	5,621	6.37
Foraminifera 有孔蟲	41,590	58,971	3,481	34,681	28,383	8.25	79,119	93,314	54,025	75,486	19,895	12.91	32,096	31,777	31,936	226	5.52
Radiolaria 放射蟲	2,919	731	1,230	1,627	1,147	0.39	4,017	3,477	2,592	3,362	720	0.58	4,781	3,151	3,966	1,153	0.69
Medusa 水母	9,160	8,389	3,711	7,087	2,948	1.69	11,818	7,169	9,955	9,648	2,340	1.65	24,600	18,181	21,390	4,539	3.70
Siphonophore 管水母	16,991	14,963	2,683	11,546	7,742	2.75	24,044	21,745	4,884	16,891	10,462	2.89	9,358	17,944	13,651	6,071	2.36
Ctenophora 櫛水母	1,609	0	338	649	849	0.15	0	262	0	87	151	0.01	4,327	689	2,508	2,573	0.43
Cladocera 枝角類	2,891	2,040	0	1,644	1,486	0.39	1,048	976	4,201	2,075	1,841	0.35	6,764	5,251	6,007	1,070	1.04
Copepoda nauplius 橈足類幼生	2,863	2,368	1,690	2,307	589	0.55	3,027	2,453	3,406	2,962	480	0.51	3,067	4,890	3,978	1,289	0.69
Calanoida 哲水蚤	238,265	240,345	79,613	186,074	92,204	44.27	222,278	307,330	135,997	221,869	85,667	37.95	272,222	203,974	238,098	48,258	41.16
Cyclopoida 劍水蚤	64,822	55,974	15,946	45,581	26,043	10.84	60,722	104,793	34,133	66,549	35,689	11.38	85,669	50,262	67,966	25,036	11.75
Harpacticoida 猛水蚤	327	0	0	109	189	0.03	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Amphipoda 端腳類	982	403	338	575	355	0.14	1,339	1,691	982	1,337	354	0.23	2,066	361	1,214	1,206	0.21
Crab megalopa 大眼幼生	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Crab larvae 蟹幼生	5,286	3,502	338	3,042	2,506	0.72	8,034	19,363	3,902	10,433	8,005	1.78	3,336	2,789	3,062	386	0.53
Shrimp larvae 蝦幼生	16,524	9,245	1,575	9,115	7,475	2.17	12,168	11,956	15,523	13,215	2,001	2.26	19,282	14,138	16,710	3,637	2.89
Mysidacea 糠蝦類	327	403	223	318	90	0.08	524	1,667	327	840	723	0.14	899	1,084	991	131	0.17
Euphausiacea 磷蝦類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Sergestidae 櫻蝦類	299	1,612	223	712	781	0.17	2,038	953	0	997	1,020	0.17	0	0	0	0	0.00
Luciferinae 螢蝦類	299	327	338	322	20	0.08	291	1,000	0	430	515	0.07	0	361	181	256	0.03
Other Decapoda 其他十足類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Ostracoda 介形類	2,891	2,443	1,122	2,152	920	0.51	3,027	4,859	627	2,838	2,122	0.49	1,353	1,445	1,399	66	0.24
Pteropoda 翼足類	3,789	5,114	784	3,229	2,219	0.77	3,027	3,453	982	2,488	1,321	0.43	2,344	3,478	2,911	802	0.50
Heteropoda 異足類	10,938	6,827	2,021	6,595	4,463	1.57	8,966	5,192	10,283	8,147	2,642	1.39	6,847	9,090	7,969	1,586	1.38
Cephalopoda larvae 頭足類幼生	327	0	0	109	189	0.03	291	238	655	395	227	0.07	0	0	0	0	0.00
Bivalvia 二枚貝幼生	327	0	0	109	189	0.03	0	0	0	0	0	0.00	361	361	361	0	0.06
Chaetognatha 毛顎類	12,659	9,421	2,359	8,147	5,267	1.94	9,897	16,410	8,458	11,588	4,237	1.98	18,661	10,502	14,581	5,769	2.52
Appendicularia 有尾類	80,644	41,086	12,925	44,885	34,019	10.68	64,448	57,470	62,212	61,376	3,563	10.50	62,867	83,417	73,142	14,531	12.64
Thaliacae 海樽類	27,630	37,887	8,055	24,524	15,156	5.83	17,174	33,200	8,075	19,483	12,721	3.33	13,417	31,449	22,433	12,751	3.88
Polychaeta 多毛類	1,609	1,537	338	1,161	714	0.28	873	3,739	5,015	3,209	2,121	0.55	3,150	2,134	2,642	718	0.46
Barnacle nauplius 藤壺幼生	627	731	0	452	395	0.11	0	476	0	159	275	0.03	269	361	315	66	0.05
Echinodermata larvae 棘皮動物幼生	982	403	338	575	355	0.14	0	524	655	393	347	0.07	1,353	689	1,021	469	0.18
Fish egg 魚卵	327	403	338	356	41	0.08	524	476	0	333	290	0.06	899	1,378	1,138	339	0.20
Fish larvae 仔稚魚	2,292	1,385	0	1,226	1,154	0.29	3,493	2,739	2,620	2,951	474	0.50	2,437	361	1,399	1,468	0.24
Other 其他	327	731	0	353	366	0.08	1,048	524	0	524	524	0.09	269	1,084	676	577	0.12
TOTAL	581,510	530,214	149,336	420,353	236,105	100.0	592,315	769,731	391,993	584,680	188,985	100.0	615,575	541,436	578,506	52,424	100.0
Biomass 生物量：																	
Wet wt. 濕重 (g/1000 m^3)	63.6	66.4	52.5	60.8	7.3		44.5	84.3	33.6	54.1	26.7		187.9	91.7	139.8	68.0	
Dry wt. 乾重 (g/1000 m^3)	1.3	1.0	22.5	8.3	12.3		0.0	3.7	1.6	1.8	1.8		4.4	0.4	2.4	2.9	
Displa. V. 排水容積量 (ml/1000 m^3)	313.4	692.7	841.5	615.9	272.3		2037.6	988.4	912.3	1312.8	628.9		676.4	705.8	691.1	20.8	
Settling V. 生物沉澱量 (ml/1000 m^3)	894.5	1007.6	651.6	851.2	181.9		652.0	886.0	357.4	631.8	264.9		3159.6	977.9	2068.7	1542.6	
Impurity 雜質 (%)	0.3	4.5	37.9	14.2	20.6		1.2	0.6	0.5	0.8	0.4		1.1	0.8	0.9	0.2	
Species No. 種類數	31	27	24	31			26	29	23	29			27	28	28		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.0532	0.2439	0.0608	0.1851			0.0363	0.2090	0.1799	0.1943			0.2356	0.1907	0.2117		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	1.3961	1.9794	1.1602	1.9140			1.2880	2.0653	2.1688	2.1347			2.0422	2.1665	2.1183		
Evenness 均勻度指數	0.4066	0.6006	0.3651	0.5574			0.3953	0.6133	0.6917	0.6340			0.6196	0.6502	0.6357		

表3-27 民國111年5月5日第三核能發電廠附近海域表層採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000m^3)及生物量

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Category				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
Noctiluca 夜光蟲	82,525	78,499	83,715	81,579	2,733	23.65	94,927	97,762	93,792	95,494	2,045	23.78	111,917	123,298	117,607	8,048	33.73
Foraminifera 有孔蟲	2,673	3,710	3,003	3,129	530	0.91	3,299	6,191	7,234	5,575	2,038	1.39	8,238	11,081	9,659	2,011	2.77
Radiolaria 放射蟲	3,252	2,745	4,605	3,534	962	1.02	3,269	3,357	3,351	3,326	49	0.83	5,618	8,030	6,824	1,705	1.96
Medusa 水母	794	4,308	2,006	2,370	1,785	0.69	2,485	2,069	2,075	2,210	238	0.55	1,176	2,438	1,807	892	0.52
Siphonophore 管水母	5,994	9,210	7,980	7,728	1,623	2.24	8,989	19,544	10,408	12,980	5,728	3.23	6,579	6,626	6,603	33	1.89
Ctenophora 櫛水母	434	327	940	567	327	0.16	325	415	815	518	261	0.13	2,030	1,212	1,621	578	0.46
Cladocera 枝角類	3,319	1,964	3,760	3,014	936	0.87	933	6,411	5,628	4,324	2,963	1.08	6,034	7,554	6,794	1,075	1.95
Copepoda nauplius 橈足類幼生	2,597	3,531	2,851	2,993	483	0.87	4,223	3,704	823	2,916	1,832	0.73	4,066	2,254	3,160	1,281	0.91
Calanoida 哲水蚤	106,439	74,067	101,867	94,124	17,520	27.28	75,540	130,117	169,691	125,116	47,274	31.16	89,068	76,998	83,033	8,534	23.81
Cyclopoida 劍水蚤	37,763	31,038	111,406	60,069	44,586	17.41	23,645	72,507	70,006	55,386	27,517	13.79	61,802	44,343	53,073	12,345	15.22
Harpacticoida 猛水蚤	0	0	0	0	0	0.00	94	528	0	207	281	0.05	0	55	28	39	0.01
Amphipoda 端腳類	361	491	1,722	858	751	0.25	669	528	577	591	72	0.15	128	181	155	37	0.04
Crab megalopa 大眼幼生	0	0	44	15	26	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Crab larvae 蟹幼生	2,312	5,295	7,419	5,009	2,566	1.45	2,342	6,278	2,606	3,742	2,200	0.93	1,893	1,452	1,672	312	0.48
Shrimp larvae 蝦幼生	15,955	11,067	14,144	13,722	2,471	3.98	12,503	11,367	14,965	12,945	1,839	3.22	8,904	5,863	7,383	2,150	2.12
Mysidacea 糠蝦類	0	600	555	385	334	0.11	608	904	2,961	1,491	1,282	0.37	86	1,218	652	801	0.19
Euphausiacea 磷蝦類	0	164	0	55	95	0.02	325	0	0	108	188	0.03	0	0	0	0	0.00
Sergestidae 櫻蝦類	72	1,526	95	564	833	0.16	378	183	0	187	189	0.05	0	0	0	0	0.00
Luciferinae 螢蝦類	0	614	1,274	629	637	0.18	1,856	345	1,184	1,128	757	0.28	0	0	0	0	0.00
Other Decapoda 其他十足類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Ostracoda 介形類	72	900	650	541	425	0.16	450	609	161	407	227	0.10	49	55	52	4	0.01
Pteropoda 翼足類	4,911	6,304	3,659	4,958	1,323	1.44	3,523	17,653	15,111	12,096	7,532	3.01	5,666	5,119	5,393	387	1.55
Heteropoda 異足類	3,752	12,172	5,028	6,984	4,538	2.02	10,261	15,942	3,905	10,036	6,022	2.50	2,077	2,483	2,280	287	0.65
Cephalopoda larvae 頭足類幼生	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	43	55	49	9	0.01
Bivalvia 二枚貝幼生	0	41	372	138	204	0.04	136	91	0	76	69	0.02	49	0	25	35	0.01
Chaetognatha 毛顎類	2,382	5,064	1,994	3,146	1,672	0.91	2,734	7,848	12,718	7,767	4,992	1.93	2,763	3,321	3,042	394	0.87
Appendicularia 有尾類	6,567	8,962	10,239	8,589	1,864	2.49	4,455	11,800	5,097	7,117	4,068	1.77	5,589	6,613	6,101	724	1.75
Thaliacae 海樽類	13,580	38,576	20,680	24,279	12,880	7.04	16,092	44,470	24,037	28,200	14,640	7.02	20,978	21,418	21,198	311	6.08
Polychaeta 多毛類	434	887	789	703	238	0.20	818	1,998	1,814	1,543	635	0.38	355	347	351	6	0.10
Barnacle nauplius 藤壺幼生	217	232	416	288	111	0.08	94	91	0	62	54	0.02	92	118	105	19	0.03
Echinodermata larvae 棘皮動物幼生	2,023	1,816	2,158	1,999	172	0.58	2,395	1,379	2,152	1,976	530	0.49	2,359	2,176	2,267	130	0.65
Fish egg 魚卵	7,798	1,487	27,872	12,386	13,778	3.59	1,347	3,540	5,351	3,413	2,005	0.85	8,349	6,077	7,213	1,607	2.07
Fish larvae 仔稚魚	217	136	650	334	276	0.10	115	172	315	201	103	0.05	361	403	382	29	0.11
Other 其他	72	559	227	286	249	0.08	42	619	569	410	320	0.10	269	0	135	191	0.04
TOTAL	306,516	306,292	422,120	344,976	66,808	100.0	278,871	468,424	457,346	401,547	106,385	100.0	356,540	340,789	348,665	11,138	100.0
Biomass 生物量：																	
Wet wt. 濕重 (g/1000 m^3)	21.9	36.3	33.5	30.5	7.6		25.7	43.5	82.0	50.4	28.8		28.9	22.1	25.5	4.8	
Dry wt. 乾重 (g/1000 m^3)	1.4	2.3	3.4	2.4	1.0		1.8	3.4	9.9	5.0	4.3		1.6	1.3	1.5	0.2	
Displa. V. 排水容積量 (ml/1000 m^3)	27.1	44.4	56.8	42.7	14.9		44.4	43.1	98.0	61.8	31.3		46.0	29.6	37.8	11.6	
Settling V. 生物沉澱量 (ml/1000 m^3)	111.9	281.4	181.9	191.7	85.1		197.1	227.0	548.6	324.2	194.9		238.7	173.4	206.1	46.2	
Impurity 雜質 (%)	2.5	1.5	12.8	5.6	6.2		8.0	5.5	20.0	11.2	7.8		2.5	4.5	3.5	1.4	
Species No. 種類數	26	30	30	31			31	30	26	31			28	27	29		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.2154	0.1566	0.1770	0.1710			0.2055	0.1603	0.2103	0.1826			0.1979	0.2069	0.2010		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	1.9882	2.2841	2.1385	2.1930			2.0955	2.2321	2.0401	2.1617			2.0446	2.0564	2.0570		
Evenness 均勻度指數	0.6102	0.6715	0.6288	0.6386			0.6102	0.6563	0.6262	0.6295			0.6136	0.6239	0.6109		

表3-28 民國111年5月5日第三核能發電廠附近海域垂直採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000m^3)及生物量

Station	18V	20V	21V				22V	23V	24V				14V	12V			
Category				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
Noctiluca 夜光蟲	111,138	103,982	63,495	92,872	25,692	12.37	73,953	195,198	112,507	127,219	61,947	11.39	203,280	127,943	165,612	53,271	19.45
Foraminifera 有孔蟲	26,634	22,119	6,368	18,374	10,640	2.45	11,367	28,838	19,914	20,039	8,736	1.79	31,925	52,333	42,129	14,431	4.95
Radiolaria 放射蟲	11,075	10,085	946	7,369	5,584	0.98	8,228	9,368	5,603	7,733	1,931	0.69	14,765	18,291	16,528	2,494	1.94
Medusa 水母	21,543	9,657	10,225	13,808	6,705	1.84	12,254	24,839	21,932	19,675	6,589	1.76	16,655	13,401	15,028	2,301	1.76
Siphonophore 管水母	19,779	8,282	11,716	13,259	5,902	1.77	11,021	29,622	35,361	25,335	12,724	2.27	12,051	14,417	13,234	1,673	1.55
Ctenophora 櫛水母	1,754	349	4,767	2,290	2,257	0.31	318	645	1,352	772	529	0.07	627	349	488	196	0.06
Cladocera 枝角類	8,449	6,209	1,601	5,420	3,492	0.72	4,754	2,263	7,150	4,722	2,444	0.42	12,809	4,700	8,754	5,734	1.03
Copepoda nauplius 橈足類幼生	15,783	13,950	6,368	12,033	4,992	1.60	6,613	17,565	7,253	10,477	6,147	0.94	9,048	6,192	7,620	2,019	0.89
Calanoida 哲水蚤	287,863	351,576	159,919	266,453	97,606	35.50	173,245	519,035	865,606	519,295	346,180	46.48	319,068	219,113	269,091	70,678	31.60
Cyclopoida 劍水蚤	86,545	182,814	132,556	133,972	48,150	17.85	64,015	120,463	253,799	146,092	97,453	13.08	183,454	125,085	154,270	41,273	18.12
Harpacticoida 猛水蚤	723	338	655	572	205	0.08	318	4,218	2,684	2,406	1,965	0.22	898	0	449	635	0.05
Amphipoda 端腳類	1,701	1,363	291	1,118	736	0.15	626	2,918	2,960	2,168	1,336	0.19	1,937	699	1,318	876	0.15
Crab megalopa 大眼幼生	0	0	0	0	0	0.00	0	327	0	109	189	0.01	0	0	0	0	0.00
Crab larvae 蟹幼生	9,629	18,536	3,093	10,419	7,752	1.39	3,148	14,270	9,373	8,930	5,575	0.80	4,145	6,383	5,264	1,582	0.62
Shrimp larvae 蝦幼生	31,778	33,432	10,006	25,072	13,074	3.34	20,977	49,717	35,658	35,451	14,371	3.17	19,770	21,308	20,539	1,087	2.41
Mysidacea 糠蝦類	3,560	1,037	873	1,823	1,506	0.24	934	2,292	2,346	1,857	800	0.17	2,395	2,096	2,246	212	0.26
Euphausiacea 磷蝦類	0	0	0	0	0	0.00	0	327	0	109	189	0.01	0	0	0	0	0.00
Sergestidae 櫻蝦類	1,445	3,144	655	1,748	1,272	0.23	0	2,947	1,014	1,320	1,497	0.12	0	0	0	0	0.00
Luciferinae 螢蝦類	2,115	1,747	619	1,493	780	0.20	0	2,590	2,325	1,638	1,425	0.15	2,152	699	1,425	1,028	0.17
Other Decapoda 其他十足類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Ostracoda 介形類	1,339	1,701	0	1,014	896	0.14	318	1,300	1,967	1,195	830	0.11	327	0	164	232	0.02
Pteropoda 翼足類	14,731	14,130	7,823	12,228	3,827	1.63	9,751	17,743	49,395	25,630	20,966	2.29	26,722	15,497	21,110	7,938	2.48
Heteropoda 異足類	28,388	10,220	8,114	15,574	11,147	2.07	7,229	31,775	36,898	25,301	15,859	2.26	4,416	4,446	4,431	21	0.52
Cephalopoda larvae 頭足類幼生	308	338	327	325	15	0.04	0	0	338	113	195	0.01	0	0	0	0	0.00
Bivalvia 二枚貝幼生	1,031	0	0	344	595	0.05	0	0	973	324	562	0.03	954	0	477	675	0.06
Chaetognatha 毛顎類	18,865	13,849	7,168	13,294	5,868	1.77	8,574	48,149	45,564	34,096	22,140	3.05	16,374	15,592	15,983	553	1.88
Appendicularia 有尾類	64,109	41,106	15,537	40,251	24,297	5.36	21,519	50,789	50,409	40,906	16,791	3.66	34,161	32,613	33,387	1,094	3.92
Thaliacae 海樽類	43,894	18,942	36,641	33,159	12,836	4.42	24,685	31,458	41,672	32,605	8,551	2.92	32,009	20,609	26,309	8,061	3.09
Polychaeta 多毛類	10,681	4,834	946	5,487	4,900	0.73	4,754	5,845	5,030	5,210	567	0.47	4,248	3,493	3,870	534	0.45
Barnacle nauplius 藤壺幼生	723	687	0	470	407	0.06	635	0	338	324	318	0.03	0	349	175	247	0.02
Echinodermata larvae 棘皮動物幼生	9,066	10,772	3,129	7,656	4,012	1.02	6,659	14,548	6,341	9,183	4,649	0.82	7,738	11,845	9,791	2,904	1.15
Fish egg 魚卵	7,982	18,401	3,639	10,007	7,587	1.33	1,896	3,195	3,913	3,002	1,022	0.27	13,445	5,938	9,692	5,308	1.14
Fish larvae 仔稚魚	2,062	1,048	619	1,243	741	0.17	953	3,860	2,960	2,591	1,489	0.23	1,553	984	1,269	402	0.15
Other 其他	1,754	2,073	655	1,494	744	0.20	635	645	3,001	1,427	1,363	0.13	926	699	812	161	0.10
TOTAL	846,446	906,722	498,751	750,640	220,214	100.0	479,378	1,236,750	1,635,637	1,117,255	587,318	100.0	977,853	725,075	851,464	178,741	100.0
Biomass 生物量：																	
Wet wt. 濕重 (g/1000 m^3)	31.7	35.5	50.7	39.3	10.1		26.6	124.7	179.0	110.1	77.2		48.2	9.7	28.9	27.2	
Dry wt. 乾重 (g/1000 m^3)	3.5	4.8	2.3	3.6	1.2		1.6	8.0	12.1	7.2	5.3		6.4	3.0	4.7	2.4	
Displa. V. 排水容積量 (ml/1000 m^3)	977.8	687.4	618.6	761.2	190.7		625.8	645.0	655.6	642.1	15.1		954.4	666.9	810.6	203.3	
Settling V. 生物沉澱量 (ml/1000 m^3)	875.8	962.3	960.6	932.9	49.5		569.7	2199.1	1772.2	1513.7	844.9		948.8	876.5	912.6	51.1	
Impurity 雜質 (%)	2.0	3.5	2.0	2.5	0.9		3.0	3.5	7.5	4.7	2.5		2.5	0.0	1.3	1.8	
Species No. 種類數	31	30	28	31			27	30	31	33			28	26	29		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.0396	0.2108	0.0419	0.1189			0.0094	0.2190	0.3141	0.2528			0.1909	0.1640	0.1785		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	1.5508	2.1270	1.3120	1.9985			0.8436	2.1366	1.8202	2.0274			2.1258	2.2460	2.1872		
Evenness 均勻度指數	0.4516	0.6254	0.3937	0.5820			0.2560	0.6282	0.5300	0.5798			0.6380	0.6894	0.6496		

表3-29 民國111年8月12日第三核能發電廠附近海域表層採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000m^3)及生物量

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Category				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
Noctiluca 夜光蟲	1,601	421	2,384	1,469	988	1.08	1,817	3,574	1,926	2,439	985	1.80	2,240	1,603	1,922	450	1.86
Foraminifera 有孔蟲	11,678	7,497	5,091	8,089	3,333	5.93	11,185	8,195	7,228	8,869	2,063	6.56	6,425	4,353	5,389	1,465	5.21
Radiolaria 放射蟲	2,468	836	2,577	1,960	976	1.44	1,197	1,082	474	918	388	0.68	1,153	2,621	1,887	1,038	1.83
Medusa 水母	1,063	914	2,976	1,651	1,150	1.21	2,192	2,766	531	1,830	1,160	1.35	1,272	463	868	572	0.84
Siphonophore 管水母	19,070	5,123	25,841	16,678	10,564	12.22	11,278	27,699	5,511	14,829	11,512	10.97	20,775	9,831	15,303	7,738	14.81
Ctenophora 櫛水母	72	211	726	336	345	0.25	485	289	68	280	209	0.21	335	54	194	199	0.19
Cladocera 枝角類	7,314	3,559	3,240	4,704	2,265	3.45	9,697	10,324	1,161	7,061	5,119	5.22	14,815	7,641	11,228	5,072	10.86
Copepoda nauplius 橈足類幼生	0	0	25	8	15	0.01	50	46	14	37	20	0.03	27	27	27	0	0.03
Calanoida 哲水蚤	23,574	59,120	38,990	40,561	17,825	29.73	26,719	65,000	19,906	37,208	24,308	27.52	37,115	6,182	21,648	21,873	20.94
Cyclopoida 劍水蚤	24,614	21,743	49,801	32,052	15,437	23.49	12,673	28,461	8,978	16,704	10,348	12.35	38,224	6,912	22,568	22,141	21.83
Harpacticoida 猛水蚤	0	0	109	36	63	0.03	25	0	0	8	14	0.01	27	0	13	19	0.01
Amphipoda 端腳類	0	188	390	193	195	0.14	113	250	54	139	100	0.10	24	38	31	10	0.03
Crab megalopa 大眼幼生	0	0	0	0	0	0.00	0	46	250	99	133	0.07	81	0	40	57	0.04
Crab larvae 蟹幼生	2,205	4,050	8,162	4,806	3,049	3.52	1,380	7,372	2,085	3,612	3,275	2.67	2,538	633	1,585	1,347	1.53
Shrimp larvae 蝦幼生	557	1,357	2,451	1,455	951	1.07	1,016	1,993	963	1,324	580	0.98	1,021	221	621	566	0.60
Mysidacea 糠蝦類	0	327	55	127	175	0.09	25	0	13	13	13	0.01	51	0	25	36	0.02
Euphausiacea 磷蝦類	0	0	0	0	0	0.00	63	513	39	205	267	0.15	0	0	0	0	0.00
Sergestidae 櫻蝦類	47	93	80	73	23	0.05	288	2,822	673	1,261	1,365	0.93	102	73	87	20	0.08
Luciferinae 螢蝦類	89	810	915	604	450	0.44	1,524	374	162	687	733	0.51	24	12	18	9	0.02
Other Decapoda 其他十足類	0	92	0	31	53	0.02	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Ostracoda 介形類	44	300	399	248	183	0.18	92	1,011	285	463	484	0.34	373	0	187	264	0.18
Pteropoda 翼足類	861	1,019	1,394	1,091	273	0.80	691	1,404	899	998	367	0.74	1,084	244	664	594	0.64
Heteropoda 異足類	2,674	3,075	10,470	5,406	4,390	3.96	3,429	12,699	5,116	7,081	4,938	5.24	10,343	1,168	5,755	6,488	5.57
Cephalopoda larvae 頭足類幼生	0	24	25	16	14	0.01	0	0	39	13	23	0.01	0	12	6	8	0.01
Bivalvia 二枚貝幼生	0	23	0	8	13	0.01	0	0	14	5	8	0.00	0	0	0	0	0.00
Chaetognatha 毛顎類	1,829	7,037	6,189	5,018	2,794	3.68	10,259	22,873	3,306	12,146	9,919	8.98	6,672	335	3,503	4,481	3.39
Appendicularia 有尾類	3,075	1,411	4,524	3,003	1,558	2.20	3,266	4,293	1,079	2,879	1,641	2.13	2,608	2,838	2,723	162	2.63
Thaliacae 海樽類	334	234	6,026	2,198	3,316	1.61	745	1,331	147	741	592	0.55	370	231	300	99	0.29
Polychaeta 多毛類	415	539	722	559	154	0.41	1,167	2,518	300	1,328	1,118	0.98	804	185	494	438	0.48
Barnacle nauplius 藤壺幼生	72	94	269	145	108	0.11	46	46	96	62	29	0.05	311	90	201	156	0.19
Echinodermata larvae 棘皮動物幼生	925	1,186	315	808	447	0.59	481	393	204	359	141	0.27	355	354	355	1	0.34
Fish egg 魚卵	4,861	1,072	2,295	2,743	1,933	2.01	5,513	12,880	14,484	10,959	4,784	8.11	6,767	2,768	4,767	2,828	4.61
Fish larvae 仔稚魚	98	164	310	191	109	0.14	71	85	148	102	41	0.08	203	90	147	80	0.14
Other 其他	245	187	50	161	100	0.12	431	1,109	108	549	511	0.41	1,010	596	803	293	0.78
TOTAL	109,785	122,706	176,800	136,430	35,553	100.0	107,917	221,447	76,262	135,209	76,343	100.0	157,147	49,575	103,361	76,065	100.0
Biomass 生物量：																	
Wet wt. 濕重 (g/1000 m^3)	15.6	12.9	30.1	19.5	9.2		18.6	45.0	16.5	26.7	15.9		26.7	5.4	16.0	15.1	
Dry wt. 乾重 (g/1000 m^3)	0.1	0.9	1.1	0.7	0.6		0.9	2.7	1.0	1.5	1.0		3.1	0.1	1.6	2.2	
Displa. V. 排水容積量 (ml/1000 m^3)	46.6	57.5	103.3	69.1	30.1		76.5	92.8	67.1	78.8	13.0		117.3	51.0	84.1	46.9	
Settling V. 生物沉澱量 (ml/1000 m^3)	76.2	77.8	279.1	144.4	116.7		120.7	280.3	276.2	225.7	91.0		178.0	43.8	110.9	94.9	
Impurity 雜質 (%)	7.2	7.5	6.3	7.0	0.6		6.9	3.8	33.0	14.6	16.0		14.3	9.2	11.7	3.6	
Species No. 種類數	25	30	30	32			30	29	32	33			30	27	31		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.1473	0.2756	0.1604	0.1693			0.1199	0.1416	0.1410	0.1296			0.1520	0.1172	0.1362		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	2.2412	1.9092	2.2720	2.2417			2.4684	2.3729	2.3353	2.4390			2.2442	2.4077	2.3286		
Evenness 均勻度指數	0.6963	0.5613	0.6680	0.6468			0.7258	0.7047	0.6738	0.6975			0.6598	0.7305	0.6781		

表3-30 民國111年8月12日第三核能發電廠附近海域垂直採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000m^3)及生物量

Station	18V	20V	21V				22V	23V	24V				14V	12V			
Category				**Mean**	**S.D.**	**%**				**Mean**	**S.D.**	**%**			**Mean**	**S.D.**	**%**
Noctiluca 夜光蟲	1,983	2,560	966	1,836	807	0.65	1,048	3,694	2,794	2,512	1,345	0.59	1,311	4,903	3,107	2,539	0.94
Foraminifera 有孔蟲	32,288	45,470	1,582	26,447	22,519	9.41	46,533	38,344	27,246	37,374	9,680	8.71	17,117	23,711	20,414	4,662	6.18
Radiolaria 放射蟲	3,682	1,280	349	1,770	1,720	0.63	4,341	1,472	2,096	2,637	1,509	0.61	1,014	911	963	73	0.29
Medusa 水母	3,965	5,448	14,712	8,042	5,824	2.86	5,290	11,443	11,178	9,303	3,479	2.17	12,999	8,584	10,792	3,122	3.27
Siphonophore 管水母	16,144	16,761	35,322	22,742	10,898	8.09	25,874	36,203	28,644	30,240	5,346	7.04	44,909	24,640	34,774	14,332	10.53
Ctenophora 櫛水母	850	655	699	734	102	0.26	1,447	2,556	2,096	2,033	557	0.47	4,292	0	2,146	3,035	0.65
Cladocera 枝角類	6,514	5,111	1,007	4,211	2,862	1.50	11,852	24,813	15,020	17,228	6,757	4.01	12,600	12,849	12,724	176	3.85
Copepoda nauplius 橈足類幼生	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Calanoida 哲水蚤	100,545	109,190	62,732	90,822	24,708	32.32	127,773	106,373	164,875	133,007	29,600	30.98	87,164	86,423	86,793	524	26.29
Cyclopoida 劍水蚤	65,992	104,912	27,205	66,036	38,854	23.50	47,506	62,515	69,862	59,961	11,395	13.97	78,201	54,128	66,164	17,022	20.04
Harpacticoida 猛水蚤	566	635	0	401	349	0.14	0	361	699	353	349	0.08	1,014	0	507	717	0.15
Amphipoda 端腳類	0	327	0	109	189	0.04	0	388	1,747	712	917	0.17	338	0	169	239	0.05
Crab megalopa 大眼幼生	283	0	0	94	164	0.03	0	0	0	0	0	0.00	338	456	397	83	0.12
Crab larvae 蟹幼生	8,780	27,082	2,548	12,803	12,752	4.56	2,246	10,854	20,959	11,353	9,367	2.64	13,153	9,513	11,333	2,574	3.43
Shrimp larvae 蝦幼生	1,699	6,480	2,938	3,706	2,481	1.32	6,412	4,216	8,383	6,337	2,085	1.48	2,325	3,080	2,703	534	0.82
Mysidacea 糠蝦類	0	0	0	0	0	0.00	374	0	349	241	209	0.06	0	0	0	0	0.00
Euphausiacea 磷蝦類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Sergestidae 櫻蝦類	566	327	616	503	154	0.18	0	1,111	2,096	1,069	1,049	0.25	338	0	169	239	0.05
Luciferinae 螢蝦類	566	635	0	401	349	0.14	1,123	1,164	2,096	1,461	550	0.34	953	0	476	674	0.14
Other Decapoda 其他十足類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Ostracoda 介形類	283	963	0	415	495	0.15	1,447	2,248	2,794	2,163	678	0.50	635	875	755	169	0.23
Pteropoda 翼足類	566	1,945	925	1,145	715	0.41	2,520	2,222	4,192	2,978	1,062	0.69	3,001	2,169	2,585	589	0.78
Heteropoda 異足類	5,665	12,583	11,589	9,946	3,741	3.54	16,393	9,128	28,993	18,171	10,051	4.23	20,385	8,402	14,393	8,473	4.36
Cephalopoda larvae 頭足類幼生	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	419	210	296	0.06
Bivalvia 二枚貝幼生	0	327	0	109	189	0.04	0	0	0	0	0	0.00	338	0	169	239	0.05
Chaetognatha 毛顎類	9,346	13,278	4,685	9,103	4,302	3.24	18,164	33,740	49,602	33,835	15,719	7.88	17,947	6,652	12,300	7,987	3.73
Appendicularia 有尾類	8,214	8,921	7,315	8,150	805	2.90	11,028	17,867	9,082	12,659	4,614	2.95	11,709	13,268	12,488	1,102	3.78
Thaliacae 海樽類	283	1,280	11,589	4,384	6,259	1.56	1,821	1,552	1,747	1,707	139	0.40	338	1,367	852	727	0.26
Polychaeta 多毛類	566	1,618	2,794	1,659	1,115	0.59	2,096	6,223	9,082	5,800	3,512	1.35	1,311	3,116	2,214	1,277	0.67
Barnacle nauplius 藤壺幼生	850	1,270	0	707	647	0.25	724	361	1,747	944	718	0.22	1,352	1,330	1,341	15	0.41
Echinodermata larvae 棘皮動物幼生	3,115	2,888	0	2,001	1,737	0.71	2,495	1,834	1,048	1,792	724	0.42	1,332	1,750	1,541	296	0.47
Fish egg 魚卵	1,699	1,300	658	1,219	526	0.43	4,741	5,634	81,040	30,472	43,796	7.10	23,663	25,825	24,744	1,529	7.49
Fish larvae 仔稚魚	0	1,608	349	652	846	0.23	349	1,084	1,048	827	414	0.19	676	875	775	141	0.23
Other 其他	566	1,935	0	834	995	0.30	3,244	361	2,794	2,133	1,551	0.50	1,670	2,624	2,147	675	0.65
TOTAL	275,578	376,790	190,580	280,983	93,222	100.0	346,841	387,762	553,309	429,304	109,323	100.0	362,423	297,868	330,146	45,647	100.0
Biomass 生物量：																	
Wet wt. 濕重 (g/1000 m^3)	14.2	25.5	29.3	23.0	7.9		19.3	30.0	56.9	35.4	19.4		49.6	26.3	37.9	16.4	
Dry wt. 乾重 (g/1000 m^3)	0.3	3.2	2.9	2.1	1.6		2.5	4.5	8.7	5.2	3.2		4.4	2.7	3.6	1.2	
Displa. V. 排水容積量 (ml/1000 m^3)	566.5	640.1	328.8	511.8	162.7		711.1	736.1	349.3	598.8	216.5		665.8	437.4	551.6	161.5	
Settling V. 生物沉澱量 (ml/1000 m^3)	566.5	514.0	743.8	608.1	120.4		638.7	599.6	768.5	668.9	88.4		659.7	623.3	641.5	25.7	
Impurity 雜質 (%)	5.5	13.0	22.8	13.8	8.6		2.4	8.3	14.2	8.3	5.9		31.3	22.5	26.9	6.2	
Species No. 種類數	26	28	20	29			25	27	28	28			29	24	30		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.0531	0.1870	0.0724	0.1347			0.0277	0.1366	0.1457	0.1454			0.1371	0.1456	0.1387		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	1.3596	2.1228	1.6203	2.0027			1.2125	2.3812	2.3678	2.3912			2.3683	2.3507	2.3848		
Evenness 均勻度指數	0.4173	0.6371	0.5409	0.5947			0.3767	0.7225	0.7106	0.7176			0.7033	0.7397	0.7012		

表3-31 民國111年11月17日第三核能發電廠附近海域表層採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000m^3)及生物量

Station	18S	20S	21S				22S	23S	24S				14S	12S			
Category				Mean	S.D.	%				Mean	S.D.	%			Mean	S.D.	%
Noctiluca 夜光蟲	277,206	235,222	136,085	216,171	72,464	46.98	184,382	141,271	136,593	154,082	26,345	31.20	120,418	236,023	178,221	81,745	31.68
Foraminifera 有孔蟲	1,054	850	1,226	1,043	188	0.23	216	668	909	598	352	0.12	176	974	575	564	0.10
Radiolaria 放射蟲	3,688	4,217	1,709	3,205	1,322	0.70	2,322	2,420	1,361	2,034	585	0.41	3,921	4,086	4,004	116	0.71
Medusa 水母	2,116	2,764	1,445	2,108	659	0.46	1,998	2,628	2,246	2,291	317	0.46	2,027	1,499	1,763	373	0.31
Siphonophore 管水母	14,313	25,773	11,387	17,158	7,603	3.73	24,991	32,471	10,522	22,661	11,159	4.59	33,918	19,696	26,807	10,056	4.77
Ctenophora 櫛水母	107	222	90	139	72	0.03	829	83	0	304	456	0.06	0	106	53	75	0.01
Cladocera 枝角類	2,697	1,527	443	1,556	1,127	0.34	468	438	615	507	95	0.10	176	1,017	597	594	0.11
Copepoda nauplius 橈足類幼生	0	0	0	0	0	0.00	108	521	295	308	207	0.06	1,212	63	637	812	0.11
Calanoida 哲水蚤	137,957	134,201	129,310	133,823	4,336	29.08	208,861	157,857	194,571	187,096	26,311	37.89	270,666	132,533	201,599	97,674	35.84
Cyclopoida 劍水蚤	38,413	40,704	21,522	33,546	10,476	7.29	48,325	75,542	27,562	50,477	24,062	10.22	83,856	58,458	71,157	17,959	12.65
Harpacticoida 猛水蚤	62	117	0	60	59	0.01	198	167	0	122	106	0.02	0	0	0	0	0.00
Amphipoda 端腳類	911	2,204	519	1,211	881	0.26	90	771	808	556	404	0.11	882	634	758	176	0.13
Crab megalopa 大眼幼生	0	0	0	0	0	0.00	90	0	0	30	52	0.01	0	0	0	0	0.00
Crab larvae 蟹幼生	1,178	2,622	904	1,568	923	0.34	486	1,313	1,813	1,204	670	0.24	5,023	3,741	4,382	907	0.78
Shrimp larvae 蝦幼生	946	1,539	1,803	1,429	439	0.31	5,582	4,378	4,790	4,917	612	1.00	5,882	3,745	4,814	1,511	0.86
Mysidacea 糠蝦類	339	991	501	610	339	0.13	1,549	83	66	566	851	0.11	219	381	300	114	0.05
Euphausiacea 磷蝦類	0	652	45	232	364	0.05	954	1,147	945	1,015	114	0.21	1,937	126	1,032	1,280	0.18
Sergestidae 櫻蝦類	62	536	103	234	262	0.05	0	459	386	282	247	0.06	968	63	516	640	0.09
Luciferinae 螢蝦類	447	1,434	2,420	1,434	987	0.31	1,386	792	1,458	1,212	365	0.25	5,066	464	2,765	3,254	0.49
Other Decapoda 其他十足類	0	0	0	0	0	0.00	90	0	0	30	52	0.01	0	106	53	75	0.01
Ostracoda 介形類	125	1,188	45	453	638	0.10	630	480	391	500	120	0.10	1,674	0	837	1,184	0.15
Pteropoda 翼足類	1,188	3,509	1,553	2,083	1,248	0.45	576	2,545	1,042	1,388	1,029	0.28	5,500	2,216	3,858	2,322	0.69
Heteropoda 異足類	4,224	5,152	2,847	4,074	1,160	0.89	4,067	2,335	2,271	2,891	1,019	0.59	2,838	2,704	2,771	95	0.49
Cephalopoda larvae 頭足類幼生	0	117	0	39	68	0.01	198	83	66	116	72	0.02	0	0	0	0	0.00
Bivalvia 二枚貝幼生	0	314	134	149	158	0.03	90	167	0	86	83	0.02	286	106	196	127	0.03
Chaetognatha 毛顎類	4,946	7,872	3,821	5,546	2,092	1.21	5,996	13,766	7,553	9,105	4,111	1.84	18,762	7,121	12,941	8,232	2.30
Appendicularia 有尾類	5,366	10,391	10,173	8,643	2,841	1.88	15,483	17,407	12,464	15,118	2,492	3.06	10,900	6,970	8,935	2,779	1.59
Thaliacae 海樽類	14,376	32,605	13,033	20,005	10,933	4.35	19,592	33,116	20,566	24,425	7,542	4.95	33,951	12,859	23,405	14,914	4.16
Polychaeta 多毛類	1,670	1,200	1,476	1,449	236	0.31	1,530	1,002	1,306	1,279	265	0.26	1,364	1,161	1,263	144	0.22
Barnacle nauplius 藤壺幼生	0	0	0	0	0	0.00	180	397	452	343	144	0.07	219	212	216	5	0.04
Echinodermata larvae 棘皮動物幼生	839	2,087	1,110	1,345	656	0.29	1,044	1,481	1,102	1,209	237	0.24	2,271	846	1,558	1,008	0.28
Fish egg 魚卵	402	222	533	385	156	0.08	648	6,778	10,077	5,834	4,785	1.18	9,890	866	5,378	6,381	0.96
Fish larvae 仔稚魚	232	665	295	397	234	0.09	486	1,543	452	827	620	0.17	925	401	663	371	0.12
Other 其他	107	0	0	36	62	0.01	90	480	584	385	261	0.08	639	275	457	257	0.08
TOTAL	514,972	520,894	344,531	460,132	100,157	100.0	533,535	504,588	443,267	493,797	46,092	100.0	625,571	499,454	562,512	89,179	100.0
Biomass 生物量：																	
Wet wt. 濕重 (g/1000 m^3)	119.8	74.1	74.1	89.4	26.4		70.7	97.9	48.2	72.3	24.9		77.9	51.2	64.6	18.9	
Dry wt. 乾重 (g/1000 m^3)	2.2	3.0	2.0	2.4	0.5		2.9	3.9	2.9	3.2	0.6		5.5	2.8	4.1	1.9	
Displa. V. 排水容積量 (ml/1000 m^3)	116.1	63.5	117.8	99.1	30.9		68.7	134.3	45.1	82.7	46.2		105.8	80.5	93.2	17.9	
Settling V. 生物沉澱量 (ml/1000 m^3)	483.4	390.8	357.5	410.6	65.2		351.1	605.0	267.0	407.7	175.9		467.8	275.8	371.8	135.8	
Impurity 雜質 (%)	12.9	4.2	7.2	8.1	4.4		7.4	6.8	24.4	12.9	10.0		5.9	7.9	6.9	1.4	
Species No. 種類數	27	29	27	30			33	32	29	34			29	30	31		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.3690	0.2837	0.3046	0.3146			0.2856	0.2095	0.2961	0.2576			0.2500	0.3103	0.2500		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	1.4165	1.7288	1.6054	1.5997			1.6452	1.9310	1.6811	1.7786			1.8739	1.5857	1.8000		
Evenness 均勻度指數	0.4298	0.5134	0.4871	0.4703			0.4705	0.5572	0.4992	0.5044			0.5565	0.4662	0.5242		

表3-32 民國111年11月17日第三核能發電廠附近海域垂直採樣動物性浮游生物各大類之豐度(ind./1000m^3)及生物量

Station	18V	20V	21V	Mean	S.D.	%	22V	23V	24V	Mean	S.D.	%	14V	12V	Mean	S.D.	%
Category																	
Noctiluca 夜光蟲	246,651	212,762	121,718	193,711	64,609	24.99	286,011	268,493	109,465	221,323	97,267	25.01	235,750	208,912	222,331	18,977	21.75
Foraminifera 有孔蟲	5,190	10,409	1,173	5,591	4,631	0.72	5,764	2,469	2,581	3,605	1,871	0.41	2,140	1,747	1,943	278	0.19
Radiolaria 放射蟲	7,095	6,139	2,653	5,296	2,338	0.68	2,171	1,739	973	1,627	606	0.18	2,431	2,457	2,444	19	0.24
Medusa 水母	16,751	18,736	13,565	16,351	2,609	2.11	14,746	11,972	9,363	12,027	2,692	1.36	5,750	16,996	11,373	7,952	1.11
Siphonophore 管水母	20,740	43,540	24,011	29,431	12,328	3.80	45,810	33,050	8,625	29,162	18,895	3.30	26,780	42,447	34,613	11,079	3.39
Ctenophora 櫛水母	318	1,658	299	758	779	0.10	1,497	318	0	605	789	0.07	916	349	633	401	0.06
Cladocera 枝角類	0	0	299	100	173	0.01	349	1,421	1,670	1,147	702	0.13	1,224	2,469	1,847	880	0.18
Copepoda nauplius 橈足類幼生	0	0	299	100	173	0.01	374	318	1,014	569	387	0.06	907	1,060	984	108	0.10
Calanoida 哲水蚤	225,107	339,432	201,145	255,228	73,900	32.93	466,929	233,673	222,811	307,805	137,913	34.79	369,498	395,673	382,586	18,509	37.43
Cyclopoida 劍水蚤	91,883	103,488	46,758	80,709	29,970	10.41	110,856	145,726	115,426	124,003	18,951	14.01	119,482	172,403	145,943	37,421	14.28
Harpacticoida 猛水蚤	0	0	291	97	168	0.01	2,171	262	338	924	1,081	0.10	299	2,445	1,372	1,517	0.13
Amphipoda 端腳類	1,280	1,799	0	1,027	926	0.13	0	897	1,291	729	662	0.08	907	1,072	990	117	0.10
Crab megalopa 大眼幼生	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Crab larvae 蟹幼生	6,113	4,481	1,763	4,119	2,197	0.53	2,196	1,683	2,325	2,068	340	0.23	5,724	6,360	6,042	450	0.59
Shrimp larvae 蝦幼生	3,870	8,045	1,189	4,368	3,455	0.56	13,848	8,693	4,927	9,156	4,478	1.03	6,111	8,263	7,187	1,521	0.70
Mysidacea 糠蝦類	635	388	0	341	320	0.04	5,190	580	338	2,036	2,734	0.23	0	349	175	247	0.02
Euphausiacea 磷蝦類	318	388	0	235	207	0.03	0	580	338	306	291	0.03	1,532	361	947	828	0.09
Sergestidae 櫻蝦類	0	0	0	0	0	0.00	0	262	318	193	170	0.02	299	0	150	212	0.01
Luciferinae 螢蝦類	1,300	7,868	1,489	3,552	3,739	0.46	1,846	2,223	656	1,575	818	0.18	1,832	5,625	3,728	2,682	0.36
Other Decapoda 其他十足類	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Ostracoda 介形類	327	388	882	532	304	0.07	1,098	1,421	676	1,065	374	0.12	2,113	699	1,406	1,000	0.14
Pteropoda 翼足類	3,225	4,799	2,354	3,459	1,239	0.45	724	2,525	2,643	1,964	1,076	0.22	3,619	7,095	5,357	2,457	0.52
Heteropoda 異足類	5,170	8,433	2,379	5,327	3,030	0.69	9,132	5,311	2,960	5,801	3,115	0.66	2,431	4,276	3,353	1,305	0.33
Cephalopoda larvae 頭足類幼生	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Bivalvia 二枚貝幼生	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Chaetognatha 毛顎類	19,728	17,395	14,480	17,201	2,630	2.22	17,441	11,607	5,009	11,352	6,220	1.28	11,554	27,909	19,731	11,565	1.93
Appendicularia 有尾類	64,017	125,787	50,026	79,944	40,313	10.31	77,597	98,609	73,417	83,208	13,501	9.40	83,377	64,346	73,861	13,457	7.23
Thaliacae 海樽類	49,281	72,367	25,774	49,141	23,297	6.34	60,481	41,584	29,922	43,996	15,421	4.97	55,761	62,695	59,228	4,904	5.79
Polychaeta 多毛類	3,850	6,528	3,834	4,737	1,550	0.61	2,495	2,787	3,278	2,853	396	0.32	3,919	8,215	6,067	3,038	0.59
Barnacle nauplius 藤壺幼生	655	1,905	582	1,047	744	0.14	0	2,112	1,670	1,260	1,114	0.14	4,007	699	2,353	2,339	0.23
Echinodermata larvae 棘皮動物幼生	9,368	17,889	4,425	10,560	6,811	1.36	7,685	11,313	10,356	9,785	1,880	1.11	12,135	23,283	17,709	7,883	1.73
Fish egg 魚卵	0	0	1,472	491	850	0.06	0	318	4,948	1,755	2,769	0.20	3,637	3,204	3,420	306	0.33
Fish larvae 仔稚魚	327	1,341	591	753	526	0.10	2,221	3,049	2,325	2,531	451	0.29	616	4,228	2,422	2,554	0.24
Other 其他	1,627	635	291	851	694	0.11	724	580	0	434	383	0.05	299	3,565	1,932	2,309	0.19
TOTAL	784,829	1,016,602	523,742	775,058	246,575	100.0	1,139,354	895,571	619,664	884,863	260,010	100.0	965,050	1,079,203	1,022,127	80,718	100.0
Biomass 生物量：																	
Wet wt. 濕重 (g/1000 m^3)	65.6	116.9	87.6	90.0	25.8		188.1	118.2	72.3	126.2	58.3		108.1	121.7	114.9	9.6	
Dry wt. 乾重 (g/1000 m^3)	1.0	4.2	1.2	2.1	1.8		5.4	2.8	2.0	3.4	1.8		3.6	5.7	4.7	1.4	
Displa. V. 排水容積量 (ml/1000 m^3)	481.3	546.9	590.5	539.6	55.0		536.4	448.5	496.8	493.9	44.0		457.9	530.0	494.0	51.0	
Settling V. 生物沉澱量 (ml/1000 m^3)	710.5	1354.9	771.8	945.7	355.7		1512.0	1043.2	699.6	1084.9	407.8		1369.4	1129.8	1249.6	169.4	
Impurity 雜質 (%)	10.9	3.9	9.1	7.9	3.6		15.3	8.4	17.5	13.7	4.8		32.5	21.4	26.9	7.9	
Species No. 種類數	25	25	26	29			25	30	28	30			29	29	30		
Simpson's Dominance Index 優勢種指數	0.0519	0.1892	0.1004	0.1634			0.0626	0.2008	0.2126	0.2163			0.2337	0.2076	0.2185		
Shannon-Weiner Index 歧異度指數	1.3240	2.0528	1.5450	1.9050			1.2499	1.9370	1.9308	1.9094			1.8540	2.0100	1.9482		
Evenness 均勻度指數	0.4113	0.6378	0.4742	0.5657			0.3883	0.5695	0.5794	0.5614			0.5506	0.5969	0.5728		

表3-33 民國110-111年八次採樣第三核能發電廠附近海域對照與監測測站植物性浮游生物之平均密度比較(cells/l)

	環保署公告之沈澱法						原過濾濃縮法分析					
	對照測站		監測測站		所有測站		對照測站		監測測站		所有測站	
日期	Mean	SD	mean	SD	mean	SD	mean	SD	mean	SD	mean	SD
110年2月26日	77	25	40	20	49	30	82	10	132	43	123	47
110年5月14日	28	3	52	34	39	22	63	10	143	80	107	58
110年8月17日	67	12	90	26	83	21	117	12	147	28	130	22
110年11月5日	607	153	570	35	581	89	972	47	1,175	221	1,035	186
111年2月16日	22	4	19		21	3	66	8	80	26	67	19
111年5月5日	630	239	790	816	678	470	1,190	245	1,340	367	1,250	307
111年8月12日	677	532	847	40	685	331	1,137	511	1,738	889	1,403	648
111年11月17日	103	137	187	64	140	90	202	213	688	788	427	494

註：對照測站為18、20和21，監測測站為22、23和24

表3-34 民國110-111年八次採樣第三核能發電廠附近海域對照與監測測站動物性浮游生物之平均豐度比較(ind./m^3)

	水平採樣				垂直採樣				所有測站	
	對照測站		監測測站		對照測站		監測測站			
日期	mean	SD	mean	SD	mean	SD	mean	SD	mean	SD
110年2月26日	359	143	580	646	999	613	1,460	700	1,003	1,076
110年5月14日	400	33	506	37	536	347	1,054	14	692	371
110年8月17日	298	114	923	169	1,051	688	2,006	705	1,041	719
110年11月5日	216	75	225	137	423	211	739	522	403	316
111年2月16日	206	51	232	61	420	236	585	189	359	214
111年5月5日	345	67	402	106	751	220	1,117	587	640	388
111年8月12日	136	36	135	76	281	93	429	109	238	140
111年11月17日	460	100	494	46	775	247	885	260	688	253

註：對照測站為18、20和21，監測測站為22、23和24

表3-35 民國110-111年八次採樣第三核能發電廠附近海域對照與監測測站蝦蟹幼生、魚卵及仔魚之平均豐度比較(ind./m^3)

	水平採樣				垂直採樣				所有測站	
	對照測站		監測測站		對照測站		監測測站			
日期	mean	SD	mean	SD	mean	SD	mean	SD	mean	SD
A.蝦幼生										
110年2月26日	**9.6**	3.3	4.6	3.2	**33.8**	27.1	29.1	10.0	17.2	17.0
110年5月14日	0.8	0.1	**3.7**	1.9	3.8	2.8	**7.1**	2.3	3.6	2.7
110年8月17日	**13.0**	18.2	8.4	1.6	**60.9**	99.0	25.4	12.4	23.7	42.1
110年11月5日	3.4	2.3	**3.9**	2.2	7.9	9.2	**15.8**	10.5	8.4	7.7
111年2月16日	4.4	2.9	**5.0**	1.2	9.8	7.6	**14.2**	1.3	8.7	6.1
111年5月5日	**14.3**	1.6	13.2	1.7	26.8	14.1	**36.9**	16.0	20.6	12.8
111年8月12日	1.6	1.0	**2.8**	2.2	4.2	2.3	**7.4**	2.7	3.4	2.8
111年11月17日	1.9	0.9	**6.2**	0.3	4.6	3.6	**9.7**	4.1	6.0	3.5
B.蟹幼生										
110年2月26日	0.7	0.3	**0.8**	0.4	2.5	2.3	**3.2**	1.6	2.0	2.2
110年5月14日	**2.0**	2.8	1.6	1.0	0.8	1.1	**8.0**	3.8	3.0	3.3
110年8月17日	**13.0**	18.2	8.4	1.6	**60.9**	99.0	25.4	12.4	23.7	42.1
110年11月5日	0.9	0.6	**2.7**	3.0	3.7	4.6	**14.5**	14.1	4.4	7.6
111年2月16日	1.6	1.4	**2.9**	2.2	3.0	2.5	**10.4**	8.0	3.8	4.7
111年5月5日	**5.0**	2.6	3.7	2.2	**10.4**	7.8	9.0	5.7	6.2	4.9
111年8月12日	**4.8**	3.0	3.7	3.2	**12.9**	12.7	11.4	9.4	7.8	7.5
111年11月17日	**1.6**	0.9	1.2	0.6	**4.1**	2.2	2.1	0.3	3.0	2.0
C.魚卵										
110年2月26日	0.8	0.3	**1.9**	2.1	0.4	0.5	**5.7**	5.5	2.8	4.8
110年5月14日	3.2	2.7	**6.4**	2.7	2.0	0.4	**8.0**	5.4	5.9	5.9
110年8月17日	4.8	2.7	**102.5**	144.8	5.9	2.3	**65.0**	82.0	43.5	74.0
110年11月5日	1.8	0.5	**3.4**	4.3	2.4	0.7	**3.2**	2.3	2.2	2.1
111年2月16日	0.6	0.6	0.6	0.2	**0.4**	0.0	0.3	0.3	0.5	0.4
111年5月5日	**12.4**	13.8	3.4	2.0	**10.0**	7.6	3.0	1.0	7.5	7.1
111年8月12日	2.7	1.9	**11.0**	4.8	1.2	0.5	**30.5**	43.8	12.2	19.9
111年11月17日	0.4	0.2	**5.8**	4.8	0.5	0.8	**1.8**	2.8	2.7	3.5
D.仔魚										
110年2月26日	0.16	0.05	**0.53**	0.49	0.77	1.21	**1.18**	0.35	0.6	0.7
110年5月14日	0.18	0.06	**0.20**	0.09	0.69	0.85	**1.18**	0.21	0.5	0.5
110年8月17日	0.37	0.40	**0.64**	0.59	1.85	2.21	**5.21**	4.42	1.8	2.6
110年11月5日	0.10	0.07	**0.20**	0.15	0.51	0.50	**1.69**	0.96	0.6	0.8
111年2月16日	0.49	0.45	**0.62**	0.23	1.23	1.15	**2.95**	0.47	1.2	1.2
111年5月5日	**0.33**	0.28	0.20	0.10	1.24	0.74	**2.59**	1.49	1.0	1.1
111年8月12日	**0.19**	0.11	0.10	0.04	0.65	0.85	**0.83**	0.41	0.4	0.5
111年11月17日	0.40	0.23	**0.83**	0.62	0.75	0.53	**2.53**	0.45	1.2	1.2

註：對照測站為18、20和21，監測測站為22、23和24

表3-36 One-way ANOVA 統計分析動物性浮游生物(ZP)、植物性浮游生物(PP)、魚卵(F-egg)、仔魚(F-lar)、蟹幼生(C-lar) 及 蝦幼生(S-lar)在各季節之不同年間差異

	第1次(冬季)		第2次(春季)		第3次(夏季)		第4次(秋季)	
	F value	**Probability**	**F value**	**Probability**	**F value**	**Probability**	**F value**	**Probability**
Log(ZP)	5.50	< 0.0001***	11.74	< 0.0001***	8.95	< 0.0001***	5.49	< 0.0001***
Log(PP)	36.42	< 0.0001***	24.12	< 0.0001***	61.29	< 0.0001***	34.64	< 0.0001***
Log(F-egg)	4.88	< 0.0001***	4.28	< 0.0001***	3.07	< 0.0001***	2.43	0.0003***
Log(F-lar)	3.85	< 0.0001***	3.24	< 0.0001***	7.62	< 0.0001***	2.67	< 0.0001***
Log(C-lar)	5.31	< 0.0001***	5.98	< 0.0001***	4.96	< 0.0001***	2.65	< 0.0001***
Log(S-lar)	4.56	< 0.0001***	5.49	< 0.0001***	6.13	< 0.0001***	4.19	< 0.0001***

ns＝無顯著差異　*：p≦ 0.05　**：p≦ 0.01　***：p≦ 0.001

表3-37 Duncan's多變距統計分析動物性浮游生物(ZP)、植物性浮游生物(PP)、魚卵(F-egg)、仔魚 (F-lar)、蟹幼生(C-lar)及蝦幼生(S-lar)在第1次(冬季)與第2次(春季)之不同年份間的差異

項目 \ 年	年代 (民國)																										
第1次(冬季)					High																			Low			
Log(ZP)	100	99	86	107	108	97	92	**110**	96	88	101	102	89	94	87	104	103	105	109	95	106	93	**111**	98	91	90	
Log(PP)	88	103	97	107	108	86	92	94	87	99	106	90	105	102	95	104	98	**110**	89	100	101	**111**	93	109	96	91	
Log(F-egg)	86	87	97	108	102	103	100	98	99	109	90	106	95	88	96	93	94	107	101	**110**	105	91	89	92	104	**111**	
Log(F-lar)	108	107	92	103	106	99	101	**111**	98	109	87	94	102	93	97	**110**	105	104	95	86	96	90	91	100	88	89	
Log(C-lar)	102	86	107	109	108	101	**111**	97	96	87	100	**110**	99	104	106	95	94	103	92	98	88	90	91	105	93	89	
Log(S-lar)	100	102	103	107	92	97	101	87	109	**110**	99	108	88	96	98	106	89	**111**	93	94	86	90	105	95	91	104	
第2次(春季)																											
Log(ZP)	107	106	101	89	102	100	99	109	98	87	103	104	105	96	97	91	**110**	**111**	86	95	93	108	88	92	94	90	
Log(PP)	106	89	108	105	**111**	103	109	88	92	102	86	87	107	104	93	95	96	101	98	94	97	99	100	**110**	91	90	
Log(F-egg)	106	102	97	104	109	105	89	87	98	94	88	92	100	101	93	96	95	90	86	**111**	107	103	108	91	**110**	99	
Log(F-lar)	101	109	93	103	107	97	102	106	86	100	87	105	**111**	96	104	91	89	99	108	98	88	95	94	**110**	90	92	
Log(C-lar)	97	107	101	106	91	**111**	86	109	103	96	99	105	100	98	94	93	87	95	88	**110**	102	89	104	92	108	90	
Log(S-lar)	101	89	97	106	**111**	107	109	105	96	103	100	104	99	98	87	108	91	95	102	93	86	88	90	**110**	94	92	

——— 表示年間沒有顯著差異，豐度由高至低排列

表3-38 Duncan's多變距統計分析動物性浮游生物(ZP)、植物性浮游生物(PP)、魚卵(F-egg)、仔魚(F-lar)、蟹幼生(C-lar)及蝦幼生(S-lar)在第3次(夏季)與第4次(秋季)之不同年份間的差異

項目＼年	年代 (民國)																												
第3次(夏季)				High																							Low		
Log(ZP)	98	104	100	95	103	107	102	101	**110**	99	108	94	97	106	90	87	86	105	109	85	93	92	96	91	89	**111**	88		
Log(PP)	103	107	106	85	87	109	93	102	**111**	88	97	92	90	101	86	89	94	104	96	95	99	100	105	**110**	91	98	108		
Log(F-egg	99	94	105	98	106	92	103	90	95	102	**110**	86	100	104	96	88	85	107	89	108	97	91	**111**	87	93	101	109		
Log(F-lar)	103	98	86	100	99	102	107	94	104	**110**	109	105	106	89	97	101	88	92	91	**111**	96	87	108	85	93	90	95		
Log(C-lar)	85	106	91	**110**	99	98	107	109	102	103	100	**111**	97	89	92	101	96	87	90	108	94	104	86	95	105	93	88		
Log(S-lar)	98	97	103	104	102	99	107	101	106	85	109	90	100	108	**110**	94	87	86	91	96	105	89	92	95	**111**	93	88		
第4次(秋季)																													
Log(ZP)	102	101	99	106'	85	93	**111**	108	98	107	104	97	103	95	100	86	89	94	96	105	**110**	92	87	91	88	109	90		
Log(PP)	104	87	102	89	93	96	86	**110**	97	98	91	101	92	108	106'	95	105	85	103	**111**	94	88	99	107	109	90	100		
Log(F-egg	85	89	105	86	97	98	100	93	95	109	103	88	96	104	92	87	**110**	91	94	101	107	**111**	90	99	108	106'	102		
Log(F-lar)	97	**111**	99	101	85	107	108	89	100	86	95	105	106'	103	102	96	104	94	93	**110**	91	98	92	87	109	90	88		
Log(C-lar)	95	85	100	103	109	104	93	**111**	97	101	**110**	86	87	92	105	107	99	96	89	90	98	108	91	94	102	106'	88		
Log(S-lar)	102	101	97	99	96	93	85	94	98	108	92	107	103	105	95	106'	100	109	**110**	91	**111**	89	104	86	87	88	90		

—— 表示年間沒有顯著差異，豐度由高至低排列；106'：因為106年第4次氣候不佳延後至107年1月採樣

表3-39 民國85年7月至111年11月第三核能發電廠附近海域浮游生物於各季之總平均豐/密度

		採樣趟次 (n)	植物性浮游生物-沉澱法* (cells/l)	植物性浮游生物-濃縮法 (cells/l)	動物性浮游生物 (ind./m^3)	蝦幼生 (ind./m^3)	蟹幼生 (ind./m^3)	魚卵 (ind./m^3)	仔魚 (ind./m^3)
第1次 (冬)	Mean	26	181	362	870	16.6	2.5	8.8	1.2
	SD		*227*	*420*	*490*	*10.2*	*1.9*	*17.4*	*1.0*
第2次 (春)	Mean	26	597	1,037	**1,089**	**17.8**	7.6	17.6	**1.7**
	SD		*775*	*1,207*	*726*	*15.6*	*8.9*	*13.0*	*1.4*
第3次 (夏)	Mean	27	**5,800**	**5,197**	**914**	**16.9**	**11.0**	**22.4**	**1.5**
	SD		*19,550*	*15,147*	*542*	*13.0*	*10.8*	*12.0*	*1.3*
第4次 (秋)	Mean	27	388	1,214	622	11.8	2.9	6.4	0.6
	SD		*707*	*1,692*	*300*	*7.7*	*1.5*	*5.6*	*0.4*
每次	Mean	106	1,741	1,976	872	15.7	6.0	13.8	1.2
	SD		*9,842*	*7,848*	*553*	*12.0*	*7.8*	*14.1*	*1.1*

*：數據為民國96年1月至今，沉澱法第1~4次採樣趟次合計共64次

表3-40 民國85年7月至111年11月在第三核能發電廠停機大修和運轉下，植物性和動物性浮游生物、蝦蟹幼生和魚卵及仔魚於各次總平均豐/密度的比較

		第2次(4~6月)					**第4次(10~12月)**				
		停機		運轉		p<	停機		運轉		p<
	測站	Mean	SD	Mean	SD	0.05	Mean	SD	Mean	SD	0.05
		n=9		n=7			n=5		n=10		
植物性浮游生物	22入	233	203	1,111	1,345	ns	604	786	168	144	ns
-沉澱法	24出	276	365	725	851	ns	847	1,213	118	122	ns
(cells/l)	其他	608	976	624	707	ns	823	1,290	206	213	ns
		n=14		n=12			n=10		n=16		
植物性浮游生物	22入	1,227	1,163	1,100	1,107	ns	1,765	1,208	916	2,336	ns
-過濾濃縮法	24出	1,115	1,630	592	595	ns	**1,949**	**1,847**	**452**	**397**	*
(cells/l)	其他	1,189	1,566	868	844	ns	2,027	1,889	814	1,681	ns
動物性浮游生物	22入	512	661	295	168	ns	450	594	286	150	ns
(ind./m^3)	24出	529	406	526	627	ns	483	364	278	156	ns
	其他	434	184	387	236	ns	316	160	289	175	ns
蝦幼生	22入	5.32	12.13	1.98	1.50	ns	2.03	2.23	1.55	1.01	ns
(ind./m^3)	24出	2.72	5.46	2.17	2.76	ns	3.20	3.68	1.63	1.47	ns
	其他	2.89	3.51	2.24	1.74	ns	2.07	1.43	2.28	2.64	ns
蟹幼生	22入	3.06	3.97	1.63	1.86	ns	1.85	2.56	0.85	0.73	ns
(ind./m^3)	24出	**2.50**	**3.12**	**0.40**	**0.47**	*	1.09	1.18	0.85	0.65	ns
	其他	2.77	4.97	0.99	0.86	ns	0.65	0.43	0.82	0.71	ns
魚卵	22入	7.57	11.68	7.97	10.05	ns	9.84	24.67	3.73	5.82	ns
(ind./m^3)	24出	10.98	7.50	10.87	8.29	ns	17.02	26.24	9.52	11.53	ns
	其他	7.74	5.32	9.84	4.93	ns	2.21	1.48	3.91	4.23	ns
仔魚	22入	0.38	0.49	0.26	0.25	ns	0.53	1.02	0.19	0.21	ns
(ind./m^3)	24出	0.40	0.46	0.31	0.30	ns	0.28	0.23	0.35	0.67	ns
	其他	0.38	0.23	0.38	0.17	ns	0.19	0.11	0.18	0.17	ns

註：過去於每年第1次採樣時，僅一次遇上電廠停機，第3次採樣均在運轉期，無停機樣本。因此，第1和3次採樣的停機樣本數量不足進行差異統計分析




圖 3-1 第三核能發電廠附近海域各測站之位置圖




圖3-2　民國110年四次採樣第三核能發電廠附近海域各測站之植物性浮游生物組成圖(以沉澱法之數據分析)




圖3-3　民國111年四次採樣第三核能發電廠附近海域各測站之植物性浮游生物組成圖(以沉澱法之數據分析)




圖3-4　民國110年四次採樣第三核能發電廠附近海域各測站之植物性浮游生物組成圖(以濃縮法之數據分析)




圖3-5　民國111年四次採樣第三核能發電廠附近海域各測站之植物性浮游生物組成圖(以濃縮法之數據分析)




圖3-6　民國110年四次採樣第三核能發電廠動物性浮游生物豐度於入出水口及其擴散情形




圖3-7　民國111年四次第三核能發電廠動物性浮游生物豐度於入出水口及其擴散情形




圖3-8　民國110年四次採樣第三核能發電廠附近海域各測站中植物性浮游生物之群聚分析(以沉澱法之數據分析)




圖3-9　民國111年四次採樣第三核能發電廠附近海域各測站中植物性浮游生物之群聚分析(以沉澱法之數據分析)




圖3-10　民國110年四次採樣第三核能發電廠附近海域各測站中植物性浮游生物之群聚分析(以濃縮法之數據分析)




圖3-11　民國111年四次採樣第三核能發電廠附近海域各測站中植物性浮游生物之群聚分析(以濃縮法之數據分析)




圖3-12　民國110年四次採樣第三核能發電廠附近海域各測站中動物性浮游生物之群聚分析




圖3-13　民國111年四次採樣第三核能發電廠附近海域各測站中動物性浮游生物之群聚分析




圖3-14 民國110年2月26日第三核能發電廠附近海域各測站動物性浮游生物之出現百分率




圖3-15 民國110年5月14日第三核能發電廠附近海域各測站動物性浮游生物之出現百分率




圖3-16 民國110年8月17日第三核能發電廠附近海域各測站動物性浮游生物之出現百分率




圖3-17 民國110年11月5日第三核能發電廠附近海域各測站動物性浮游生物之出現百分率




圖3-18 民國111年2月16日第三核能發電廠附近海域各測站動物性浮游生物之出現百分率




圖3-19 民國111年5月5日第三核能發電廠附近海域各測站動物性浮游生物之出現百分率




圖3-20 民國111年8月12日第三核能發電廠附近海域各測站動物性浮游生物之出現百分率




圖3-21 民國111年11月17日第三核能發電廠附近海域各測站動物性浮游生物之出現百分率




圖3-22　民國110年2月26日第三核能發電廠附近海域蝦蟹幼生、魚卵及仔魚之豐度於入出水口及其擴散情形




圖3-23　民國110年5月14日第三核能發電廠附近海域蝦蟹幼生、魚卵及仔魚之豐度於入出水口及其擴散情形




圖3-24　民國110年8月17日第三核能發電廠附近海域蝦蟹幼生、魚卵及仔魚之豐度於入出水口及其擴散情形




圖3-25　民國110年11月5日第三核能發電廠附近海域蝦蟹幼生、魚卵及仔魚之豐度於入出水口及其擴散情形




圖3-26　民國111年2月16日第三核能發電廠附近海域蝦蟹幼生、魚卵及仔魚之豐度於入出水口及其擴散情形




圖3-27　民國111年5月5日第三核能發電廠附近海域蝦蟹幼生、魚卵及仔魚之豐度於入出水口及其擴散情形




圖3-28　民國111年8月12日第三核能發電廠附近海域蝦蟹幼生、魚卵及仔魚之豐度於入出水口及其擴散情形




圖3-29　民國111年11月17日第三核能發電廠附近海域蝦蟹幼生、魚卵及仔魚之豐度於入出水口及其擴散情形




圖3-30 民國85年7月至111年11月第三核能發電廠附近海域植物性浮游生物(濃縮法和沉澱法分析)之密度




圖3-31 民國85年7月至111年11月第三核能發電廠附近海域動物性浮游生物豐度




圖3-32 民國85年7月至111年11月第三核能發電廠附近海域蝦幼生之豐度




圖3-33　民國85年7月至111年11月第三核能發電廠附近海域蟹幼生之豐度




圖3-34　民國85年7月至111年11月第三核能發電廠附近海域魚卵之豐度




圖3-35 民國85年7月至111年11月第三核能發電廠附近海域仔魚之豐度




圖3-36　民國85年7月至111年11月在第三核能發電廠停機大修和運轉下，沉澱法、過濾濃縮法植物性浮游生物和動物性浮游生物群聚之非度量多維度分析(nMDS)




圖3-37　民國85年至111年在第三核能發電廠停機大修開始與出海採樣間隔日數和浮游生物總量變化趨勢圖

肆、底棲動物

一、計畫目的與緣起

本國有不少發電廠分布於西海岸及澎湖，其對環境生態之影響也有長期之監測存在，其中第三核能發電廠附近海域之生態研究起於 68 年迄今（111 年），已監測 43 年。第三核能發電廠於 73 年起開始運轉發電，由於核能發電廠運轉後需吸入大量的冷卻用海水，使該區域之非生物環境發生變化，這些非生物因子的改變，可能使原來生態系中的生物相及生物的生理及生化組成發生變化，本計畫即針對此進行探討；其中底棲動物部分之生態研究已進行了 43 年，回顧過去之研究大致上可分為二階段。其一於 68 年 7 月至 82 年 6 月（蘇等，1979-1987；洪等，1988-1993），研究調查分（1）固定橫截線生物被覆調查；（2）固定區域特種生物密度及成長調查；及（3）生物相之調查三部分。測站前後共有 A、B、C、D、香蕉灣及萬里桐等六個。但是，68 年 10 月後壁湖漁港擴建工程將廢土傾倒在 C 站，因此，C 站在往後之研究已停止使用，而自 72 年 7 月起另增香蕉灣及萬里桐二測站做對照之用，各測站之相關位置見圖 4-1。

所使用之調查方法，在固定橫截線生物被覆調查方面，是以計數採樣橫截線上各類生物覆蓋之比例，來探討石珊瑚、軟珊瑚、藻類及其它底棲動物之空間分布及時間上之消長情形。在固定區域特種生物密度及成長調查方面，選取標定紫叢海膽（*Echinostrephus molaris*）、長硨磲貝（*Tridaena maxima*）及大旋鰓蟲（*Spirobranchus giganteus*）定期測量體長，以追蹤成長狀況。生物相調查則以拍照或標本採集加以分類鑑定，以瞭解第三核能發電廠附近海域底棲動物之種類。

綜合第 1 階段歷年之研究結果如下：各種底棲動物覆蓋比例及總覆蓋率，並未受第三核能發電廠運轉溫水排放影響（圖 4-2）（Jan et al., 1994）。固定區域特種生物密度及成長調查方面，發現尖枝列孔珊瑚、板葉千孔珊瑚、大管蛇螺、長硨磲貝、紫叢海膽及梅氏長海膽較具有監測環境之潛力。在生物相調查方面，15 年來，共記錄底棲無脊椎動物 11 門 889 種生物。而長期在第三核能發電廠附近海域及出水口附近所進行的研究顯示，溫排水影響第三核能發電廠附近海域範圍只在出水口附近海域之小範圍內。因此，底棲動物方面之研究第 2 階段，在 82 年 7 月由本實驗室接手，繼續執行後就調整測站。

過去之研究主要以監測群聚變化為主，由於無法看出顯著差異，顯示溫排水影響可能在監測站涵蓋範圍之外或該監測方式不夠靈敏，以致無法看出差異。所以 82 年 7 月由本實驗室接手後，即縮小監測範圍，因為若溫排水的影響範圍不大，理論上太遠的監測站可能無法看出差異；此外並針對底棲動物幼生及補充群是否受溫排水之影響進行監測。底棲動物從受精卵發育成幼生後，會在水中行浮游性生活一段時間，再沈降至海底著苗變態發育成小個體，成為族群中的補充群。浮游期長短因生物而異，短則數小時長者可達數月之久，各類底棲動物之幼生見圖 4-3，若溫排水對補充群有影響，會反映在補充量上，因此，本計畫以浮游性幼生與補充群在各測站之變化為調查監測方向。雖然前研究顯示尖枝列孔珊瑚、板葉千孔珊瑚、大管蛇螺、長硨磲貝、紫叢海膽及梅氏長海膽較具有監測環境之潛力，但在入水口及出水口附近無法同時找到適當之族群量，因此並未採用這些種類進行監測。

第 2 階段 82 年 7 月至今之研究結果概述如下，主要研究範圍在入水口及出水口南堤外側小灣（圖 4-4）。死亡率在入水口移至排水道之漁舟蚤螺較高，顯示生活在排水道之漁舟蚤螺族群有適應較高水溫之現象（陳等，1994-1996）。以生物成長率而言，則是軸孔珊瑚及江珧貝在入水口處之成長高於出水口南堤外側小灣。在幼生分布及補充群研究方面，發現甲殼類幼生在 9、10 月及 2-5 月出現較多，軟體動物則在 3-5 月出現較多，而藤壺、海葵及一些軟體動物（如蚤螺、寶螺、海兔及黑蝶貝等）對溫排水有較高之忍受能力。海綿、海葵、珊瑚、水螅、苔蘚蟲、多毛類、軟體動物、藤壺及海鞘等九大類底棲動物及卵塊均可在各測站之附著板著生，多毛類與苔蘚蟲著生量在測站間有顯著差異存在，呈現之趨勢為入水口區域高於非入水口區域，而底棲動物補充量與該區多數浮游動物種類之幼生數量無一致的關係。固定橫截線底棲生物覆蓋率監測結果顯示入水口區域之底棲生物覆蓋率高於出水口區域各測站，入水口以藻類、石珊瑚及海葵為優勢生物，出水口為藻類、石珊瑚及軟珊瑚，說明入水口底棲生物相之結構與出水口不同，且入水口多為對溫度變化較敏感的枝狀珊瑚種類如軸孔珊瑚及鹿角珊瑚，出水口主要為團塊及平鋪狀珊瑚，有棘杯珊瑚、角星珊瑚、角菊珊瑚、腦紋珊瑚等。

二、文獻回顧

水生生物的生長常直接受溫度的影響，如 Florida red tilapia 在海水鹽度 18 ppt 和 36 ppt 時，隨著溫度升高生長率及食物消耗率（food consumption）都逐漸增加，在溫

度 32 °C 時達到最高（Watanabe et al., 1993）。此外，發育中的海洋動物胚胎也會受到溫度的影響而有不同程度的異常現象，稚魚在發育中若溫度較高，則脊椎骨數較少（Coutant, 1976）。橈腳類受精卵的孵化速率受親體抱卵及孵化時環境的水溫影響很大，當孵化溫度在 10-15 °C 的範圍內，溫度愈高，孵化的時間愈短（Landry, 1975）。另外，溫度對海洋生物的代謝及生化組成亦有直接的影響，有報告指出虹鱒魚鰭的不對稱波動（fluctuating asymmetry）和水溫有正相關（Clarke, 1993）；南加州浮游植物在天然海水培育時，當溫度升高 5 °C 則整個生長率和生物量會增加，但當溫度再增高時生物量便開始下降。但對美國麻薩諸塞州附近海域的藤壺 *Semibalanus balanoides* 幼生而言，突然由 4 °C 增高 3 °C 時，其幼生變態著苗的數量同時增加（Pineda et al., 2002），所以水溫的變化亦可能是誘發幼生變態的環境因子之一。

Nevo *et al.*（1977）在研究 Haifa 發電廠出、入水口的藤壺時指出：溫度對藤壺同功腖多型性（allozyme polymorphisms）的等位基因頻率有天擇的作用；除了上述的影響之外，有些同功腖的等位基因出現頻率與溫度梯度有關；Buckley（1982）指出：在 2 °C 受精的 winter flounder 魚卵，分別置於 2、5、7 及 10 °C 培育，結果發現培育於 10 °C 下的幼魚有較低的 RNA-DNA ratio，且四個溫度之 RNA-DNA ratio 和生長有正相關。

高溫廢水主要由發電廠或其他工廠冷卻機件後排放產生，他們對於自然環境造成的衝擊雖較其他污染源低，如油污、重金屬、放射性物質等，但是熱廢水對生態環境的影響仍然是不容忽視的（陳和鐘，1989）。對水生環境而言，熱廢水最直接的影響就是提高水溫，間接的降低水中的溶氧、黏度、增加重金屬及其他離子的溶解度，進而生活於其中的生物自然也受到影響，而不會移動或移動緩慢的底棲動物是發電廠排放熱廢水受害最大的一群。以美國 Florida 電廠為例，該廠於 1968 年開始商業運轉，由發電機組所排出之熱廢水溫度升高 6.7 °C 排入 Biscayen 灣中，在次年 6 月，出水口 350-550 公尺範圍內的珊瑚全部死亡，其底棲動物相亦發生改變，在距離出水口 900 公尺範圍內發現大量死亡的槍蝦、藍蟹、石蟹、蜘蛛蟹、二枚貝，在距離出水口附近 1400 公尺範圍內的海底則發現一些死亡的動植物（Laws, 1981）。當熱廢水溫度達 38 °C 以上時，即使抵抗力最強的甲殼類和魚類在 3 小時內都會死亡。此外，熱廢水亦會改變生物相組成，如在印地安河邊的 Delmarva 電廠，其熱廢水使河口底棲動物的種類數降低，但污染指標生物的數量卻增加（Logan and Maurer, 1975）。另外，Jokiel

and Coles（1974）在研究夏威夷 Kahe 發電廠外的珊瑚時發現，當電廠附近環境水溫升高 4 到 5 °C 時，珊瑚就會死亡，若水溫升高 2 至 4 °C 時則有珊瑚白化及死亡率增加的現象。

核三廠位於墾丁國家公園之南灣，其海域屬於珊瑚礁生態系，有許多遊客至此進行水上遊憩及浮潛活動，Liu et al.（2012）調查 2001-2008 年之每月遊客量最高可達 8000 人次，而於核三廠排水口南側小灣進行水上活動（浮潛）的人數平均可達 3500 人次，並發現南灣污水排放增加海域的營養鹽及懸浮物，導致藻類繁生與珊瑚競爭空間、珊瑚被沉積物覆蓋致死和遊憩人數越高珊瑚覆蓋率越低等現象。Liu et al.（2015）的生態缸實驗發現當營養鹽及懸浮物增加時，會有海葵攻擊珊瑚，珊瑚死亡率增加的情形，這可能是營養鹽及懸浮物促進海葵過度生長，與珊瑚競爭空間導致。除此之外，近年來全球氣候變遷，海水暖化嚴重影響世界各地珊瑚礁生態系，南灣之珊瑚於 1998、2007、2016 及 2017 年大量白化，在臺灣及其它地區也有類似的報導(王，2022)，顯示台灣海域珊瑚礁受到氣候變遷的衝擊，已呈現衰退和破壞的徵兆（Dai et al., 2002; Kimura et al., 2004; Eakin et al., 2016），多處且大範圍的白化現象和區域性小範圍溫排水的影響有所不同，這種愈來愈頻繁發生的白化現象已是全球珊瑚礁區都有的艱難挑戰。

三、研究方法與進度說明

本計畫以第三核能發電廠附近海域（入水口、出水口南堤外側小灣（以下簡稱為出水口南側）及石牛溪等海域）之（1）軸孔珊瑚成長變化；（2）底棲動物著生量及消長情形和溫排水是否相關；（3）固定橫截線底棲生物覆蓋率變化；（4）入、出水口微環境沉積物沉積量變化；（5）入水口及出水口附近測站水溫變化，是否受溫排水影響為調查方向。每季調查一次，每年共 4 次調查，冬季為 11 月至翌年 1 月，春季為 2 月至 4 月，夏季為 5 月至 7 月，秋季為 8 月至 10 月，原則上採樣時間為各季的第一個月內，作為前一季的調查，例如春季的第 1 個月是 2 月，為冬季之調查，亦為每年第 1 次的調查時間；依序為 5 月、8 月及 11 月，分別是春、夏及秋季之調查時間。

1. 軸孔珊瑚之成長變化：目的在比較入水口及出水口附近珊瑚成長之差異。實驗地點在出水口附近及入水口，選擇軸孔珊瑚（*Acropora* sp.）為實驗物種，從同一株軸孔珊瑚截取小段樣品（大約 10 公分）固定在鋼架上，每季測量主軸枝的長度，以計算其成長情形。

2. 底棲動物補充量之比較：目的在了解底棲動物補充量在不同地點和季節間是否有差異及其消長。在入水口灣內北側（Influ-2）、入水口北堤外側（Influ-3）、入水口南堤外側（Influ-10）、入水口卸貨碼頭堤防外側（Influ-11）、入水口灣內南側（Influ-5）、出水口南側水深 8 公尺處（Efflu）、出水口南側水深 9 公尺處（Efflu-2）、出水口南側水深 3 公尺處（Efflu-3）、貓鼻頭（MPT）及石牛溪（SNS）附近選定測站（圖 4-4），測站除 Efflu-3 水深 3 公尺，其餘測站水深皆大於 6 公尺。於水深 3-10 公尺處，放置附著板（附著板面積 20×20 cm^2），收集固著性底棲動物，每季各收放一組附著板（每組三重覆），以每平方公分為單位計算各類固著性底棲動物出現的情形；每一至二個月潛水觀察有無流失或被人為破壞；每季收回鑑定及計數各類底棲動物，比較底棲動物在不同測站和季節間補充量是否有差異。消長部分則是在上述之測站放置一組附著板，一年後收回鑑定及計數各類底棲無脊椎動物，比較底棲動物在不同測站之消長情形。

3. 固定橫截線底棲生物覆蓋率變化：依據環保署公告之硬底質海域表棲生物採樣通則（NIEA E104.20C），採用固定橫截線調查法，於入水口灣內及出水口南側各設置 3 條 25 公尺長的固定橫截線，調查硬底質海域如珊瑚礁等之底棲生物，其橫截線以最近的測站為代號，故於入水口灣內有 3 條橫截線，分別為入水口灣內北側（Inf 2.1）水深 5 公尺處、最北側（Inf 2.2）水深 3 至 5 公尺處及入水口灣內南側水深 3 至 5 公尺處（Inf 5）各有 1 條橫截線；在出水口南側的 3 條橫截線則於水深 3 至 5 公尺處（Eff）、水深 9 公尺處（Eff 2）及近貓鼻頭水深 9 公尺處（MPT）等測站各設置 1 條橫截線；每隔 0.1 公尺計數該處之底質種類及底棲生物種類，並分析其群聚結構。

4. 入、出水口微環境沉積物沉積量變化：目的在了解底棲動物補充量多寡是否與出入水口微環境之差異有相關。測站在入水口灣內北側（Influ-2）、入水口灣內南側（Influ-5）、出水口南側水深 8 公尺處（Efflu）、出水口南側水深 9 公尺處（Efflu-2）及貓鼻頭（MPT）附近（圖 4-4），將沉積物收集器（6mm 厚的 PVC 圓筒內徑 10cm、高 30cm）置於各測站收集沉積物，每季各收放一重覆，計算各測站之每日沉積量，比較沉積量在不同測站和季節間是否有差異。

5. 入水口及出水口附近測站水溫監測：目的在了解出水口附近測站水溫變化是否受溫排水影響，而與其他測站有差異，故於採樣地點入水口灣內南側（Influ-5）、

出水口南側水深 8 公尺處（Efflu）、出水口南側水深 9 公尺處（Efflu-2）、出水口南側水深 3 公尺處(Efflu-3)與貓鼻頭(MPT)放置長期水溫紀錄器(HOBO, Water Temp Pro v2; Tinytag, TG-4100），每 15 分鐘紀錄一次，比較其水溫變化。

四、目前研究成果

1.軸孔珊瑚之成長變化：

入、出水口監測之軸孔珊瑚於 109 年第 4 次調查（11 月 08 日）時重新放置，入水口的珊瑚平均放置長度為 110.9±23.4 mm（n=20），而出水口南側珊瑚平均放置長度為 75.2±14.9 mm（n=20）（表 4-1）（圖 4-5）。

110 年第 1 次調查(2 月 23 日)，入水口之珊瑚平均長度為 122.3±27.8 mm(n=20)，每日平均成長量為 0.11 mm；而出水口之 20 株珊瑚，9 株存活，平均長度為 84.8±15.7 mm，每日平均成長量為 0.08 mm，入水口與出水口之珊瑚成長差異不顯著（T-test; p>0.05）。

110 年第 2 次調查(5 月 07 日)，入水口 20 株軸孔珊瑚存活，平均長度為 136.3±33.0 mm，每日平均成長量為 0.19 mm；而出水口之軸孔珊瑚有 8 株存活，平均長度為 87.8±20.3 mm，每日平均成長量為 0.10 mm，入水口與出水口之珊瑚成長差異不顯著（T-test; p>0.05）。

110 年第 3 次調查(8 月 17 日)，入水口之珊瑚有 20 株存活，平均長度為 159.9±41.5 mm，每日平均成長量為 0.17 mm；而出水口之珊瑚 8 株存活，平均長度為 93.3±20.5 mm，每日平均成長量為 0.13 mm，入水口與出水口之珊瑚成長差異不顯著（T-test; p>0.05）。

110 年第 4 次調查（11 月 05 日），入水口 19 株軸孔珊瑚存活，平均長度為 185.6±65.3 mm，每日平均成長量為 0.32 mm；而出水口之軸孔珊瑚皆無存活，故重置珊瑚 20 株，出水口因軸孔珊瑚數量變少，難找到健康且枝條長度夠 10 公分長的珊瑚株，因此，平均長度較以往為短，平均長度為 51.9±19.4 mm。

110 年第 1 次至 110 年第 4 次的調查期間，入水口平均每季別死亡 0.3 株；出水口平均每季別死亡 5.0 株，出水口之死亡率較入水口高。

111 年第 1 次調查(2 月 11 日),入水口之珊瑚平均長度為 167.9±65.7 mm(n=19),每日平均成長量為-0.18 mm;而出水口之 20 株珊瑚,11 株存活,平均長度為 47.2±15.1 mm,每日平均成長量為-0.08 mm,入水口與出水口之珊瑚成長差異不顯著(T-test; p>0.05)。此次重新放置出水口珊瑚 20 株,平均長度為 93.5±25.0 mm。

111 年第 2 次調查(5 月 05 日),入水口 18 株軸孔珊瑚存活,平均長度為 210.6±86.7 mm,每日平均成長量為 0.48 mm;而出水口之軸孔珊瑚 20 株有 10 株存活,平均長度為 114.8±35.8 mm,每日平均成長量為 0.10 mm,入水口與出水口之珊瑚成長差異不顯著(T-test; p>0.05)。

111 年第 3 次調查(8 月 05 日),入水口之珊瑚之 18 株珊瑚,平均長度為 178.0±88.5 mm,每日平均成長量為-0.36 mm;而出水口之珊瑚有 9 株存活,平均長度為 118.0±39.8 mm,每日平均成長量為-0.04 mm,入水口與出水口之珊瑚成長差異不顯著(T-test; p>0.05)。由於入水口之珊瑚分枝緊密相連不易測量,故重新放置 20 株珊瑚,平均長度為 81.8±11.0 mm

111 年第 4 次調查(11 月 05 日),入水口 20 株軸孔珊瑚存活,平均長度為 89.8±22.2 mm,每日平均成長量為 0.08 mm;而出水口之軸孔珊瑚皆無存活,故重置珊瑚 20 株,平均長度為 87.3±19.4 mm。

111 年第 1 次至 111 年第 4 次的調查期間,入水口平均每季別死亡 0.3 株;出水口平均每季別死亡 6.1 株,出水口之死亡率較入水口高(T-test, p<0.05)。

將入水口的珊瑚平均日成長率與中央氣象局颱風資料庫(http://rdc28.cwb.gov.tw/)之各季累計警報天數及颱風期間總雨量做迴歸分析,結果為負相關,其簡單迴歸關係為珊瑚平均日成長率(y)= 0.23 – 0.02* 累計警報天數(x)(N=55, R^2=0.10, p = 0.02)及珊瑚平均日成長率(y) = 0.21 – 3.64*10^{-4}* 颱風期間雨量(x)(N=55, R^2=0.08, p=0.03),表示颱風之累計警報天數越多,還有颱風期間雨量越多,則珊瑚平均日成長率越低(圖 4-6),而珊瑚平均日成長率與沉積物沉積量無明顯迴歸關係(p>0.05),其與各季累積雨量亦無迴歸關係(p>0.05);但各季累積雨量與沉積物沉積量之間有迴歸相關性(R^2=0.14-0.33, p<0.01;圖 4-36),換言之,各季累積雨量高時,沉積量隨之增加,且單以颱風期間的雨量與珊瑚成長做相關分析,則顯示兩者有迴歸相關,說明第 3 及 4 次較多颱風形成,而颱風對珊瑚成長有負向的影響;而出水口的珊瑚成長量雖與颱風之數量、雨量無相關,但與沉積量有迴歸

相關性（珊瑚平均日成長率（y）=0.17 – 0.14*出水口平均日沉積量（x）；N=44, R^2=0.11, p=0.03），表示沉積量越多，出水口之珊瑚成長越慢。

2.底棲動物補充量之比較：

整體而言，110 年第 1 次至 111 年第 4 次共 8 季調查，入水口區域之測站的底棲動物季平均總著生量為 0.65 -1.60/cm^2，常顯著多於出水口總著生量（0.23-0.86/cm^2）（T-test; p<0.05），僅 110 及 111 年第 2 次調查（春）出水口區域總著生量未顯著少於入水口（T-test; p>0.05）。8 次調查中，苔蘚蟲之著生量皆是入水口顯著高於出水口（T-test; p<0.05），藤壺、軟體動物及多毛蟲大多是入水口高於出水口（T-test; p<0.05），但都在 110 年第 2 次（春）於入、出水口無顯著差異（T-test; p>0.05），在 111 年軟體動物是第 1 及 2 次入、出水口無顯著差異（T-test; p>0.05），而多毛蟲是第 2 及 3 次無顯著差異（T-test; p>0.05）；海鞘僅在 111 年第 2 次（春）入水口高於出水口（T-test; p<0.05），大多數季別入水口及出水口無顯著差異（T-test; p>0.05）；珊瑚著生量入水口及出水口無顯著差異（T-test; p>0.05）（圖 4-7 至圖 4-12）。

各類底棲動物之著生量，大多有季節性的差異（ANOVA; p<0.05），110-111 年藤壺在入、出水口都以第 3 次（夏）著生量顯著高於第 1、2 次（冬春）；海鞘、苔蘚蟲、多毛蟲及軟體動物雖有季節性差異，但入、出水口不一致，如苔蘚蟲在入水口無季節間差異，在出水口第 4 次（秋）著生量顯著高於第 1、2 次（冬春）；而軟體動物在入水口以第 3 次（夏）著生量顯著高於第 1、2 次（冬春），出水口區無顯著的季節性差異；多毛蟲在出水口以第 3 次（夏）著生量顯著高於第 1、2 次（冬春），但在入水口第 4 次（秋）著生量顯著高於第 2 次（春）；珊瑚在入、出水口都無顯著季節間的差異（圖 4-7 至圖 4-12）。

110 年各類底棲動物著生量以多毛蟲及苔蘚蟲最多，其次為海鞘、藤壺，而軟體動物及珊瑚的著生量最少。第 1 次調查（冬），苔蘚蟲最高著生量在入水口灣內北堤外側（Influ-3），分別為 0.56/cm^2，出水口區域之著生量為 0.00-0.04/cm^2；多毛蟲最高的著生量在入水口灣內南側（Influ-5），為 0.80/cm^2，出水口區域之著生量為 0.06-0.58/cm^2；海鞘最高著生量在入水口灣內北堤外側（Influ-3），為 0.10/cm^2，出水口之著生量為 0.00-0.06/cm^2；藤壺最高著生量於入水口北堤外側（Influ-3）為 0.07/cm^2；軟體動物最高著生量於入水口北堤外側（Influ-3）及入水口卸貨碼頭堤防外側（Influ-11）為 0.01/cm^2；珊瑚最高著生量於入水口灣內南側（Influ-5）為 0.003/cm^2（圖 4-7 至圖 4-12）。

第 2 次調查（春），各類底棲動物最高著生量都在入水口灣內南側（Influ-5），苔蘚蟲為 0.42/cm^2，出水口區域之著生量為 0.00-0.07/cm^2；多毛蟲在入水口最高的著生量為 0. 67/cm^2，出水口區域之著生量為 0.11-0.63cm^2；海鞘最高著生量在入水口灣內南側（Influ-5）為 0.06/cm^2，出水口之著生量為 0-0.04/cm^2；藤壺最高著生量於入水口灣內南側（Influ-5）為 0.01/cm^2，出水口之著生量為 0 /cm^2；軟體動物最高著生量為 0.003/cm^2；珊瑚最高著生量於入水口灣內南側（Influ-5）及出水口南側水深 9 公尺處（Efflu-2）為 0.002/cm^2（圖 4-7 至圖 4-12）。

第 3 次調查（夏），苔蘚蟲最高著生量在入水口卸貨碼頭堤防外側（Influ-11），為 0.59/cm^2，出水口區域之著生量為 0.00-0.04/cm^2；多毛蟲最高的著生量在入水口南堤外側（Influ-10），為 0. 73/cm^2，出水口區域之著生量為 0.06-0.42/cm^2；海鞘最高著生量在入水口卸貨碼頭堤防外側（Influ-11）及出水口南側水深 9 公尺處（Efflu-2），為 0.21 /cm^2，其餘之著生量為 0-0.12/cm^2；藤壺最高著生量於入水口北堤外側（Influ-3）為 0.95/cm^2，出水口之著生量為 0-0.14/cm^2；軟體動物最高著生量於入水口卸貨碼頭堤防外側（Influ-11）為 0.02/cm^2；珊瑚最高著生量於入水口灣內南側（Influ-5）為 0.03/cm^2（圖 4-7 至圖 4-12）。

第 4 次調查（秋），苔蘚蟲最高著生量在入水口卸貨碼頭堤防外側（Influ-11），為 0.56/cm^2，出水口區域之著生量為 0.00-0.04/cm^2；多毛蟲最高的著生量在入水口灣內南側（Influ-5）為 0. 98/cm^2，出水口區域之著生量為 0.07-0.41/cm^2；海鞘最高著生量在入水口卸貨碼頭堤防外側（Influ-11），為 0.14/cm^2，出水口之著生量為 0-0.04/cm^2；藤壺最高著生量於入水口灣內南側（Influ-5）為 0.29/cm^2，出水口之著生量為 0-0.01/cm^2；軟體動物最高著生量於入水口卸貨碼頭堤防外側（Influ-11）為 0.04/cm^2；珊瑚最高著生量於入水口北堤外側（Influ-3）及灣內南側（Influ-5）為 0.001/cm^2（圖 4-7 至圖 4-12）。

111 年各類底棲動物著生量以多毛蟲及苔蘚蟲最多，其次為海鞘、藤壺，而軟體動物及珊瑚的著生量最少。第 1 次調查（冬），苔蘚蟲最高著生量在入水口灣內北堤外側（Influ-3），為 0.54/cm^2，出水口區域之著生量為 0.01-0.02/cm^2；多毛蟲最高的著生量在入水口灣內北側（Influ-2），為 0.74/cm^2，出水口區域之著生量為 0.13-0.24/cm^2；海鞘最高著生量在入水口卸貨碼頭堤防外側（Influ-11），為 0.23/cm^2，出水口之著生量為 0.00-0.07/cm^2；藤壺最高著生量於入水口北堤外側（Influ-3）為 0.19/cm^2；軟體動物最高著生量於入水口灣內北側（Influ-2）為 0.01/cm^2；珊瑚最高著生量於入水口灣內南側（Influ-5）為 0.01/cm^2（圖 4-7 至圖 4-12）。

第 2 次調查（春），各類底棲動物最高著生量都在入水口區域，苔蘚蟲為 0.66/cm^2（Influ-3），出水口區域之著生量為 0.00-0.03/cm^2；多毛蟲在入水口最高的著生量為 0. 73/cm^2（Influ-5），出水口區域之著生量為 0.08-0.61/cm^2；海鞘最高著生量在入水口灣內北堤外側（Influ-3）為 0.10/cm^2，出水口之著生量為 0.01-0.03/cm^2；藤壺最高著生量於入水口灣內南側（Influ-5）為 0.19/cm^2，出水口之著生量為 0-0.001 /cm^2；軟體動物最高著生量為 0.004/cm^2（Influ-5）；珊瑚最高著生量於入水口灣內南側（Influ-5）為 0.01/cm^2（圖 4-7 至圖 4-12）。

第 3 次調查（夏），苔蘚蟲最高著生量在入水口灣內北側（Influ-2），為 0.61/cm^2，出水口區域之著生量為 0.00-0.23/cm^2；多毛蟲最高的著生量在入水口灣內北側（Influ-2），為 0.95/cm^2，出水口區域之著生量為 0.45-0.69/cm^2；海鞘最高著生量在貓鼻頭（MPT），為 0.37 /cm^2，其餘之著生量為 0.02-0.32/cm^2；藤壺最高著生量於入水口北堤外側（Influ-3）為 0.74/cm^2，出水口之著生量為 0-0.001/cm^2；軟體動物最高著生量於入水口卸貨碼頭堤防外側（Influ-11）為 0.09/cm^2；珊瑚在各測站皆無觀察到，著生量為 0.00/cm^2（圖 4-7 至圖 4-12）。

第 4 次調查（秋），苔蘚蟲最高著生量在入水口卸貨碼頭堤防外側（Influ-11），為 0.75/cm^2，出水口區域之著生量為 0.02-0.24/cm^2；多毛蟲最高的著生量在入水口灣內南側（Influ-5）為 0. 91/cm^2，出水口區域之著生量為 0.20-0.56/cm^2；海鞘最高著生量在入水口北堤外側（Influ-3），為 0.31/cm^2，出水口之著生量為 0-0.20/cm^2；藤壺最高著生量於入水口北堤外側（Influ-3）為 0.55/cm^2，出水口之著生量為 0-0.003/cm^2；軟體動物最高著生量於入水口卸貨碼頭堤防外側（Influ-11）為 0.02/cm^2；珊瑚在各測站皆無觀察到，著生量為 0.00/cm^2（圖 4-7 至圖 4-12）。

由圖 4-7 可知，各測站珊瑚歷年平均以入水口之灣內南側（Influ-5）最多，覆蓋率為 0.01/cm^2，第 1 次（冬）以 91 年著生覆蓋率可達 0.09/cm^2，第 2 次（春）以 104 年的覆蓋率可達 0.10/cm^2，第 3 次（夏）以 101 年覆蓋率達 0.23/cm^2，第 4 次（秋）則以 93 年最多，覆蓋率可達 0.06/cm^2。出水口南側區域歷年各季以出水口南側水深 9 公尺處（Efflu-2）的覆蓋率最高，在 105 年第 4 次（秋）為 0.08/cm^2、109 年第 2 次（春）為 0.06/cm^2 及 96 年第 2 次（春）為 0.03/cm^2，其次貓鼻頭（MPT）在 97 年第 1 次（春）為 0.03/cm^2，其餘各季次皆少於 0.03/cm^2。灣內北側（Influ-2）、南堤外側（Influ-10）及卸貨碼頭堤防外側（Influ-11）最少，平均覆蓋率都為 0.001/cm^2；出水口之南側水深 9 公尺處（Efflu-2）及貓鼻頭（MPT）最多，覆蓋率為 0.005/cm^2，南側水深 8 公尺處（Efflu）最少，其平均覆蓋率為 0.0004/cm^2，與對照測站石牛溪（SNS）覆蓋率 0.003/cm^2 相近。季節間比較以第 3 次（夏）較多，平均覆蓋率為 0.004/cm^2；而第 1 次（冬）最少，平均覆蓋率為 0.002/cm^2。

在軟體動物幼生方面，歷年第 1 次（冬）著生以 99 年入水口灣內北側（Influ-2）最多，覆蓋率可達 0.10/cm^2，第 2 次（春）以 96 年入水口灣內北側（Influ-2）最多，覆蓋率可達 0.06/cm^2，第 3 次（夏）以 88 年入水口北堤外側（Influ-3）最多，覆蓋率可達 0.15/cm^2，第 4 次（秋）以 98 年入水口灣內北側（Influ-2）最多，覆蓋率可達 0.22/cm^2（圖 4-8）。出水口南側區域以 94 年第 4 次（秋）出水口南側水深 9 公尺處（Efflu-2）的覆蓋率最高將近 0.05/cm^2，其餘各季出水口測站覆蓋率皆低於 0.03/cm^2。各測站歷年平均入水口以北堤外側（Influ-3）最多，覆蓋率為 0.02/cm^2，南堤外側（Influ-10）最少，覆蓋率為 0.002/cm^2；出水口南側以水深 9 公尺處（Efflu-2）的覆蓋率最多，為 0.002/cm^2，水深 3 公尺處（Efflu-3）最少，覆蓋率為 0.0003/cm^2；對照測站石牛溪（SNS）為 0.001/cm^2。季節間比較以第 3 次（夏）較多，平均覆蓋率為 0.01/cm^2；而第 1 次（冬）及第 2 次（春）最少，平均覆蓋率為 0.003/cm^2。

多毛類的著生歷年第 1 次（冬）以 93 年入水口灣內南側（Influ-5）最多，覆蓋率可達 0.94/cm^2，第 2 次（春）以 90 年入水口灣內南側（Influ-5）最多，覆蓋率可達 0.97/cm^2，第 3 次（夏）以 95 年入水口北堤外側（Influ-3）最多，覆蓋率可達 0.99/cm^2，第 4 次（秋）以 87 年入水口灣內南側（Influ-5）最多，覆蓋率可達 1.00/cm^2（圖 4-9）。出水口南側區域從 91 年至今，南側水深 8 公尺處（Efflu）、南側水深 9 公尺處（Efflu-2）及南側水深 3 公尺處（Efflu-3）三個測站的覆蓋率偶有高於 0.50/cm^2，而貓鼻頭（MPT）之覆蓋率僅 111 年第 3 次（秋）為 0.63/cm^2，其餘季次皆低於 0.50/cm^2。各測站歷年平均入水口以灣內南側（Influ-5）最多，覆蓋率為 0.71/cm^2，南堤外側（Influ-10）最少，覆蓋率為 0.35/cm^2；出水口南側以水深 3 公尺處（Efflu-3）的覆蓋率最多，為 0.37/cm^2，以貓鼻頭（MPT）最少，覆蓋率為 0.13/cm^2；水深 8 公尺處（Efflu）、水深 9 公尺處（Efflu-2）測站的平均覆蓋率分別為 0.23、0.22/cm^2，與對照測站石牛溪（SNS）相近（0.23/cm^2）。季節間比較以第 3 次（夏）較多，平均覆蓋率為 0.42/cm^2，而其次為春、秋季，第 1 次（冬）最少，平均覆蓋率為 0.30/cm^2。

苔蘚蟲方面，入水口區域歷年第 1 次（冬）以 102 年入水口灣內北側（Influ-2）的覆蓋率最高，為 0.92/cm^2。第 2 次（春）以 98 年入水口北堤外側（Influ-3）的覆蓋率最高，為 0.90/cm^2，第 3 次（夏）以 98 年入水口北堤外側（Influ-3）的覆蓋率最高，為 0.98/cm^2，第 4 次（秋）則以 94 年入水口灣內北側（Influ-2）最高，為 0.97/cm^2（圖 4-10）。出水口區域以南側水深 9 公尺處（Efflu-2）92 年第 1 次的覆蓋率最高將近 100%，及 104 年第 3 次的覆蓋率為 0.59/cm^2，其餘出水口測站各季覆蓋率皆低於 0.50/cm^2。各測站歷年平均入水口以灣內北側（Influ-2）、北堤外側（Influ-3）及

灣內南側（Influ-5）最多，覆蓋率為 0.40-0.45/cm^2，南堤外側（Influ-10）最少，覆蓋率為 0.20/cm^2；出水口南側以水深 9 公尺處（Efflu-2）的覆蓋率最多，為 0.10/cm^2，以水深 3 公尺處（Efflu-3）最少，覆蓋率為 0.01/cm^2；對照測站石牛溪（SNS）的平均覆蓋率介於入、出水口之間，為 0.17/cm^2。季節間比較以第 1 次（冬）較多，平均覆蓋率為 0.25/cm^2，而其次為春、夏季，第 4 次（秋）最少，平均覆蓋率為 0.20/cm^2。

在海鞘著生方面，歷年覆蓋率介於 0-0.64/cm^2 之間，第 1 次（冬）著生以 102 年入水口灣內南側（Influ-5）最多，覆蓋率可達 0.64/cm^2，第 2 次（春）以 102 年入水口北堤外側（Influ-3）最多，覆蓋率可達 0.61/cm^2，第 3 次（夏）以 100 年入水口北堤外側（Influ-3）最多，覆蓋率可達 0.33/cm^2，第 4 次（秋）以 101 年入水口灣內南側（Influ-5）及 109 年入水口北堤外側（Influ-3）最多，覆蓋率可達 0.52/cm^2（圖 4-11）。出水口區域僅貓鼻頭（MPT）及南側水深 9 公尺處（Efflu-2）覆蓋率偶爾超過 0.20/cm^2 以上（0.20-0.39/cm^2），如貓鼻頭（MPT）在 90 年第 1 次、99 年第 3 次、101 年第 1 次、111 年第 3、4 次，以及南側水深 9 公尺處（Efflu-2）於 100 年第 1 次、101 年第 4 次、110 年第 3 次，其餘各季出水口測站覆蓋率皆低於 0.15/cm^2。各測站歷年平均入水口以北堤外側（Influ-3）最多，覆蓋率為 0.11/cm^2，南堤外側（Influ-10）最少，覆蓋率為 0.03/cm^2；出水口南側以貓鼻頭（MPT）的覆蓋率最多，為 0.04/cm^2，以水深 8 公尺處（Efflu）最少，覆蓋率小於 0.01/cm^2；對照測站石牛溪（SNS）的平均覆蓋率為 0.05/cm^2。季節間比較以第 3 次（夏）較多，平均覆蓋率為 0.06/cm^2，而第 2 次（春）最少，平均覆蓋率為低於 0.05/cm^2。

在藤壺著生方面，入水口歷年第 1 次（冬）以 104 年北堤外側（Influ-3）最多，覆蓋率可達 0.36/cm^2，第 2 次（春）以 105 年北堤外側（Influ-3）最多，覆蓋率可達 0.56/cm^2，第 3 次（夏）以 110 年入水口灣內南側（Influ-5）最多，覆蓋率可達 0.95/cm^2，第 4 次（秋）以 108 年入水口灣內南側（Influ-5）最多，覆蓋率可達 0.68/cm^2（圖 4-12）。出水口區域 110 年第 3 次出水口南側水深 9 公尺處（Efflu-2）覆蓋率為 0.14/cm^2，其餘各季出水口測站覆蓋率皆低於 0.11/cm^2。各測站歷年平均入水口以北堤外側（Influ-3）最多，覆蓋率為 0.15/cm^2，南堤外側（Influ-10）最少，覆蓋率為 0.02/cm^2；出水口南側以水深 9 公尺處（Efflu-2）的覆蓋率最多，為 0.01/cm^2，以水深 3 公尺處（Efflu-3）最少，覆蓋率為 0.0002/cm^2；對照測站石牛溪（SNS）的平均覆蓋率為 0.04/cm^2。季節間比較以第 3 次（夏）較多，平均覆蓋率為 0.10/cm^2，而第 1 次（冬）最少，平均覆蓋率為 0.02/cm^2。

總而言之，底棲動物在出水口及入水口以多毛蟲及苔蘚蟲最多，覆蓋率高時可在 0.5/cm^2 以上，偶而覆蓋率甚至可達 100% (1.0/cm^2)，但各類底棲動物皆以入水口的著生量高於出水口，且多以夏季著生量較高，僅苔蘚蟲在冬季為多。

颱風可能會影響底棲動物著生量之多寡，故將各季節分成受颱風影響的颱風季（夏、秋季）及不受影響的非颱風季（冬、春季）來比較兩季各底棲動物之著生量（表 4-2），出水口測站各底棲動物只有海鞘有顯著差異，入水口為藤壺、多毛蟲及軟體動物著生量於颱風季明顯較非颱風季高（T-test, $p<0.05$），平均著生量分別為 0.21±0.01 vs. 0.06±0.01、0.69±0.03 vs. 0.56±0.03 及 0.02±0.002 vs. 0.01±0.002/cm^2，海鞘、苔蘚蟲及珊瑚則無顯著差異（T-test, $p>0.05$）；而出水口之海鞘著生量於非颱風季明顯較颱風季多（T-test, $p<0.05$），平均著生量分別為 0.04±0.01 vs. 0.02±0.01/cm^2，其餘底棲動物則無顯著差異，整體而言，颱風對底棲動物著生可能是有影響的。

3.底棲動物消長比較

110 年 5 月回收 109 年放置整年的附著板（109 年 5 月~110 年 5 月），僅石牛溪（SNS）的附著板部分流失，其餘都有收回。入水口灣內南側（Influ-5）珊瑚覆蓋率最高，為 0.04/cm^2（圖 4-13）；軟體動物的覆蓋率在 0-0.09/cm^2 之間（圖 4-14），以入水口灣內北側（Influ-2）覆蓋率最高；多毛類與苔蘚蟲在年度消長方面仍為數量最多的動物，多毛類之覆蓋率在 0.04−0.55/cm^2 之間，最高覆蓋率在出水口南側小灣水深 3 公尺處（Efflu-3）（圖 4-15），平均覆蓋率為 0.22/cm^2；苔蘚蟲之覆蓋率在 0. 06−0.94/cm^2 之間，入水口卸貨碼頭堤防外側（Influ-11）的覆蓋率最高，平均覆蓋率為 0.40/cm^2（圖 4-16）；海鞘之覆蓋率在 0-0.33/cm^2 之間，最高著生量出現於入水口北堤外側（Influ-3）（圖 4-17）；藤壺的覆蓋率介於 0-0.30/cm^2 之間，最高著生量出現於入水口卸貨碼頭堤防外側（Influ-11）（圖 4-18）。

整年的附著板經過一年 4 個季節（109 年的第 3、4 次及 110 年第 1、2 次）的消長，其生物相之覆蓋率明顯與各單一季節不同（MANOVA, $p<0.05$），入水口區的珊瑚、軟體動物及苔蘚蟲較各季為多，平均覆蓋率分別為 0.010 vs. 0-0.007/cm^2、0.04 vs. 0.001-0.017/cm^2 及 0.61 vs. 0.23-0.38/cm^2（ANOVA, $p<0.05$）；出水口區的軟體動物及苔蘚蟲較各單季為多，平均覆蓋率分別為 0.002 vs. 0-0.001/cm^2 及 0.14 vs. 0.01-0.04/cm^2（ANOVA, $p<0.05$）。整體而言，雖然整年及各季的覆蓋率都以多毛蟲及苔蘚蟲為多，但是整年與各單季的覆蓋率有差異，入水口的珊瑚、軟體動物及苔蘚

蟲，還有出水口的軟體動物及苔蘚蟲整年覆蓋率也都比各單季高，表示整年在消長上最具競爭力的底棲動物在入水口是珊瑚、軟體動物及苔蘚蟲，在出水口則為軟體動物及苔蘚蟲。

111 年 5 月回收 110 年放置整年的附著板（110 年 5 月~111 年 5 月），全數收回。入水口灣內南側（Influ-5）珊瑚覆蓋率最高，為 0.07/cm^2（圖 4-13）；軟體動物的覆蓋率在 0-0.06/cm^2 之間（圖 4-14），以入水口灣內北側（Influ-2）覆蓋率最高；多毛類與苔蘚蟲在年度消長方面仍為數量最多的動物，多毛類之覆蓋率在 0.05−0.37/cm^2 之間，最高覆蓋率在入水口灣內南側（Influ-5）（圖 4-15），平均覆蓋率為 0.15/cm^2；苔蘚蟲之覆蓋率在 0. 01−0.76/cm^2 之間，入水口卸貨碼頭堤防外側（Influ-11）的覆蓋率最高，平均覆蓋率為 0.28/cm^2（圖 4-16）；海鞘之覆蓋率在 0-0.25/cm^2 之間，最高著生量出現於入水口北堤外側（Influ-3）（圖 4-17）；藤壺的覆蓋率介於 0-0.69/cm^2 之間，最高著生量出現於入水口卸貨碼頭堤防外側（Influ-11），平均覆蓋率為 0.26/cm^2（圖 4-18）。

整年的附著板經過一年 4 個季節（110 年的第 3、4 次及 111 年第 1、2 次）的消長，其生物相之覆蓋率明顯與各單一季節不同（MANOVA, $p<0.05$），入水口區的珊瑚、軟體動物、苔蘚蟲及海鞘較各季為多，平均覆蓋率分別為 0.016 vs. 0.0002-0.007/cm^2、0.03 vs. 0.001-0.017/cm^2、0.47 vs. 0.23-0.45/cm^2 及 0.12 vs. 0.02-0.10/cm^2（ANOVA, $p<0.05$）；出水口區的苔蘚蟲及藤壺較各單季為多，平均覆蓋率分別為 0.08 vs. 0.01-0.03/cm^2 及 0.06 vs. 0.00-0.04/cm^2（ANOVA, $p<0.05$）。整體而言，雖然整年及各季的覆蓋率都以苔蘚蟲為多，但是整年與各單季的覆蓋率有差異，入水口的珊瑚、軟體動物、苔蘚蟲及海鞘，還有出水口的苔蘚蟲及藤壺整年覆蓋率也都比各單季高，表示整年在消長上最具競爭力的底棲動物在入水口是珊瑚、軟體動物、苔蘚蟲及海鞘，在出水口則為苔蘚蟲及藤壺。

同類底棲動物歷年整年的著生量比較部分，珊瑚著生以 92 年最多，覆蓋率達 0.42/cm^2（圖 4-13）；軟體動物著生則以 98 年較多，覆蓋率達 0.37/cm^2 以上（圖 4-14）；多毛類著生以 92 及 94 年最多，覆蓋率可達 0.91/cm^2 以上（圖 4-15）；苔蘚蟲著生由圖 4-16 可知，以 92 年最多，覆蓋率達 1.00/cm^2；由圖 4-17 可知，海鞘著生以 88、96 、103 及 104 年最多，覆蓋率可達 0.50/cm^2 以上（0.5-0.62）；藤壺著生以 87、103 及 110 年最多，可達 0.60/cm^2 以上（0.66-0.72）（圖 4-18）。由圖 4-13 至圖 4-18 可知，各類底棲動物整年的年間著生量變動並無趨勢可言。

以非度量多維標度 Multi-Dimensional Scaling（MDS）方法分析各季之底棲動物群聚，呈現第 3 及 4 次的群聚相分散度較大，第 1 次最為集中（圖 4-19 至圖 4-22）。基本上，四季之底棲動物群聚相可分為出水口南側以及入水口兩大群，石牛溪則介於其間。但 90 年第 2 及 3 次出水口南側水深 8 公尺處（Efflu）的群聚與入水口的群聚聚集在同一群，而不是與出水口南側其他測站的群聚聚集，此特殊現象可能與第三核能發電廠於 90 年 3 月 18 日至 4 月 15 日間為期 29 天的停機有關（3A 事件），而此 2 次出水口南側水深 8 公尺處（Efflu）的多毛蟲覆蓋率則較歷年高（圖 4-9）。95 年第 1、3 及 4 次出水口南側水深 9 公尺處（Efflu-2）的群聚相與入水口的群聚歸在同一群，而非與出水口南側其他測站的群聚在同一群，其多毛蟲及苔蘚蟲覆蓋率有較歷年高的情形（圖 4-9 至圖 4-10）。

各類底棲動物歷年著生量變動在測站間的相似程度，以群聚分析 Clustering analysis 顯示，珊瑚在各測站的著生量可分成兩群，一為入水口灣內測站 Influ-5、北堤測站 Influ-3 與出水口南側小灣測站 Efflu-2 及 MPT，另一群為入水口灣內測站 Influ-2，灣外之 Influ-10、Influ-11 與對照站 SNS，及出水口南側小灣測站 Efflu 、Efflu-3（圖 4-23）；軟體動物著生量變化，在出水口南側小灣測站（Efflu、Efflu-2、Efflu-3 及 MPT）與對照站 SNS 成一群，而入水口灣內測站及灣外之北堤測站 Influ-3 及 Influ-10、Influ-11 成一群（圖 4-24）；多毛蟲在出水口南側小灣的著生量變化除了 MPT 與其他測站最不相似，Efflu-2 與對照站 SNS 成一群，Efflu、Efflu-3 及入水口灣外之南堤外側（Influ-10）相似，入水口灣內測站與北堤外側測站 Influ-3 成一群，並與入水口灣外之北堤測站 Influ-11 相似（圖 4-25）；苔蘚蟲以入水口灣內測站與北堤測站 Influ-3 的著生量相似，並與 Influ-11 成一群，出水口南側小灣測站自成一群，但出水口南側小灣測站 Efflu-3 與其他測站最不相似，入水口南堤外側（Influ-10）及對照站 SNS 較相似，介於出、入水口兩區之間（圖 4-26）；海鞘以入水口灣內測站與北堤測站 Influ-3 及 Influ-11，還有對照站 SNS 及出水口之貓鼻頭（MPT）相似，出水口之 Efflu-2 測站與入水口南堤外側（Influ-10）成一群，其餘測站 Efflu、Efflu-3 為一群（圖 4-27）；藤壺以入水口灣內測站與北堤測站 Influ-3 及 Influ-11，還有對照站 SNS 相似，出水口 Efflu-3 與 Efflu、貓鼻頭（MPT）成一群，Efflu-2 測站與入水口南堤外側（Influ-10）為一群（圖 4-28）。由此可知，除了珊瑚之外，各類底棲動物著生量相似度以入水口灣內測站與北堤測站 Influ-3 及 Influ-11 較為一致，其餘測站相似度依各底棲動物類別而有不同。

停機維修多在春秋冬三季進行，偶發之 3A 事件（90 年 07 月 12 日至 90 年 07 月 20 日）發生於夏季，由群聚分析推測停機可能會影響多毛蟲的著生量，106 年亦有停機大修 106 年 04 月 07 日至 106 年 06 月 15 日，還有 106 年 07 月 23 日凌晨 1 點 10 分二號機組因冷卻水泵故障跳機，至 106 年 07 月 24 日晚間 11 點 20 分機組再啟動。自 85 年來迄今共有 54 次停機記錄，將出水口南側各測站（水深 8 公尺處（Efflu）、水深 9 公尺處（Efflu-2）、水深 3 公尺處（Efflu-3）與貓鼻頭（MPT））歷年的資料分成停機及非停機時期的著生量比較（圖 4-29），用貓鼻頭（MPT）著生量為基準並除去季節之影響，結果顯示出水口區域南側水深 8 公尺處（Efflu）及水深 9 公尺處（Efflu-2）測站有顯著差異（T-test, p= 0.01），停機時期的平均著生量分別為 0.157 及 0.116/cm^2，高於非停機時期的平均著生量 0.071 及 0.001/cm^2。

參考 87 至 110 年赤道太平洋區海面溫度指數 Niño3.4 index （北緯 5 度-南緯 5 度、西經 170 度-西經 120 度）、Niño4 index （北緯 5 度-南緯 5 度、東經 160 度-西經 150 度）（ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/wd52dg/data/indices/sstoi.indices）以及北太平洋年際震蕩 The Pacific Decadal Oscillation（PDO）於北緯 20 度海域（http://jisao.washington.edu/pdo/PDO.latest），Niño3.4 index 連續五個月以上超過正常值±0.5，才認定聖嬰（+0.5）或反聖嬰（-0.5）現象，由於 Niño4 區與台灣較接近，故 Niño4 index 可能更具代表性，故也將之加入分析，兩者指數之相關性為 0.91（$p<0.001$）；PDO 為北太平洋的海水溫度變化狀況，於 1990 年發現其與鮭魚漁業產量有關，此事件的周期大約 20-30 年，PDO 及 Niño3.4 index 的溫度指數相關性為 0.66（$p<0.001$）（圖 4-40），PDO 及 Niño4 index 之相關為 0.66（$p<0.001$），Niño3.4 及 Niño4 index 相關性為 0.90（$p<0.001$），將之各別換算成季節平均值後與各季底棲動物著生量做相關性分析，分析聖嬰及反聖嬰現象對底棲動物之影響，由於其效應可能影響當季之底棲動物著生量，亦可能延伸影響後 2 季之著生量，因此以此 3 種時間（當季、後 1 季及後 2 季）對應來探討三指數與著生量之相關性，Niño3.4 index 之分析結果如表 4-3，珊瑚著生量、軟體動物與 Niño3.4 index 在 3 種時間對應多無相關性，僅珊瑚於後兩季之出水口南側水深 8 公尺處（Efflu）著生量有正相關（0.24），藤壺延後一及兩季之著生量與 Niño3.4 index 有負相關（-0.27 ~ -0.23），以入水口南堤外側（Influ-10）海鞘著生量與 Niño3.4 index 相關為例，在 3 種時間對應下，與 Niño3.4 index 有負相關（-0.33 ~ -0.25），以後兩季的相關性較高，整體而言，後兩季的時間對應

下有較多的相關性，但所有分析之相關性偏低（-0.33～0.24）；Niño4 index 與著生量之相關性結果如表 4-4，趨勢與 Niño3.4 index 雷同，與珊瑚著生量在 3 種時間對應無相關性，與海鞘延後兩季之著生量有負相關（-0.41 ～ -0.36），在 3 種時間對應下，以後兩季的相關性較高，且有較多的相關性；以 PDO 與底棲動物著生量之相關性相較 Niño3.4 index 與 Niño4 index 的為多，亦多為負相關（-0.41～0.38），亦是以後兩季的時間對應下為最（表 4-5），表示當指數高時，之後一及兩季的底棲生物著生量偏低。

4. 固定橫截線底棲生物覆蓋率變化

此部分調查始於 94 年第 3 次（9 月），入水口及出水口南側測站的底質主要以礁岩及沙質為主（表 4-6），但其比例在各橫截線中不同，入水口灣內南側（Inf 5）及出水口南側水深 3 至 5 公尺處（Eff）以礁岩為主（礁岩＞60%），而貓鼻頭（MPT）以沙質為主（礁岩＜30%），其餘則是礁岩及沙質各半。而底棲生物覆蓋率以入水口灣內南側（Inf 5）最高（表 4-6），覆蓋率為 64.0%，其次為入水口灣內最北側（Inf 2.2）覆蓋率為 52.4%；而貓鼻頭（MPT）覆蓋率 14.0%最低，整體而言，入水口的底棲生物覆蓋率高於出水口南側各測站。底棲生物有珊瑚、海葵、軟體動物、多毛類、海綿動物、棘皮動物及海藻等大類，共記錄到珊瑚 23 屬，海葵 2 屬，軟體動物 2 屬，海藻 9 屬，各橫截線以珊瑚類的覆蓋率最高，但入水口灣內北側（Inf 2.1）除外，本測站海葵覆蓋率最高（10.0%），珊瑚次之（9.6%）。

入水口及出水口南側測站的底棲生物群聚相可分為入水口及出水口南側兩群的群聚相（圖 4-30），入水口內以入水口灣內北側（Inf 2.1）與入水口灣內最北側（Inf 2.2）的群聚相最為相似，其次為入水口灣內南側（Inf 5）；而出水口南側以出水口南側水深 9 公尺處（Eff 2）與貓鼻頭（MPT）最為相似，其次為出水口南側水深 3 至 5 公尺處（Eff）；而以相似性百分比分析 Similarity Percentages（SIMPER）得知入水口內有優勢底棲生物—球莖觸手海葵（*Entacmaea* sp.）（表 4-6），而出水口南側並無明顯的優勢生物。

自 94 年第 3 次監測至 111 年第 4 次的底棲生物覆蓋率之季節變化發現（圖 4-31 及 4-32），藻類覆蓋率逐年增加，由 94 年各測站皆低於 40%，至 110 年各測站覆蓋率皆高於 70%，111 年 4 次的覆蓋率有降低，但各季次平均覆蓋率皆高於 70%，為覆

蓋率最高的大類，以出水口南側小灣之貓鼻頭（MPT）最高，107 年 8 月覆蓋率高達於 98%；石珊瑚以出水口南側水深 3 至 5 公尺處（Eff）覆蓋率最高（70-94%），入水口灣內北側（Inf 2.1）覆蓋率最低（23-71%），除了出水口貓鼻頭（MPT）在 102-104 年第 4 次明顯減少為 7.6-16.4%的覆蓋率，推測減少的現象是受到颱風影響；海葵在入水口的覆蓋率最多為 50-81%，無明顯的季節性變化，但於 100 年之後觀察到覆蓋率減低的現象，至 109 年第 4 次為 20-50%，而 110 年第 3 季覆蓋率驟增之現象，覆蓋率為 25-73%，至第 4 次為 31-80%，至 111 年降低，覆蓋率為 16-56%，在出水口區域之海葵較少，目前在貓鼻頭（MPT）記錄到覆蓋率最多為 2%；軟珊瑚主要出現於出水口南側，覆蓋率為 0.8-30%，而入水口覆蓋率為 0-7%；海綿、多毛類、棘皮動物、貝類等底棲動物覆蓋率極低，介於 0-10%，僅 111 年第 3 次多毛類及海綿覆蓋率較高，多毛蟲在入水口灣內南側（Inf 5）及出水口南側水深 9 公尺處（Eff 2）分別為 28.8 及 14%，海綿在入水口灣內南側（Inf 5）為 14.8%。

珊瑚白化是環境變化的指標，影響之環境因素很多，例如水溫太高、水體混濁或光線不足時，會造成共生藻死亡或離開而白化，如果環境變好，共生藻會再回來。104 年第 1 次至 111 年第 4 次調查每季皆有發現珊瑚白化（圖 4-31 及 4-32），以 105 年第 3 次（7-8 月）、106 年第 3 次（7-8 月）、106 年第 4 次（9-11 月）、107 年第 2 次（3-5 月）、108 年第 2 次（3-5 月）及 109 年第 3 次（5-7 月）較其它次季為高，白化比例分別為 7-54%、9-62%、9-43%、1-60%、1-54%及 9-80%，其他介於 0-57%，白化現象多分布於水深 3-5 公尺處，入水口的白化比例較出水口為高，分別平均為 105 年為 32%及 18%，106 年第 3 次為 32%及 12%，107 年第 2 次為 29%及 4%，108 年第 2 次為 26%及 5%，109 年第 3 次為 59%及 31%，106 年第 4 次反為出水口平均白化率較入水口高，分別為 23%及 20%，但在出水口水深 8-10 公尺處白化率則較低（105 年：7-8%；106 年第 3 次：9-10%；106 年第 4 次：9-16%；107 年第 2 次：1-6%；108 年第 2 次：1-8%；109 年第 3 次：9-12%），而 109 年第 3 次的白化率較往年為高。

入水口 110 年 4 季白化率最高的測線（Inf 2.2）有 6-19%，在第 1 季及第 4 季白化率較高，為 18.4 及 15.6%，第 2、3 季為 6-11%，入水口其餘測線為 2-8%；出水口之貓鼻頭（MPT）在第 1 及 2 次無紀錄到白化，在 3-4 季為 1-2%，出水口測線中為最輕微的，出水口水深 3-5 公尺處（Efflu）第 4 季有 11.2%的白化率，水深 8-9 公尺處（Efflu-2）為 5%，出水口第 4 季以水深 3-5 公尺處（Efflu）有較為高的白化率（圖 4-32）。

入水口 111 年 4 季白化率最高的測線（Inf 2.2）有 10-41.2%，在第 2 季及第 3 季白化率較高，為 29.6 及 41.2%，第 1、4 季為 10-15.6%，入水口其餘測線為 2-20%；出水口之貓鼻頭（MPT）在第 3 次無紀錄到白化，在其餘 3 季為 0.4%，出水口測線中為最輕微的，出水口水深 3-5 公尺處（Efflu）第 2 季有 4%的白化率，水深 8-9 公尺處(Efflu-2)為 6.8%，出水口在水深 8-9 公尺處(Efflu-2)有較高的白化率(圖 4-32)。

底棲生物覆蓋率變化與大環境氣候變遷亦有相關（表 4-7），入、出水口珊瑚與後 1-2 季之 Niño4 index 呈負相關（r = -0.33 ~ -0.26），入水口海葵與當季至後 2 季之 Niño4 及 PDO index 呈負相關（r = -0.39 ~ -0.26），入、出水口軟體動物與當季至後 2 季之三個 index 呈負相關（r = -0.46 ~ -0.28），入水口海綿與當季之三個 index 呈負相關(r = -0.35 ~ -0.24)，出水口多毛蟲與後 2 季之 PDO index 呈負相關(r = -0.25)，兩區的珊瑚白化率與後 2 季之 Niño3.4 index 及 Niño4 index 的相關性為正相關，為 0.28-0.39（$p<0.05$），整體上，生物覆蓋率與 Niño4 index 的相關性最高可達-0.46，表示當大環境海面溫度指數高時，珊瑚、海葵、軟體動物、海綿及多毛蟲之覆蓋率偏低，而珊瑚白化率偏高。因珊瑚成長與颱風數量及颱風期雨量有關，故將白化與颱風數量、颱風期累積雨量、季累積雨量及沉積量做相關分析，但皆無相關存在。

在 103-111 年 36 次調查所見之白化珊瑚在入、出水口南側小灣之種類有所不同（圖 4-33），入水口灣內多為枝狀，北側 Inf 2.1 及 Inf 2.2 主要是軸孔珊瑚，南側 Inf 5 為鹿角珊瑚、軸孔珊瑚、盤星珊瑚及角星珊瑚，而出水口主要為團塊及平鋪狀珊瑚，有棘杯珊瑚、角星珊瑚、角菊珊瑚、腦紋珊瑚、細菊珊瑚及表孔珊瑚，枝狀的珊瑚有列孔珊瑚及鹿角珊瑚。白化珊瑚之種類由 1-7 種，至 105-107 年 1-18 種，109 年 1-25 種，顯示受影響之珊瑚種類有增多的趨勢，在 110 及 111 年較為輕微，0-12 種（圖 4-34）。

5. 入、出水口微環境沉積物沉積量與底棲動物著生量之相關性

96 年至 97 年第 2 次調查間出水口有泥沙淤積於監測樣點之情況，且沉積厚度超過 30 公分，將其下之固著生物掩埋而致無法生存，故於 98 年第 2 次調查（2 月 09 日至 5 月 06 日）開始放置沉積物收集器，以監測沉積物沉積量，結果如圖 4-35，可知出水口南側區域各季沉積物沉積量常較入水口灣內區域高，並在第 3、4 次平均每日沉積量高於第 1、2 次。

110 年 4 次調查沉積物沉積量變化，110 年第 2 至 4 次出水口區域沉積量明顯高於入水口灣內區域，平均沉積量分別為 1.77±0.36 vs. 0.01 ± 0.003 mm/day、1.12±0.11 vs. 0.22 ± 0.21 mm/day 及 2.16±0.03 vs. 0.11 ± 0.06 mm/day（T-test; $p<0.01$），僅第 1 次出水口區域沉積量未明顯高於入水口灣內區域（T-test; $p>0.05$）（圖 4-35）。

111 年 4 次調查沉積物沉積量變化，出水口區域沉積量皆與入水口灣內區域無明顯差異，平均沉積量分別為 1.04±1.15 vs. 0.63 ± 0.02 mm/day、0.58±0.69 vs. 0.36 ± 0.02 mm/day、0.99±0.77 vs. 0.61 ± 0.05 mm/day 及 0.77±0.50 vs. 0.47 ± 0.03 mm/day（T-test; $p>0.05$），可能與今年颱風未影響台灣有關（圖 4-35）。

出水口的沉積量有年間的差異，在第 1 次（冬），各年間的沉積量無明顯差異（ANOVA, Duncan, $p>0.05$）；在第 2 次（春）， 110 年的沉積量最高，明顯較 98-100、103、105-109 及 111 年為高（ANOVA, Duncan, $p<0.05$），顯示在沒有颱風影響的季節（冬及春），可能與近岸海域的海流及潮流輸沙量有關；在第 3 次（夏），100 及 102 年顯著較 106 及 109 年為高（ANOVA, Duncan, $p<0.05$）；在第 4 次（秋），各年間的沉積量無明顯差異（ANOVA, Duncan, $p>0.05$）（圖 4-35）。

將出、入水口區域 98 年第 2 次至今之沉積量分別與中央氣象局颱風資料庫之各季颱風累計警報天數、颱風期累積雨量及季累積雨量做迴歸分析，僅有入水口沉積量與各季颱風累計警報天數及颱風期累積雨量成正相關，其簡單迴歸關係為入水口平均日沉積量（y）=0.03＋0.02* 颱風警報天數（x）（$R^2=0.43$; $p<0.01$）；入水口平均日沉積量（y）=0.05＋$3.28*10^{-4}$* 颱風雨量（x）（$R^2=0.46$; $p<0.01$），表示颱風之累計警報天數及累積雨量越多，入水口平均日沉積量越高，並且入水口及出水口之沉積量皆與季累積雨量有迴歸正相關，R^2 分別為 0.33 及 0.14，表示累積雨量越多，沉積量越高（圖 4-36）。將沉積量分成颱風季（有颱風經過台灣附近海域的季節）與非颱風季比較，出、入水口區域皆以颱風季沉積量明顯高於非颱風季（T-test, $p<0.001$），颱風季沉積量分別為 1.56±0.94 及 0.15±0.18 mm/day，非颱風季為 0.76±0.64 及 0.04±0.05 mm/day，可見颱風季沉積量明顯較多。

為瞭解沉積量對各類底棲動物著生量之影響，分別將入、出水口各測站之沉積量與各類底棲動物著生量作迴歸分析，出水口之迴歸關係不顯著（p>0.05），而入水口之沉積量與藤壺、軟體動物有顯著正相關（R^2=0.04-0.07; P<0.05），與其他底棲動物無迴歸相關，迴歸關係式為藤壺(y)=0.09+0.33*沉積量(x)及軟體動物(y)=0.01+0.04*沉積量(x)，呈現沉積量越高底棲動物之藤壺及軟體動物的著生量就越高(圖 4-37)，顯示沉積量對部分底棲動物著生有正面影響。

當抽水機組停機維修時，會將廠用海水（NSCW）迴轉欄汙柵吊起來清除附著生物，兩部機組以輪流停機方式進行維修，清污的廠用海水經過濾後，因網目較大，所以還是會有比較細小的殘渣排回大海。當一號機組停機維修時，清污的廠用海水經過濾後，會在樣點灣內北側（Influ-2）附近的排水孔排出;當二號機組停機維修時，清污的廠用海水經過濾後，會在樣點灣內南側（Influ-5）附近的排水孔排出，因清污海水排出可能會造成進水口的沉積量增加，又因沉積量受颱風季影響，故將歷年進水口的沉積量分成停機清除附著生物時期及正常運作時期，分別在颱風季及非颱風季下比較差異性（Two-way ANOVA）（圖 4-38），結果顯示在非颱風季及颱風季時期，兩樣點的沉積量在停機清除附著生物時期及正常運作時期無顯著差異（P>0.05），表示清污海水排出不會造成灣內的沉積量增加，並且其對入水口底棲動物著生量無顯著影響（P>0.05）。

6. 出水口南側各測站與入水口之水溫比較

109 年、110 年及 111 年第 1 次（108 年 11 月 03 日至 109 年 02 月 07 日、109 年 11 月 08 日至 110 年 02 月 21 日及 110 年 11 月 04 日至 111 年 02 月 09 日）（圖 4-39)，109 年出水口南側水深 3 公尺處(Efflu-3)的平均水溫 25.7°C、最高水溫 28.0°C、最低水溫 21.4°C、平均溫差 1.78°C，平均水溫高於其餘測站（平均水溫介於 24.6~24.8°C、最高水溫為 26.9~27.2°C、最低水溫為 18.2~20.2°C 及平均溫差為 1.10~1.81°C）（ANOVA, Waller-Duncan; p<0.05）；110 年出水口南側水深 3 公尺處（Efflu-3）的平均水溫 25.4°C、最高水溫 28.9°C、最低水溫 20.9°C、平均溫差 1.91°C，平均水溫高於其餘測站（平均水溫介於 24.0~24.5°C、最高水溫為 26.9~28.2°C、最低水溫為 18.5~18.8°C 及平均溫差為 0.99~1.57°C）（ANOVA, Waller-Duncan; p<0.05）；

111 年出水口南側水深 3 公尺處（Efflu-3）的平均水溫 26.0°C、最高水溫 28.8°C、最低水溫 22.5°C、平均溫差 1.82°C，平均水溫高於其餘測站（平均水溫介於 25.0~25.2°C、最高水溫為 27.1~27.6°C、最低水溫為 20.4~21.2°C 及平均溫差為 1.30~1.96°C）（ANOVA, Waller-Duncan; $p<0.05$）；低於 20°C 現象發生於 109 年 01 月 25 日，以及 110 年 01 月 14 日至 02 月 08 日其中 7 天，日溫差高達 5.4°C ，111 年沒有低於 20°C 現象，是顯著高於 109 及 110 年（109-111 年分別為 24.9°C、24.5°C 及 25.3°C）（ANOVA, Waller-Duncan; $p<0.05$）。

109 年、110 年及 111 年第 2 次（109 年 02 月 12 日至 109 年 05 月 06 日、110 年 02 月 22 日至 110 年 05 月 05 日及 111 年 02 月 10 日至 111 年 05 月 04 日）（圖 4-39），109 年出水口南側水深 3 公尺處（Efflu-3）的平均水溫 27.2°C、最高水溫 30.5°C、最低水溫 23.7°C、平均溫差 1.86°C，也是都明顯高於其餘測站（平均水溫介於 25.8~26.0°C、最高水溫為 27.7~28.3°C、最低水溫為 20.5~22.1°C 及平均溫差為 1.02~1.38°C）；110 年出水口南側水深 3 公尺處（Efflu-3）的平均水溫 26.6°C、最高水溫 29.5°C、最低水溫 22.5°C、平均溫差 1.85°C，也是都明顯高於其餘測站（平均水溫介於 25.1~25.4°C、最高水溫為 27.4~27.8°C、最低水溫為 21.2~21.6°C 及平均溫差為 1.44~1.85°C）；111 年出水口南側水深 3 公尺處（Efflu-3）的平均水溫 26.8°C、最高水溫 31.1°C、最低水溫 23.7°C、平均溫差 1.96°C，也是都明顯高於其餘測站（平均水溫介於 25.4~25.6°C、最高水溫為 28.5~28.7°C、最低水溫為 21.3~22.4°C 及平均溫差為 1.23~1.74°C）（ANOVA, Waller-Duncan; $p<0.05$）；出水口南側水深 3 公尺處（Efflu-3）三年平均水溫比較， 109 年顯著較 110 及 111 年的為高（109-111 年平均水溫分別為 27.2、26.6 及 26.8°C）（ANOVA, Waller-Duncan; $p<0.05$），其他測站也是 109 年顯著較高溫，110 及 111 年無差異（ANOVA, Waller-Duncan; $p<0.05$）。

109 年、110 年及 111 年第 3 次（109 年 05 月 07 日至 109 年 08 月 04 日、110 年 05 月 06 日至 110 年 08 月 15 日及 111 年 05 月 05 日至 111 年 08 月 03 日）（圖 4-39），109 年出水口南側水深 3 公尺處（Efflu-3）的平均水溫 30.0°C、最高水溫 34.2°C、最低水溫 24.2°C、平均溫差 2.59°C（範圍 0.71~6.12°C），平均水溫高於其餘測站（平均水溫介於 27.9~28.8°C、最高水溫為 31.3~31.8°C、最低水溫為 22.5~23.9°C 及平均

溫差為 1.98~2.82°C，溫差範圍為 0.33~7.07°C）（ANOVA, Waller-Duncan; $p<0.05$），Efflu-3 水溫從 04 月 25 日開始高於 29.5°C（南灣珊瑚白化溫度閥值;戴，2007），此季次 90 天內的日最高溫高於南灣珊瑚白化溫度閥值有 76 天，日最低溫有 32 天，而出水口 9 公尺深之 MPT 測站水溫之日最高溫有 44 天，日最低水溫有 2 天（06 月 13 及 28 日）; 110 年出水口南側水深 3 公尺處（Efflu-3）的平均水溫 28.0°C、最高水溫 32.7°C、最低水溫 21.3°C、平均溫差 3.33°C（範圍 1.07~7.76°C），平均水溫高於其餘測站(平均水溫介於 25.6~27.0°C、最高水溫為 30.1~30.4°C、最低水溫為 19.4~19.6°C 及平均溫差為 3.42~4.06°C，溫差範圍為 0.49~8.33°C）（ANOVA, Waller-Duncan; $p<0.05$），Efflu-3 水溫從 05 月 15 日開始高於 29.5°C，此季次 102 天內的日最高溫高於南灣珊瑚白化溫度閥值有 54 天，日最低溫有 5 天，而出水口 9 公尺深之 MPT 測站水溫之日最高溫有 16 天，日最低水溫有 0 天；111 年出水口南側水深 3 公尺處(Efflu-3）的平均水溫 29.3°C、最高水溫 33.5°C、最低水溫 22.1°C、平均溫差 3.47°C（範圍 1.01~7.11°C），平均水溫高於其餘測站（平均水溫介於 26.7~28.0°C、最高水溫為 30.5~31.2°C、最低水溫為 20.6 ~ 21.5°C 及平均溫差為 3.03~3.95°C，溫差範圍為 0.47~7.65°C）（ANOVA, Waller-Duncan; $p<0.05$），Efflu-3 水溫從 04 月 18 日開始高於 29.5°C，此季次 91 天裡的日最高溫高於南灣珊瑚白化溫度閥值有 72 天，日最低溫有 13 天，而出水口 9 公尺深之 MPT 測站水溫之日最高溫有 33 天，日最低水溫有 0 天;出水口南側水深 3 公尺處（Efflu-3）三年平均水溫比較，109 年顯著較 110 及 111 年的為高(109-111 年平均水溫分別為 30.0、28.0 及 29.3°C)(ANOVA, Waller-Duncan; $p<0.05$），其他測站亦是 109 年顯著較 110 及 111 年高溫（ANOVA, Waller-Duncan; $p<0.05$）。

109 年、110 年及 111 年第 4 次（109 年 08 月 05 日至 109 年 11 月 07 日、110 年 08 月 16 日至 110 年 11 月 03 日及 111 年 08 月 04 日至 111 年 11 月 08 日）（圖 4-39)，109 年出水口南側水深 3 公尺處(Efflu-3)的平均水溫 29.6°C、最高水溫 32.9°C、最低水溫 25.8°C、平均溫差 2.02°C（範圍 0.62~5.08°C），平均水溫高於其餘測站之同期記錄（平均水溫介於 28.1~ 28.5°C、最高水溫為 30.4~30.9°C、最低水溫為 21.8~23.1°C 及平均溫差為 1.44 ~ 2.07°C，溫差範圍為 0.30~6.56°C）（ANOVA,

Waller-Duncan; p<0.05），此季次 95 天內的日最高溫高於南灣珊瑚白化溫度閥值有 66 天，日最低溫有 21 天，而出水口 9 公尺深之 MPT 測站水溫之日最高溫有 31 天，日最低水溫有 0 天；110 年出水口南側水深 3 公尺處（Efflu-3）的平均水溫 29.7°C、最高水溫 32.4°C、最低水溫 26.6°C、平均溫差 1.75°C（範圍 0.80~3.59°C），平均水溫高於其餘測站之同期記錄（平均水溫介於 28.4~ 28.8°C、最高水溫為 30.3~30.9°C、最低水溫為 23.3~24.9°C 及平均溫差為 1.40 ~ 1.81°C，溫差範圍為 0.18~5.38°C）（ANOVA, Waller-Duncan; p<0.05），此季次 80 天內的日最高溫高於南灣珊瑚白化溫度閥值有 68 天，日最低溫有 29 天，而出水口 9 公尺深之 MPT 測站水溫之日最高溫有 37 天，日最低水溫有 0 天；111 年出水口南側水深 3 公尺處（Efflu-3）的平均水溫 29.5°C、最高水溫 33.2°C、最低水溫 25.9°C、平均溫差 2.05°C，平均水溫高於其餘測站之同期記錄（平均水溫介於 28.0~ 28.3°C、最高水溫為 30.9~32.8°C、最低水溫為 23.5~23.9°C 及平均溫差為 1.53~2.03°C）（ANOVA, Waller-Duncan; p<0.05），此季次 97 天內的日最高溫高於南灣珊瑚白化溫度閥值有 71 天，日最低溫有 2 天，而出水口 9 公尺深之 MPT 測站水溫之日最高溫有 27 天，日最低水溫有 1 天(8 月 24 日)；出水口南側水深 3 公尺處（Efflu-3）三年的平均水溫無顯著差異（110-111 年平均水溫分別為 29.6、29.7 及 29.5°C）（ANOVA, Waller-Duncan; p>0.05），入水口（Influ-5）及出水口南側水深 5 及 8 公尺處（Efflu 及 Efflu-2）測站三年間的平均溫度為 110 年顯著較 111 年高（ANOVA, Waller-Duncan; p<0.05）。

整體而言，110-111 年 8 次的水溫與過去的趨勢相同，除出水口南側 3 公尺水深測站（Efflu-3）的水溫較其他測站高約 0.8~2.6°C，其餘出水口各測站之水溫與入水口的水溫無異，顯示溫排水不影響出水口南側地區 6 公尺以深的水溫。94 年至 111 年各月的平均水溫、平均最高水溫、平均最低水溫及月平均溫差、Nino 3.4、Nino 4 及 PDO index 變化如圖 4-40，測站間的平均水溫變化趨勢以入水口灣內南側（Influ-5）及貓鼻頭（MPT）較相近，出水口南側水深 8 公尺處（Efflu）與水深 9 公尺處（Efflu2）近似。

各測站的月平均水溫、最高水溫、最低水溫及溫差之間有 0.21-0.99 的相關性（$p<0.01$），經因素分析（Factor Analysis）將之縮減成一個水溫參數，再與 Nino 3.4、Nino 4 及 PDO index 作相關分析，各測站當月及延後 1-6 個月的水溫參數與 Nino 3.4 及 Nino 4 index 無顯著相關（表 4-8）；出水口南側貓鼻頭測站（MPT）水溫參數與當月之 PDO index 有顯著負相關（$r = -0.17$, $p<0.05$），而延後 4 月的水溫資料，與 PDO index 有正相關（$r = 0.14$），又以延後 4 月的水溫相關性最高及有相關的測站數最多，此顯示南灣的水溫變化與 PDO index 有時間遲滯性的相關。

底棲動物的著生量存有季節性的差異，可能與水溫的變化有關，故將各測站的水溫資料，經因素分析（Factor Analysis）將之縮減成兩個水溫參數，分別為季高溫及季低溫，再以當季及延後 1-2 季的水溫與各類底棲動物作相關分析（表 4-9），以當季的相關性較多，在入水口（Influ-5）、出水口 MPT 測站之藤壺有一致性的結果，與季高溫有正相關性（$r=0.34 \sim 0.45$），表示高溫時藤壺著生量較高，越低溫時著生量較少，較無時間遲滯性的相關。

出水口南側 3 公尺水深測站（Efflu-3）的水溫長期較其餘測站高，將出水口南側水深 8 公尺處（Efflu）的底棲動物著生量與出水口水深 3 公尺測站（Efflu-3）相互比較（圖 4-41 至圖 4-46），兩測站的珊瑚、軟體動物著生量皆少，無顯著差異，多毛蟲著生量 3 公尺水深（Efflu-3）常高於水深 8 公尺處（Efflu），苔蘚蟲著生量水深 8 公尺處（Efflu）偶高於 3 公尺水深（Efflu-3），海鞘著生量於 3 公尺水深（Efflu-3）偶高於水深 8 公尺處（Efflu），而 3 公尺水深（Efflu-3）少有藤壺著生，107 年至 111 年第 4 季苔蘚蟲為水深 8 公尺處（Efflu）顯著較 3 公尺水深（Efflu-3）為多。將兩測站之平均水溫與多毛蟲著生量作相關分析，3 公尺水深（Efflu-3）及水深 8 公尺處（Efflu）之多毛蟲著生量與平均水溫不具相關性，溫排水對這些底棲動物著生量之直接影響仍無定論。

五、討論

無論是軸孔珊瑚的存活或是成長情形，皆以入水口區域高於出水口南側區域，這可能與出水口南側區域是遊客潛水的熱門景點，有較大的人為干擾有關。但造成軸孔

珊瑚呈現負成長的原因，可能有一、因為軸孔珊瑚對環境的變化比較敏感，在移植過程中造成成長緩慢或零成長；二、有些海水混濁的季節在測定過程中樣本未全數檢測到；三、人為或自然干擾造成，如出水口泥沙沉積量大。由於出水口沉積量明顯高於入水口，為了避免沉積物影響，而將出水口監測之珊瑚移至珊瑚礁石上，在 100 至 101 年珊瑚死亡率原為每季 6-10 株，移至珊瑚礁石後，102 至 103 年珊瑚死亡率減為平均每季 1.38 株，並且在 105 年第 1 次之成長量首次顯著較入水口佳（$p<0.05$），據此可知泥沙沉積量對珊瑚生存有明顯的影響。

經野外潛水觀察發現移植至出水口南側之軸孔珊瑚其尖端之生長點多有受損之痕跡，造成的原因可能是遭白結螺或雀鯛、鸚哥魚吃食，被啃食的現象在 105 年 8 月期間特別顯著，入水口此次珊瑚長度為 68.4±10.1mm，在 8 月 10 日有觀察到被啃食的痕跡及長度變短，還有大量的雀鯛，至第 4 次（11 月）測量死亡珊瑚之骨骼長度為 39.7±13.3mm，明顯變短（T-test, $p<0.001$）；另外，也有觀察到珊瑚株流失的情形，如出水口 109 年第 3 季無珊瑚生長紀錄（表 4-1）（圖 4-5），推測可能被人為移除、生物啃食或是被海浪打散掉落。由入水口珊瑚平均日成長率季節性變化有負成長的現象，與颱風之迴歸相關係數（R^2）為 0.08-0.10，可知颱風亦是影響因子之一。109 年第 3 季入水口的珊瑚株除了負成長，尚有白化的現象，入水口此季平均水溫為 28.8°C，最高水溫為 31.8°C，水溫高於 30°C 的天數有 19 天，並且在第 4 季死亡株數高達 9 株，另外，110 年第 4 次及 111 年第 3 次白化率增加應也與高溫有關，如出水口 9 公尺深之 MPT 測站水溫之日最高溫高於南灣珊瑚白化溫度閥值（29.5°C）110 年第 4 次有 37 天，111 年第 3 次有 33 天，且 109 年第 3 次、110 年第 4 次及 111 年第 3 次之各測站平均水溫(不含出水口南側水深 3 公尺處 Efflu-3 測站)，分別為 27.9-28.8°C、28.4-28.8°C 及 26.7-28°C，較 110 年第 3 次(25.6-27°C)為高。

出水口南側小灣之珊瑚架固定於水深 5 公尺處的珊瑚礁石上，近水深 3 公尺處（Efflu-3）測站，於 106 年第 2 次（5 月 08 日）及 108 年第 2 次（5 月 09 日）觀察到珊瑚株成長量明顯較入水口長的現象，由於珊瑚株是放置在溫排水影響的深度範圍，所以溫排水在有些季節有助於珊瑚成長，第 2 季水溫度範圍 106 年為 23.1-29.8°C（平均水溫 26.4°C，平均溫差 1.92°C）及 108 年水溫度範圍為 24.0-31.7°C（平均水

溫 27.2°C，平均溫差 2.16°C），可能為出水口之軸孔珊瑚適合生長的水溫範圍，此範圍和熱帶區珊瑚最適生長水溫 25-29°C 重疊（Saptarini et al., 2017）。

比較入水口、出水口南側之底棲動物補充量及底棲生物覆蓋率，整體來說，入水口區域底棲動物之著生量及底棲生物覆蓋率皆高於出水口南側區域，以目前的資料可知溫排水是影響因素之一，且造成這種現象的原因可能有：1、溫排水的效應；2、非入水口區域有較大的人為或自然干擾；3、入水口區域因冷卻機組抽水，導致總水體量與幼生量大於非入水口區域；4、出水口區域泥沙沉積量較入水口區域高。

入水口底棲動物之藤壺、軟體動物著生量與沉積物沉積量有顯著迴歸正相關（R^2=0.04-0.07，圖 4-37），其餘底棲動物雖無迴歸關係，仍表示沉積量多寡會影響底棲動物之著生。沉積物沉積量常是出水口高於入水口，可能因入水口較封閉，海浪不易影響入水口灣內，故沉積量少且粒徑較細。此外，沉積量可能因颱風經過而增加，因而入水口沉積量與颱風雨量之迴歸相關性顯著（R^2 = 0.46，圖 4-35）；出水口沉積量與颱風雨量之迴歸相關性不高（R^2 = 0.08，圖 4-35），可能是因為有些季節之樣本的沉積量過高，超出收集器的負荷或是容器傾倒及移位，因而在統計分析上看到相關性較低；由出、入水口颱風季的平均沉積量明顯比非颱風季高，可知颱風經過會帶來較多的沉積物，且入水口之底棲動物著生量相對於沉積量呈迴歸正相關，所以有颱風季著生量較非颱風季多的情形，例如藤壺、多毛蟲及軟體動物著生量均有此情形（表 4-2），因此推測颱風伴隨之沉積量及水溫降低等環境因子會影響底棲動物著生量。

當抽水機組停機大修時，會將迴轉欄柵吊起來清除附著生物，清污的廠用海水經過濾後，會再由入水口排出，分析發現在颱風季及非颱風季時之沉積量無明顯差異，此與藤壺、多毛蟲及軟體動物著生量是颱風季顯著高於非颱風季之結果不一致（表 4-2）。

110 年颱風季僅有盧碧颱風（08 月 06 至 07 日）以特殊路徑登陸台灣桃園新竹一帶，其餘經過台灣周遭海域有彩雲（06 月 03 至 04 日）、烟花（07 月 21 至 24 日）、燦樹（09 月 10 至 13 日）及圓規（10 月 10 至 12 日）等 4 個颱風，111 年無颱風登陸台灣，由台灣東部太平洋海域 6 號路徑經過的颱風有軒嵐諾（09 月 02 至 04 日）

及梅花（09 月 11 至 13 日），以及從巴士海峽經過的尼莎（10 月 15 至 16 日）等 3 個颱風，兩年沉積量與 109 年類似，109 年第 3-4 季次未見颱風侵台，僅數個颱風黃蜂（05 月 16 至 17 日）、哈格比（08 月 02 至 03 日）、米克拉（08 月 10 至 11 日）、巴威（08 月 22 日）、閃電（11 月 5 至 7 日）有發布海上警報，這些颱風僅經過台灣周遭海域，因此推測沉積量可能較往年少，但第三季沉積量最少的是 106 年最少（05 月 08 至 07 月 25 日），該年當時無颱風經過，故沉積量最少；第四季是 99 年（08 月 13 日至 11 月 10 日），雖有颱風凡那比（09 月 17 至 20 日）從花蓮壽豐登陸侵台，造成高雄、屏東豪雨，恆春累積雨量為 166.8mm，並未見出、入水口沉積量增加，所以沉積量增加程度可能與颱風路徑及當時風浪大小有關。

Niño3.4 index 是在北緯 5 度-南緯 5 度、西經 170 度-西經 120 度之範圍測得的海水溫度變化指數，而 Niño4 index 為北緯 5 度-南緯 5 度、東經 160 度-西經 150 度之範圍測得，較鄰近於台灣，Niño3.4 及 Niño4 index 效應可能影響當季之底棲動物著生量，亦可能延伸影響後一季或後兩季之著生量，目前皆以後兩季有負相關性之數量最多，但分析之相關性不高，Niño3.4 index 的相關性（r）介於-0.36～0.27，Niño4 index 的相關性介於-0.41～0.26，而 PDO index 為東北太平洋的海水溫度變化指數，周期長有 20-30 年，對底棲動物之相關性以後兩季最多，有相關性（r＝-0.41～0.38）的數量多於與 Niño3.4 及 Niño4 index 相關數量。整體而言，PDO 及 Niño3.4 或 Niño4 index 與底棲動物著生量有相關，說明大環境變化對底棲動物有影響，當 PDO 越高，東北太平洋水溫隨之越高，後一季或後兩季底棲動物之著生量則是越低，而臺灣位居西北太平洋水溫呈現為冷相，並且三個指標都是對後兩季之底棲動物有較多的相關，故大尺度環境變化有反應在區域性底棲動物著生量上；反之，東北太平洋水溫越低（冷相），西北太平洋為暖相，後一季或後兩季底棲動物之著生量則是越高。

湧升流會影響本調查區域的水溫及溫差，但湧升流強度受大尺度的海流及颱風影響，如黑潮向東（向西）擺動時，湧升流會變明顯（不明顯），且在上層 30 公尺處最為明顯（Wu et al., 2008; 林及吳，2013）。此外，南灣也受到東北季風及西南季風影響，冬季之東北季風盛行於每年的十月至第二年的四月間，厚達 1500 公尺的東北季風越過中央山脈抵達背風面，形成密度較大、較重、較冷的落山風（湯與黃，1979），

夏季除了西南季風還有颱風的影響。南灣沿岸可能因東北季風引起下沉流，也可能有西南季風引起的上升流，這些因大氣系統影響波浪與海流的作用造成了水溫變動(Sponaugle et al., 2002; Pineda et al., 2010），但從各測站的底棲動物著生量及水溫與 Nino 3.4、Nino 4 及 PDO index 多有後兩季之相關（表 4-3 至 5、表 4-8），顯示本區域底棲動物的著生量及水溫變動是受大尺度的環境變化影響，而非小尺度的溫排水或落山風效應，若能監測湧升流之變化，才有可能追蹤其對底棲動物著生之影響。

102 年至 111 年各季次調查皆有珊瑚白化的現象，以 105 年、106 年及 109 年第 3 次入、出水口水深 3-5 公尺處白化率分別為 38-54%、12-62.4%及 42-80%最明顯，而 105-106 年南灣海域珊瑚礁生態系調查報告（樊等，2018），也提出大光里、入、出水口，105 年及 106 年第 3 次皆有珊瑚白化現象，由於南灣非溫水排放區域亦有白化現象，可知此白化現象非溫排水之影響。美國國家海洋及大氣總署（NOAA）指出，從 103 年開始海水就異常溫暖（Eakin et al., 2016），且 110 年 10 月的全球表面平均氣溫比 20 世紀（民國前 10 年至 89 年）高出 0.89°C（NOAA），這些都說明了全球暖化有明顯上升趨勢。此外，105 年白化現象連東沙海域亦有，而南半球澳洲大堡礁全長 2,300 公里範圍的最北部之蜥蜴島早在同年 3 月珊瑚就有大範圍白化，106 年的夏季也有白化，至 111 年大堡礁已經歷 6 次白化（87、91、105、106、109 及 111 年），而 111 年是第 1 次在較冷的反聖嬰期發生白化現象(Morton and Cox, 2022)。大堡礁珊瑚在 105-106 年白化之後，珊瑚的著生量也下降了 89%，新著生的珊瑚以鹿角珊瑚為優勢種，與歷年紀錄的組成不同，表示珊瑚群聚組成有改變（Hughes et al., 2019）。印度洋地區的珊瑚也類似，根據馬爾地夫的調查顯示(Pisapia et al., 2019)，該地有 60-90%的珊瑚白化；太平洋的聖誕島及島礁賈維斯島也高達 85%。108 年為聖嬰年，在太平洋海域法屬玻里尼西亞的大溪地及茉莉島 5 月已有 50-60%的珊瑚白化，109 年澳洲氣象局發現 2 月單月的海水溫度超過 1900 年來的紀錄，並且大堡礁珊瑚白化的範圍也超過 105 及 106 年，109 年 7 月進入反聖嬰期，但南灣夏季也如預測因高溫而有大量珊瑚白化，109 年第 2 至 4 季入、出水口測站海水溫度都較 107-108 年同季高出 0.2-1.2°C（圖 4-39），並且有新聞報導小琉球、東北角、蘭嶼、綠島及澎湖等多處非溫排水影響之海域都有珊瑚白化現象(王，2022)，故此大尺度的白化現象實為大環境暖化之影響。

本調查入水口除夏季之外，歷年在第 2 次調查亦有出現白化的高峰（6.4-59.0%），以 101 年的白化現象為例，此季白化可能因冬季低溫影響，或是核三廠內機組大修（101 年 4 月 22 日至 5 月 26 日），於入水口之排水管道排放污水而影響水質，106 年第 2 次調查（106 年 05 月 09 日）恰巧遇到大修停機（106 年 4 月 07 日至 6 月 15 日）的馬達開始啟動時，排放管內的汙水影響調查區域能見度約半小時的時間，待清澈後才將作業完成，所以推測大修工作的管線汙物清除所排放的汙水可能會短期影響能見度、沉積量及水質，並且抽水機組停機大修時清除附著生物是會增加入水口沉積量，表示會對底棲動物如珊瑚等造成影響，但統計上停機與正常運作的沉積量並無差異，故可排除停機大修時沉積物之影響；但是 102 年冬季並無低溫影響，而 103 至 110 年冬季有低溫之影響，推測其他如降雨造成懸浮物多、溫差大、營養鹽等因素也可能造成白化。有研究指出冬季的白化因素是因低溫，夏秋季珊瑚白化可能是持續高溫且溫差小影響所致（廖，2013），另有研究指出高溫引起的白化會因頻繁的溫差變化而舒緩，尤其當溫差增加 1°C 以上時較明顯（Safaie *et al.*, 2018），這也說明湧升流帶動的水溫變化對珊瑚的重要性。

此外，入水口灣內平均白化率皆較出水口為高，此與珊瑚種類組成有關，入水口灣內多為枝狀，主要是軸孔珊瑚，而出水口主要為團塊及平鋪狀珊瑚，有棘杯珊瑚、角星珊瑚、角菊珊瑚、腦紋珊瑚；生長較快的枝狀珊瑚種類如軸孔珊瑚及鹿角珊瑚，對溫度變化較敏感，易白化及死亡率高，而團塊狀的珊瑚種類如微孔珊瑚及盤星珊瑚，較慢白化且維持白化的時間較久，及死亡率低（Baird and Marshall, 2002）。整合各季，不論高溫或低溫，珊瑚白化率與三個海水溫度變化指數都有相關性，入、出水口與後二季之 Nino 3.4 及 Niño4 index 呈正相關性（r = 0.28-0.39, 表 4-7），入水口與當季之 PDO index 相關最高（r = 0.25, 表 4-7），在入、出水口珊瑚覆蓋率部分與後二季之 Niño4 index 有負相關（r = -0.33 至-0.28, 表 4-7）。

整體而言，入水口底棲動物之著生量及底棲生物覆蓋率皆高於出水口南側區域，並且，出水口南側水深 9 公尺處（Efflu-2）測站，停機時期的多毛蟲平均著生量高於非停機時期的平均著生量（T-test, p= 0.01），據此推測出水口南側區域底棲動物著生量低可能不是直接受溫排水影響造成。由 90 年第 2 次第三核能發電廠停機 3A 事件

出水口南側水深 8 公尺處（Efflu）的底棲動物著生量與入水口的相似之結果推測，出水口南側底棲動物著生量低可能與溫水排放所引起之其他環境因子改變有關，例如入水口區域因冷卻機組抽水，導致總水體量與幼生量大於非入水口區域，或溫水排放引起出水口南側區域海流流況發生變化。

水溫變化除出水口南側 3 公尺水深的測站（Efflu-3）外，其餘各測站之水溫變化無差異，顯示溫排水不影響出水口南側區域 6 公尺以深的水溫變化。比較本測站（Efflu-3）與出水口南側水深 8 公尺處（Efflu）底棲動物著生情形，Efflu-3 第 2 次（春）多毛蟲著生量常高於 Efflu，但此現象在 104 年之後有減少的現象，且著生量有時與 Efflu 無顯著差異，至 107 年後反而是 Efflu 多毛蟲著生量常較 Efflu-3 高，而 108 至 110 年 Efflu-3 多毛蟲著生量高於 Efflu，Efflu-3 多毛蟲著生量與當季 Niño4 及 PDO index 呈負相關（r = -0.32 及-0.40），當指數高時，Efflu-3 多毛蟲著生量低，當指數低時，Efflu-3 多毛蟲著生量高，而由以上可知，大環境變化對底棲動物著生量之影響高於溫排水的影響。

六、附表與附圖

表 4-1、 軸孔珊瑚在入水口右側（Influ-2）與出水口水深 8 公尺處（Efflu）之成長情形。(Mean±SD; SD:標準差）

	入水口右側		出水口	
日期	樣本數	長度（mm）	樣本數	長度（mm）
107 年 02 月 08 日	15	136.5±43.2	14	123.9±23.5
107 年 05 月 08 日	15	131.0±36.4	20 (新)	113.4±16.8
107 年 08 月 09 日	20 (新)	93.3±18.0	20 (新)	99.0±11.7
107 年 11 月 05 日	20 (新)	95.2±21.4	20 (新)	91.9±23.4
108 年 03 月 15 日	15	104.9±45.0	16	102.5±22.3
108 年 05 月 10 日	14	108.3±33.2	14	111.6±30.4
108 年 08 月 30 日	14	118.7±39.4	14	106.6±52.6
108 年 11 月 08 日	13	124.5±48.3	14	120.6±40.4
109 年 02 月 13 日	13	118.8±41.5	20 (新)	77.1±10.7
109 年 05 月 07 日	20 (新)	114.8±16.9	18	88.1±20.1
109 年 08 月 05 日	16	110.4±15.8	0	流失
109 年 11 月 08 日	20 (新)	110.9±23.5	20 (新)	75.2±14.9
110 年 02 月 23 日	20	122.3±27.8	9	84.8±15.7
110 年 05 月 07 日	20	136.3±33.0	8	87.8±20.3
110 年 08 月 17 日	20	159.9±41.5	8	93.3±20.5
110 年 11 月 05 日	19	185.6±65.3	20 (新)	51.9±19.4
111 年 02 月 11 日	19	167.9±65.7	20 (新)	93.5±25.0
111 年 05 月 05 日	18	210.6±86.7	10	114.8±35.8
111 年 08 月 04 日	20 (新)	81.8±11.0	9	118.0±39.8
111 年 11 月 09 日	20	89.8±22.2	20 (新)	87.3±19.4

表 4-2、 98-111 年入、出水口底棲動物著生量之非颱風季與颱風季之比較表。（Mean± SEM; SEM:平均值標準誤差)(註：T-test or Mann-Whitney Rank Sum Test, -：無顯著; *: p<0.05; **: p<0.01；***: p<0.001)

底棲動物\區域		入水口	出水口	入 vs. 出 (p-value)
	非颱風季	0.06±0.01	0.002±0.01	***
藤壺	颱風季	**0.21±0.01**	0.006±0.01	***
	p-value	***	-	
	非颱風季	0.10±0.01	0.04±0.01	***
海鞘	颱風季	0.10±0.01	0.02±0.01	***
	p-value	-	*	
	非颱風季	0.48±0.02	0.04±0.01	***
苔蘚蟲	颱風季	0.48±0.02	0.05±0.02	***
	p-value	-	-	
	非颱風季	0.56±0.03	0.22±0.02	***
多毛蟲	颱風季	**0.69±0.03**	0.28±0.02	***
	p-value	**	-	
	非颱風季	0.01±0.002	0.001±0.001	**
軟體動物	颱風季	**0.02±0.002**	0.001±0.002	***
	p-value	**	-	
	非颱風季	0.006±0.002	0.002±0.001	-
珊瑚	颱風季	0.009±0.002	0.003±0.002	*
	p-value	-	-	

表 4-3、 87-111 年 Niño3.4 index 與底棲動物著生量之相關表。(註：x：無相關性；*：p<0.05；**： p<0.01；***： p<0.001)

	Niño3.4 vs. 當季著生量	Niño3.4 vs. 後一季著生量	Niño3.4 vs. 後兩季著生量
珊瑚			
Influ-2	x	x	x
Influ-3	x	x	x
Influ-5	x	x	x
Influ-10	x	x	x
Influ-11	x	x	x
Efflu	x	x	x
Efflu-2	x	x	0.24*
Efflu-3	x	x	x
MPT	x	x	x
SNS	x	x	x
軟體動物			
Influ-2	x	x	x
Influ-3	x	x	x
Influ-5	x	x	x
Influ-10	x	x	x
Influ-11	x	x	x
Efflu	x	x	x
Efflu-2	x	x	x
Efflu-3	x	x	x
MPT	x	x	x
SNS	x	x	x
多毛蟲			
Influ-2	-0.24*	-0.23 *	-0.21 *
Influ-3	x	-0.22 *	x
Influ-5	-0.27 **	-0.26 *	-0.25 *
Influ-10	x	x	x
Influ-11	x	x	x
Efflu	x	x	x
Efflu-2	x	x	x
Efflu-3	-0.36 **	-0.26 *	x
MPT	x	x	x
SNS	-0.24 *	-0.25 *	-0.26 *
苔蘚蟲			
Influ-2	x	x	x
Influ-3	x	x	x
Influ-5	x	x	x
Influ-10	x	x	x
Influ-11	x	x	x
Efflu	x	x	x
Efflu-2	0.27 *	0.24*	0.23*
Efflu-3	x	x	x
MPT	x	x	x
SNS	-0.25 *	-0.33 **	-0.33 **
海鞘			
Influ-2	x	x	x
Influ-3	x	x	x
Influ-5	x	x	x
Influ-10	-0.25 *	-0.30 **	-0.33 **
Influ-11	x	x	x
Efflu	x	x	x
Efflu-2	x	x	x
Efflu-3	x	x	x
MPT	x	x	x
SNS	x	x	x
藤壺			
Influ-2	x	x	x
Influ-3	x	x	x
Influ-5	x	x	x
Influ-10	x	-0.24 *	-0.27 **
Influ-11	x	x	x
Efflu	x	x	x
Efflu-2	x	x	x
Efflu-3	x	x	x
MPT	x	x	x
SNS	x	x	-0.23*

表 4-4、 87-111 年 Niño4 index 與底棲動物著生量之相關表。(註：x：無相關性；*：p<0.05； **： p<0.01; ***： p<0.001)

	Niño4 vs. 當季著生量	Niño4 vs. 後一季著生量	Niño4 vs. 後兩季著生量
珊瑚			
Influ-2	x	x	x
Influ-3	x	x	x
Influ-5	x	x	x
Influ-10	x	x	x
Influ-11	x	x	x
Efflu	x	x	x
Efflu-2	x	x	0.26
Efflu-3	x	x	x
MPT	x	x	x
SNS	x	x	x
軟體動物			
Influ-2	x	x	x
Influ-3	x	x	x
Influ-5	x	x	x
Influ-10	x	x	x
Influ-11	x	x	x
Efflu	x	x	x
Efflu-2	x	x	x
Efflu-3	x	x	x
MPT	x	x	x
SNS	x	x	-0.24 *
多毛蟲			
Influ-2	-0.23*	-0.20 *	-0.21 *
Influ-3	x	-0.29 **	-0.26 *
Influ-5	x	x	-0.24 *
Influ-10	x	x	x
Influ-11	x	x	x
Efflu	x	x	x
Efflu-2	x	x	x
Efflu-3	-0.32*	x	x
MPT	x	x	x
SNS	-0.29**	-0.31 **	-0.34 **
苔蘚蟲			
Influ-2	x	x	x
Influ-3	x	x	x
Influ-5	x	x	x
Influ-10	x	x	x
Influ-11	x	x	x
Efflu	x	x	x
Efflu-2	0.24*	0.27 *	0.23*
Efflu-3	x	x	x
MPT	x	x	x
SNS	-0.33 **	-0.38**	-0.38 **
海鞘			
Influ-2	x	x	-0.28 **
Influ-3	x	x	x
Influ-5	x	x	x
Influ-10	-0.30 *	-0.36 **	-0.41***
Influ-11	x	x	x
Efflu	x	x	x
Efflu-2	x	-0.22 *	x
Efflu-3	x	x	x
MPT	x	x	x
SNS	x	x	x
藤壺			
Influ-2	x	x	x
Influ-3	x	x	x
Influ-5	x	x	x
Influ-10	x	-0.28 **	-0.31 **
Influ-11	x	x	x
Efflu	x	x	x
Efflu-2	x	x	x
Efflu-3	x	x	x
MPT	x	x	x
SNS	x	x	-0.24*

表 4-5、 87-111 年 PDO index 與底棲動物著生量之相關表。(註：x：無相關性；*：p<0.05； **： p<0.01; ***： p<0.001)

	PDO vs. 當季著生量	PDO vs. 後一季著生量	PDO vs. 後兩季著生量
珊瑚			
Influ-2	x	x	x
Influ-3	x	x	x
Influ-5	x	x	-0.22 *
Influ-10	x	x	x
Influ-11	x	x	x
Efflu	x	x	x
Efflu-2	x	x	x
Efflu-3	x	x	x
MPT	x	x	x
SNS	x	x	x
軟體動物			
Influ-2	x	x	x
Influ-3	x	x	x
Influ-5	x	x	x
Influ-10	x	x	x
Influ-11	x	x	x
Efflu	x	x	x
Efflu-2	x	x	x
Efflu-3	x	x	x
MPT	x	x	-0.29 **
SNS	x	x	x
多毛蟲			
Influ-2	-0.28**	x	-0.20 *
Influ-3	x	x	x
Influ-5	-0.41 ***	-0.34 ***	-0.35 ***
Influ-10	x	x	x
Influ-11	x	x	x
Efflu	x	x	x
Efflu-2	x	x	x
Efflu-3	-0.40**	-0.33**	-0.38**
MPT	-030**	-0.27**	-0.38***
SNS	-0.25*	-0.26*	-0.35**
苔蘚蟲			
Influ-2	x	x	x
Influ-3	x	x	x
Influ-5	x	-0.27**	-0.32**
Influ-10	x	x	x
Influ-11	x	x	x
Efflu	x	x	x
Efflu-2	0.36 **	0.38**	0.30**
Efflu-3	x	x	x
MPT	x	x	-0.23*
SNS	-0.24*	-0.36***	-0.34**
海鞘			
Influ-2	x	-0.23*	-0.21*
Influ-3	x	x	x
Influ-5	x	x	x
Influ-10	x	-0.23*	-0.23*
Influ-11	-0.24*	-0.26*	-0.26*
Efflu	x	x	-0.29**
Efflu-2	-0.25*	-0.24*	x
Efflu-3	x	x	x
MPT	-0.34**	-0.30**	-0.35***
SNS	x	x	-0.31**
藤壺			
Influ-2	x	x	x
Influ-3	x	x	x
Influ-5	x	x	x
Influ-10	x	x	x
Influ-11	x	x	x
Efflu	x	x	x
Efflu-2	x	x	x
Efflu-3	x	x	x
MPT	x	x	x
SNS	x	x	x

表 4-6、 94 年第 3 次固定橫截線調查入水口及出水口南側之底棲生物種類及覆蓋率。

		Inf 5	Inf 2.1	Inf 2.2	Eff 2	MPT	Eff
深度(m)		3-5	5	3-5	9	9	3-5
底質(%)	礁石	78.8	42.8	48.8	49.6	28.0	62.4
	沙	21.2	57.2	51.2	45.2	72.0	37.6
	其他(鋼管、水泥)	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0
底棲生物種數		**18**	**9**	**9**	**13**	**17**	**19**
珊瑚(%)	軸孔珊瑚	0.8	5.2	18.8	0.0	0.0	4.4
	柱星珊瑚	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	細菊珊瑚	0.4	0.0	0.0	1.2	0.0	0.4
	真葉珊瑚	4.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
	菊珊瑚	4.0	1.2	2.0	0.8	0.8	0.4
	角菊珊瑚	4.8	0.4	3.6	0.8	1.6	1.2
	棘杯珊瑚	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
	角星珊瑚	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4
	萼柱珊瑚	0.0	0.4	0.0	0.4	0.4	0.8
	迷紋珊瑚	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
	繩紋珊瑚	0.0	0.0	1.2	0.0	0.8	0.0
	千孔珊瑚	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4
	圓菊珊瑚	0.8	0.0	0.0	1.2	0.8	1.2
	表孔珊瑚	4.0	0.0	0.0	2.4	0.0	1.6
	耳紋珊瑚	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
	腦紋珊瑚	5.2	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2
	鹿角珊瑚	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	微孔珊瑚	3.6	1.2	0.4	3.6	2.0	0.4
	沙珊瑚	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	列孔珊瑚	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.8
	柱珊瑚	0.0	0.4	0.0	1.2	0.8	0.8
	管星珊瑚	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	笠珊瑚	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
	指形軟珊瑚	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
	肉質軟珊瑚	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
	指形軟珊瑚	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.8
	sum of coral	31.2	9.6	28.8	12.4	10.4	23.2
海葵(%)	星簇海葵	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	球莖觸手海葵	16.0	10.0	23.2	0.0	0.0	0.0
	sum of anemone	16.4	10.0	23.2	0.0	0.0	0.0
軟體動物(%)	刺海牛	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
	硨磲貝	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	sum of mollusks	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
海綿動物(%)	海綿	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
棘皮動物(%)	海百合	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
海藻(%)	紅羽凹頂藻	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
	網地藻	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
	凹頂藻	0.0	0.0	0.0	2.4	1.2	0.0
	中葉藻	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0
	葡萄擬石花	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
	旋花藻	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
	寬珊藻	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
	其他藻類	15.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
	sum of algae	15.6	0.0	0.0	3.2	3.6	1.6
底棲生物覆蓋率總計(%)		64.0	19.6	52.4	16.4	14.0	24.8

表 4-7、 94-111 年海面水溫指數 Niño3.4、Niño4 及 PDO index 與底棲生物覆蓋率變化之相關表。
(註：x：無相關性；*：p<0.05； **： p<0.01)

底棲生物覆蓋率		Niño3.4 index			Niño4 index			PDO index		
	/測站	當季	後一季	後兩季	當季	後一季	後兩季	當季	後一季	後兩季
藻類										
	入水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	出水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
珊瑚										
	入水口	x	x	x	x	-0.26*	-0.33**	x	x	x
	出水口	x	x	x	x	x	-0.28*	-0.28*	-0.33**	-0.28*
海葵										
	入水口	x	x	x	-0.30*	-0.26*	-0.31**	-0.33**	-0.39**	-0.34**
	出水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
軟體動物										
	入水口	-0.28*	-0.27*	-0.31*	-0.33**	-0.30**	-0.30*	-0.46***	-0.45***	-0.46***
	出水口	-0.31**	-0.36**	-0.38**	-0.39**	-0.44***	-0.46***	-0.39**	-0.40**	-0.40**
海綿										
	入水口	-0.24*	x	x	-0.29*	x	x	-0.35**	-0.30*	-0.35**
	出水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
多毛類										
	入水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	出水口	x	x	x	x	x	x	x	x	-0.25*
棘皮動物										
	入水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	出水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
白化珊瑚										
	入水口	x	x	0.28*	x	0.36**	0.39**	0.25*	x	x
	出水口	x	x	0.28*	x	x	0.32**	x	x	x

表 4-8、 94-111 年海面水溫指數 Niño3.4、Niño4 及 PDO index 與各測站水溫之相關表。

(註：x：無相關性; *: p<0.05; **: p<0.01)

海面溫度指數	測站	當月	後1月	後2月	後3月	後4月	後5月	後6月
Niño3.4								
	Efflu	x	x	x	x	x	x	x
	Efflu-2	x	x	x	x	x	x	x
	MPT	x	x	x	x	x	x	x
	Efflu-3	x	x	x	x	x	x	x
	Influ-5	x	x	x	x	x	x	x
Niño4								
	Efflu	x	x	x	x	x	x	x
	Efflu-2	x	x	x	x	x	x	x
	MPT	x	x	x	x	x	x	x
	Efflu-3	x	x	x	x	x	x	x
	Influ-5	x	x	x	x	x	x	x
PDO								
	Efflu	-0.14*	x	x	x	0.14*	x	x
	Efflu-2	-0.15*	x	x	x	x	x	x
	MPT	-0.17*	x	x	x	0.14*	x	x
	Efflu-3	x	x	x	0.16**	0.18*	x	x
	Influ-5	x	x	x	x	0.18*	0.14*	x

表 4-9、 93-111 年各次 (季)測站間的溫度與底棲動物著生量之相關性。

(註：x：無相關性；*：p<0.05； **： p<0.01)

測站	底棲動物	當季		後一季		後兩季	
		季高溫	季低溫	季高溫	季低溫	季高溫	季低溫
Influ-5							
	珊瑚	x	-0.31 *	x	x	x	x
	軟體動物	x	x	x	-0.24 *	x	x
	多毛蟲	x	x	x	x	x	x
	苔蘚蟲	x	-0.24 *	-0.38 **	x	x	x
	海鞘	x	x	x	x	x	x
	藤壺	0.45 ***	x	x	x	-0.38 **	x
Efflu							
	珊瑚	x	x	x	x	x	x
	軟體動物	x	x	x	x	x	x
	多毛蟲	x	x	x	x	-0.32 **	x
	苔蘚蟲	x	x	x	x	x	x
	海鞘	x	x	x	x	x	x
	藤壺	x	-0.26 *	x	x	x	x
Efflu-2							
	珊瑚	x	x	x	x	x	x
	軟體動物	x	x	x	x	x	x
	多毛蟲	x	x	x	x	x	x
	苔蘚蟲	x	x	x	x	-0.28 *	x
	海鞘	x	x	x	x	x	x
	藤壺	x	x	x	x	x	x
Efflu-3							
	珊瑚	x	x	x	x	x	x
	軟體動物	x	0.27 *	x	x	x	x
	多毛蟲	x	x	x	x	x	-0.29 *
	苔蘚蟲	x	0.28 *	x	x	-0.25 *	x
	海鞘	x	x	x	x	x	x
	藤壺	x	x	x	x	x	x
MPT							
	珊瑚	x	x	x	x	x	x
	軟體動物	x	x	x	x	x	x
	多毛蟲	x	-0.31 *	x	x	x	x
	苔蘚蟲	x	x	x	-0.26 *	x	x
	海鞘	x	-0.44 **	x	x	x	x
	藤壺	0.34 **	x	x	x	-0.39 **	x





圖 4-1、 68 年至 82 年底棲動物調查之測站。



註：箭頭所指處為第三核能發電廠開始運轉之時間（Jan *et al.*, 1994）。

圖 4-2、 68-80 年第三核能發電廠附近海域藻類及底棲動物之消長情形。






圖 4-3、 各類底棲動物之幼生形態。



註：Influ-2：入水口灣內北側、Influ-3：入水口北堤外、Influ-5：入水口灣內南側、Influ-10：入水口南堤外、 Influ-11：入水口卸貨碼頭堤防外側外、Efflu：出水口南堤外側小灣水深 8 公尺處、Efflu-2：出水口南堤外側小灣水深 9 公尺處、Efflu-3：出水口南堤外側小灣水深 3 公尺測站、MPT：貓鼻頭、SNS：石牛溪（ ▲ station 1, 2, 3, 4, 5：魚類調查測站；N3C1：海潮流水溫測站）。

圖 4-4、 底棲動物調查之測站。



註：*: $p<0.05$，代表入水口與出水口南側珊瑚成長有顯著差異；　　：兩測站重置珊瑚

圖4-5 軸孔珊瑚在入水口右側(Influ-2)與出水口南堤外側小灣水深8公尺(Efflu)之成長情形。Lost: 流失; new exp.:重置珊瑚




圖 4-6、97 年至 111 年各次(季)入水口珊瑚平均日成長率與颱風相關資料之迴歸相關圖。A. 珊瑚平均日成長率與颱風累計警報天數之圖； B. 珊瑚平均日成長率與颱風期間累計雨量之圖。




圖 4-7、珊瑚在 89-111 年各次(季)各測站附著板之著生情形。(空白組為該站尚未設置或流失)




圖 4-8、軟體動物在 89-111 年各次(季)各測站附著板之著生情形。（空白組為該站尚未設置或流失）




圖 4-9、多毛類在 89-111 年各次(季)各測站附著板之著生情形。（空白組為該站尚未設置或流失）




圖 4-10、苔蘚蟲在 89-111 年各次(季)各測站附著板之著生情形。（空白組為該站尚未設置或流失）




圖 4-11、海鞘在 89-111 年各次(季)各測站附著板之著生情形。(空白組為該站尚未設置或流失)




圖 4-12、藤壺在 89-111 年各次(季)各測站附著板之著生情形。(空白組為該站尚未設置或流失)




圖 4-13、珊瑚在 88-111 年間各測站附著板之著生情形。(空白組為該站流失)




圖 4-14、軟體動物在 88-111 年間各測站附著板之著生情形。(空白組為該站流失)




圖 4-15、多毛類在 88-111 年間各測站附著板之著生情形。(空白組為該站流失)




圖 4-16、苔蘚蟲在 88-111 年間各測站附著板之著生情形。(空白組為該站流失)




圖 4-17、海鞘在 88-111 年間各測站附著板之著生情形。(空白組為該站流失)




圖 4-18、藤壺在 88-111 年間各測站附著板之著生情形。(空白組為該站流失)




圖 4-19、90-111 年間第 1 次（冬）各測站 6 大類底棲動物著生量群聚分析。




圖 4-20、90-111 年間第 2 次（春）各測站 6 大類底棲動物著生量群聚分析。




圖 4-21、90-111 年間第 3 次（夏）各測站 6 大類底棲動物著生量群聚分析。




圖 4-22、90-111 年間第 4 次（秋）各測站 6 大類底棲動物著生量群聚分析。




圖 4-23、珊瑚 87-111 年各測站著生量之相似度群聚分析。虛線：表測站間無顯著差異。




圖 4-24、軟體動物 87-111 年各測站著生量之相似度群聚分析。虛線：表測站間無顯著差異。




圖 4-25、多毛蟲 87-111 年各測站著生量之相似度群聚分析。虛線：表測站間無顯著差異。




圖 4-26、苔蘚蟲 87-111 年各測站著生量之相似度群聚分析。虛線：表測站間無顯著差異。




圖 4-27、海鞘 87-111 年各測站著生量之相似度群聚分析。虛線：表測站間無顯著差異。




圖 4-28、藤壺 87-111 年各測站著生量之相似度群聚分析。虛線：表測站間無顯著差異。




圖 4-29、出水口南側小灣測站之多毛蟲著生量在停機及非停機時期的比較。A. 貓鼻頭（MPT）之著生量為基準；B. 水深 8 公尺處（Efflu）；C. 水深 9 公尺處（Efflu-2）；D. 水深 3 公尺處（Efflu-3）；a, b：表示停機與非停機時期之著生量有顯著差異（T-test, $p<0.05$; b>a）；┅：平均值。




圖 4-30、固定橫截線調查入水口及出水口南側各測線底棲生物之群聚分析。




圖 4-31、固定橫截線調查入水口各測線底棲生物覆蓋率。




圖 4-32、固定橫截線調查出水口南側各測線底棲生物覆蓋率。




圖 4-33、固定橫截線調查入水口及出水口南側各測線白化珊瑚覆蓋率之主成份分析。





圖 4-34、各季固定橫截線調查入水口及出水口南側各測線白化珊瑚平均之物種數隨時間變化圖。



註: *:入水口與出水口有顯著差異(T-test, $p<0.05$); ⬇: 颱風影響; Lt.:流失

圖 4-35、歷年 4 次(季)入、出水口各測站的沉積物沉積量。




圖 4-36、各次(季)颱風之累計警報天數及雨量與入、出水口的沉積物沉積量之迴歸相關圖。A. 颱風累計警報天數對入水口沉積量；B. 颱風雨量對入水口沉積量；C. 季累積雨量對入水口沉積量；D. 颱風累計警報天數對出水口沉積量；E. 颱風雨量對出水口沉積量；F. 季累積雨量對出水口沉積量。




圖 4-37、入水口各測站之日沉積量與各類底棲動物著生量之迴歸相關圖。A. 藤壺；B.；海鞘 C. 苔蘚蟲；D. 多毛蟲；E. 軟體動物；F. 珊瑚。





圖 4-38、入水口內二測站在停機清除附著生物時期及正常運作時期，及在颱風季與非颱風季之沉積量比較。A：北側（Influ-2）;B：南側（Influ-5）(two-way ANOVA, $p<0.05$, b>a)。



註：↓：颱風期；●—●：聖嬰時期；●-●：反聖嬰時期

虛線：為水溫 30°C 及 20°C 之界線

圖 4-39、109-111 年出水口南側及入水口各測站之水溫變化圖。






圖 4-40、94-111 年出水口南側及入水口各測站之各月水溫、Nino3.4、Nino4 及 PDO index 變化圖。A. 月平均溫；B. 月平均最高溫；C.月平均最低溫；D.月平均溫差；E. Nino3.4、Nino4 及 PDO index。




（註：*：T-test, p<0.05）

圖 4-41、出水口南側水深 8 公尺處（Efflu）與水深 3 公尺處（Efflu-3）的珊瑚著生量比較。




（註：*：T-test, p<0.05）

圖 4-42、出水口南側水深 8 公尺處（Efflu）與水深 3 公尺處（Efflu-3）的軟體動物著生量比較。




（註：*：T-test, p<0.05）

圖 4-43、出水口南側水深 8 公尺處（Efflu）與水深 3 公尺處（Efflu-3）的多毛蟲著生量比較。




（註：*：T-test, p<0.05）

圖 4-44、出水口南側水深 8 公尺處（Efflu）與水深 3 公尺處（Efflu-3）的苔蘚蟲著生量比較。



（註：*：T-test, p<0.05）

圖 4-45、出水口南側水深 8 公尺處（Efflu）與水深 3 公尺處（Efflu-3）的海鞘著生量比較。



（註：*：T-test, p<0.05）

圖 4-46、出水口南側水深 8 公尺處（Efflu）與水深 3 公尺處（Efflu-3）的藤壺著生量比較。

伍、魚類調查

一、計畫目的與緣起

為配合南部突飛猛進之經濟建設與工業開發，台灣電力股份有限公司在台灣最南端(馬鞍山附近)興建第三核能發電廠，一、二號機分別自民國 73 年 7 月及 74 年 5 月開始商業運轉。運轉期間有大量冷卻用海水排出，行政院原子能委員會為瞭解第三核能發電廠附近海域在核能發電廠開始運轉前與運轉後之生態系平衡狀況，進行長期調查研究工作。於 68 年 7 月即開始委託中央研究院國際環境科學委員會中國委員會執行該海域生態環境調查研究，運轉後更持續委託中央研究院、台灣大學、中山大學、高雄海專(現為高雄科技大學)等學術單位進行調查，至今已累積多年的生物環境因子、非生物環境因子和海域之漁場經濟效益之調查、統計及評估等研究，建立第三核能發電廠附近海域生物模式的基礎資料。

魚類是海洋生物中位階較高的類別，具觀賞及漁業經濟等價值，第三核能發電廠緊臨南灣海域，該海域分佈著大量的珊瑚礁，棲息在珊瑚礁海域的海洋生物形形色色，其中魚類為灣內的重要資源之一。本計畫經由設定測站，長時間定點調查(圖 5-1、5-2、5-3)以瞭解南灣海域的珊瑚礁魚類種別、數量、魚類群聚之季節性變動，並藉由對照測站之設計(溫排放水影響域及非影響域)以監測南灣海域魚類生態是否受到環境之影響。為能瞭解南灣海域外之經濟性魚類，本研究另針對後壁湖魚市場進行採樣調查，以比較同一季節南灣海域內外水域之魚類群聚組成。

二、文獻回顧

由於沿近海設立核電廠，使海洋生態系統的水文環境受到改變(Tsuchida, 1995)，冷卻水影響局部海水的溫度(Horton and Bridges, 1969)，使得排放口周圍生物密度降低(Bamber,1990)。Poornimaa (2005)研究中指出冷卻水還可能改變影響域內的生物種類組成。魚類是海洋生物中位階較高的類別，具觀賞及漁業經濟等價值，第三核能發電廠緊臨南灣海域，該海域分佈著大量的珊瑚礁，棲息在珊

瑚礁海域的海洋生物形形色色，其中珊瑚礁魚類為灣內的重要資源之一。但研究指出海域物理環境因子中的溫度變化會影響魚類的生長速率、代謝率(Elliott, 1995)；高水溫會引起花身雞魚脊椎彎曲(簡，1996)；不同魚類對環境熱變化的忍受力不同(廖等，2007)。因此，在有溫水源流入的海域，為能確保生態系的平衡，對在該海域生息的生物及其群聚組成的變化有長期追踪監測之必要性。

本計畫研究區域第三核能發電廠附近海域的棲地形態為珊瑚礁地形，因珊瑚礁是全球熱帶、亞熱帶海域特有的岩礁海岸，珊瑚種類繁多，色彩艷麗，是海岸地形中極具遊憩價值之優美景觀，棲居在珊瑚礁海域的海洋生物形形色色，有與珊瑚共生的藻類、魚、蝦蟹、貝類、棘皮動物等，另有些種類則以珊瑚礁區作為棲息、覓食、繁殖和蔽護場所，足見珊瑚礁是海洋地形中極具生產力之區域，很多海洋的資源是由珊瑚礁海域孕育而起，因此，對於珊瑚礁海域海洋資源的合理利用與保育等問題之研究，其重要性自不待言。台灣南部的墾丁海域，由於水溫適宜，水質清澈，且日照充足是極適合珊瑚生長的環境，而該海域確實是台灣本島珊瑚類生長最好，且珊瑚礁發育最完整的海域，73 年墾丁國家公園設立，珊瑚礁區的資源保育即是主要目的之一。許多與墾丁珊瑚礁有關的研究計畫即由此推展開來，如：張與邵 (1986)，張與戴(1987)、張與鄭(1989)即分別對墾丁國家公園海域內魚群群聚的調查、珊瑚種類的分佈及群聚生態學的調查，及軟體動物生態的調查，均有很深入的研究。而第三核能發電廠民國 74 年 5 月發電機組的開始運轉前(民國 68 年)即委託中央研究院國際環境科學委員會中國委員會執行墾丁海域生態環境調查，運轉後更持續委託中央研究院、台灣大學、中山大學、高雄海專(現為高雄海洋科技大學)等學術單位，針對第三核能發電廠溫排水對墾丁國家公國海域內生物及非生物因子可能造成的影響進行調查，而引發另一波研究的熱潮，如：蘇等(1984)、江與王(1987)、黃等(1991)、邱等(1993)。然而不論珊瑚本身的群聚、藻類的群聚、魚類的群聚等生物因子，常會因水文條件，氣候狀況等環境因子的變化而改變，因此，唯有建立長續性的調查研究，才能完全掌握珊瑚礁區的生態脈動。

三、研究方法與進度說明

3.1 珊瑚礁魚類調查

第三核能發電廠附近海域魚類相是採潛水定點觀測進行調查(依環保署公告NIEA E102.20C , 2004)，各測站的選定以位於第三核能發電廠附近海域之珊瑚礁群聚區為主，因珊瑚礁區有較多常棲性的種類，且可藉由其魚類群聚的組成以反應該海域環境生態的變動。另外，為了解溫排放水對珊瑚區之影響，測站之設定亦考量以溫排放水影響域為主軸中心，並選定非影響區作為對照，使調查的測站呈彎曲蛇狀排列(Zig-Zag)。因此，共設定 5 測站，即溫排放水影響域內的 3 站及未受溫排水影響域之對照測站 2 站。測站之排序則由北至南排列(圖 5-3)。各測站之位置、深度及地形特色如下：

測站 1 (21°56'37"N，120°45'0"E)：位於後壁湖漁港東南方，在該海域有一大佬蛄，測站即設於距大佬蛄東方 20 公尺處，此測站水深約 12~16 公尺，海底有 7 座高約 5~6 公尺的連續礁石突起，距連續礁石東南方 15 公尺以外，則為沙地地形。

測站 2 (21°56'22"N，120°44'32"E)：位於後壁湖漁港南方的近岸區，此區礁石為高度約 7~8 公尺之裙礁珊瑚，自海底向上於退潮時礁裙部份常突出水面，往外則是珊瑚的殘枝及碎片，在此區的水深約 2~5 公尺。

測站 3 (21°55'50"N，120°44'35"E)：位於溫排水的主軸，為距排放口約 500 公尺處，水深約 20 公尺，此區為自沿岸向外延伸的珊瑚礁體，除有一較突出，其底為 22 公尺，高 18 公尺之礁體外，另有 2~3 個高約 1~2 公尺之小突出礁體。

測站 4 (21°55'28"N，120°44'12"E)：位於雷打石外海距岸約 250 公尺，為延伸的珊瑚礁，其中止處為砂底，砂地中央有一約長 16 公尺，寬 6 公尺的長方形礁石。此處水深約 13~14 公尺。

測站 5 (21°55'12"N，120°44'18"E)：此測站主體為貓鼻頭潮間帶礁體，該礁體表面平整，有數條長約 30~40 公尺之裂溝向外海延伸，溝深約 1.5~2.5 公尺，寬約 1.5 公尺。此處水深約 12~16 公尺。

3.2 後壁湖販售魚類調查

除配合珊瑚礁區之潛水調查外，本計畫亦進行後壁湖魚市場之漁獲生物相調查，每季 1 次，將後壁湖魚市場販售之魚類相進行拍照及種類鑑定。

四、目前調查研究成果

4.1 民國 110 年 4 次魚類調查結果：

110 年 4 次珊瑚礁魚類相潛水調查及後壁湖漁獲魚類相調查結果如下所示：

第 1 次(民國 110 年 2 月)：本季共記錄珊瑚礁魚類 27 科 62 屬 114 種(表 5-1)，歧異度最高的科別是蝴蝶魚科(Chaetodontidae)記錄 21 種，佔本季記錄種類之 18.4 %，其次依序為隆頭魚科(Labridae)，發現有 20 種，佔本季記錄種類之 17.5 %，雀鯛科(Pomacentridae)，記錄 17 種，佔本季記錄魚類相數之 14.9%，刺尾鯛科(Acanthuridae)記錄 10 種，佔本季發現總魚類數之 8.8% (圖 5-4、圖 5-5)。

本季珊瑚礁魚類豐度較高的魚種(每季發現 10 隻以上)計有 31 種(表 5-1)：

刺尾鯛科(Acanthuridae)的杜氏刺尾鯛(*Acanthurus dussumieri*)、褐斑刺尾鯛(*A. nigrofuscus*)及單角鼻魚(*Naso unicornis*)

烏尾鮗科(Caesionidae)的烏尾鮗(*Caesio caerulaureus*)及雙帶鱗鰭烏尾鮗(*Pterocaesio digramma*)

蝴蝶魚科(Chaetodontidae)的胡麻斑蝴蝶魚(*Chaetodon citrinellus*)、克氏蝴蝶魚(*C. kleinii*)及弓月蝴蝶魚(*C. lunulatus*)

金鱗魚科(Holocentridae)的紫鋸鱗魚(*Myripristis violacea*)及銀帶棘鱗魚(*Sargocentron ittodai*)

隆頭魚科(Labridae)的鈍頭錦魚(*Thalassoma amblycephalus*)、哈氏錦魚(*T. hardwicke*)、詹氏錦魚(*T. jansenii*)及黃衣錦魚(*T. lutescens*)

笛鯛科(Lutjanidae)的黃足笛鯛(*Lutjanus fulvus*)

羊魚科(Mullidae)的多帶海緋鯉(*Parapeneus multifasciatus*)

擬金眼鯛科(Pempheridae)的烏伊蘭擬金眼鯛(*Pempheris oualensis*)

蓋刺魚科(Pomacanthidae)的伏羅式蓋刺魚(*Centropyge vrolickii*)

雀鯛科(Pomacentridae)的橘鈍寬刻齒雀鯛(*Amblyglyphidodon curacao*)、六線雀鯛(*Abedefduf sexfasciatus*)、條紋豆娘魚(*A. vaigiensis*)、細鱗光鰓雀鯛(*Chromis lepidolepis*)、二色光鰓雀鯛(*C. margaritifer*)、三葉光鰓雀鯛(*C.sternatensis*)、藍綠光鰓雀鯛(*C. virides*)、網紋圓雀鯛(*Dascyllas reticulatus*)、三斑圓雀鯛(*D. trimaculatus*)及黑副雀鯛(*Neoglyphidodon melas*)

鸚哥魚科(Scaridae)的史氏鸚哥魚(*Scarus schlegeli*)

鮨科(Serianidae)的絲鰭擬花鮨(*Pseudanthias squamipinnis*)

角蝶魚科(Zanclidae)的角鐮魚(*Zanclus cornutus*)

另外，後壁湖魚市場販售之魚類相調查，本季(2 月)共記錄 16 科 21 屬 45 種(表 5-2)。本季後壁湖魚市場中漁獲豐度較高的種類(每季發現 10 隻以上)，計有 15 種(表 5-2)，為：

刺尾鯛科的杜氏刺尾鯛

鯵科的紅鉗鯵

二齒魨科(Diodontidae)的六斑二齒魨(*Diodon holocanthus*)

笛鯛科(Lutjanidae)的隆背笛鯛(*Lutjanus gibbus*)、正笛鯛(*L. lutjanus*)、四線笛鯛(*L. kasmira*)及五線笛鯛(*L. quinquelineatus*)

鮭科(Salmonidae)的鮭魚(*Oncorhynchus keta*)

鸚哥魚科(Scaridae)的藍點鸚哥魚(*Scarus ghobban*)

鮋科(Scorpaenidae)的無鰾鮋(*Helicolenus hilgendorfi*)

鮨科(Serianidae)的青星九刺鮨(*Cephalopholis miniata*)、黑緣九刺鮨(*Cephalopholis spiloparaea*)、龍虎斑(*Epinephelus fuscoguttatus*♀* *Epinephelus lanceolatus*♂)及星鱠(*Variola louti*)

帶魚科(Trichiuridae)的白帶魚(*Trichiurus lepturus*)

第 2 次(民國 110 年 5 月)：於本季調查珊瑚礁魚類得知本海域之魚類相(表 5-3)為 29 科 72 屬 153 種，歧異度較高的科分別為隆頭魚科，記錄 36 種，佔本季發現總魚類數之 23.5%，其次為依序為雀鯛科記錄 24 種，佔本季記錄魚類相數之 15.7%；蝴蝶魚科記錄 18 種，佔本季記錄魚類相數之 11.8%及刺尾鯛科(Acanthuridae)記錄 9 種，佔本季發現總魚類數之 5.9% (圖 5-4、圖 5-5)。

珊瑚礁魚類豐度較高的魚種(每季發現 10 隻以上)計有 30 種(表 5-3)：

刺尾鯛科的褐斑刺尾鯛、黑背鼻魚(*Naso lituratus*)及小高鰭刺尾鯛(*Zebrasoma scopas*)

烏尾鮗科的黃藍背烏尾鮗(*Caesio teres*)

蝴蝶魚科的克氏蝴蝶魚、鏡斑蝴蝶魚(*Chaetodon speculum*)及飄浮蝴蝶魚(*C. vagabundus*)

金鱗魚科的台灣松毬(*Myripristis formosa*)及康德鋸鱗魚(*M. kuntee*)

隆頭魚科的裂唇魚(*Labroides dimidiatus*)、雲斑海豬魚(*Halichoeres hortulanus*)、鈍頭錦魚、哈氏錦魚(*Thalassoma hardwickii*)及黃衣錦魚

笛鯛科的黃足笛鯛

羊魚科的金帶擬鬚鯛(*Mulloidichthys vanicolensis*)及多帶海鯡鯉

金線魚科的雙帶眶棘鱸(*Scolopsis bilineatus*)

擬金眼鯛科的烏伊蘭擬金眼鯛

雀鯛科的橘鈍寬刻齒雀鯛、條紋豆娘魚、二色光鰓雀鯛、三葉光鰓雀鯛、藍綠光鰓雀鯛、網紋圓雀鯛、三斑圓雀鯛及黑副雀鯛

鸚哥魚科的福氏鸚哥魚(*Scarus forsteni*)及史氏鸚哥魚

角蝶魚科的角鐮魚

後壁湖魚市場第 2 次(5 月)的調查共計漁獲 18 科 22 屬 35 種(表 5-2)，漁獲豐度較高的種類(每季發現 10 隻以上)，共計 13 種，為：

刺尾鯛科的杜氏刺尾鯛

二齒魨科的六斑二齒魨

鰭科(Coryphaenidae)的鬼頭刀(*Coryphaena hippurus*)

飛魚科的黑鰭飛魚(*Cheilopogon cyanopterus*)、白鰭飛魚(*C. unicolor*)及斑鰭飛魚(*Cypselurus poecilopterus*)

金鱗魚科的康德松毬(*Myripristis kuntee*)

笛鯛科的隆背笛鯛及藍色擬烏尾冬(*Paracaesio caeruleus*)

羊魚科的黃線擬鬚鯛(*Mulloidichthys falvolineatus*)

鮭科的鮭魚

鸚哥魚科的雜紋鸚哥魚(*Scarus rivulatus*)

鮨科的龍虎斑

第 3 次(民國 110 年 8 月)：於本季調查珊瑚礁魚類得知本海域之魚類相(表 5-4)為 29 科 66 屬 132 種，歧異度較高的科分別為隆頭魚科，記錄 31 種，佔本季發現總魚類數之 23.5%，其次為依序為雀鯛科記錄 24 種，佔本季記錄魚類相數之 18.2%；蝴蝶魚科記錄 18 種，佔本季記錄魚類相數之 13.6%及刺尾鯛科(Acanthuridae)記錄 10 種，佔本季發現總魚類數之 7.6% (圖 5-4、圖 5-5)。

珊瑚礁魚類豐度較高的魚種(每季發現 10 隻以上)計有 31 種(表 5-4)：

刺尾鯛科的褐斑刺尾鯛及雙斑櫛齒刺尾鯛

烏尾鮗科的雙帶鱗鰭烏尾鮗及烏尾鮗

蝴蝶魚科的克氏蝴蝶魚、弓月蝴蝶魚及飄浮蝴蝶魚

金鱗魚科(Holocentridae)的康德鋸鱗魚

隆頭魚科的雲斑海豬魚、黑額海豬魚、裂唇魚、鈍頭錦魚、哈氏錦魚、詹氏錦魚、黃衣錦魚及五帶錦魚

擬金眼鯛科的烏伊蘭擬金眼鯛

雀鯛科的橘鈍寬刻齒雀鯛、條紋豆娘魚、六線豆娘魚、二色光鰓雀鯛、藍綠光鰓雀鯛、網紋圓雀鯛、三斑圓雀鯛、黑副雀鯛、黑褐副雀鯛、霓虹雀鯛及菲律賓雀鯛

鮨科的絲鰭擬花鮨

四齒魨科的瓦氏尖鼻魨

角蝶魚科的角鐮魚

後壁湖魚市場第 3 次(8 月)的調查共計漁獲 17 科 25 屬 43 種(表 5-2)，漁獲豐度較高的種類(每季發現 10 隻以上)，共計 12 種，為：

刺尾鯛科的杜氏刺尾鯛

鯵科的紅舶鯵

笛鯛科的長尾濱鯛(*Etelis coruscans*)、隆背笛鯛及絲鰭姬鯛(*Pristipomoides filamentosus*)

鯔科(Mugilidae)的大鱗鮻(*Planiliza macrolepis*)

羊魚科的多帶海緋鯉(*Parupeneus multifasciatus*)

雀鯛科的條紋豆娘魚及六線豆娘魚

鮭科的鮭魚

鮪科的無鰾鮪

鮨科的龍虎斑

第 4 次(民國 110 年 11 月)：於本季調查珊瑚礁魚類得知本海域之魚類相(表 5-5)為 32 科 71 屬 146 種，歧異度較高的科分別為隆頭魚科，記錄 30 種，佔本季發現總魚類數之 20.5%，其次為依序為雀鯛科記錄 25 種，佔本季記錄魚類相數之 17.1%；蝴蝶魚科記錄 21 種，佔本季記錄魚類相數之 14.4%及刺尾鯛科(Acanthuridae)記錄 8 種，佔本季發現總魚類數之 5.5% (圖 5-4、圖 5-5)。

珊瑚礁魚類豐度較高的魚種(每季發現 10 隻以上)計有 30 種(表 5-5)：

刺尾鯛科的褐斑刺尾鯛

烏尾鮗科的雙帶鱗鰭烏尾鮗及烏尾鮗

蝴蝶魚科的克氏蝴蝶魚

隆頭魚科的雜色尖嘴魚、黑星紫胸魚、鈍頭錦魚、哈氏錦魚及黃衣錦魚

笛鯛科的白斑笛鯛、黃足笛鯛、單斑笛鯛及五線笛鯛

羊魚科(Mullidae)的金帶擬鬚鯛

金線魚科的雙帶眶棘鱸

擬金眼鯛科的烏伊蘭擬金眼鯛

雀鯛科的橘鈍寬刻齒雀鯛、條紋豆娘魚、二色光鰓雀鯛、三葉光鰓雀鯛、藍綠光鰓雀鯛、網紋圓雀鯛、三斑圓雀鯛、黑副雀鯛、黑褐副雀鯛及霓虹雀鯛

鸚哥魚科的福氏鸚哥魚及史氏鸚哥魚

鮨科的絲鰭擬花鮨

角蝶魚科的角鑌魚

後壁湖魚市場第 4 次(11 月)的調查共計漁獲 23 科 26 屬 36 種(表 5-2)，漁獲豐度較高的種類(每季發現 10 隻以上)，共計 11 種，為：

刺尾鯛科的杜氏刺尾鯛

鯵科的紅舡鯵

石鱸科(Haemulidae)的雷氏胡椒鯛(*Plectorhinchus lessonii*)

笛鯛科的隆背笛鯛及絲鰭姬鯛

鯖科的大鱗鯖

羊魚科的金帶擬鬚鯛

鮭科的鮭魚

金錢魚科(Scatophagidae)的金錢魚(*Scatophagus argus*)

鮣科的無鰾鮣

鮨科的龍虎斑

綜合民國 110 年 4 次的採樣調查，第三核能發電廠附近海域之珊瑚礁魚類相共記錄 36 科 89 屬 224 種(表 5-6)，歧異度方面以隆頭魚科(48 種)最高，是本海域同階生態地位利用較完整的科別，其次為雀鯛科(33 種)；數量方面以雀鯛科的族群量最多。此外，後壁湖魚市場 110 年 4 次的調查共記錄 30 科 47 屬 86 種魚類相，合併珊瑚礁魚類相及後壁湖魚類相 2 種調查方式所記錄到的魚種，110 年 4 次魚類調查部份共記錄 47 科 117 屬 281 種(表 5-4)。

本研究珊瑚礁魚類相調查的海域為沿近海域，是多數魚類幼生棲息的場所，本計畫 110 年第 1 次觀測到核三廠附近海域珊瑚礁魚類相新加入的補充群(幼魚)有 7 種，種類為雜色尖嘴魚、中胸狐鯛、蓋馬氏盔魚、二色光鰓雀鯛、克氏雙鋸魚、黑副雀鯛及網紋圓雀鯛；第 2 次調查記錄到 14 種，種類為蓋馬氏盔魚、藍身絲鰭鸚鯛、紅緣絲鰭鸚鯛、花鰭副海豬魚、黑星紫胸魚、三線紫胸魚、背斑盔魚、鈍頭錦魚、粒突箱鮭、藍綠光鰓雀鯛、三帶圓雀鯛、三斑圓雀鯛、網紋圓雀鯛及藍頭綠鸚哥魚；第 3 次調查記錄到 10 種，種類為蓋馬氏盔魚、背斑盔魚、雜色尖嘴魚、黑緣絲鰭鸚鯛、雲斑海豬魚、鈍頭錦魚、條紋豆娘魚、黑副雀鯛、黑褐副雀鯛及疊波蓋刺魚；第 4 次調查記錄到 6 種，種類為雜色尖嘴魚、二色光鰓雀鯛、三斑圓雀鯛、網紋圓雀鯛、黑副雀鯛及黑褐副雀鯛。

為了解溫排放水對珊瑚區之影響，本研究以溫排放水影響域為主軸中心，並選定非影響區作為對照，設定 5 測站，其中，測站 3~測站 5 位於溫排放水影響域內，測站 1~測站 2 則位於未受溫排水影響域內。

分析民國 110 年 4 次 5 個測站所記錄之珊瑚礁魚類魚類相組成：如下所示，參考表 5-1、表 5-3、表 5-4、表 5-5、表 5-7 及圖 5-6 及圖 5-7 所示：

測站 1：本測站 4 次(民國 110 年 2 月、5 月、8 月及 11 月)採樣依序記錄 49 種、70 種、47 種及 60 種，合計共記錄 31 科 69 屬 116 種珊瑚礁魚類相。其中隆頭魚科記錄 25 種最多，佔本測站發現種類數之 21.6%；其次為蝴蝶魚科及雀鯛科，依序記錄 18 種及 17 種，分佔本測站發現種類之 15.5%及 14.7%。本測站 4 次調查的優勢魚種依序為雙帶鱗鰭烏尾鮗(52 尾)、條紋豆娘魚(125 尾)、條紋豆娘魚(42 尾)、網紋圓雀鯛(73 尾)。

測站 2：本測站第 1 次(民國 110 年 2 月)記錄 55 種；第 2 次(5 月)記錄 65 種；第 3 次(8 月)記錄 67 種；第 4 次(11 月)記錄 58 種，合計共記錄 29 科 61 屬 124 種珊瑚礁魚類相，其中雀鯛科記錄 25 種為最多，佔本測站發現種類之 20.2%；其次為隆頭魚科及蝴蝶魚科，依序記錄 23 種及 12 種，分佔本測站發現種類之 18.5%及 9.7%。本測站 4 次記錄到的優勢魚種烏尾鮗(62 尾)、藍綠光鰓雀鯛(172 尾)、藍綠光鰓雀鯛(139 尾)、網紋圓雀鯛(252 尾)。

測站 3：本測站第 1 次記錄 40 種、第 2 次記錄 66 種、第 3 次記錄 59 種、第 4 次記錄 59 種，共記錄 29 科 59 屬 115 種珊瑚礁魚類相。其中隆頭魚科記錄 27 種最多，佔本測站發現種類數之 23.5%；其次為蝴蝶魚科及雀鯛科，依序記錄 17 種及 16 種，分佔本測站發現種類之 14.8%及 13.9%。本測站 4 次記錄到的優勢魚種雙帶鱗鰭烏尾鮗(36 尾)、烏伊蘭擬金眼鯛(32 尾)、雙帶鱗鰭烏尾鮗(46 尾)、雙帶鱗鰭烏尾鮗(158 尾)。

測站 4：本測站第 1 次記錄 42 種、第 2 次記錄 55 種、第 3 次記錄 48 種、第 4 次記錄 55 種，本年度 4 次共發現 25 科 57 屬 115 種珊瑚礁魚類相。其中隆頭魚科記錄 33 種最多，佔本測站發現種類數之 28.7%；其次為雀鯛科及蝴蝶魚科，依序記錄 22 種及 15 種，分佔本測站發現種類之 19.1%及 13.0%。第 1 次記錄到的優勢種為細鱗光鰓雀鯛(37 尾)；第 2 次為黃衣錦魚(數量有 22 尾)；第 3 次為黃衣錦魚(數量有 25 尾) ；第 4 次為鈍頭錦魚(數量有 23 尾)。

測站 5：本測站 4 次調查發現的魚類相依序為 49 種、64 種、49 種及 47 種，合計發現 24 科 61 屬 118 種珊瑚礁魚類相。優勢科別為隆頭魚科記錄 33 種最多，佔本測站發現種類數之 28.0%；其次為蝴蝶魚科及雀鯛科，依序記錄 19 種及 16 種，分佔本測站發現種類之 16.1%及 13.6%。本年度 4 次的優勢魚種依序為條紋豆娘魚(發現 72 尾)、二色光鰓雀鯛(發現 72 尾)、鈍頭錦魚(135 尾)、二色光鰓雀鯛(35 尾)。

分析 5 個測站之珊瑚礁魚類相群聚組成，發現第 1 次調查(民國 110 年 2 月)測站 3 與測站 5 相似度較高(0.41) (表 5-8)；第 2 次調查(5 月)測站 1 與測站 5 相似度較高(0.43) (表 5-9)；第 3 次調查(8 月)測站 1 與測站 3 相似度較高(0.38) (表 5-10)；第 4 次調查(11 月)測站 3 與測站 5 相似度較高(0.31) (表 5-11)。民國 110 年 4 次於溫排水影響域及非影響域海域內皆可發現到的魚類相有 125 種(表 5-7)，經由 Jaccard coefficient 數值分析，計算各測站魚種之相似度，得知測站 1 與測站 3 及測站 3 與測站 4 相似度最高，為 0.50(表 5-12)，其餘測站間之相似度均低於此值，顯示本海域不同測站棲息之魚類相差異大。本年度 4 次調查 5 個測站記錄到的種類數介於 115 種~124 種之間，測站 2 記錄了 124 種為本海域魚類相記錄較豐富的測站(圖 5-7)；測站 3 及測站 4 皆記錄 115 種，是種類數偏低的測站。

4.2 民國 111 年 4 次魚類調查結果：

111 年 4 次珊瑚礁魚類相潛水調查及後壁湖漁獲魚類相調查結果如下所示：

第 1 次(民國 111 年 2 月)：本季共記錄珊瑚礁魚類 31 科 66 屬 128 種(表 5-13)，歧異度最高的科別是雀鯛科(Pomacentridae)記錄 25 種，佔本季記錄種類之 19.5 %，其次依序為隆頭魚科(Labridae)，發現有 23 種，佔本季記錄種類之 18.0 %，蝴蝶魚科(Chaetodontidae)，記錄 18 種，佔本季記錄魚類相數之 14.8%，刺尾鯛科(Acanthuridae)記錄 8 種，佔本季發現總魚類數之 6.3% (圖 5-8、圖 5-9)。

本季珊瑚礁魚類豐度較高的魚種(每季發現 10 隻以上)計有 38 種(表 5-13)：

刺尾鯛科的杜氏刺尾鯛、雙斑櫛齒刺尾鯛、單角鼻魚及小高鰭刺尾鯛

烏尾鮗科的烏尾鮗及雙帶鱗鰭烏尾鮗

蝴蝶魚科的克氏蝴蝶魚、弓月蝴蝶魚及飄浮蝴蝶魚

金鱗魚科的康德鋸鱗魚

隆頭魚科的藍身絲鰭鸚鯛、雜色尖嘴魚、裂唇魚、雲斑海豬魚、鈍頭錦魚、哈氏錦魚(*Thalassoma hardwickii*)及黃衣錦魚

笛鯛科的金帶擬鬚鯛

金線魚科的雙帶眶棘鱸

擬金眼鯛科的烏伊蘭擬金眼鯛

雀鯛科的橘鈍寬刻齒雀鯛、六線雀鯛、條紋豆娘魚、克氏雙鋸魚、二色光鰓雀鯛、藍綠光鰓雀鯛、網紋圓雀鯛、三斑圓雀鯛、三帶圓雀鯛(*Dascyllas aruanus*)、黑副雀鯛及菲律賓雀鯛(*Pomacentrus philippinus*)

鸚哥魚科的福氏鸚哥魚、橫紋鸚哥魚、雜紋鸚哥魚、紅紫鸚哥魚及史氏鸚哥魚

鮨科的絲鰭擬花鮨

角蝶魚科的角鑌魚

另外，後壁湖魚市場販售之魚類相調查，本季(2 月)共記錄 16 科 21 屬 31 種(表 5-14)。本季後壁湖魚市場中漁獲豐度較高的種類(每季發現 10 隻以上)，計有 17 種(表 5-2)，為：

刺尾鯛科的杜氏刺尾鯛

烏尾鮗科的雙帶鱗鰭烏尾鮗

鱒科的紅鮭鱒

二齒魨科的六斑二齒魨

笛鯛科的長尾濱鯛、銀紋笛鯛、隆背笛鯛、正笛鯛及四線笛鯛

鮭科的鮭魚

鸚哥魚科的藍點鸚哥魚

鯖科(Scombridae)的黃鰭鮪(*Thunnus albacares*)

鮪科的無鰾鮪

鯻科的青星九刺鯻、黑緣九刺鯻及龍虎斑

帶魚科的白帶魚

第 2 次(民國 111 年 5 月)：於本季調查珊瑚礁魚類得知本海域之魚類相(表 5-15)為 31 科 70 屬 134 種，歧異度較高的科分別為隆頭魚科，記錄 27 種，佔本季發現總魚類數之 20.1%，其次為依序為雀鯛科記錄 21 種，佔本季記錄魚類相數之 15.7%；蝴蝶魚科記錄 18 種，佔本季記錄魚類相數之 13.4%及刺尾鯛科(Acanthuridae)記錄 10 種，佔本季發現總魚類數之 7.5% (圖 5-8、圖 5-9)。

珊瑚礁魚類豐度較高的魚種(每季發現 10 隻以上)計有 27 種(表 5-3)：

刺尾鯛科的褐斑刺尾鯛、雙斑櫛齒刺尾鯛、黑背鼻魚及小高鰭刺尾鯛

烏尾鮗科的烏尾鮗及雙帶鱗鰭烏尾鮗

蝴蝶魚科的克氏蝴蝶魚

隆頭魚科的雜色尖嘴魚、鈍頭錦魚、哈氏錦魚及黃衣錦魚

笛鯛科的五線笛鯛(*Lutjanus quinquelineatus*)

羊魚科的金帶擬鬚鯛

擬金眼鯛科的烏伊蘭擬金眼鯛

雀鯛科的條紋豆娘魚、二色光鰓雀鯛、藍綠光鰓雀鯛、網紋圓雀鯛、三斑圓雀鯛、三帶雀鯛、黑副雀鯛及霓虹雀鯛(*Pomacentrus coelestis*)

鸚哥魚科的福氏鸚哥魚、橫紋鸚哥魚及史氏鸚哥魚

鯻科的絲鰭擬花鯻

角蝶魚科的角鐮魚

後壁湖魚市場第 2 次(5 月)的調查共計漁獲 26 科 34 屬 48 種(表 5-14)，漁獲豐度較高的種類(每季發現 10 隻以上)，共計 17 種，為：

刺尾鯛科的杜氏刺尾鯛

鯵科的紅舡鯵

二齒魨科的六斑二齒魨

鰶科的鬼頭刀

飛魚科的黑鰭飛魚、白鰭飛魚及斑鰭飛魚

金鱗魚科的康德鋸鱗魚

笛鯛科的長尾濱鯛、隆背笛鯛、海雞母笛鯛(*Lutjanus rivulatus*)及藍色擬烏尾冬

鮭科的鮭魚

鸚哥魚科的雜紋鸚哥魚

鮨科的龍虎斑及星鱠

帶魚科的白帶魚

第 3 次(民國 111 年 8 月)：於本季調查珊瑚礁魚類得知本海域之魚類相(表 5-16)為 27 科 62 屬 125 種，歧異度較高的科分別為隆頭魚科，記錄 27 種，佔本季發現總魚類數之 21.6%，其次為依序為雀鯛科記錄 23 種，佔本季記錄魚類相數之 18.4%；蝴蝶魚科記錄 18 種，佔本季記錄魚類相數之 14.4%及刺尾鯛科(Acanthuridae)記錄 6 種，佔本季發現總魚類數之 4.8%(圖 5-8、圖 5-9)。

珊瑚礁魚類豐度較高的魚種(每季發現 10 隻以上)計有 21 種(表 5-16)：

刺尾鯛科的褐斑刺尾鯛及雙斑櫛齒刺尾鯛

蝴蝶魚科的克氏蝴蝶魚

隆頭魚科的裂唇魚、鈍頭錦魚、黃衣錦魚及新月錦魚

雀鯛科的條紋豆娘魚、六線豆娘魚、細鱗光鰓雀鯛(*Chromis lepidolepis*)、二色光鰓雀鯛、藍綠光鰓雀鯛、魏氏光鰓雀鯛(*Chromis weberi*)、三帶圓雀鯛、網紋圓雀鯛、三斑圓雀鯛、黑副雀鯛及菲律賓雀鯛

鸚哥魚科的橫紋鸚哥魚及紅紫鸚哥魚

角蝶魚科的角鑌魚

後壁湖魚市場第 3 次(8 月)的調查共計漁獲 18 科 29 屬 38 種(表 5-14)，漁獲豐度較高的種類(每季發現 10 隻以上)，共計 9 種，為：

鯵科的紅舡鯵

笛鯛科的隆背笛鯛、海雞母笛鯛、藍色擬烏尾冬及黃擬烏尾冬(*Paracaesio xanthurus*)

鮭科的鮭魚

鸚哥魚科的藍點鸚哥魚(*Scarus ghobban*)

鮨科的龍虎斑及粗斑花鱸(*Holanthias borbonius*)

第 4 次(民國 111 年 11 月)：於本季調查珊瑚礁魚類得知本海域之魚類相(表 5-17)為 28 科 69 屬 136 種，歧異度較高的科分別為雀鯛科，記錄 26 種，佔本季發現總魚類數之 19.1%，其次為依序為隆頭魚科記錄 24 種，佔本季記錄魚類相數之 17.6%；蝴蝶魚科記錄 21 種，佔本季記錄魚類相數之 15.4%及刺尾鯛科(Acanthuridae)記錄 9 種，佔本季發現總魚類數之 6.6% (圖 5-4、5-5)。

珊瑚礁魚類豐度較高的魚種(每季發現 10 隻以上)計有 33 種(表 5-17)：

刺尾鯛科的褐斑刺尾鯛、雙斑櫛齒刺尾鯛及小高鰭刺尾鯛

鰧科(Blenniidae)的黑帶稀棘鰧(*Meiacanthus grammistes*)

烏尾鮗科的烏尾鮗及雙帶鱗鰭烏尾鮗

蝴蝶魚科的克氏蝴蝶魚

金鱗魚科的康德鋸鱗魚

隆頭魚科的藍身絲鰭鸚鯛、雲斑海豬魚、黑帶海豬魚、鈍頭錦魚、哈氏錦魚及黃衣錦魚

笛鯛科的白斑笛鯛、黃足笛鯛、單斑笛鯛及五線笛鯛

羊魚科的黃帶擬鬚鯛及金帶擬鬚鯛

金線魚科的雙帶眶棘鱸

雀鯛科的橘鈍寬刻齒雀鯛、條紋豆娘魚、六線豆娘魚、二色光鰓雀鯛、藍綠光鰓雀鯛、魏氏光鰓雀鯛、網紋圓雀鯛、三斑圓雀鯛、黑副雀鯛、黑褐副雀鯛、霓虹雀鯛及菲律賓雀鯛

鸚哥魚科的紅紫鸚哥魚及史氏鸚哥魚

鮨科的絲鰭擬花鮨

角蝶魚科的角鑌魚

後壁湖魚市場第 4 次(11 月)的調查共計漁獲 20 科 26 屬 37 種(表 5-14)，漁獲豐度較高的種類(每季發現 10 隻以上)，共計 7 種，為：

鯵科的紅鉗鯵

笛鯛科的隆背笛鯛

雀鯛科的條紋豆娘魚

鮭科的鮭魚

鯖科的棘鰆(*Acanthocybium solandii*)

鮨科的龍虎斑及白緣星鱠(*Variola albimarginata*)

綜合民國 111 年 4 次的採樣調查，第三核能發電廠附近海域之珊瑚礁魚類相共記錄 35 科 88 屬 199 種，歧異度方面以隆頭魚科(39 種)最高，是本海域同階生態地位利用較完整的科別，其次為雀鯛科(34 種)；數量方面以雀鯛科的族群量最多。此外，後壁湖魚市場 111 年 4 次的調查共記錄 30 科 46 屬 72 種魚類相，合併珊瑚礁魚類相及後壁湖魚類相 2 種調查方式所記錄到的魚種，111 年 4 次魚類調查部份共記錄 45 科 114 屬 244 種(表 5-18)。

本研究珊瑚礁魚類相調查的海域為沿近海域，是多數魚類幼生棲息的場所，本計畫 111 年第 1 次觀測到核三廠附近海域珊瑚礁魚類相新加入的補充群(幼魚)有 6 種，種類有鈍頭錦魚、黃衣錦魚、朱斑大咽齒鯛、三帶圓雀鯛、三斑圓雀鯛及網紋圓雀鯛；第 2 次調查記錄到 17 種，種類有川紋蝴蝶魚、雜色尖嘴魚、蓋馬氏盔魚、背斑盔魚、藍身絲鰭鸚鯛、丁氏絲鰭鸚鯛、珠斑大咽齒鯛、鈍頭錦魚、雲斑海豬魚、二色光鰓雀鯛、三帶圓雀鯛、三斑圓雀鯛、網紋圓雀鯛、克氏雙鋸魚、黑副雀鯛、黑褐副雀鯛及藍頭綠鸚哥魚；第 3 次調查記錄到 14 種，種類有雙斑櫛齒刺尾鯛、雜色尖嘴魚、蓋馬氏盔魚、藍身絲鰭鸚鯛、中胸狐鯛、狹帶全裸鸚鯛、裂唇魚、鈍頭錦魚、黃衣錦魚、克氏雙鋸魚、二色光鰓雀鯛、三帶圓雀鯛、網紋圓雀鯛及藍綠光鰓雀鯛；第 4 次調查記錄到 10 種，種類有雜色尖嘴魚、藍身絲鰭鸚鯛、背斑盔魚、鈍頭錦魚、三斑圓雀鯛、克氏雙鋸魚、黑副雀鯛、網紋圓雀鯛、藍綠光鰓雀鯛及雙色鯨鸚哥魚。

為了解溫排放水對珊瑚區之影響，本研究以溫排放水影響域為主軸中心，並選定非影響區作為對照，設定 5 測站，其中，測站 3~測站 5 位於溫排放水影響域內，測站 1~測站 2 則位於未受溫排水影響域內。

分析民國 111 年 4 次 5 個測站所記錄之珊瑚礁魚類魚類相組成：如下所示，參考表 5-13、表 5-15、表 5-16、表 5-17、表 5-19 及圖 5-10 及圖 5-11 所示：

測站 1：本測站 4 次(民國 111 年 2 月、5 月、8 月及 11 月)採樣依序記錄 60 種、68 種、57 種及 62 種，合計共記錄 29 科 65 屬 136 種珊瑚礁魚類相。以隆頭魚科及雀鯛科皆記錄 24 種最多，各佔本測站發現種類數之 17.6%；其次為蝴蝶魚科，記錄 18 種，佔本測站發現種類之 13.2%。本測站 4 次調查的優勢魚種依序為六線豆娘魚(47 尾)、二色光鰓雀鯛(52 尾)、條紋豆娘魚(42 尾)、藍綠光鰓雀鯛(75 尾)。

測站 2：本測站第 1 次(民國 1110 年 2 月)記錄 67 種；第 2 次(5 月)記錄 53 種；第 3 次(8 月)記錄 51 種；第 4 次(11 月)記錄 71 種，合計共記錄 28 科 61 屬 121 種珊瑚礁魚類相，以隆頭魚科記錄 23 種為最多，佔本測站發現種類之 19.0%；其次為雀鯛科及蝴蝶魚科，依序記錄 21 種及 20 種，分

佔本測站發現種類之 17.4%及 16.5%。本測站 4 次記錄到的優勢魚種雙帶鱗鰭烏尾鮗(155 尾)、二色光鰓雀鯛(26 尾)、網紋圓雀鯛(116 尾)、條紋豆娘魚(83 尾)。

測站 3：本測站第 1 次記錄 57 種、第 2 次記錄 52 種、第 3 次記錄 48 種、第 4 次記錄 62 種，共記錄 26 科 60 屬 107 種珊瑚礁魚類相。其中隆頭魚科記錄 22 種最多，佔本測站發現種類數之 20.6%；其次為雀鯛科及蝴蝶魚科，依序記錄 18 種及 17 種，分佔本測站發現種類之 16.8%及 15.9%。本測站 4 次記錄到的優勢魚種雙帶鱗鰭烏尾鮗(127 尾)、網紋圓雀鯛(56 尾)、二色光鰓雀鯛(28 尾)、金帶擬鬚鯛(78 尾)。

測站 4：本測站第 1 次記錄 56 種、第 2 次記錄 65 種、第 3 次記錄 58 種、第 4 次記錄 53 種，本年度 4 次共發現 26 科 63 屬 122 種珊瑚礁魚類相。以隆頭魚科記錄 30 種最多，佔本測站發現種類數之 24.6%；其次為雀鯛科及蝴蝶魚科，依序記錄 19 種及 17 種，分佔本測站發現種類之 15.6%及 13.9%。第 1 次記錄到的優勢種為鈍頭錦魚(42 尾)；第 2 次為鈍頭錦魚(數量有 73 尾)；第 3 次為二色光鰓雀鯛(28 尾)；第 4 次為二色光鰓雀鯛(67 尾)。

測站 5：本測站 4 次調查發現的魚類相依序為 42 種、38 種、52 種及 60 種，合計發現 26 科 62 屬 114 種珊瑚礁魚類相。優勢科別為隆頭魚科記錄 22 種最多，佔本測站發現種類數之 19.3%；其次為雀鯛科及蝴蝶魚科，依序記錄 20 種及 16 種，分佔本測站發現種類之 17.5%及 14.0%。本年度 4 次的優勢魚種依序為雙帶鱗鰭烏尾鮗(57 尾)、網紋圓雀鯛(192 尾)、二色光鰓雀鯛(42 尾)、二色光鰓雀鯛(51 尾)。

分析 5 個測站之珊瑚礁魚類相群聚組成，發現第 1 次調查(民國 111 年 2 月)測站 2 與測站 4 相似度較高(0.38) (表 5-20)；第 2 次調查(5 月)測站 1 與測站 3 相似度較高(0.43) (表 5-21)；第 3 次調查(8 月)測站 1 與測站 3 及測站 3 與測站 4 相似度較高(0.38) (表 5-22)；第 4 次調查(11 月)測站 3 與測站 4 相似度較高(0.44) (表 5-23)。民國 111 年 4 次於溫排水影響域及非影響域海域內皆可發現到的魚類相有 129 種(表 5-19)，經由 Jaccard coefficient 數值分析，計算各測站魚種之相似度，測站 2 與測站 4 相似度最高，為 0.62(表 5-24)，其餘測站間之相似度均低於此值，顯示本海域不同測站棲息之魚類相差異大。本年度 4 次調查 5 個測站記錄到的種類數介於 107 種~136 種之間，測站 1 記錄了 137 種為本海域魚類相記錄較豐富的測站(圖 5-10)；測站 3 記錄 107 種，是種類數偏低的測站。

4.3 歷年魚類調查研究回顧

第三核能發電廠附近海域之魚類相調查共分二部份進行，珊瑚礁魚類相的部份從82年開始，後壁湖魚市場漁獲種類的調查自民國87年開始(表5-25)，二項調查至目前為止共記錄第三核能發電廠附近海域的魚類相有112科309屬845種，隨著調查次數的增加，本海域記錄到的魚種數亦呈現上升趨勢，魚類相組成中，科別歧異度最大為隆頭魚科(113種)，其次為雀鯛科(74種)及笛鯛科(41種)。而屬間種類數記錄最高者為蝴蝶魚科中之蝴蝶魚屬(*Chaetodon*)，第三核能發電廠附近海域歷年來調查共記錄38種。由於邵等(1993)曾記錄墾丁海域魚類相有1,200種之多，顯示墾丁海域擁有多樣的魚類相。

觀察歷年第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚類種類數及尾數的變動情形(圖5-12、圖5-13)，5個測站魚種數平均值介於38種(測站4)~47種(測站2)之間；5個測站魚尾數平均值介於183尾(測站4)~439尾(測站2)之間，由於後壁湖海洋資源保護示範區(94年3月成立)，其劃設地點係位於本計畫測站2的區域，分析歷年四季記錄到珊瑚礁魚種數，發現94年成立後壁湖海洋資源保護示範區(S2)後，本海域各測站記錄到的魚種數有增加的現象。

歷年各次採樣中，刺尾鯛科、蝴蝶魚科、隆頭魚科及雀鯛科為本計畫珊瑚礁魚類相的主要組成魚種，此4科種類組成在調查期間累計種類數百分比佔歷年各次魚類相的44%~71%之間(圖5-14)，歷次調查中，除民國90年第1季、第3季、91年第1季及108年第2季4次採樣中隆頭魚科及雀鯛科記錄到的魚種數一樣並列為優勢大科，其餘各季的採樣中，隆頭魚科為優勢大科的頻率有82次，雀鯛科有16次，蝴蝶魚科有4次，整體而言，本海域常見到魚種為隆頭魚科(圖5-15)。

分析民國85年至111年調查期間各測站珊瑚礁魚類相的組成，發現第1測站在民國85年、100年、101年及109年主要記錄到的魚類相為蝴蝶魚科，87年、94年、106年及109年為雀鯛科，107年及111年隆頭魚科及雀鯛科記錄的種類數相同，其餘年度皆以隆頭魚科記錄到種類數較高；第2測站歷次調查主要的魚種組成為隆頭魚科及雀鯛科，110年雀鯛科的魚種數較多；第3測站主要的魚種組成在不同年間有變更的情形，86年及88年及102年以蝴蝶魚科為主，87年、94年及95年則以雀鯛科為主，108年調查隆頭魚科及雀鯛科記錄到的種類數相同，其餘年度則以隆頭魚科為主；第4測站主要的魚種組成以隆頭魚科及雀鯛科出現的種類數較多，108年至111年主要記錄到的魚類相以隆頭魚科為主；第5測站主要的魚種組成在88年前以蝴蝶魚科為主，108年至111年主要記錄到的魚類相以隆頭魚科為主(圖5-16)。上述資料顯示第三核能發電廠附近海域測站間的魚種組成除了受到年間變動的影響，也受到棲所環境的影響呈現差異。

進一步分析5個測站珊瑚礁魚類的群聚組成，探討受溫排水影響區(測站3、4、5)與未影響區之間(測站1、2)魚類群聚組成變化，以MDS二度空間排序後發現，未受溫排水影響區(測站1)與受溫排水影響區(測站3 及5)的重疊性較高(圖5-17)，89-111年調查期間記錄到651種珊瑚礁魚類，其中在影響域(測站3、4、5)及未影響域(測站1、2)間皆可發現的魚種比率為69%(圖5-18)。機組歲修保養期間南灣海域溫排水輸入量減少，影響域測站(S3~S5)運轉期間及歲修保養期間珊瑚礁魚類的種類數、魚尾數在歲修保養期間沒有明顯增加的現象，珊瑚礁魚類群聚組成在運轉期間及歲修保養期間有重疊現象，由於珊瑚礁魚類主要活動區域在礁石間，而溫排水的影響在表層局部水域，本研究聚類分析發現測站2(後壁湖海洋資源保護示範區)魚類群聚組成略有差異，推論受到水深、礁石環境及人為活動(餵食)的影響，陳(1990)研究南臺灣珊瑚礁魚類群聚指出珊瑚礁魚類在空間分佈上與底質與地形狀況有關。

後壁湖魚市場位於恆春區漁會旁邊，灣外捕獲的大型魚隻(紅魽鯵、雙帶鯵、黃鰭鮪、刺鰆、鬼頭刀等)多在此卸貨給在地盤商，灣內捕獲的魚隻船長多交貨給配合的攤販，故後壁湖魚市場販售兼具二種交易模式。歷年珊瑚礁魚類與後壁湖販售魚類年間相似度值介於5~17%，未發現逐年增加(圖5-18)，歷年資料顯示90年~111年後壁湖魚市場販售的魚種數變動介於31~55種/次(圖5-19)，93年至104年記錄到販售魚種較多，105年有下降的情形，110-111年後壁湖販售之魚種數較少(圖5-19)，推論與人為活動減少有關(如：遊客數及攤販數都減少)，減少的種類為灣內的珊瑚礁魚種。

本研究歷年於珊瑚礁區及後壁湖魚市場調查記錄到洄游性類有：浪人鯵、紅甘鯵、鬼頭刀、飛魚、黃鰭鮪、鰆魚、旗魚、白帶魚等。其中後壁湖魚市場記錄之洄游性魚類作業漁場在灣外海域(表5-25)。而核三廠附近海域記錄到單獨活動的浪人鯵為沿近海洄游性魚類，幼魚多棲息於河口域，成魚多單獨棲息於具清澈水質的瀉湖或向海的礁區。漁業署資料顯示屏東後壁湖漁港經營漁船類型有一支釣、延繩釣、鏢旗魚等，產量及產值較高的經濟性捕撈魚種有鯵科、鬼頭刀、飛魚、鯖科(黃鰭鮪、長鰭鮪、大目鮪、正鰹等)、旗魚科、帶魚科等，台灣水產試驗所報告指出東部海域的黑潮為沿近海域帶來豐富性的洄游性魚類，夏季魚類有鬼頭刀、飛魚、正鰹、雨傘旗魚、黑鯧等；冬季則以烏魚、鰆魚、鯖魚、旗魚等為主，上述魚種因水溫季節性的變化而隨洋流移動，屬於季節性洄游。台灣西南海域在108年12月出現大量鰻苗，109年4月底至5月上旬捕獲大量白帶魚，說明大環境變動(海潮流、水溫)影響洄游性魚類的漁場位置(侯等，2019；吳等，2014)。

近年來由於政府開放民眾親海，至墾丁地區遊憩的民眾可搭乘娛樂海船出海船釣或於開放水域進行岸邊垂釣，目前墾丁海域有10個開放釣區，其中第5垂釣區鄰近核三廠出海口，由於垂釣魚種多為珊瑚礁種類(106年墾丁國家公園海域垂釣魚類資源量之監測)，持續追踪。

五、結論

民國110年4次的採樣調查，第三核能發電廠附近海域之珊瑚礁魚類相共記錄36科89屬224種，歧異度方面以隆頭魚科(48種)最高，是本海域同階生態地位利用較完整的科別，其次為雀鯛科(33種)；數量方面以雀鯛科的族群量最多。後壁湖魚市場110年4次的調查共記錄30科47屬86種魚類相，合併珊瑚礁魚類相及後壁湖魚類相2種調查方式所記錄到的魚種，110年4次魚類調查部份共記錄47科117屬281種。民國111年4次的採樣調查，第三核能發電廠附近海域之珊瑚礁魚類相共記錄35科88屬199種，歧異度方面以隆頭魚科(39種)最高，是本海域同階生態地位利用較完整的科別，其次為雀鯛科(34種)；數量方面以雀鯛科的族群量最多。後壁湖魚市場111年4次的調查共記錄30科46屬72種魚類相，合併珊瑚礁魚類相及後壁湖魚類相2種調查方式所記錄到的魚種，111年4次魚類調查部份共記錄45科114屬244種。

由於本研究珊瑚礁魚類相調查的海域為沿近海域，是多數魚類幼生棲息的場所，多樣性的補充群，顯示本海域是魚類幼生成長的場所。歷年第三核能發電廠附近海域之魚類相調查共分二部份進行，珊瑚礁魚類相的部份從82年開始，後壁湖魚市場漁獲種類的調查自民國87年開始，二項調查至目前為止共記錄第三核能發電廠附近海域的魚類相有112科309屬845種，係因墾丁海域擁有多樣的魚類相所致。本研究分析5個測站珊瑚礁魚類的群聚組成，探討受溫排水影響區(測站3、4、5)與未影響區之間(測站1、2)魚類群聚組成變化，以MDS 二度空間排序後發現，未受溫排水影響區(測站1)與受溫排水影響區(測站3、4及5)的重疊性較高，89-111年調查期間記錄到651種珊瑚礁魚類，其中在影響域(測站3、4、5)及未影響域(測站1、2)間皆可發現的魚種比率為69%。歷年珊瑚礁魚類與後壁湖販售魚類年間相似度值介於5~17%，未發現逐年增加，係因灣內海域非主要經濟性作業漁場。

六、附表與附圖

表 5-1 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：110 年 2 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
Acanthuridae 刺尾鯛科	*Acanthurus dussumieri*	杜氏刺尾鯛	++++	+++	++++		+
	Acanthurus japonicus	日本刺尾鯛				+	
	Acanthurus nigrofuscus	褐斑刺尾鯛	++++	++++	++++	++	++++
	Acanthurus olivaceus	一字刺尾鯛	+				
	Acanthurus pyroferus	火紅刺尾鯛			+	+	+
	Ctenochaetus binotatus	雙斑櫛齒刺尾鯛		+			+
	Naso lituratus	黑背鼻魚			+	+	
	Naso unicornis	單角鼻魚		++++			
	Zebrasoma scopas	小高鰭刺尾鯛	+			+	
	Zebrasoma veliferum	高鰭刺尾鯛		+			
Balistidae 鱗鮕科	*Balistoides viridescens*	褐擬鱗鮕		+			
	Balistapus undulatus	波紋鈎鱗鮕					+
	Sufflamen chrysopterus	金鰭鼓氣鱗鮕	+				
Blenniidae 鰨科	*Meiacanthus grammistes*	黑帶稀棘鰨					+
Caesionidae 烏尾鮗科	*Pterocaesio digramma*	雙帶鱗鰭烏尾鮗	++++		++++	++++	++++
	Caesio caerulaureus	烏尾鮗		++++			
Carangidae 鯵科	*Caranx ignobilis*	浪人鯵		+			
Chaetodontidae 蝴蝶魚科	*Chaetodon argentatus*	銀身蝴蝶魚			+	+	
	Chaetodon auriga	揚旛蝴蝶魚		+			
	Chaetodon auripes	耳帶蝴蝶魚		+	+		+
	Chaetodon citrinellus	胡麻斑蝴蝶魚	+			+	++
	Chaetodon ephippium	鞍斑蝴蝶魚			+		
	Chaetodon kleinii	克氏蝴蝶魚	+	+	+	+++	++
	Chaetodon lunulatus	弓月蝴蝶魚		+	+	+	+
	Chaetodon lunula	月斑蝴蝶魚					++
	Chaetodon melannotus	黑背蝴蝶魚	+	+	++		+
	Chaetodon rafflecii	雷氏蝴蝶魚	+				
	Chaetodon speculum	鏡斑蝴蝶魚	+		++	+	+
	Chaetodon trifascialis	川紋蝴蝶魚		+			
	Chaetodon ulietensis	烏利蝴蝶魚	+				
	Chaetodon unimaculatus	一點蝴蝶魚				+	
	Chaetodon vagabundus	飄浮蝴蝶魚	+	+	+		
	Chaetodon wiebeli	魏氏蝴蝶魚					++
	Chaetodon xanthurus	紅尾蝴蝶魚			+		
	Chaetodon punctatofasciatus	點斑橫帶蝴蝶魚			+	++	+
	Forcipiger flavissimus	黃鑷口魚				+	
	Heniochus acuminatus	白吻雙帶立旗鯛					+
	Heniochus monoceros	烏面立旗鯛					+
Cirrhitidae 魚翁科	*Paracirrhites forsteri*	福氏副翁				+	
Gobiidae 鰕虎科	*Amblygobius phalaena*	尾斑鈍鯊		+			
Holocentridae 金鱗魚科	*Myripristis formosa*	台灣松毬	+				+
	Myripristis kuntee	康德鋸鱗魚	+		+		
	Myripristis violacea	紫鋸鱗魚		++++			
	Sargocentron caudomaculatum	尾斑棘鱗魚					+
	Sargocentron spiniferum	尖吻棘鱗魚	+				
	Sargocentron ittodai	銀帶棘鱗魚			+		++++
	Neoniphon sammara	莎姆金鱗魚	++	+			
Labridae 隆頭魚科	*Anampses meleagrides*	北斗阿南魚			+		
	Bodianus axillaris	腋斑狐鯛					+
	Bodianus mesothorax	中胸狐鯛			+	+	+
	Cheilinus chlorourus	綠尾唇魚				+	
	Cheilinus trilobatus	三葉唇魚		+	+	+	

續表 5-1 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：110 年 2 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
	Cirrhilabrus cyanopleura	藍身絲鰭鸚鯛				+++	
	Coris gaimard	蓋馬氏盔魚	+				
	Gomphosus varius	雜色尖嘴魚	+	+		+	
	Labroides bicolor	二色裂唇魚		+			+
	Labroides dimidiatus	裂唇魚		+	+		+
	Halichoeres hortulanus	雲斑海豬魚	+			+	+
	Halichoeres prostopeion	黑額海豬魚	+				
	Hemigymnus fasciatus	條紋厚唇魚				+	
	Hemigymnus melapterus	黑鰭半裸魚	+	+			
	Oxycheilinus unifasciatus	單帶尖唇魚	+	+			+
	Thalassoma amblycephalus	鈍頭錦魚	++			+++	
	Thalassoma hardwickii	哈氏錦魚	++++	++++		++++	
	Thalassoma jansenii	詹氏錦魚	+		+	++	++++
	Thalassoma lutescens	黃衣錦魚	++++		++	++++	++++
	Thalassoma lunare	新月錦魚	+	+		+	
Lethrinidae 龍占魚科	*Monotaxis grandoculis*	異黑鯛					+
	Lutjanus monostigma	單斑笛鯛		++			
Lutjanidae 笛鯛科	*Lutjanus fulvus*	黃足笛鯛	+++	++++			
Monacanthidae 單棘魨科	*Cantherhines dumerilii*	杜氏刺鼻單棘魨		+			
Mullidae 羊魚科	*Mulloidichthys falvolineatus*	黃線擬鬚鯛		+++			
	Mulloidichthys vanicolensis	金帶擬鬚鯛		++			
Mullidae 羊魚科	*Parapeneus barberinus*	單帶海緋鯉		+			
Mullidae 羊魚科	*Parapeneus multifasciatus*	多帶海緋鯉	+		+	++	+
Mullidae 羊魚科	*Upeneus tragula*	黑斑緋鯉		+			
Nemipteridae 金線魚科	*Scolopsis bilineatus*	雙帶眶棘鱸	++		+		+
	Scolopsis xenochrous	欖斑赤尾冬					+
	Ostracion meleagris	米點箱魨					+
Pempheridae 擬金眼鯛科	*Pempheris oualensis*	烏伊蘭擬金眼鯛		++			++++
Pinguipedidae 虎鰶科(擬鯔科)	*Parapercis millepunctata*	雪點擬鱸	+				
Pomacanthidae 蓋刺魚科	*Centropyge vrolickii*	伏羅式蓋刺魚	+		++	+	+
	Pomacanthus imperator	條紋蓋刺魚				+	
	Pomacanthus semicirculatus	疊波蓋刺魚	+	+	+		
	Pygoplites diacanthus	甲冑魚		+	+	+	
Pomacentridae 雀鯛科	*Amblyglyphidodon curacao*	橘鈍寬刻齒雀鯛	++++	++++			+
	Amblyglyphidodon aureus	黃背寬刻齒雀鯛		+			
	Abedefduf vaigiensis	條紋豆娘魚	++++	++++			++++
	Abudefduf sexfasciatus	六線豆娘魚		++++			
	Amphiprion clarkii	克氏雙鋸魚	++	+		+	
	Chromis lepidolepis	細鱗光鰓雀鯛	++++			++++	
	Chromis margaritifer	二色光鰓雀鯛	+	++++	+	++++	+
	Chromis ternatensis	三葉光鰓雀鯛	++++	+	+		++
	Chromis virides	藍綠光鰓雀鯛	++++				
	Chromis weberi	魏氏光鰓雀鯛					+
	Dascyllas reticulatus	網紋圓雀鯛	++++	++++		++++	
	Dascyllas trimaculatus	三斑圓雀鯛		++++	+	++	+
	Neoglyphidodon melas	黑副雀鯛	++++	++++	+++		++++
	Neoglyphidodon nigroris	黑褐副雀鯛		++			
	Plectroglyphidodon johnstonianus	約島式固曲齒鯛				++	
	Plectroglyphidodon lacrymatus	珠點固曲齒鯛			+		+
	Pomacentrus philippinus	菲律賓雀鯛		+	+		+

續表 5-1 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：110 年 2 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
Pseudochromidae 准雀鯛科	*Labracinus cyclophthalmus*	圓眼戴氏魚	+	+	+	+	
Ptereleotridae 凹尾塘鱧科	*Ptereleotris evides*	瑰麗塘鱧	+			+	
Scaridae 鸚哥魚科	*Scarus forsteni*	福氏鸚哥魚	+	+	+		
	Scarus hypselopterus	爪哇鸚哥魚		+			
	Scarus rubroviolaceus	紅紫鸚哥魚		+++			
	Scarus schlegeli	史氏鸚哥魚	++	+	+	++++	
Scorpaenidae 鮋科	*Pterois antennata*	觸角簑鮋					+
	Dendrochirus zebra	斑馬紋多臂簑鮋					+
Serranidae 鮨科	*Cephalopholis urodeta*	尾紋九刺鮨	+				
	Pseudanthias squamipinnis	絲鰭擬花鮨			+	++++	
Tetraodontidae 四齒鈍科	*Canthigaster valentini*	瓦氏尖鼻鈍		+	+		++
Zanclidae 角蝶魚科	*Zanclus cornutus*	角鑲魚	++	++++	+++	++	+

表 5-2 第三核能發電廠附近海域漁獲魚類相之調查　　調查日期：110 年 2 月、5 月、8 月及 11 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	*110/2*	*110/5*	*110/8*	*110/11*
Acanthuridae 刺尾鯛科	*Acanthurus bariene*	肩斑刺尾鯛		+	+	
	Acanthurus bleekeri	布氏刺尾鯛	++	+	+	+
	Acanthurus dussumieri	杜氏刺尾鯛	++++	++++	++++	++++
	Acanthurus lineatus	線紋刺尾鯛			+	
	Acanthurus mata	後刺尾鯛			++	
Balistidae 鱗鮕科	*Balistoides viridescens*	褐擬鱗鮕				+
	Pseudobalistes flavimarginatus	黃緣副鱗鮕			+	
Berycidae 金眼鯛科	*Centroberyx rubricaudus*	紅尾棘金眼鯛			+	
Carangidae 鰺科	*Seriola dumerili*	紅鉤鰺	++++	++	++++	++++
Chaetodontidae 蝴蝶魚科	*Chaetodon lineolatus*	紋身蝴蝶魚				+
Coryphaenidae 鱰科	*Coryphaena hippurus*	鬼頭刀		++++		
Diodontidae 二齒鮕科	*Diodon holocanthus*	六斑二齒鮕	++++	++++		+++
	Diodon hystrix	密斑二齒鮕	+	+		
Exocoetidae 飛魚科	*Cheilopogon cyanopterus*	黑鰭飛魚		++++		
	Cheilopogon unicolor	白鰭飛魚		++++		
	Cypselurus poecilopterus	斑鰭飛魚		++++		
Fistulariidae 馬鞭魚科	*Fistularia petimba*	鱗馬鞭魚				+
Haemulidae 石鱸科	*Parapristipoma trilineatum*	三線雞魚	+		+	
	Plectorhinchus lessonii	雷氏胡椒鯛	+		++	++++
	Plectorhinchus lineatus	條紋胡椒鯛	++	++	+	
	Plectorhinchus vittatus	條斑胡椒鯛	+	+		
Holocentridae 金鱗魚科	*Myripristis kuntee*	康德鋸鱗魚		++++		++
	Sargocentron diadema	黑鰭棘鱗魚		++		
Kyphosidae 舵魚科	*Kyphosus lembus*	蘭勃舵魚		++		+
Labridae 隆頭魚科	*Cheilinus trilobatus*	三葉唇魚			+	++
	Iniistius baldwini	巴氏項鰭魚	+			
	Thalassoma purpureum	紫錦魚	+			
Lethrinidae 龍占魚科	*Lethrinus miniatus*	長吻龍占			++	+
	Lethrinus ornatus	黃帶龍占	+	+	+	
	Lethrinus rubrioperculatus	紅鰓龍占		+	+	
	Monotaxis grandoculis	單列齒鯛			+	
Lutjanidae 笛鯛科	*Aphareus rutilans*	銹色細齒笛鯛			++	
	Etelis coruscans	長尾濱鯛			++++	+++
	Lutjanus argentimaculatus	銀紋笛鯛	+	++	+	++
	Lutjanus bengalensis	孟加拉笛鯛	++			
	Lutjanus fulvus	黃足笛鯛	+			
	Lutjanus gibbus	隆背笛鯛	++++	++++	++++	++++
	Lutjanus lutjanus	正笛鯛	++++	++	+	
	Lutjanus kasmira	四線笛鯛	++++			
	Lutjanus quinquelineatus	五線笛鯛	++++			
	Lutjanus fulviflamma	火斑笛鯛			+	
	Lutjanus boutton	藍帶笛鯛	+			
	Lutjanus rivulatus	海雞母笛鯛	+		++	++
	Paracaesio xanthura	黃擬烏尾鮹			+++	
	Paracaesio caeruleus	藍色擬烏尾冬		++++		
	Pristipomoides filamentosus	絲鰭姬鯛			++++	++++
Monacanthidae 單棘鮕科	*Aluterus scriptus*	長尾革單棘鮕			+	
Mugilidae 鯔科	*Planiliza macrolepis*	大鱗鯔			++++	++++
Mullidae 羊魚科	*Mulloidichthys falvolineatus*	黃線擬鬚鯛		++++		
	Mulloidichthys vanicolensis	金帶擬鬚鯛				++++
	Parupeneus ciliatus	短鬚海緋鯉			+	
	Parupeneus multifasciatus	多帶海緋鯉	++		++++	
	Parupeneus spilurus	大型海緋鯉	+		+	+

續表 5-2 第三核能發電廠附近海域漁獲魚類相之調查　　調查日期：110 年 2 月、5 月、8 月及 11 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	*110/2*	*110/5*	*110/8*	*110/11*
Muraenidae 鰻科	*Gymothorax favagircus*	黑斑裸胸鰻	+	+	+	++
	Oplegnathus punctatus	斑石鯛	+	+		
Polynemidae 馬鮁科	*Eleutheronema tetradactylum*	四指馬鮁				+
Pomacentridae 雀鯛科	*Abedefduf vaigiensis*	條紋豆娘魚			++++	
Pomacentridae 雀鯛科	*Abudefduf sexfasciatus*	六線豆娘魚			++++	
Priacanthidae 大眼鯛科	*Priacanthus hamrur*	寶石大眼鯛		++		
	Cookeolus japonicus	日本紅目大眼鯛				+
Salmonidae 鮭科	*Oncorhynchus keta*	鮭魚	++++	++++	++++	++++
	Scarus festivus	橫紋鸚哥魚		+		++
	Scarus forsteni	福氏鸚哥魚		++		+
	Scarus ghobban	藍點鸚哥魚	++++	++	++	+++
	Scarus prasiognathos	綠頷鸚哥魚	+	+		
	Scarus rubroviolaceus	紅紫鸚哥魚	++	+	++	+++
	Scarus rivulatus	雜紋鸚哥魚	+	++++	+	+
	Scarus psittacus	棕吻鸚哥魚				+
	Scarus schlegeli	史氏鸚哥魚			+	++
Scatophagidae 金錢魚科	*Scatophagus argus*	金錢魚				++++
Scorpaenidae 鮋科	*Helicolenus hilgendorfi*	無鰾鮋	++++	+++	++++	++++
	Synanceia verrucosa	玫瑰毒鮋	+		+	
Serianidae 鮨科	*Anyperodon leucogrammicus*	白線光腭鱸	+			
	Cephalopholis argus	斑點九刺鮨	+			
	Cephalopholis miniata	青星九刺鮨	++++			
	Cephalopholis spiloparaea	黑緣九刺鮨	++++			
	Epinephelus areolatus	寶石石斑魚	+			
	Epinephelus bleekeri	布氏石斑魚	+			
	Epinephelus coioides	點帶石斑魚	+			+
	Epinephelus fasciatus	橫帶石斑魚			+	
	Epinephelus fuscoguttatus♀* *Epinephelus lanceolatus*♂	龍虎斑	++++	++++	++++	++++
	Variola albimarginata	白緣星鱠	++			
	Variola louti	星鱠	++++	+		
Trichiuridae 帶魚科	*Trichiurus lepturus*	白帶魚	++++			
Tetraodontidae 四齒鮐科	*Arothron hispidus*	紋腹叉鼻鮐	+		+	
	Arothron manilensis	菲律賓叉鼻鮐	+			+

表 5-3 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：110 年 5 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
Acanthuridae 刺尾鯛科	*Acanthurus bariene*	肩斑刺尾鯛		+			
	Acanthurus dussumieri	杜氏刺尾鯛		++			
	Acanthurus nigrofuscus	褐斑刺尾鯛	++++	++++	++++	++++	++++
	Acanthurus olivaceus	一字刺尾鯛				++	+
	Acanthurus pyroferus	火紅刺尾鯛			+	+	
	Naso lituratus	黑背鼻魚	+		+	+	++++
	Naso unicornis	單角鼻魚			+		+
	Zebrasoma flavescens	高鰭刺尾鯛	+		++		
	Zebrasoma scopas	小高鰭刺尾鯛		+	+		+++
Balistidae 鱗鮻科	*Balistapus undulatus*	波紋鈎鱗鮻	+				
	Balistoides viridescens	褐擬鱗鮻		+			
	Melichthys vidua	黑邊角鱗鮻	+				
	Sufflamen chrysopterus	金鰭鼓氣鱗鮻		+			
Blenniidae 鰨科	*Meiacanthus grammistes*	黑帶稀棘鰨			+		
Aulostomidae 管口魚科	*Aulostomus chinensis*	中華管口魚			+		
Caesionidae 烏尾鮗科	*Caesio caerulaureus*	烏尾鮗	++	+			
	Caesio teres	黃藍背烏尾鮗					++++
	Pterocaesio digramma	雙帶鱗鰭烏尾鮗			++		
Carangidae 鰺科	*Caranx ignobilis*	浪人鰺		+	+		
	Caranx melampygus	藍鰭鰺		+			
Chaetodontidae 蝴蝶魚科	*Chaetodon argentatus*	銀身蝴蝶魚				+	++
	Chaetodon auriga	揚旛蝴蝶魚		+			
	Chaetodon auripes	耳帶蝴蝶魚	+		+	++	
	Chaetodon baronessa	曲紋蝴蝶魚	+				
	Chaetodon citrinellus	胡麻斑蝴蝶魚	+		+		+
	Chaetodon ephippium	鞍斑蝴蝶魚				+	
	Chaetodon kleinii	克氏蝴蝶魚	++++		++	+	+++
	Chaetodon lunulatus	弓月蝴蝶魚		+	+	++	
	Chaetodon lunula	月斑蝴蝶魚	+		+	+	
	Chaetodon melannotus	黑背蝴蝶魚	+	+			+
	Chaetodon punctatofasciatus	點斑橫帶蝴蝶魚	+		+		+
	Chaetodon speculum	鏡班蝴蝶魚	+		+	+++	+
	Chaetodon trifascialis	川紋蝴蝶魚	+				+
	Chaetodon unimaculatus	一點蝴蝶魚	+				+
	Chaetodon xanthurus	紅尾蝴蝶魚			+		+
	Chaetodon vagabundus	飄浮蝴蝶魚	++	+	++	++	+
	Forcipiger flavissimus	黃鑷口魚	+		+		+
	Heniochus chrysostomus	三帶立旗鯛					+
Cirrhitidae 魚翁科	*Paracirrhites forsteri*	福氏副翁					+
Diodontidae 二齒鮻科	*Diodon liturosus*	紋二齒鮻	+				
Gobiidae 鰕虎科	*Amblyeleotris wheeleri*	紅紋鈍鯊	+				
Haemulidae 石鱸科	*Plectorhinchus lineatus*	條紋胡椒鯛					+
Holocentridae 金鱗魚科	*Myripristis kuntee*	康德鋸鱗魚	++++		+		
	Myripristis formosa	台灣松毬	+	++++			
	Myripristis violacea	紫鋸鱗魚		+			
	Neoniphon sammara	莎姆金鱗魚		+	+		
	Sargocentron caudomaculatum	尾斑棘鱗魚			+		
	Sargocentron spiniferum	尖吻棘鱗魚		+			
Labridae 隆頭魚科	*Anampses meleagrides*	北斗阿南魚	+		+	+	+
	Anampses neoguinaicus	新幾內亞鸚鯛			+		
	Anampses twistii	雙斑阿南魚			+		
	Bodianus axillaris	腋斑狐鯛			+		

續表 5-3 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：110 年 5 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
	Bodianus mesothorax	中胸狐鯛	+				+
	Cheilinus trilobatus	三葉唇魚			+	+	+
	Cheilinus undulates	曲紋唇魚				+	
	Cirrhilabrus exquistus	艷麗絲鰭鸚鯛		+			
	Cirrhilabrus cyanopleura	藍身絲鰭鸚鯛	+			+	
	Cirrhilabrus rubimarginatus	紅緣絲鰭鸚鯛				+	
	Cirrhilabrus lunatus	新月絲鰭鸚鯛	+				+
	Coris dorsomacula	背斑盔魚	+		+	+	
	Coris gaimard	蓋馬氏盔魚	++				
	Gomphosus varius	雜色尖嘴魚	+	+	+	+	+
	Labrichthys unilineatus	單線突唇魚	+		+		+
	Labroides bicolor	二色裂唇魚		+	+	+	+
	Labroides dimidiatus	裂唇魚	+++		+	+	+
	Halichoeres hortulanus	雲斑海豬魚	+	+	+	++	+
	Halichoeres prostopeion	黑額海豬魚	+			+	+
	Halichoeres scapularis	頸帶海豬魚		++			
	Halichoeres trimaculatus	三斑海豬魚		++			
	Hemigymnus fasciatus	條紋厚唇魚			+		+
	Hemigymnus melapterus	黑鰭半裸魚	+	+			+
	Hologymnosus annulatus	環紋全裸鸚鯛	+				
	Macropharyngodon meleagris	朱斑大咽齒魚	+		+		+
	Parajulis poecilepterus	花鰭副海豬魚	++				
	Pseudocheilinus evanidus	姬擬唇魚	+			+	
	Pseudocheilinus hexataenia	六帶擬唇魚					+
	Stethojulis bandanensis	黑星紫胸魚			+	+	+
	Stethojulis trilineata	三線紫胸魚				+	+
	Oxycheilinus unifasciatus	單帶尖唇魚		+			
	Thalassoma amblycephalus	鈍頭錦魚	++++		++		++++
	Thalassoma hardwickii	哈氏錦魚		++++		+	++
	Thalassoma jansenii	詹氏錦魚	+		+		+
	Thalassoma lutescens	黃衣錦魚	++++		++++	++++	++
	Thalassoma lunare	新月錦魚	+	+++	+		
Lethrinidae 龍占魚科	*Gnathodentex aurolineatus*	金帶鯛	+				
	Lethrinus miniatus	長吻龍占		+			
	Monataxis grandoculis	異黑鯛			+		
Lutjanidae 笛鯛科	*Lutjanus fulvus*	黃足笛鯛		++++			
Mullidae 羊魚科	*Mulloidichthys falvolineatus*	黃線擬鬚鯛		+			
	Mulloidichthys vanicolensis	金帶擬鬚鯛	+		+	++++	
	Parapeneus ciliatus	短鬚海緋鯉				+	
	Parapeneus cyclostomus	圓口海緋鯉					+
	Parapeneus barberinus	單帶海緋鯉	+	+			
	Parapeneus multifasciatus	多帶海緋鯉	+	++		+	++
Nemipteridae 金線魚科	*Scolopsis bilineatus*	雙帶眶棘鱸	+	+	+	++	+
	Scolopsis ciliata	齒頜眶棘鱸		+			
	Scolopsis lineata	線紋眶棘鱸					++
	Scolopsis monogramma	單帶眶棘鱸		+		+	
Ostraciidae 箱鮐科	*Ostracion cubicus*	粒突箱鮐				+	
Pempheridae 擬金眼鯛科	*Pempheris oualensis*	烏伊蘭擬金眼鯛	+	++++	++++		
Pinguipedidae 虎鰶科(擬鯔科)	*Parapercis clathrata*	四斑擬鱸	+				+
	Parapercis pacifica	太平洋擬鱸		+			
Pomacanthidae 蓋刺魚科	*Centropyge bicolor*	二色刺尻魚				+	
	Centropyge vrolickii	伏羅式蓋刺魚	+		+	+	+

續表 5-3 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：110 年 5 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
	Pomacanthus imperator	條紋蓋刺魚				+	
	Pomacanthus semicirculatus	疊波蓋刺魚	+	+	+	+	+
	Pygoplites diacanthus	甲尻魚			+		+
Pomacentridae 雀鯛科	*Amblyglyphidodon curacao*	橘鈍寬刻齒雀鯛		++++			
	Amblyglyphidodon leucogaster	白腹寬刻齒雀鯛		+			
	Abedefduf vaigiensis	條紋豆娘魚	++++	++++		++	++++
	Abudefduf sexfasciatus	六線雀鯛		+			
	Amphiprion clarkii	克氏雙鋸魚		++			++
	Chromis atripectoralis	黑腋光鰓雀鯛				+	
	Chromis margaritifer	二色光鰓雀鯛	++++	+	++++	++++	++++
	Chromis rex	雷克斯刻齒雀鯛		+		+	
	Chromis weberi	魏氏光鰓雀鯛		+			
	Chromis virides	藍綠光鰓雀鯛		++++			
	Chromis ternatensis	三葉光鰓雀鯛	+	+	+++	++	+
	Chromis xanthura	黃尾光鰓雀鯛	+	+			
	Dascyllas aruanus	三帶圓雀鯛		+	+		
	Dascyllas reticulatus	網紋圓雀鯛	++++	++++	++++		
	Dascyllas trimaculatus	三斑圓雀鯛	+	++++	+		
	Neoglyphidodon melas	黑副雀鯛	+++	++++		++	
	Neoglyphidodon nigroris	黑褐副雀鯛		+++	+		
	Plectroglyphidodon johnstonianus	約島式固曲齒鯛				+	
	Plectroglyphidodon lacrymatus	珠點固曲齒鯛		+			
	Pomacentrus chrysurus	白尾雀鯛		+			
	Pomacentrus tripunctatus	三斑雀鯛			+		
	Pomacentrus vaiuli	王子雀鯛			++		
	Pomacentrus coelestis	霓虹雀鯛	+		+		+
	Pomacentrus philippinus	菲律賓雀鯛		++		+	
Pseudochromidae 准雀鯛科	*Labracinus cyclophthalmus*	圓眼戴氏魚		+			
Ptereleotridae 凹尾塘鱧科	*Nemateleotris magnifica*	絲鰭線塘鱧					+
	Ptereleotris evides	瑰麗塘鱧	+		+	+	
Scaridae 鸚哥魚科	*Chlorurus sordidus*	白斑鸚哥魚	+				
	Scarus dimidiatus	新月鸚哥魚		+			
	Scarus festivus	橫紋鸚哥魚			+	+++	
	Scarus forsteni	福氏鸚哥魚	+		+	++++	+
	Scarus ghobban	藍點鸚哥魚	++	+			+
	Scarus hypselopterus	爪哇鸚哥魚				+	
	Scarus oviceps	姬鸚哥魚	+				
	Scarus rivulatus	雜紋鸚哥魚				+	
	Scarus rubroviolaceus	紅紫鸚哥魚	+	+	+	+	+
	Scarus schlegeli	史氏鸚哥魚	++++	++	+	++++	++
Scorpaenidae 鮋科	*Pterois antennata*	觸角簑鮋			+		
Serranidae 鮨科	*Cephalopholis urodeta*	尾紋九刺鮨	+	+	+		+
	Cephalopholis argus	斑點九刺鮨	+				
	Epinephelus fasciatus	橫帶石斑魚					+
Tetraodontidae 四齒魨科	*Arothron reticularis*	網斑叉鼻魨					+
	Canthigaster valentini	瓦氏尖鼻魨	+		+	+	+
	Cantherhines dumerilii	杜氏刺鼻單棘魨		+			
	Cantherhines pardalis	細斑刺鼻單棘魨					+
Zanclidae 角蝶魚科	*Zanclus cornutus*	角鑲魚	+	+	+++	++	+++

表 5-4 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：110 年 8 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
Acanthuridae 刺尾鯛科	*Acanthurus dussumieri*	杜氏刺尾鯛			++		+
	Acanthurus japonicus	日本刺尾鯛			+		
	Acanthurus lineatus	線紋刺尾鯛					+
	Acanthurus nigrofuscus	褐斑刺尾鯛	++++	++	++++	++++	++++
	Acanthurus nigricauda	黑尾刺尾鯛		+			
	Acanthurus olivaceus	一字刺尾鯛					+
	Ctenochaetus binotatus	雙斑櫛齒刺尾鯛	++++			++	+
	Naso lituratus	黑背鼻魚	+				
	Naso unicornis	單角鼻魚		++			+
	Zebrasoma scopas	小高鰭刺尾鯛		+	+		+
Apogonidae 天竺鯛科	*Cheilodipterus artus*	縱帶巨齒天竺鯛			+		
	Balistapus undulatus	波紋鈎鱗鮄		+			
Balistidae 鱗鮄科	*Sufflamen chrysopterus*	金鰭鼓氣鱗鮄		+		+	+
Belonidae 鶴鱵科	*Tylosurus crocodilus*	鱷形叉尾鶴鱵		+			
Blenniidae 鰭科	*Meiacanthus grammistes*	黑帶稀棘鰭		+	+	+	
Caesionidae 烏尾鮗科	*Pterocaesio digramma*	雙帶鱗鰭烏尾鮗		++++	++++	+	
	Caesio caerulaureus	烏尾鮗			++++		
	Caesio teres	黃藍背烏尾鮗			+		
Carangidae 鰺科	*Caranx melampygus*	藍鰭鰺	+	+			
Chaetodontidae 蝴蝶魚科	*Chaetodon argentatus*	銀身蝴蝶魚		+	+	+	
	Chaetodon auriga	揚旛蝴蝶魚		+			
	Chaetodon auripes	耳帶蝴蝶魚		+	+		
	Chaetodon citrinellus	胡麻斑蝴蝶魚	+		+	+	+
	Chaetodon ephippium	鞍斑蝴蝶魚	+	+			
	Chaetodon kleinii	克氏蝴蝶魚	++		++	+	+
	Chaetodon lunulatus	弓月蝴蝶魚	+++	+	+		
	Chaetodon lunula	月斑蝴蝶魚	+		++		
	Chaetodon melannotus	黑背蝴蝶魚	+	+			
	Chaetodon rafflecii	雷氏蝴蝶魚		+			
	Chaetodon speculum	鏡斑蝴蝶魚	+		+		
	Chaetodon trifascialis	川紋蝴蝶魚		+			
	Chaetodon unimaculatus	一點蝴蝶魚	++				
	Chaetodon vagabundus	飄浮蝴蝶魚	++	+	+	+	+
	Chaetodon xanthurus	紅尾蝴蝶魚				+	
	Chaetodon punctatofasciatus	點斑橫帶蝴蝶魚	+		++		
	Heniochus acuminatus	白吻雙帶立旗鯛			+		
	Heniochus varius	黑身立旗鯛	+		+		
Cirrhitidae 魚翁科	*Paracirrhites forsteri*	福氏副翁		+			+
Gobiidae 鰕虎科	*Amblygobius phalaena*	尾斑鈍鯊		+			
Haemulidae 石鱸科	*Plectorhinchus lessonii*	雷氏胡椒鯛	+				
Holocentridae 金鱗魚科	*Myripristis kuntee*	康德鋸鱗魚	++++	+	+++		
	Neoniphon sammara	莎姆金鱗魚			+		
	Sargocentron caudomaculatum	尾斑棘鱗魚	+		++		
	Sargocentron ittodai	銀帶棘鱗魚			+		
	Sargocentron spiniferum	尖吻棘鱗魚			+		
Labridae 隆頭魚科	*Anampses meleagrides*	北斗阿南魚			+	+	+
	Anampses twistii	雙斑阿南魚	+	+	+	+	
	Coris dorsomacula	背斑盔魚	+		+	+	+
	Coris aygula	紅喉盔魚				+	
	Bodianus diana	對斑狐鯛			+		
	Bodianus mesothorax	中胸狐鯛	+		+	+	
	Oxycheilinus unifasciatus	單帶尖唇魚	+			+	

續表 5-4 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：110 年 8 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
	Cheilinus trilobatus	三葉唇魚		+		+	
	Cirrhilabrus cyanopleura	藍身絲鰭鸚鯛		+++			
	Cirrhilabrus melanomarginatus	黑緣絲鰭鸚鯛			++		++
	Cirrhilabrus lunatus	新月絲鰭鸚鯛		++	+		
	Coris gaimard	蓋馬氏盔魚		+			+
	Gomphosus varius	雜色尖嘴魚		+			+
	Labroides bicolor	二色裂唇魚			+		
	Labroides dimidiatus	裂唇魚	++	+	+	+	+++
	Halichoeres hortulanus	雲斑海豬魚	+	+	+	+++	++
	Halichoeres prostopeion	黑額海豬魚	+		+	++	+
	Halichoeres trimaculatus	三斑海豬魚				+	+
	Halichoeres scapularis	頸帶海豬魚		+			+
	Halichoeres margaritaceus	斑點海豬魚					++
	Hemigymnus melapterus	黑鰭半裸魚		+			
	Macropharyngodon meleagris	朱斑大咽齒鯛				++	
	Pseudocheilinus hexataenia	六帶擬唇魚		+			
	Stethojulis bandanensis	黑星紫胸魚		+			
	Thalassoma amblycephalus	鈍頭錦魚	++++	++			++++
	Thalassoma hardwickii	哈氏錦魚		++++	++	+	
	Thalassoma jansenii	詹氏錦魚			+		++++
	Thalassoma lutescens	黃衣錦魚	++++	+	++	++++	+
	Thalassoma lunare	新月錦魚		+			++
	Thalassoma purpureum	紫錦魚					+
	Thalassoma quinquevittatum	五帶錦魚					++++
Lutjanidae 笛鯛科	*Lutjanus fulvus*	黃足笛鯛	+	++			
	Lutjanus fulviflamma	火斑笛鯛			+		
	Lutjanus decussates	交叉笛鯛				+	
	Macolor maculatus	斑點笛鯛			+	+	
Monacanthidae 單棘魨科	*Cantherhines dumerilii*	杜氏刺鼻單棘魨		+			
Mullidae 羊魚科	*Mulloidichthys falvolineatus*	黃線擬鬚鯛		+			
	Mulloidichthys vanicolensis	金帶擬鬚鯛			++		
	Parapeneus multifasciatus	多帶海緋鯉	+	+	+		+
Nemipteridae 金線魚科	*Scolopsis bilineatus*	雙帶眶棘鱸	+	+	+	+	
	Scolopsis monogramma	單帶眶棘鱸				+	
Pempheridae 擬金眼鯛科	*Pempheris oualensis*	烏伊蘭擬金眼鯛	++++		+++		
Pinguipedidae 虎鰶科(擬鯔科)	*Parapercis millepunctata*	雪點擬鱸		+			+
	Parapercis pacifica	太平洋擬鱸		+			
Pomacanthidae 蓋刺魚科	*Centropyge vrolickii*	伏羅式蓋刺魚	++		++		
	Pomacanthus semicirculatus	疊波蓋刺魚		+	+	+	+
	Pygoplites diacanthus	甲尻魚			+		+
Pomacentridae 雀鯛科	*Amblyglyphidodon curacao*	橘鈍寬刻齒雀鯛		++++			
	Abedefduf vaigiensis	條紋豆娘魚	++++	++++		+	+++
	Abudefduf sexfasciatus	六線豆娘魚		++++			
	Amphiprion frenatus	白條雙鋸魚		+++			
	Amphiprion clarkii	克氏雙鋸魚					++
	Chromis margaritifer	二色光鰓雀鯛	++++	++++	++++	++++	++++
	Chromis xanthura	黃尾光鰓雀鯛				+	
	Chromis ternatensis	三葉光鰓雀鯛	+		+	+	
	Chromis virides	藍綠光鰓雀鯛		++++			
	Chromis weberi	魏氏光鰓雀鯛	+			+	++
	Chromis alleni	亞倫氏光鰓雀鯛				+	+

續表 5-4 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：110 年 8 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
	Dascyllas reticulatus	網紋圓雀鯛	+	++++			
	Dascyllas trimaculatus	三斑圓雀鯛	+	++++	+	+	
	Dascyllas aruanus	三帶圓雀鯛		+			
	Pomacentrus coelestis	霓虹雀鯛				+	++++
	Pomacentrus vaiuli	王子雀鯛				+	
	Stegastes fasciolatus	藍紋高身雀鯛				+	
	Pomacentrus tripunctatus	三斑雀鯛		+			
	Neoglyphidodon melas	黑副雀鯛		++++	+	+	+
	Neoglyphidodon nigroris	黑褐副雀鯛	+	+++	+	+	
	Plectroglyphidodon johnstonianus	約島式固曲齒鯛		+			+
	Plectroglyphidodon lacrymatus	珠點固曲齒鯛		+		+	+
	Pomacentrus philippinus	菲律賓雀鯛	+	+	++	+	+
	Pomacentrus amboinensis	安邦雀鯛		+			
Pseudochromidae 准雀鯛科	*Labracinus cyclophthalmus*	圓眼戴氏魚	+	+			
Ptereleotridae 凹尾塘鱧科	*Ptereleotris evides*	瑰麗塘鱧		+			
Priacanthidae 大眼鯛科	*Priacanthus hamrur*	寶石大眼鯛			+		
	Priacanthus macracanthus	大棘大眼鯛			+		
Scaridae 鸚哥魚科	*Scarus forsteni*	福氏鸚哥魚	+				+
	Scarus ghobban	藍點鸚哥魚				+	
	Scarus rivulatus	雜紋鸚哥魚				+	
	Scarus schlegeli	史氏鸚哥魚	+			++	+
Scorpaenidae 鈾科	*Pterois antennata*	觸角簑鈾			+		
Serranidae 鮨科	*Cephalopholis urodeta*	尾紋九刺鮨	+				
	Epinephelus hexagonatus	六角石斑魚		+			
	Epinephelus akaara	赤點石斑魚					+
	Pseudanthias squamipinnis	絲鰭擬花鮨					++++
	Pseudanthias pascalus	厚唇擬花鱸	++				
Tetraodontidae 四齒魨科	*Canthigaster valentini*	瓦氏尖鼻魨	+	+	++	+	+
Zanclidae 角蝶魚科	*Zanclus cornutus*	角鑲魚	++	+++	++	+++	+

表 5-5 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：110 年 11 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
Acanthuridae 刺尾鯛科	*Acanthurus dussumieri*	杜氏刺尾鯛		+		+	+
	Acanthurus lineatus	線紋刺尾鯛	+				
	Acanthurus nigrofuscus	褐斑刺尾鯛	++++	++	++	++++	++++
	Ctenochaetus binotatus	雙斑櫛齒刺尾鯛	+++		+		
	Ctenochaetus striatus	連紋櫛齒刺尾鯛			+		
	Naso lituratus	黑背鼻魚	+		+		
	Naso unicornis	單角鼻魚					+
	Zebrasoma scopas	小高鰭刺尾鯛	+		+		+
Apogonidae 天竺鯛科	*Cheilodipterus artus*	縱帶巨齒天竺鯛		+			
Balistidae 鱗鮋科	*Sufflamen chrysopterus*	金鰭鼓氣鱗鮋			+	+	
Blenniidae 鰭科	*Meiacanthus grammistes*	黑帶稀棘鰭	+	+	+		
Aulostomidae 管口魚科	*Aulostomus chinensis*	中華管口魚	+				
Caesionidae 烏尾鮗科	*Pterocaesio digramma*	雙帶鱗鰭烏尾鮗	++++		++++		
	Caesio caerulaureus	烏尾鮗			++++		
	Caesio teres	黃藍背烏尾鮗					++
Carangidae 鯵科	*Pseudocaranx dentex*	黃帶擬鯵		+			
Chaetodontidae 蝴蝶魚科	*Chaetodon argentatus*	銀身蝴蝶魚			+	+	+
	Chaetodon auriga	揚旛蝴蝶魚			+		+
	Chaetodon auripes	耳帶蝴蝶魚		+		+	+
	Chaetodon baronessa	曲紋蝴蝶魚	+				
	Chaetodon citrinellus	胡麻斑蝴蝶魚	+			+	
	Chaetodon kleinii	克氏蝴蝶魚	++		++	+	++
	Chaetodon lunulatus	弓月蝴蝶魚	++		+	+	
	Chaetodon lunula	月斑蝴蝶魚	+		+		+
	Chaetodon melannotus	黑背蝴蝶魚			+		+
	Chaetodon rafflecii	雷氏蝴蝶魚	+				
	Chaetodon speculum	鏡斑蝴蝶魚	+	+	+	+	+
	Chaetodon trifascialis	川紋蝴蝶魚	++			+	
	Chaetodon unimaculatus	一點蝴蝶魚	+				+
	Chaetodon vagabundus	飄浮蝴蝶魚	+		+	+	++
	Chaetodon xanthurus	紅尾蝴蝶魚			+		+
	Chaetodon punctatofasciatus	點斑橫帶蝴蝶魚			+		+
	Chaetodon ulietensis	烏利蝴蝶魚		+			
	Forcipiger flavissimus	黃鑷口魚	+				+
	Heniochus acuminatus	白吻雙帶立旗鯛	+				
	Heniochus chrysostomus	三帶立旗鯛			+		
	Heniochus varius	黑身立旗鯛	+			+	
Cirrhitidae 魚翁科	*Paracirrhites forsteri*	福氏副翁			+		
	Cirrhitichthys oxycephalus	尖頭金					+
	Cirrhitichthys falco	鷹金翁	+				
Ephippidae 白鯧科	*Platax orbicularis*	圓眼燕魚			+		
Gobiidae 鰕虎科	*Valenciennea strigata*	紅帶范氏塘鱧				+	
Haemulidae 石鱸科	*Plectorhinchus lessonii*	雷氏胡椒鯛	+			+	
	Diagramma pictum	密點少棘胡椒鯛		+			
Holocentridae 金鱗魚科	*Neoniphon sammara*	莎姆金鱗魚		+++			
	Sargocentron caudomaculatum	尾斑棘鱗魚				+	
	Sargocentron melanospilos	黑點棘鱗魚		+			
Labridae 隆頭魚科	*Anampses meleagrides*	北斗阿南魚	++	+		+	
	Anampses twistii	雙斑阿南魚		+	+	+	+
	Bodianus axillaris	腋斑狐鯛	+		+		
	Bodianus mesothorax	中胸狐鯛			+	+	+
	Cheilinus chlorourus	綠尾唇魚					+

續表 5-5 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：110 年 11 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
	Cheilinus fasciatus	橫帶唇魚		+			
	Cheilinus trilobatus	三葉唇魚	+	+		+	
	Cheilio inermis	管唇魚		+	+	+	
	Cirrhilabrus cyanopleura	藍身絲鰭鸚鯛			+		
	Cirrhilabrus melanomarginatus	黑緣絲鰭鸚鯛				+	
	Cirrhilabrus temminckii	丁氏絲鰭鸚鯛				+	
	Coris gaimard	蓋馬氏盔魚			+		+
	Gomphosus varius	雜色尖嘴魚	+	++	++	+	
	Labroides bicolor	二色裂唇魚		+		+	
	Labroides dimidiatus	裂唇魚		+	+	+	+
	Halichoeres hortulanus	雲斑海豬魚	++		+	+	+
	Halichoeres prostopeion	黑額海豬魚				+	
	Halichoeres nebulosus	雲紋海豬魚				+	
	Halichoeres trimaculatus	三斑海豬魚		+			
	Halichoeres scapularis	頸帶海豬魚		+			
	Hemigymnus melapterus	黑鰭半裸魚	+	+			
	Oxycheilinus digramma	雙線尖唇魚				+	
	Oxycheilinus unifasciatus	單帶尖唇魚	+			+	
	Parajulis poecilepterus	花鰭副海豬魚				++	
	Stethojulis bandanensis	黑星紫胸魚			++++		
	Thalassoma amblycephalus	鈍頭錦魚	++++			++++	
	Thalassoma hardwickii	哈氏錦魚		++++		+	
	Thalassoma jansenii	詹氏錦魚	+			+	+
	Thalassoma lutescens	黃衣錦魚	+			++++	+++
	Thalassoma lunare	新月錦魚		+			+
Lethrinidae 龍占魚科	*Monotaxis grandoculis*	異黑鯛	+				
	Lethrinus olivaceus	長吻龍占	+	+	+		
Lutjanidae 笛鯛科	*Lutjanus monostigma*	單斑笛鯛		++++			
	Lutjanus quinquelineatus	五線笛鯛		++++			
	Lutjanus bohar	白斑笛鯛	++++				
	Lutjanus fulvus	黃足笛鯛		++++		+	
	Macolor macularis	斑點羽鰓笛鯛					+
	Macolor niger	黑背羽鰓笛鯛			+		
Kyphosidae 舵科	*Kyphosus cinerascens*	天竺舵魚	++		+		
Monacanthidae 單棘鮐科	*Cantherhines dumerilii*	杜氏刺鼻單棘鮐	+	+	+	+	
Mullidae 羊魚科	*Mulloidichthys vanicolensis*	金帶擬鬚鯛	++++	++++	+		
	Parapeneus barberinus	單帶海緋鯉	+				
	Parapeneus multifasciatus	多帶海緋鯉		+		+	+
	Upeneus tragula	黑斑緋鯉		++			
Nemipteridae 金線魚科	*Scolopsis bilineatus*	雙帶眶棘鱸	++	+	+		+
	Scolopsis trilineata	三帶眶棘鱸		+			
	Scolopsis xenochroa	欖斑眶棘鱸		+			
Nemipteridae 金線魚科	*Scolopsis xenochrous*	黃帶赤尾冬		+			
	Ostracion meleagris	米點箱鮐	+				
Pempheridae 擬金眼鯛科	*Pempheris oualensis*	烏伊蘭擬金眼鯛	+++	++++			++
Pinguipedidae 虎鰶科(擬鯔科)	*Parapercis millepunctata*	雪點擬鱸	+				+
	Parapercis pacifica	太平洋擬鱸		+			
Pomacanthidae 蓋刺魚科	*Centropyge ferrugata*	鏽紅刺尻魚			+		
	Centropyge vrolickii	伏羅式蓋刺魚	+		+		
	Pomacanthus imperator	條紋蓋刺魚			+		
	Pomacanthus semicirculatus	疊波蓋刺魚		+	+		+

續表 5-5 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：110 年 11 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
Pomacentridae 雀鯛科	*Amblyglyphidodon curacao*	橘鈍寬刻齒雀鯛		++++			
	Amblyglyphidodon aureus	黃背寬刻齒雀鯛	+				
	Abedefduf vaigiensis	條紋豆娘魚	++++				
	Amphiprion frenatus	白條雙鋸魚			+		
	Amphiprion clarkii	克氏雙鋸魚		+		+	+
	Chromis margaritifer	二色光鰓雀鯛	++++	+	++++	++++	++++
	Chromis xanthura	黃尾光鰓雀鯛			+	+	
	Chromis ternatensis	三葉光鰓雀鯛	++++				++++
	Chromis virides	藍綠光鰓雀鯛	+	++++			
	Chromis weberi	魏氏光鰓雀鯛	++		+		
	Dascyllas reticulatus	網紋圓雀鯛	++++	++++			
	Dascyllas trimaculatus	三斑圓雀鯛		++++	++++		
	Dascyllas aruanus	三帶圓雀鯛		+			
	Neoglyphidodon melas	黑副雀鯛		++++	++++	++	+
	Neoglyphidodon nigroris	黑褐副雀鯛		++++	+		
	Pomacentrus coelestis	霓虹雀鯛	+++		+	+++	+++
	Pomacentrus vaiuli	王子雀鯛				+	+
	Stegastes fasciolatus	藍紋高身雀鯛		+			+
	Pomacentrus nagasakiensis	長崎雀鯛				+	
	Pomacentrus alexanderae	胸斑雀鯛			+		
	Pomacentrus chrysurus	白尾雀鯛				+	
	Pomacentrus lepidogenys	頰鱗雀鯛					+
	Plectroglyphidodon johnstonianus	約島式固曲齒鯛	+				
	Plectroglyphidodon lacrymatus	珠點固曲齒鯛		+		+	
	Pomacentrus philippinus	菲律賓雀鯛			+		
Pseudochromidae 准雀鯛科	*Labracinus cyclophthalmus*	圓眼戴氏魚		+			
Ptereleotridae 凹尾塘鱧科	*Ptereleotris evides*	瑰麗塘鱧		+		++	+
	Nemateleotris magnifica	絲鰭線塘鱧				+	
Scaridae 鸚哥魚科	*Scarus forsteni*	福氏鸚哥魚	++++	+	+	++	+
	Scarus rubroviolaceus	紅紫鸚哥魚	+++		+		
	Scarus rivulatus	雜紋鸚哥魚		+			
	Scarus festivus	橫紋鸚哥魚				+++	
	Scarus oviceps	姬鸚哥魚	+	+			
	Scarus schlegeli	史氏鸚哥魚	+++		+		+
Scorpaenidae 鮋科	*Pterois antennata*	觸角簑鮋			+		
	Pterois radiata	輻紋簑鮋				+	
	Pterois volitans	魔鬼簑鮋		+			
Serranidae 鮨科	*Cephalopholis urodeta*	尾紋九刺鮨		+		+	
	Pseudanthias squamipinnis	絲鰭擬花鮨					++++
	Pseudanthias pascalus	厚唇擬花鱸			++		
Siganidae 臭肚魚科	*Siganus virgatus*	藍帶臭肚魚	+				
Tetraodontidae 四齒鈍科	*Canthigaster valentini*	瓦氏尖鼻鈍			+	+	+
Zanclidae 角蝶魚科	*Zanclus cornutus*	角鑲魚	++	+++	++	+	+

表 5-6 第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚類相及後壁湖魚類相一覽表(民國 110 年 4 次調查)

＊表珊瑚礁魚類　※表魚市場所漁獲種類

科名	學名	中文名稱	110/2	110/5	110/8	110/11
Acanthuridae 刺尾鯛科	*Acanthurus bariene*	肩斑刺尾鯛		*※	※	
	Acanthurus bleekeri	布氏刺尾鯛	※	※	※	※
	Acanthurus dussumieri	杜氏刺尾鯛	*※	*※	*※	*※
	Acanthurus japonicus	日本刺尾鯛	*		*	
	Acanthurus lineatus	線紋刺尾鯛			*※	*
	Acanthurus mata	後刺尾鯛			※	
	Acanthurus nigricauda	黑尾刺尾鯛			*	
	Acanthurus nigrofuscus	褐斑刺尾鯛	*	*	*	*
	Acanthurus olivaceus	一字刺尾鯛	*	*	*	
	Acanthurus pyroferus	火紅刺尾鯛	*	*		
	Ctenochaetus binotatus	雙斑櫛齒刺尾鯛	*		*	*
	Ctenochaetus striatus	連紋櫛齒刺尾鯛				*
	Naso lituratus	黑背鼻魚	*	*	*	*
	Naso unicornis	單角鼻魚	*	*	*	*
	Zebrasoma flavescens	高鰭刺尾鯛		*		
	Zebrasoma scopas	小高鰭刺尾鯛	*	*	*	*
	Zebrasoma veliferum	高鰭刺尾鯛	*			
Apogonidae 天竺鯛科	*Cheilodipterus artus*	縱帶巨齒天竺鯛			*	*
Aulostomidae 管口魚科	*Aulostomus chinensis*	中華管口魚		*		*
Balistidae 鱗鮕科	*Balistapus undulatus*	波紋鈎鱗鮕	*	*	*	
	Balistoides viridescens	褐擬鱗鮕	*	*		※
	Melichthys vidua	黑邊角鱗鮕		*		
	Pseudobalistes flavimarginatus	黃緣副鱗鮕				※
	Sufflamen chrysopterus	金鰭鼓氣鱗鮕	*	*	*	*
Berycidae 金眼鯛科	*Centroberyx rubricaudus*	紅尾棘金眼鯛			※	
Belonidae 鶴鱵科	*Tylosurus crocodilus*	鱷形叉尾鶴鱵			*	
Blenniidae 鰨科	*Meiacanthus grammistes*	黑帶稀棘鰨	*	*	*	*
Caesionidae 烏尾鮗科	*Caesio caerulaureus*	烏尾鮗	*	*	*	*
	Caesio teres	黃藍背烏尾鮗		*	*	*
	Pterocaesio digramma	雙帶鱗鰭烏尾鮗	*	*	*	*
Carangidae 鯵科	*Caranx ignobilis*	浪人鯵	*	*		
	Caranx melampygus	藍鰭鯵		*	*	
	Pseudocaranx dentex	黃帶擬鯵				*
	Seriola dumerili	紅鉤鯵	※	※	※	※
Chaetodontidae 蝴蝶魚科	*Chaetodon argentatus*	銀身蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon auriga	揚旛蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon auripes	耳帶蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon baronessa	曲紋蝴蝶魚		*		*
	Chaetodon citrinellus	胡麻斑蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon ephippium	鞍斑蝴蝶魚	*	*	*	
	Chaetodon kleinii	克氏蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon lineolatus	紋身蝴蝶魚				※
	Chaetodon lunula	月斑蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon lunulatus	弓月蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon melannotus	黑背蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon punctatofasciatus	點斑橫帶蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon rafflecii	雷氏蝴蝶魚	*		*	*
	Chaetodon speculum	鏡班蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon trifascialis	川紋蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon ulietensis	烏利蝴蝶魚	*			*
	Chaetodon unimaculatus	一點蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon vagabundus	飄浮蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon wiebeli	魏氏蝴蝶魚	*			

續表 5-6 第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚類相及後壁湖魚類相一覽表(民國 110 年 4 次調查)

＊表珊瑚礁魚類　※表魚市場所漁獲種類

科名	學名	中文名稱	110/2	110/5	110/8	110/11
	Chaetodon xanthurus	紅尾蝴蝶魚	*	*	*	*
	Forcipiger flavissimus	黃鑷口魚	*	*		*
	Heniochus acuminatus	白吻雙帶立旗鯛	*		*	*
	Heniochus chrysostomus	三帶立旗鯛		*		*
	Heniochus monoceros	烏面立旗鯛	*			
	Heniochus varius	黑身立旗鯛			*	*
Cirrhitidae 魚翁科	*Cirrhitichthys falco*	鷹金翁				*
	Cirrhitichthys oxycephalus	尖頭金				*
	Paracirrhites forsteri	福氏副翁	*	*	*	*
Coryphaenidae 鱰科	*Coryphaena hippurus*	鬼頭刀		※		
Diodontidae 二齒魨科	*Diodon holocanthus*	六斑二齒魨	※	※		※
	Diodon hystrix	密斑二齒魨	※	※		
	Diodon liturosus	紋二齒魨		*		
Ephippidae 白鯧科	*Platax orbicularis*	圓眼燕魚				*
Exocoetidae 飛魚科	*Cheilopogon cyanopterus*	黑鰭飛魚		※		
	Cheilopogon unicolor	白鰭飛魚		※		
	Cypselurus poecilopterus	斑鰭飛魚		※		
Fistulariidae 馬鞭魚科	*Fistularia petimba*	鱗馬鞭魚				※
Gobiidae 鰕虎科	*Amblyeleotris wheeleri*	紅紋鈍鯊		*		
	Amblygobius phalaena	尾斑鈍鯊	*		*	
	Valenciennea strigata	紅帶范氏塘鱧				*
Haemulidae 石鱸科	*Diagramma pictum*	密點少棘胡椒鯛				*
	Parapristipoma trilineatum	三線雞魚	※		※	
	Plectorhinchus lessonii	雷氏胡椒鯛	※		*※	*※
	Plectorhinchus lineatus	條紋胡椒鯛	※	*※	※	
	Plectorhinchus vittatus	條斑胡椒鯛	※	※		
Holocentridae 金鱗魚科	*Myripristis formosa*	台灣松毬	*	*		
	Myripristis kuntee	康德鋸鱗魚	*	*※	*	※
	Myripristis violacea	紫鋸鱗魚	*	*		
	Neoniphon sammara	莎姆金鱗魚	*	*	*	*
	Sargocentron caudomaculatum	尾斑棘鱗魚	*	*	*	*
	Sargocentron diadema	黑鰭棘鱗魚		※		
	Sargocentron ittodai	銀帶棘鱗魚	*		*	
	Sargocentron melanospilos	黑點棘鱗魚				*
	Sargocentron spiniferum	尖吻棘鱗魚	*	*	*	
Kyphosidae 舵科	*Kyphosus cinerascens*	天竺舵魚				*
	Kyphosus lembus	蘭勃舵魚		※		※
Labridae 隆頭魚科	*Anampses meleagrides*	北斗阿南魚	*	*	*	*
	Anampses neoguinaicus	新幾內亞鸚鯛		*		
	Anampses twistii	雙斑阿南魚		*	*	*
	Bodianus axillaris	腋斑狐鯛	*	*		*
	Bodianus diana	對斑狐鯛			*	
	Bodianus mesothorax	中胸狐鯛	*	*	*	*
	Cheilinus chlorourus	綠尾唇魚	*			*
	Cheilinus fasciatus	橫帶唇魚				*
	Cheilinus trilobatus	三葉唇魚	*	*	*※	*※
	Cheilinus undulates	曲紋唇魚		*		
	Cheilio inermis	管唇魚				*
	Cirrhilabrus cyanopleura	藍身絲鰭鸚鯛	*	*	*	*
	Cirrhilabrus exquistus	艷麗絲鰭鸚鯛		*		
	Cirrhilabrus lunatus	新月絲鰭鸚鯛		*	*	
	Cirrhilabrus melanomarginatus	黑緣絲鰭鸚鯛			*	*

續表 5-6 第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚類相及後壁湖魚類相一覽表(民國 110 年 4 次調查)

＊表珊瑚礁魚類　※表魚市場所漁獲種類

科名	學名	中文名稱	110/2	110/5	110/8	110/11
	Cirrhilabrus rubimarginatus	紅緣絲鰭鸚鯛		*		
	Cirrhilabrus temminckii	丁氏絲鰭鸚鯛				*
	Coris aygula	紅喉盔魚			*	
	Coris dorsomacula	背斑盔魚		*	*	
	Coris gaimard	蓋馬氏盔魚	*	*	*	*
	Gomphosus varius	雜色尖嘴魚	*	*	*	*
	Halichoeres hortulanus	雲斑海豬魚	*	*	*	*
	Halichoeres margaritaceus	斑點海豬魚			*	
	Halichoeres nebulosus	雲紋海豬魚				*
	Halichoeres prostopeion	黑額海豬魚	*	*	*	*
	Halichoeres scapularis	頸帶海豬魚		*	*	*
	Halichoeres trimaculatus	三斑海豬魚		*	*	*
	Hemigymnus fasciatus	條紋厚唇魚	*	*		
	Hemigymnus melapterus	黑鰭半裸魚	*	*	*	*
	Hologymnosus annulatus	環紋全裸鸚鯛		*		
	Iniistius baldwini	巴氏項鰭魚	※			
	Labrichthys unilineatus	單線突唇魚		*		
	Labroides bicolor	二色裂唇魚	*	*	*	*
	Labroides dimidiatus	裂唇魚	*	*	*	*
	Macropharyngodon meleagris	朱斑大咽齒魚		*	*	
	Oxycheilinus unifasciatus	單帶尖唇魚	*	*	*	*
	Oxycheilinus digramma	雙線尖唇魚				*
	Parajulis poecilepterus	花鰭副海豬魚		*		*
	Pseudocheilinus evanidus	姬擬唇魚		*		
	Pseudocheilinus hexataenia	六帶擬唇魚		*	*	
	Stethojulis bandanensis	黑星紫胸魚		*	*	*
	Stethojulis trilineata	三線紫胸魚		*		
	Thalassoma amblycephalus	鈍頭錦魚	*	*	*	*
	Thalassoma hardwickii	哈氏錦魚	*	*	*	*
	Thalassoma jansenii	詹氏錦魚	*	*	*	*
	Thalassoma lunare	新月錦魚	*	*	*	*
	Thalassoma lutescens	黃衣錦魚	*	*	*	*
	Thalassoma purpureum	紫錦魚	※		*	
	Thalassoma quinquevittatum	五帶錦魚			*	
Lethrinidae 龍占魚科	*Gnathodentex aurolineatus*	金帶鯛		*		
	Lethrinus miniatus	長吻龍占		*	※	*※
	Lethrinus ornatus	黃帶龍占	※	※	※	
	Lethrinus rubrioperculatus	紅鰓龍占		※	※	
	Monataxis grandoculis	異黑鯛	*	*	※	*
Lutjanidae 笛鯛科	*Aphareus rutilans*	銹色細齒笛鯛			※	
	Etelis coruscans	長尾濱鯛			※	※
	Lutjanus argentimaculatus	銀紋笛鯛	※	※	※	※
	Lutjanus bengalensis	孟加拉笛鯛	※			
	Lutjanus bohar	白斑笛鯛				*
	Lutjanus boutton	藍帶笛鯛	※			
	Lutjanus decussates	交叉笛鯛			*	
	Lutjanus fulviflamma	火斑笛鯛			*※	
	Lutjanus fulvus	黃足笛鯛	*※	*	*	*
	Lutjanus gibbus	隆背笛鯛	※	※	※	※
	Lutjanus lutjanus	正笛鯛	※	※	※	
	Lutjanus kasmira	四線笛鯛	※			
	Lutjanus monostigma	單斑笛鯛	*			*
	Lutjanus quinquelineatus	五線笛鯛	※			*

續表 5-6 第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚類相及後壁湖魚類相一覽表(民國 110 年 4 次調查)

＊表珊瑚礁魚類　※表魚市場所漁獲種類

科名	學名	中文名稱	110/2	110/5	110/8	110/11
	Lutjanus rivulatus	海雞母笛鯛	※		※	※
	Paracaesio xanthura	黃擬烏尾鯵			※	
	Paracaesio caeruleus	藍色擬烏尾冬		※		
	Pristipomoides filamentosus	絲鰭姬鯛			※	※
	Macolor macularis	斑點羽鰓笛鯛				*
	Macolor maculatus	斑點笛鯛			*	
	Macolor niger	黑背羽鰓笛鯛				*
Monacanthidae 單棘魨科	*Aluterus scriptus*	長尾革單棘魨			※	
Mugilidae 鯔科	*Planiliza macrolepis*	大鱗鯔			※	※
Mullidae 羊魚科	*Mulloidichthys falvolineatus*	黃線擬鬚鯛	*	*※	*	
	Mulloidichthys vanicolensis	金帶擬鬚鯛	*	*	*	*※
	Upeneus tragula	黑斑緋鯉	*			*
	Parapeneus barberinus	單帶海緋鯉	*	*		*
	Parapeneus ciliatus	短鬚海緋鯉		*	※	
	Parapeneus cyclostomus	圓口海緋鯉		*		
	Parapeneus multifasciatus	多帶海緋鯉	*※	*	*※	*
	Parupeneus spilurus	大型海緋鯉	※		※	※
Muraenidae 鯙科	*Gymothorax favagircus*	黑斑裸胸鯙	※	※	※	※
Nemipteridae 金線魚科	*Scolopsis bilineatus*	雙帶眶棘鱸	*	*	*	*
	Scolopsis ciliata	齒頜眶棘鱸		*		
	Scolopsis lineata	線紋眶棘鱸		*		
	Scolopsis monogramma	單帶眶棘鱸		*	*	
	Scolopsis trilineata	三帶眶棘鱸				*
	Scolopsis xenochroa	欖斑眶棘鱸	*			*
	Scolopsis xenochrous	黃帶赤尾冬				*
Oplegnathidae 石鯛科	*Oplegnathus punctatus*	斑石鯛	※	※		
Ostraciidae 箱魨科	*Ostracion cubicus*	粒突箱魨		*		
	Ostracion meleagris	米點箱魨	*			*
Pempheridae 擬金眼鯛科	*Pempheris oualensis*	烏伊蘭擬金眼鯛	*	*	*	*
Pinguipedidae 虎鰔科(擬鯔科)	*Parapercis clathrata*	四斑擬鱸		*		
	Parapercis millepunctata	雪點擬鱸	*		*	*
	Parapercis pacifica	太平洋擬鱸		*	*	*
Polynemidae 馬鮁科	*Eleutheronema tetradactylum*	四指馬鮁				※
Pomacanthidae 蓋刺魚科	*Centropyge bicolor*	二色刺尻魚		*		
	Centropyge ferrugata	鏽紅刺尻魚				*
	Centropyge vrolickii	伏羅式蓋刺魚	*	*	*	*
	Pomacanthus imperator	條紋蓋刺魚	*	*		*
	Pomacanthus semicirculatus	疊波蓋刺魚	*	*	*	*
	Pygoplites diacanthus	甲尻魚	*	*	*	
Pomacentridae 雀鯛科	*Abedefduf vaigiensis*	條紋豆娘魚	*	*	*※	*
	Abudefduf sexfasciatus	六線豆娘魚	*	*	*※	
	Amblyglyphidodon aureus	黃背寬刻齒雀鯛	*			*
	Amblyglyphidodon curacao	橘鈍寬刻齒雀鯛	*	*	*	*
	Amblyglyphidodon leucogaster	白腹寬刻齒雀鯛		*		
	Amphiprion clarkii	克氏雙鋸魚	*	*	*	*
	Amphiprion frenatus	白條雙鋸魚			*	*
	Chromis alleni	亞倫氏光鰓雀鯛			*	
	Chromis atripectoralis	黑腋光鰓雀鯛		*		
	Chromis lepidolepis	細鱗光鰓雀鯛	*			
	Chromis margaritifer	二色光鰓雀鯛	*	*	*	*
	Chromis rex	雷克斯刻齒雀鯛		*		
	Chromis ternatensis	三葉光鰓雀鯛	*	*	*	*

續表 5-6 第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚類相及後壁湖魚類相一覽表(民國 110 年 4 次調查)

＊表珊瑚礁魚類　※表魚市場所漁獲種類

科名	學名	中文名稱	110/2	110/5	110/8	110/11
	Chromis virides	藍綠光鰓雀鯛	*	*	*	*
	Chromis weberi	魏氏光鰓雀鯛	*	*	*	*
	Chromis xanthura	黃尾光鰓雀鯛		*	*	*
	Dascyllas aruanus	三帶圓雀鯛		*	*	*
	Dascyllas reticulatus	網紋圓雀鯛	*	*	*	*
	Dascyllas trimaculatus	三斑圓雀鯛	*	*	*	*
	Neoglyphidodon melas	黑副雀鯛	*	*	*	*
	Neoglyphidodon nigroris	黑褐副雀鯛	*	*	*	*
	Plectroglyphidodon johnstonianus	約島式固曲齒鯛	*	*	*	*
	Plectroglyphidodon lacrymatus	珠點固曲齒鯛	*	*	*	*
	Pomacentrus alexanderae	胸斑雀鯛				*
	Pomacentrus amboinensis	安邦雀鯛			*	
	Pomacentrus chrysurus	白尾雀鯛		*		*
	Pomacentrus coelestis	霓虹雀鯛		*	*	*
	Pomacentrus lepidogenys	頰鱗雀鯛				*
	Pomacentrus nagasakiensis	長崎雀鯛				*
	Pomacentrus philippinus	菲律賓雀鯛	*	*	*	*
	Pomacentrus tripunctatus	三斑雀鯛		*	*	
	Pomacentrus vaiuli	王子雀鯛		*	*	*
	Stegastes fasciolatus	藍紋高身雀鯛			*	*
Priacanthidae 大眼鯛科	*Cookeolus japonicus*	日本紅目大眼鯛				※
	Priacanthus hamrur	寶石大眼鯛		※	*	
	Priacanthus macracanthus	大棘大眼鯛			*	
Pseudochromidae 准雀鯛科	*Labracinus cyclophthalmus*	圓眼戴氏魚	*	*	*	*
Ptereleotridae 凹尾塘鱧科	*Nemateleotris magnifica*	絲鰭線塘鱧		*		*
	Ptereleotris evides	瑰麗塘鱧	*	*	*	*
Salmonidae 鮭科	*Oncorhynchus keta*	鮭魚	※	※	※	※
Scaridae 鸚哥魚科	*Chlorurus sordidus*	白斑鸚哥魚		*		
	Scarus dimidiatus	新月鸚哥魚		*		
	Scarus festivus	橫紋鸚哥魚		*※		*※
	Scarus forsteni	福氏鸚哥魚	*	*※	*	*※
	Scarus ghobban	藍點鸚哥魚	※	*※	*※	※
	Scarus hypselopterus	爪哇鸚哥魚	*	*		
	Scarus oviceps	姬鸚哥魚		*		*
	Scarus prasiognathos	綠頷鸚哥魚	※	※		
	Scarus psittacus	棕吻鸚哥魚				※
	Scarus rivulatus	雜紋鸚哥魚	※	*※	*※	*※
	Scarus rubroviolaceus	紅紫鸚哥魚	*※	*※	※	*※
	Scarus schlegeli	史氏鸚哥魚	*	*	*※	*※
Scatophagidae 金錢魚科	*Scatophagus argus*	金錢魚				※
Scorpaenidae 鮋科	*Dendrochirus zebra*	斑馬紋多臂簑鮋	*			
	Helicolenus hilgendorfi	無鰾鮋	※	※	※	※
	Pterois antennata	觸角簑鮋	*	*	*	*
	Pterois radiata	輻紋簑鮋				*
	Pterois volitans	魔鬼簑鮋				*
	Synanceia verrucosa	玫瑰毒鮋	※		※	
Serranidae 鮨科	*Anyperodon leucogrammicus*	白線光腭鱸	※			
	Cephalopholis argus	斑點九刺鮨	※	*		
	Cephalopholis miniata	青星九刺鮨	※			
	Cephalopholis spiloparaea	黑緣九刺鮨	※			

續表 5-6 第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚類相及後壁湖魚類相一覽表(民國 110 年 4 次調查)

＊表珊瑚礁魚類　※表魚市場所漁獲種類

科名	學名	中文名稱	*110/2*	*110/5*	*110/8*	*110/11*
	Cephalopholis urodeta	尾紋九刺鮨	*	*	*	*
	Epinephelus akaara	赤點石斑魚			*	
	Epinephelus areolatus	寶石石斑魚	※			
	Epinephelus bleekeri	布氏石斑魚	※			
	Epinephelus coioides	點帶石斑魚	※			※
	Epinephelus fasciatus	橫帶石斑魚		*	※	
	Epinephelus fuscoguttatus♀* *Epinephelus lanceolatus*♂	龍虎斑	※	※	※	※
	Epinephelus hexagonatus	六角石斑魚			*	
	Pseudanthias pascalus	厚唇擬花鱸			*	*
	Pseudanthias squamipinnis	絲鰭擬花鮨	*		*	*
	Variola albimarginata	白緣星鰺	※			
	Variola louti	星鰺	※	※		
Siganidae 臭肚魚科	*Siganus virgatus*	藍帶臭肚魚				*
Tetraodontidae 四齒鮭科	*Arothron hispidus*	紋腹叉鼻鮭	※		※	
	Arothron manilensis	菲律賓叉鼻鮭				※
	Arothron reticularis	網斑叉鼻鮭		*		
	Cantherhines dumerilii	杜氏刺鼻單棘鮭	*	*	*	*
	Cantherhines pardalis	細斑刺鼻單棘鮭		*		
	Canthigaster valentini	瓦氏尖鼻鮭	*	*	*	*
Trichiuridae 帶魚科	*Trichiurus lepturus*	白帶魚	※			
Zanclidae 角蝶魚科	*Zanclus cornutus*	角鑲魚	*	*	*	*

表 5-7 民國 110 年第三核能發電廠附近海域各測站魚類相之調查

◎表示未受溫排水影響及受溫排水影響區均可發現之種類　　調查日期：110 年 2 月、5 月、8 月及 11 月

科名	學名	中文名稱		測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
Acanthuridae 刺尾鯛科	*Acanthurus bariene*	肩斑刺尾鯛			*			
	Acanthurus dussumieri	杜氏刺尾鯛	◎	*	*	*	*	*
	Acanthurus japonicus	日本刺尾鯛				*	*	
	Acanthurus lineatus	線紋刺尾鯛	◎	*				*
	Acanthurus nigricauda	黑尾刺尾鯛			*			
	Acanthurus nigrofuscus	褐斑刺尾鯛	◎	*	*	*	*	*
	Acanthurus olivaceus	一字刺尾鯛	◎	*			*	*
	Acanthurus pyroferus	火紅刺尾鯛				*	*	*
	Ctenochaetus binotatus	雙斑櫛齒刺尾鯛	◎	*	*	*	*	*
	Ctenochaetus striatus	連紋櫛齒刺尾鯛				*		
	Naso lituratus	黑背鼻魚	◎	*		*	*	*
	Naso unicornis	單角鼻魚	◎		*	*		*
	Zebrasoma flavescens	高鰭刺尾鯛	◎	*		*		
	Zebrasoma scopas	小高鰭刺尾鯛	◎	*	*	*	*	*
	Zebrasoma veliferum	高鰭刺尾鯛			*			
Apogonidae 天竺鯛科	*Cheilodipterus artus*	縱帶巨齒天竺鯛	◎		*	*		
Aulostomidae 管口魚科	*Aulostomus chinensis*	中華管口魚	◎	*		*		
Balistidae 鱗鮕科	*Balistapus undulatus*	波紋鈎鱗鮕	◎	*	*			*
	Balistoides viridescens	褐擬鱗鮕			*			
	Melichthys vidua	黑邊角鱗鮕		*				
	Sufflamen chrysopterus	金鰭鼓氣鱗鮕	◎	*	*	*	*	*
Belonidae 鶴鱵科	*Tylosurus crocodilus*	鱷形叉尾鶴鱵			*			
Blenniidae 鰨科	*Meiacanthus grammistes*	黑帶稀棘鰨	◎	*	*	*	*	*
Caesionidae 烏尾鮗科	*Caesio caerulaureus*	烏尾鮗	◎	*	*	*		
	Caesio teres	黃藍背烏尾鮗				*		*
	Pterocaesio digramma	雙帶鱗鰭烏尾鮗	◎	*	*	*	*	*
Carangidae 鯵科	*Caranx ignobilis*	浪人鯵	◎		*	*		
	Caranx melampygus	藍鰭鯵		*	*			
	Pseudocaranx dentex	黃帶擬鯵			*			
Chaetodontidae 蝴蝶魚科	*Chaetodon argentatus*	銀身蝴蝶魚	◎		*	*	*	*
	Chaetodon auriga	揚旛蝴蝶魚	◎		*	*		*
	Chaetodon auripes	耳帶蝴蝶魚	◎	*	*	*	*	*
	Chaetodon baronessa	曲紋蝴蝶魚		*				
	Chaetodon citrinellus	胡麻斑蝴蝶魚	◎	*		*	*	*
	Chaetodon ephippium	鞍斑蝴蝶魚	◎	*	*	*	*	
	Chaetodon kleinii	克氏蝴蝶魚	◎	*	*	*	*	*
	Chaetodon lunula	月斑蝴蝶魚	◎	*		*	*	*
	Chaetodon lunulatus	弓月蝴蝶魚	◎	*	*	*	*	*
	Chaetodon melannotus	黑背蝴蝶魚	◎	*	*	*		*
	Chaetodon punctatofasciatus	點斑橫帶蝴蝶魚	◎	*		*	*	*
	Chaetodon rafflecii	雷氏蝴蝶魚		*	*			
	Chaetodon speculum	鏡斑蝴蝶魚	◎	*	*	*	*	*
	Chaetodon trifascialis	川紋蝴蝶魚	◎	*	*		*	*
	Chaetodon ulietensis	烏利蝴蝶魚		*	*			
	Chaetodon unimaculatus	一點蝴蝶魚	◎	*			*	*
	Chaetodon vagabundus	飄浮蝴蝶魚	◎	*	*	*	*	*
	Chaetodon wiebeli	魏氏蝴蝶魚						*
	Chaetodon xanthurus	紅尾蝴蝶魚	◎			*	*	*
	Forcipiger flavissimus	黃鑷口魚	◎	*		*	*	*
	Heniochus acuminatus	白吻雙帶立旗鯛	◎	*		*		*
	Heniochus chrysostomus	三帶立旗鯛				*		*
	Heniochus monoceros	烏面立旗鯛						*

續表 5-7 民國 110 年第三核能發電廠附近海域各測站魚類相之調查

◎表示未受溫排水影響及受溫排水影響區均可發現之種類　　調查日期：110 年 2 月、5 月、8 月及 11 月

科名	學名	中文名稱		測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
	Heniochus varius	黑身立旗鯛	◎	*		*	*	
Cirrhitidae 魚翁科	*Cirrhitichthys falco*	鷹金翁		*				
	Cirrhitichthys oxycephalus	尖頭金						*
	Paracirrhites forsteri	福氏副翁	◎		*	*	*	*
Diodontidae 二齒魨科	*Diodon liturosus*	紋二齒魨		*				
Ephippidae 白鯧科	*Platax orbicularis*	圓眼燕魚				*		
Gobiidae 鰕虎科	*Amblyeleotris wheeleri*	紅紋鈍鯊		*				
	Amblygobius phalaena	尾斑鈍鯊			*			
	Valenciennea strigata	紅帶范氏塘鱧					*	
Haemulidae 石鱸科	*Diagramma pictum*	密點少棘胡椒鯛			*			
	Plectorhinchus lessonii	雷氏胡椒鯛	◎	*			*	
	Plectorhinchus lineatus	條紋胡椒鯛						*
Holocentridae 金鱗魚科	*Myripristis formosa*	台灣松毬	◎	*	*			*
	Myripristis kuntee	康德鋸鱗魚	◎	*	*	*		
	Myripristis violacea	紫鋸鱗魚			*			
	Neoniphon sammara	莎姆金鱗魚	◎	*	*	*		
	Sargocentron caudomaculatum	尾斑棘鱗魚	◎	*		*	*	*
	Sargocentron ittodai	銀帶棘鱗魚				*		*
	Sargocentron melanospilos	黑點棘鱗魚			*			
	Sargocentron spiniferum	尖吻棘鱗魚	◎	*	*	*		
Kyphosidae 舵科	*Kyphosus cinerascens*	天竺舵魚	◎	*		*		
Labridae 隆頭魚科	*Anampses meleagrides*	北斗阿南魚	◎	*	*	*	*	*
	Anampses neoguinaicus	新幾內亞鸚鯛				*		
	Anampses twistii	雙斑阿南魚	◎	*	*	*	*	*
	Bodianus axillaris	腋斑狐鯛	◎	*		*		*
	Bodianus diana	對斑狐鯛				*		
	Bodianus mesothorax	中胸狐鯛	◎	*		*	*	*
	Cheilinus chlorourus	綠尾唇魚					*	*
	Cheilinus fasciatus	橫帶唇魚			*			
	Cheilinus trilobatus	三葉唇魚	◎	*	*	*	*	*
	Cheilinus undulates	曲紋唇魚					*	
	Cheilio inermis	管唇魚	◎		*	*	*	
	Cirrhilabrus cyanopleura	藍身絲鰭鸚鯛	◎	*	*	*	*	
	Cirrhilabrus exquistus	艷麗絲鰭鸚鯛			*			
	Cirrhilabrus lunatus	新月絲鰭鸚鯛	◎	*	*	*		*
	Cirrhilabrus melanomarginatus	黑緣絲鰭鸚鯛				*	*	*
	Cirrhilabrus rubimarginatus	紅緣絲鰭鸚鯛					*	
	Cirrhilabrus temminckii	丁氏絲鰭鸚鯛					*	
	Coris aygula	紅喉盔魚					*	
	Coris dorsomacula	背斑盔魚	◎	*		*	*	*
	Coris gaimard	蓋馬氏盔魚	◎	*	*	*		*
	Gomphosus varius	雜色尖嘴魚	◎	*	*	*	*	*
	Halichoeres hortulanus	雲斑海豬魚	◎	*	*	*	*	*
	Halichoeres margaritaceus	斑點海豬魚						*
	Halichoeres nebulosus	雲紋海豬魚					*	
	Halichoeres prostopeion	黑額海豬魚	◎	*		*	*	*
	Halichoeres scapularis	頸帶海豬魚	◎		*			*
	Halichoeres trimaculatus	三斑海豬魚	◎		*		*	*
	Hemigymnus fasciatus	條紋厚唇魚	◎			*	*	*

續表 5-7 民國 110 年第三核能發電廠附近海域各測站魚類相之調查

◎表示未受溫排水影響及受溫排水影響區均可發現之種類　　調查日期：110 年 2 月、5 月、8 月及 11 月

科名	學名	中文名稱		測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
	Hemigymnus melapterus	黑鰭半裸魚	◎	*	*			*
	Hologymnosus annulatus	環紋全裸鸚鯛		*				
	Labrichthys unilineatus	單線突唇魚	◎	*		*		*
	Labroides bicolor	二色裂唇魚	◎		*	*	*	*
	Labroides dimidiatus	裂唇魚	◎	*	*	*	*	*
	Macropharyngodon meleagris	朱斑大咽齒魚	◎	*		*	*	*
	Oxycheilinus digramma	雙線尖唇魚					*	
	Oxycheilinus unifasciatus	單帶尖唇魚	◎	*	*		*	*
	Parajulis poecilepterus	花鰭副海豬魚	◎	*			*	
	Pseudocheilinus evanidus	姬擬唇魚	◎	*			*	
	Pseudocheilinus hexataenia	六帶擬唇魚	◎		*			*
	Stethojulis bandanensis	黑星紫胸魚	◎		*	*	*	*
	Stethojulis trilineata	三線紫胸魚					*	*
	Thalassoma amblycephalus	鈍頭錦魚	◎	*	*	*	*	*
	Thalassoma hardwickii	哈氏錦魚	◎	*	*	*	*	*
	Thalassoma jansenii	詹氏錦魚	◎	*		*	*	*
	Thalassoma lunare	新月錦魚	◎	*	*	*	*	*
	Thalassoma lutescens	黃衣錦魚	◎	*	*	*	*	*
	Thalassoma purpureum	紫錦魚						*
	Thalassoma quinquevittatum	五帶錦魚						*
Lethrinidae 龍占魚科	*Gnathodentex aurolineatus*	金帶鯛		*				
	Lethrinus olivaceus	長吻龍占	◎	*	*	*		
	Monotaxis grandoculis	異黑鯛	◎	*		*		*
Lutjanidae 笛鯛科	*Lutjanus bohar*	白斑笛鯛		*				
	Lutjanus decussates	交叉笛鯛					*	
	Lutjanus fulviflamma	火斑笛鯛				*		
	Lutjanus fulvus	黃足笛鯛	◎	*	*		*	
	Lutjanus monostigma	單斑笛鯛			*			
	Lutjanus quinquelineatus	五線笛鯛			*			
	Macolor macularis	斑點羽鰓笛鯛						*
	Macolor maculatus	斑點笛鯛				*	*	
	Macolor niger	黑背羽鰓笛鯛				*		
Monacanthidae 單棘魨科	*Cantherhines dumerilii*	杜氏刺鼻單棘魨	◎	*	*	*	*	
	Cantherhines pardalis	細斑刺鼻單棘魨						*
Mullidae 羊魚科	*Mulloidichthys falvolineatus*	黃線擬鬚鯛			*			
	Mulloidichthys vanicolensis	金帶擬鬚鯛	◎	*	*	*	*	
	Parapeneus barberinus	單帶海緋鯉	◎	*	*			
	Parapeneus ciliatus	短鬚海緋鯉					*	
	Parapeneus cyclostomus	圓口海緋鯉						*
	Parapeneus multifasciatus	多帶海緋鯉	◎	*	*	*	*	*
	Upeneus tragula	黑斑緋鯉			*			
Nemipteridae 金線魚科	*Scolopsis bilineatus*	雙帶眶棘鱸	◎	*	*	*	*	*
	Scolopsis ciliata	齒頜眶棘鱸			*			
	Scolopsis lineata	線紋眶棘鱸						*
	Scolopsis monogramma	單帶眶棘鱸	◎		*		*	
	Scolopsis trilineata	三帶眶棘鱸			*			
	Scolopsis xenochroa	欖斑眶棘鱸	◎		*			*
	Scolopsis xenochrous	黃帶赤尾冬			*			

續表 5-7 民國 110 年第三核能發電廠附近海域各測站魚類相之調查

◎表示未受溫排水影響及受溫排水影響區均可發現之種類　　調查日期：110 年 2 月、5 月、8 月及 11 月

科名	學名	中文名稱		測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
Ostraciidae 箱鮏科	*Ostracion cubicus*	粒突箱鮏					*	
	Ostracion meleagris	米點箱鮏	◎	*				*
Pempheridae 擬金眼鯛科	*Pempheris oualensis*	烏伊蘭擬金眼鯛	◎	*	*	*		*
Pinguipedidae 虎鰔科(擬鰔科)	*Parapercis clathrata*	四斑擬鱸	◎	*				*
	Parapercis millepunctata	雪點擬鱸	◎	*	*			*
	Parapercis pacifica	太平洋擬鱸			*			
Pomacanthidae 蓋刺魚科	*Centropyge bicolor*	二色刺尻魚					*	
	Centropyge ferrugata	鏽紅刺尻魚				*		
	Centropyge vrolickii	伏羅式蓋刺魚	◎	*		*	*	*
	Pomacanthus imperator	條紋蓋刺魚				*	*	
	Pomacanthus semicirculatus	疊波蓋刺魚	◎	*	*	*	*	*
	Pygoplites diacanthus	甲尻魚	◎		*	*	*	*
Pomacentridae 雀鯛科	*Abedefduf vaigiensis*	條紋豆娘魚	◎	*	*		*	*
	Abudefduf sexfasciatus	六線豆娘魚			*			
	Amblyglyphidodon aureus	黃背寬刻齒雀鯛		*	*			
	Amblyglyphidodon curacao	橘鈍寬刻齒雀鯛	◎	*	*			*
	Amblyglyphidodon leucogaster	白腹寬刻齒雀鯛			*			
	Amphiprion clarkii	克氏雙鋸魚	◎	*	*		*	*
	Amphiprion frenatus	白條雙鋸魚	◎		*	*		
	Chromis alleni	亞倫氏光鰓雀鯛					*	*
	Chromis atripectoralis	黑腋光鰓雀鯛					*	
	Chromis lepidolepis	細鱗光鰓雀鯛	◎	*			*	
	Chromis margaritifer	二色光鰓雀鯛	◎	*	*	*	*	*
	Chromis rex	雷克斯刻齒雀鯛	◎		*		*	
	Chromis ternatensis	三葉光鰓雀鯛	◎	*	*	*	*	*
	Chromis virides	藍綠光鰓雀鯛		*	*			
	Chromis weberi	魏氏光鰓雀鯛	◎	*	*	*	*	*
	Chromis xanthura	黃尾光鰓雀鯛	◎	*	*	*	*	
	Dascyllas aruanus	三帶圓雀鯛	◎		*	*		
	Dascyllas reticulatus	網紋圓雀鯛	◎	*	*	*	*	
	Dascyllas trimaculatus	三斑圓雀鯛	◎	*	*	*	*	*
	Neoglyphidodon melas	黑副雀鯛	◎	*	*	*	*	*
	Neoglyphidodon nigroris	黑褐副雀鯛	◎	*	*	*	*	
	Plectroglyphidodon johnstonianus	約島式固曲齒鯛	◎	*	*		*	*
	Plectroglyphidodon lacrymatus	珠點固曲齒鯛	◎		*	*	*	*
	Pomacentrus alexanderae	胸斑雀鯛				*		
	Pomacentrus amboinensis	安邦雀鯛			*			
	Pomacentrus chrysurus	白尾雀鯛	◎		*		*	
	Pomacentrus coelestis	霓虹雀鯛	◎	*		*	*	*
	Pomacentrus lepidogenys	頰鱗雀鯛						*
	Pomacentrus nagasakiensis	長崎雀鯛					*	
	Pomacentrus philippinus	菲律賓雀鯛	◎	*	*	*	*	*
	Pomacentrus tripunctatus	三斑雀鯛	◎		*	*		
	Pomacentrus vaiuli	王子雀鯛				*	*	*
	Stegastes fasciolatus	藍紋高身雀鯛	◎		*		*	*
Priacanthidae 大眼鯛科	*Priacanthus hamrur*	寶石大眼鯛				*		
	Priacanthus macracanthus	大棘大眼鯛				*		

續表 5-7 民國 110 年第三核能發電廠附近海域各測站魚類相之調查

◎表示未受溫排水影響及受溫排水影響區均可發現之種類　　調查日期：110 年 2 月、5 月、8 月及 11 月

科名	學名	中文名稱		測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
Pseudochromidae 准雀鯛科	*Labracinus cyclophthalmus*	圓眼戴氏魚	◎	*	*	*	*	
Ptereleotridae 凹尾塘鱧科	*Nemateleotris magnifica*	絲鰭線塘鱧					*	*
	Ptereleotris evides	瑰麗塘鱧	◎	*	*	*	*	*
Scaridae 鸚哥魚科	*Chlorurus sordidus*	白斑鸚哥魚		*				
	Scarus dimidiatus	新月鸚哥魚			*			
	Scarus festivus	橫紋鸚哥魚				*	*	
	Scarus forsteni	福氏鸚哥魚	◎	*	*	*	*	*
	Scarus ghobban	藍點鸚哥魚	◎	*	*		*	*
	Scarus hypselopterus	爪哇鸚哥魚	◎		*		*	
	Scarus oviceps	姬鸚哥魚		*	*			
	Scarus rivulatus	雜紋鸚哥魚	◎		*		*	
	Scarus rubroviolaceus	紅紫鸚哥魚	◎	*	*	*	*	*
	Scarus schlegeli	史氏鸚哥魚	◎	*	*	*	*	*
Scorpaenidae 鮋科	*Dendrochirus zebra*	斑馬紋多臂簑鮋						*
	Pterois antennata	觸角簑鮋					*	*
	Pterois radiata	輻紋簑鮋					*	
	Pterois volitans	魔鬼簑鮋				*		
Serranidae 鮨科	*Cephalopholis argus*	斑點九刺鮨			*			
	Cephalopholis urodeta	尾紋九刺鮨	◎	*	*	*	*	*
	Epinephelus akaara	赤點石斑魚						*
	Epinephelus fasciatus	橫帶石斑魚						*
	Epinephelus hexagonatus	六角石斑魚				*		
	Pseudanthias pascalus	厚唇擬花鹫	◎	*		*		
	Pseudanthias squamipinnis	絲鰭擬花鮨				*	*	*
Siganidae 臭肚魚科	*Siganus virgatus*	藍帶臭肚魚		*				
Tetraodontidae 四齒魨科	*Arothron reticularis*	網斑叉鼻魨						*
	Canthigaster valentini	瓦氏尖鼻魨	◎	*	*	*	*	*
Zanclidae 角蝶魚科	*Zanclus cornutus*	角鐮魚	◎	*	*	*	*	*

表 5-8 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 2 月各測站魚類相之相似度

採樣日期	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
測站 1	1.00				
測站 2	0.30	1.00			
測站 3	0.31	0.28	1.00		
測站 4	0.34	0.18	0.37	1.00	
測站 5	0.27	0.24	0.41	0.23	1.00

表 5-9 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 5 月各測站魚類相之相似度

採樣日期	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
測站 1	1.00				
測站 2	0.24	1.00			
測站 3	0.42	0.21	1.00		
測站 4	0.33	0.20	0.34	1.00	
測站 5	0.43	0.19	0.40	0.34	1.00

Jaccard coefficient

表 5-10 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 8 月各測站魚類相之相似度

採樣日期	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
測站 1	1.00				
測站 2	0.27	1.00			
測站 3	0.38	0.25	1.00		
測站 4	0.34	0.25	0.34	1.00	
測站 5	0.26	0.27	0.26	0.35	1.00

Jaccard coefficient

表 5-11 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 11 月各測站魚類相之相似度

採樣日期	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
測站 1	1.00				
測站 2	0.18	1.00			
測站 3	0.29	0.18	1.00		
測站 4	0.24	0.26	0.23	1.00	
測站 5	0.23	0.21	0.31	0.29	1.00

Jaccard coefficient

表 5-12 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 4 次調查各測站魚類相之相似度

採樣日期	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
測站 1	1.00				
測站 2	0.45	1.00			
測站 3	0.50	0.41	1.00		
測站 4	0.46	0.39	0.50	1.00	
測站 5	0.47	0.38	0.49	0.49	1.00

Jaccard coefficient

表 5-13 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：111 年 2 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
Acanthuridae 刺尾鯛科	*Acanthurus dussumieri*	杜氏刺尾鯛		+			
	Acanthurus lineatus	線紋刺尾鯛	+	++			
	Acanthurus nigrofuscus	褐斑刺尾鯛	++	++++	++++	++++	++++
	Acanthurus pyroferus	火紅刺尾鯛			+		
	Ctenochaetus binotatus	雙斑櫛齒刺尾鯛	+	++++	++	++++	++++
	Naso lituratus	黑背鼻魚		+			
	Naso unicornis	單角鼻魚	++++	++++			
	Zebrasoma scopas	小高鰭刺尾鯛			++	++	
Aulostomidae 管口魚科	*Aulostomus chinensis*	中華管口魚		+			
Apogonidae 天竺鯛科	*Cheilodipterus artus*	縱帶巨齒天竺鯛	+				
Blenniidae 鰨科	*Meiacanthus grammistes*	黑帶稀棘鰨	+	+		+	
Caesionidae 烏尾鮗科	*Pterocaesio digramma*	雙帶鱗鰭烏尾鮗		++++	++++	++++	++++
	Caesio caerulaureus	烏尾鮗			++++	++++	+++
Carangidae 鯵科	*Caranx ignobilis*	浪人鯵	+				
Chaetodontidae 蝴蝶魚科	*Chaetodon argentatus*	銀身蝴蝶魚				+	+
	Chaetodon auriga	揚旙蝴蝶魚	+	+			
	Chaetodon auripes	耳帶蝴蝶魚	+	+	+	+	+
	Chaetodon citrinellus	胡麻斑蝴蝶魚		+			+
	Chaetodon ephippium	鞍斑蝴蝶魚	+	+			
	Chaetodon kleinii	克氏蝴蝶魚	+	++++	++	+	+
	Chaetodon lunulatus	弓月蝴蝶魚		++++	+	+	+
	Chaetodon lunula	月斑蝴蝶魚				+	
	Chaetodon melannotus	黑背蝴蝶魚	+			+	+
	Chaetodon plebeius	藍斑蝴蝶魚			+		
	Chaetodon speculum	鏡班蝴蝶魚		+	+	+	+
	Chaetodon trifascialis	川紋蝴蝶魚		+		+	
	Chaetodon unimaculatus	一點蝴蝶魚		+		+	
	Chaetodon vagabundus	飄浮蝴蝶魚	+	++	+	+	+
	Chaetodon xanthurus	紅尾蝴蝶魚		+			
	Chaetodon punctatofasciatus	點斑橫帶蝴蝶魚		+	+	+	+
	Forcipiger flavissimus	黃鑷口魚		+	+		+
	Heniochus acuminatus	白吻雙帶立旗鯛		+	+		
	Heniochus monoceros	烏面立旗鯛		+			+
Cirrhitidae 魚翁科	*Paracirrhites arcatus*	副魚翁				+	
	Paracirrhites forsteri	福氏副魚翁		+			
Haemulidae 石鱸科	*Plectorhinchus lessonii*	雷氏胡椒鯛					+
Holocentridae 金鱗魚科	*Myripristis kuntee*	康德鋸鱗魚	++++		+		
	Sargocentron caudomaculatum	尾斑棘鱗魚			+		
Kyphosidae 舵魚科	*Kyphosus lembus*	蘭勃舵魚		+			
Labridae 隆頭魚科	*Anampses meleagrides*	北斗阿南魚		+		+	
	Anampses twistii	雙斑阿南魚			+		
	Bodianus axillaris	腋斑狐鯛					+
	Bodianus diana	對斑狐鯛		+			
	Bodianus mesothorax	中胸狐鯛	+	+	+	+	
	Cheilinus trilobatus	三葉唇魚	+	+	+		+
	Cirrhilabrus cyanopleura	藍身絲鰭鸚鯛					++++
	Gomphosus varius	雜色尖嘴魚	+	+	++	+	
	Labrichthys unilineatus	單線突唇魚		+		+	+
	Labroides bicolor	二色裂唇魚				+	+
	Labroides dimidiatus	裂唇魚	+	+	+	++	
	Macropharyngodon meleagris	珠斑大咽齒鯛	+		+		

續表 5-13 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：111 年 2 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
	Halichoeres hortulanus	雲斑海豬魚		+	+	+++	
	Halichoeres nebulosus	雲紋海豬魚	+				
	Halichoeres prostopeion	黑額海豬魚			+		
	Halichoeres trimaculatus	三斑海豬魚	+			+	
	Hemigymnus fasciatus	條紋厚唇魚		+		+	
	Oxycheilinus unifasciatus	單帶尖唇魚	+				
	Thalassoma amblycephalus	鈍頭錦魚		++++		++++	
	Thalassoma hardwickii	哈氏錦魚	++++				
	Thalassoma jansenii	詹氏錦魚		+		+	
	Thalassoma lutescens	黃衣錦魚		++++	++++	++++	
	Thalassoma lunare	新月錦魚	+	+++			
Lethrinidae 龍占魚科	*Lethrinus miniatus*	長吻龍占	+				+
Lutjanidae 笛鯛科	*Lutjanus fulvus*	黃足笛鯛	+		+	+	
	Lutjanus vitta	縱帶笛鯛	+				
	Macolor niger	黑背羽鰓笛鯛				+	
Diodontidae 二齒魨科	*Diodon holocanthus*	六斑二齒魨			+		
Monacanthidae 單棘魨科	*Aluterus scriptus*	長尾革單棘魨	+				
	Cantherhines dumerilii	杜氏刺鼻單棘魨	+			+	
Mullidae 羊魚科	*Mulloidichthys falvolineatus*	黃線擬鬚鯛			+		
	Mulloidichthys vanicolensis	金帶擬鬚鯛	++++	+++		+	
	Parupeneus ciliatus	短鬚海緋鯉			+		+
	Parapeneus multifasciatus	多帶海緋鯉			+	+	+
	Upeneus tragula	黑斑緋鯉	+				
Nemipteridae 金線魚科	*Scolopsis bilineatus*	雙帶眶棘鱸	+		+	++	+
	Scolopsis ciliata	黃點赤尾冬	+				
	Scolopsis lineata	線紋眶棘鱸	++				
	Scolopsis xenochrous	欖斑赤尾冬	+		+		
	Scolopsis vosmeri	伏氏眶棘鱸	+				
Ostraciidae 箱魨科	*Ostracion cubicus*	粒突箱魨		+			
Pempheridae 擬金眼鯛科	*Pempheris oualensis*	烏伊蘭擬金眼鯛	+++	++++	+		
Pinguipedidae 虎鰔科(擬鯔科)	*Parapercis millepunctata*	雪點擬鱸		+			
	Parapercis pacifica	太平洋擬鱸	+		+		
Pomacanthidae 蓋刺魚科	*Centropyge vrolickii*	伏羅式蓋刺魚		+		+	
	Pomacanthus imperator	條紋蓋刺魚		+	+		
	Pomacanthus semicirculatus	疊波蓋刺魚	+	+	+	+	+
	Pygoplites diacanthus	甲冑魚	+	+	++		
Pomacentridae 雀鯛科	*Amblyglyphidodon curacao*	橘鈍寬刻齒雀鯛	++++				
	Abedefduf vaigiensis	條紋豆娘魚	++++	++++			
	Abudefduf sexfasciatus	六線豆娘魚	++++				
	Amphiprion clarkii	克氏雙鋸魚	+		+		++
	Amphiprion frenatus	白條雙鋸魚	+		+		
	Chromis delta	三角光鰓雀鯛					+
	Chromis lepidolepis	細鱗光鰓雀鯛	+	+	+	+	
	Chromis margaritifer	二色光鰓雀鯛		++++	++++	++++	++++
	Chromis ternatensis	三葉光鰓雀鯛			+		
	Chromis virides	藍綠光鰓雀鯛					++++
	Chromis weberi	魏氏光鰓雀鯛		+			+
	Chrysiptera rex	雷克斯刻齒雀鯛				+	+
	Dascyllas reticulatus	網紋圓雀鯛	++++	++++	++++		
	Dascyllas trimaculatus	三斑圓雀鯛	++++	+	++++	++	++++
	Dascyllas aruanus	三帶圓雀鯛	++++	+			
	Neoglyphidodon melas	黑副雀鯛	++++		+++	++++	++++

續表 5-13 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：111 年 2 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
	Neoglyphidodon nigroris	黑褐副雀鯛	+			++	
	Plectroglyphidodon johnstonianus	約島式固曲齒鯛	+				
	Plectroglyphidodon lacrymatus	珠點固曲齒鯛	+	+			
	Pomacentrus vaiuli	王子雀鯛				+	+
	Pomacentrus chrysurus	白尾雀鯛		+			+
	Pomacentrus coelestis	霓虹雀鯛		++		+	
	Pomacentrus tripunctatus	三斑雀鯛				+	
	Pomacentrus philippinus	菲律賓雀鯛	+	+	+++	+	
	Stegastes fasciolatus	藍紋高身雀鯛	+				
Priacanthidae 大眼鯛科	*Priacanthus hamrur*	寶石大眼鯛			+		
	Priacanthus macracanthus	大棘大眼鯛			+		
Pseudochromidae 准雀鯛科	*Labracinus cyclophthalmus*	圓眼戴氏魚	+			+	
Ptereleotridae 凹尾塘鱧科	*Nemateleotris magnifica*	絲鰭線塘鱧		+			
Scaridae 鸚哥魚科	*Scarus forsteni*	福氏鸚哥魚	+	++			++++
	Scarus frenatus	網紋鸚哥魚			+		
	Scarus ghobban	藍點鸚哥魚			+	+	
	Scarus festivus	橫紋鸚哥魚		+	++	++++	++++
	Scarus rivulatus	雜紋鸚哥魚				++++	++++
	Scarus rubroviolaceus	紅紫鸚哥魚		+		+	++++
	Scarus schlegeli	史氏鸚哥魚	++++	++	+	++++	
Scorpaenidae 鮋科	*Pterois volitans*	魔鬼簑鮋		+			
Serranidae 鮨科	*Cephalopholis urodeta*	尾紋九刺鮨		+	+		
	Pseudanthias squamipinnis	絲鰭擬花鮨		+	++++		++++
Tetraodontidae 四齒魨科	*Canthigaster valentini*	瓦氏尖鼻魨	+		+	++	
Zanclidae 角蝶魚科	*Zanclus cornutus*	角鐮魚	+	+	++++	++++	+++

表 5-14 第三核能發電廠附近海域漁獲魚類相之調查　　調查日期：111 年 2 月、5 月、8 月及 11 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	*111/2*	*111/5*	*111/8*	*111/11*
Acanthuridae 刺尾鯛科	*Acanthurus bleekeri*	布氏刺尾鯛				+
	Acanthurus dussumieri	杜氏刺尾鯛	++++	++++	+++	+++
	Acanthurus mata	後刺尾鯛			+	+
	Ctenochaetus striatus	漣紋櫛齒刺尾鯛		+		
Caesionidae 烏尾鮗科	*Pterocaesio digramma*	雙帶鱗鰭烏尾鮗	++++	++	++	+
Carangidae 鰺科	*Elagatis bipinnulata*	雙帶鰺			+	
	Seriola dumerili	紅鰤	++++	++++	++++	++++
	Trachinotus blochii	布氏鯧鰺				++
Coryphaenidae 鱰科	*Coryphaena hippurus*	鬼頭刀		++++		+
Diodontidae 二齒魨科	*Diodon holocanthus*	六斑二齒魨	++++	++++	++	+++
	Diodon hystrix	密斑二齒魨		+		
Exocoetidae 飛魚科	*Cheilopogon cyanopterus*	黑鰭飛魚		++++		
	Cheilopogon unicolor	白鰭飛魚		++++		
	Cypselurus poecilopterus	斑鰭飛魚		++++		
Haemulidae 石鱸科	*Plectorhinchus lessonii*	雷氏胡椒鯛	+			
	Plectorhinchus lineatus	條紋胡椒鯛			+	+
	Plectorhinchus vittatus	條斑胡椒鯛		+		
Holocentridae 金鱗魚科	*Myripristis kuntee*	康德鋸鱗魚		++++	+	
	Sargocentron diadema	黑鰭棘鱗魚			+	
Istiophoridae 正旗魚科	*Istiophorus platypterus*	雨傘旗魚				+
Kyphosidae 舵魚科	*Kyphosus lembus*	蘭勃舵魚		++		
Labridae 隆頭魚科	*Cheilinus trilobatus*	三葉唇魚		+		++
Lethrinidae 龍占魚科	*Lethrinus miniatus*	長吻龍占		+		
	Lethrinus nebulosus	青嘴龍占		+		+
	Lethrinus ornatus	黃帶龍占	+	++	+	
	Lethrinus rubrioperculatus	紅鰓龍占		++		
Lutjanidae 笛鯛科	*Etelis coruscans*	長尾濱鯛	++++	++++	++	++
	Lutjanus argentimaculatus	銀紋笛鯛	++++	++	+	+
	Lutjanus fulvus	黃足笛鯛				++
	Lutjanus gibbus	隆背笛鯛	++++	++++	++++	++++
	Lutjanus lutjanus	正笛鯛	++++	+		
	Lutjanus kasmira	四線笛鯛	++++			
	Lutjanus quinquelineatus	五線笛鯛	+	+	+	+
	Lutjanus rivulatus	海雞母笛鯛	++	++++	++++	+
	Paracaesio caeruleus	藍色擬烏尾冬		++++	++++	
	Paracaesio xanthurus	黃擬烏尾冬			++++	
Monacanthidae 單棘魨科	*Aluterus scriptus*	長尾革單棘魨				+
Mullidae 鬚鯛科	*Mulloidichthys vanicolensis*	金帶擬鬚鯛			+	
	Parupeneus indicus	印度海緋鯉		++		
	Parupeneus multifasciatus	多帶海緋鯉			+	+
	Parupeneus spilurus	大型海緋鯉	+			
Muraenidae 海鰻科	*Gymothorax favagircus*	黑斑裸胸鯙	+	+	+	+
Nemipteridae 金線魚科	*Scolopsis monogramma*	單帶眶棘鱸		++		
Oplegnathidae 石鯛科	*Oplegnathus punctatus*	斑石鯛	+	+	+	
Pomacanthidae 蓋刺魚科	*Pomacanthus semicirculatus*	疊波蓋刺魚		+		
Pomacentridae 雀鯛科	*Abedefduf vaigiensis*	條紋豆娘魚				++++
Priacanthidae 大眼鯛科	*Priacanthus hamrur*	寶石大眼鯛		++	+	
	Cookeolus japonicus	日本紅目大眼鯛			+	
Salmonidae 鮭科	*Oncorhynchus keta*	鮭魚	++++	++++	++++	++++

續表 5-14 第三核能發電廠附近海域漁獲魚類相之調查　　調查日期：111 年 2 月、5 月、8 月及 11 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	*111/2*	*111/5*	*111/8*	*111/11*
Scaridae 鸚哥魚科	*Scarus forsteni*	福氏鸚哥魚		++		
	Scarus ghobban	藍點鸚哥魚	++++	+	++++	+
	Scarus rubroviolaceus	紅紫鸚哥魚	++	+	++	++
	Scarus rivulatus	雜紋鸚哥魚	+	++++	+	+
	Scarus schlegeli	史氏鸚哥魚	+	+	++	+
Scombridae 鯖科	*Acanthocybium solandii*	棘鰆	++	+	+	++++
	Thunnus albacares	黃鰭鮪	++++	+	+	+
Scatophagidae 金錢魚科	*Scatophagus argus*	金錢魚		+		
Scorpaenidae 鮋科	*Helicolenus hilgendorfi*	無鰾鮋	++++	+++	++	
	Synanceia verrucosa	玫瑰毒鮋	+	+		
Serianidae 鮨科	*Anyperodon leucogrammicus*	白線光腭鱸		+		
	Cephalopholis miniata	青星九刺鮨	++++		+	++
	Cephalopholis spiloparaea	黑緣九刺鮨	++++		+	+
	Epinephelus coioides	點帶石斑魚	+		+	
	Epinephelus fuscoguttatus ♀* *Epinephelus lanceolatus* ♂	龍虎斑	++++	++++	++++	++++
	Epinephelus hexagonatus	六角石斑魚		+		
	Holanthias borbonius	粗斑花鱸			++++	
	Gracila albomarginata	白邊纖齒鱸				+
	Variola albimarginata	白緣星鱠				++++
	Variola louti	星鱠	++	++++	+	+
Trichiuridae 帶魚科	*Trichiurus lepturus*	白帶魚	++++	++++	++	++
Siganidae 藍子魚科	*Siganus guttatus*	點藍子魚		+		
Sphyraenidae 金梭魚科	*Sphyraena barracuda*	巴拉金梭魚				+

表 5-15 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：111 年 5 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
Acanthuridae 刺尾鯛科	*Acanthurus dussumieri*	杜氏刺尾鯛			+		
	Acanthurus japonicus	日本刺尾鯛	+				
	Acanthurus lineatus	線紋刺尾鯛				+	
	Acanthurus mata	後刺尾鯛	+				
	Acanthurus nigrofuscus	褐斑刺尾鯛	++	++	++++	+++	
	Acanthurus pyroferus	火紅刺尾鯛	+				
	Ctenochaetus binotatus	雙斑櫛齒刺尾鯛	++++		++++	++++	
	Naso lituratus	黑背鼻魚	++++		+	+	
	Zebrasoma scopas	小高鰭刺尾鯛	+		++++		
	Zebrasoma veliferum	高鰭刺尾鯛	+				
Aulostomidae 管口魚科	*Aulostomus chinensis*	中華管口魚	+				
Balistidae 鱗鮕科	*Balistapus undulatus*	波紋鈎鱗鮕					+
	Melichthys vidua	黑邊角鱗鮕				+	
Blenniidae 鰨科	*Aspidontus dussumieri*	杜氏盾齒鰨				+	
	Meiacanthus grammistes	黑帶稀棘鰨	+		+		+
Caesionidae 烏尾鮗科	*Caesio caerulaureus*	烏尾鮗				++++	
	Pterocaesio digramma	雙帶鱗鰭烏尾鮗	++++				
Carangidae 鰺科	*Caranx ignobilis*	浪人鰺					+
	Caranx melampygus	藍鰭鰺				+	
Chaetodontidae 蝴蝶魚科	*Chaetodon argentatus*	銀身蝴蝶魚			+		
	Chaetodon auripes	耳帶蝴蝶魚	+		+	+	
	Chaetodon citrinellus	胡麻斑蝴蝶魚	+	+	+		+
	Chaetodon kleinii	克氏蝴蝶魚	+	+	++++	++	
	Chaetodon lunulatus	弓月蝴蝶魚	+	+	+	+	+
	Chaetodon lunula	月斑蝴蝶魚	+	+			
	Chaetodon melannotus	黑背蝴蝶魚	+			+	
	Chaetodon ornatissimus	華麗蝴蝶魚				+	
	Chaetodon plebeius	藍斑蝴蝶魚		+			
	Chaetodon speculum	鏡斑蝴蝶魚	+	+		+	+
	Chaetodon trifascialis	川紋蝴蝶魚			+	+	
	Chaetodon unimaculatus	一點蝴蝶魚	+	+		+	
	Chaetodon vagabundus	飄浮蝴蝶魚		+			
	Chaetodon xanthurus	紅尾蝴蝶魚				+	
	Chaetodon punctatofasciatus	點斑橫帶蝴蝶魚	+		+		
	Forcipiger flavissimus	黃鑷口魚	+			+	
	Heniochus acuminatus	白吻雙帶立旗鯛				+	
	Heniochus varius	黑身立旗鯛	+		+		
Cirrhitidae 魚翁科	*Paracirrhites forsteri*	福氏副魚翁	+	+	+		
	Cirrhitichthys falco	鷹金魚翁			+		
Diodontidae 二齒鮕科	*Diodon holocanthus*	六斑二齒鮕				+	
Gobiidae 鰕虎科	*Valenciennea strigata*	紅帶范氏塘鱧		+		+	
Haemulidae 石鱸科	*Plectorhinchus lessonii*	雷氏胡椒鯛	+	+			
Holocentridae 金鱗魚科	*Neoniphon sammara*	莎姆金鱗魚					+++
	Sargocentron caudomaculatum	尾斑棘鱗魚	+		+		
	Sargocentron spiniferum	尖吻棘鱗魚		+			
Labridae 隆頭魚科	*Anampses meleagrides*	北斗阿南魚	+		+		+
	Anampses twistii	雙斑阿南魚	+		+		
	Bodianus diana	對斑狐鯛				+	
	Bodianus mesothorax	中胸狐鯛	+	+	+	+	
	Cheilinus trilobatus	三葉唇魚	+	+		+	+
	Cirrhilabrus cyanopleura	藍身絲鰭鸚鯛	+	+		+	
	Cirrhilabrus temminckii	丁氏絲鰭鸚鯛		+		++	

續表 5-15 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：111 年 5 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
	Coris gaimard	蓋馬氏盔魚		+		+	
	Coris dorsomacula	背斑盔魚	+	+	+		
	Gomphosus varius	雜色尖嘴魚	+	++++	+	+	+
	Labroides bicolor	二色裂唇魚	+				+
	Labroides dimidiatus	裂唇魚	+	++		+	+
	Halichoeres hortulanus	雲斑海豬魚	++	+	+	+	
	Halichoeres prostopeion	黑額海豬魚		+			
	Halichoeres scapularis	頸帶海豬魚					+
	Hemigymnus fasciatus	條紋半裸魚			+	+	
	Hemigymnus melapterus	黑鰭半裸魚	+				
	Hologymnosus doliatus	狹帶全裸鸚鯛				++	
	Macropharyngodon meleagris	珠斑大咽齒鯛		+			
	Oxycheilinus unifasciatus	單帶尖唇魚				+	+
	Pseudojuloides cerasinus	細尾擬海豬魚		+			
	Pteragogus enneacanthus	九棘長鰭鸚鯛			+		
	Thalassoma amblycephalus	鈍頭錦魚	++++	++++	++++	++++	
	Thalassoma hardwickii	哈氏錦魚	+	+	+++		+
	Thalassoma jansenii	詹氏錦魚	+	+			
	Thalassoma lutescens	黃衣錦魚	++++	++++	++++	+++	
	Thalassoma lunare	新月錦魚			+	+	+++
Lethrinidae 龍占魚科	*Lethrinus miniatus*	長吻龍占					+
	Monotaxis grandoculis	異黑鯛	+			+	
Lutjanidae 笛鯛科	*Lutjanus fulvus*	黃足笛鯛					++
	Lutjanus quinquelineatus	五線笛鯛					++++
	Lutjanus boutton	藍帶笛鯛					+
	Lutjanus decussatus	交叉笛鯛	+				
	Lutjanus monostigma	單斑笛鯛					+
	Macolor niger	黑背羽鰓笛鯛			+	+	
Monacanthidae 單棘魨科	*Cantherhines dumerilii*	杜氏刺鼻單棘魨	+		+		
Mullidae 羊魚科	*Mulloidichthys falvolineatus*	黃線擬鬚鯛				+	
	Mulloidichthys vanicolensis	金帶擬鬚鯛	++++		++++		++++
	Parapeneus barberinus	單帶海緋鯉				+	
	Parupeneus ciliatus	短鬚海緋鯉	+				
	Parapeneus indicus	印度海緋鯉					+
	Parapeneus multifasciatus	多帶海緋鯉		+		+	
Muraenidae 海鰻科	*Gymnothorax javanicus*	爪哇裸胸鯙	+				
Nemipteridae 金線魚科	*Scolopsis bilineatus*	雙帶眶棘鱸	+	+		++	
	Scolopsis ciliata	黃點赤尾冬					+
	Scolopsis lineata	線紋眶棘鱸	++				
Pempheridae 擬金眼鯛科	*Pempheris oualensis*	烏伊蘭擬金眼鯛					++++
Pinguipedidae 虎鰶科(擬鱚科)	*Parapercis clathrata*	四斑擬鱸		+		+	
	Parapercis millepunctata	雪點擬鱸				+	
	Parapercis pacifica	太平洋擬鱸					++
Pomacanthidae 蓋刺魚科	*Centropyge vrolickii*	伏羅式蓋刺魚	+	+	++		
	Pomacanthus imperator	條紋蓋刺魚	+			+	
	Pomacanthus semicirculatus	疊波蓋刺魚	+		+	+	
	Pygoplites diacanthus	甲尻魚	+		+	+	
Pomacentridae 雀鯛科	*Amblyglyphidodon curacao*	橘鈍寬刻齒雀鯛					++
	Abedefduf vaigiensis	條紋豆娘魚	++++	+++		++	
	Amphiprion clarkii	克氏雙鋸魚		++		+	
	Chromis margaritifer	二色光鰓雀鯛	++++	++++	++++	++++	+
	Chromis ternatensis	三葉光鰓雀鯛			+	+	

續表 5-15 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：111 年 5 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
	Chromis weberi	魏氏光鰓雀鯛	+				
	Chromis virides	藍綠光鰓雀鯛			++++		++++
	Chromis xanthura	黃尾光鰓雀鯛	+				
	Dascyllas aruanus	三帶圓雀鯛					++++
	Dascyllas reticulatus	網紋圓雀鯛			++++	+	++++
	Dascyllas trimaculatus	三斑圓雀鯛		+	+	+	++++
	Neoglyphidodon melas	黑副雀鯛	+	++	+	+	+
	Neoglyphidodon nigroris	黑褐副雀鯛	+				++
	Plectroglyphidodon johnstonianus	約島式固曲齒鯛		+		+	
	Plectroglyphidodon lacrymatus	珠點固曲齒鯛	+	+	+		
	Pomacentrus vaiuli	王子雀鯛		+			
	Pomacentrus lepidogenys	頰鱗雀鯛			+		
	Pomacentrus chrysurus	白尾雀鯛		+			
	Pomacentrus coelestis	霓虹雀鯛	+	+		++++	+
	Pomacentrus bankanensis	班卡雀鯛				+	
	Pomacentrus philippinus	菲律賓雀鯛		+	+	+	
Priacanthidae 大眼鯛科	*Priacanthus hamrur*	寶石大眼鯛			+		
Pseudochromidae 准雀鯛科	*Labracinus cyclophthalmus*	圓眼戴氏魚		+			+
Ptereleotridae 凹尾塘鱧科	*Nemateleotris magnifica*	絲鰭線塘鱧				+	
	Ptereleotris evides	黑尾凹尾塘鱧	+	+	+		
Scaridae 鸚哥魚科	*Chlorurus sordidus*	藍頭綠鸚哥魚	+	+			
	Scarus forsteni	福氏鸚哥魚	+	+	+	++	
	Scarus hypselopterus	爪哇鸚哥魚	++++	+			
	Scarus rubroviolaceus	紅紫鸚哥魚	+		+	+	
	Scarus schlegeli	史氏鸚哥魚		++++	+	+++	
Serranidae 鮨科	*Cephalopholis urodeta*	尾紋九刺鮨				+	
	Pseudanthias squamipinnis	絲鰭擬花鮨	++++		++	+	
Tetraodontidae 四齒魨科	*Canthigaster valentini*	瓦氏尖鼻魨	+	+	+		+
Tripterygiidae 三鰭鰎科	*Helcogramma striata*	縱帶彎線鰎		+			
Zanclidae 角蝶魚科	*Zanclus cornutus*	角鑲魚	++	+	+	+++	+

表 5-16 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：111 年 8 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
Acanthuridae 刺尾鯛科	*Acanthurus dussumieri*	杜氏刺尾鯛		+			
	Acanthurus nigrofuscus	褐斑刺尾鯛	++++				
	Ctenochaetus binotatus	雙斑櫛齒刺尾鯛	++		++++	++++	++++
	Naso lituratus	黑背鼻魚	+				
	Naso unicornis	單角鼻魚		+			
	Zebrasoma scopas	小高鰭刺尾鯛		+	+		+
Apogonidae 天竺鯛科	*Ostorhinchus angustatus*	寬帶鸚天竺鯛					+
Aulostomidae 管口魚科	*Aulostomus chinensis*	中華管口魚	+		+		
Balistidae 鱗鮕科	*Balistapus undulatus*	波紋鈎鱗鮕	+				
Blenniidae 鰭科	*Meiacanthus grammistes*	黑帶稀棘鰭	+	+	+	+	
Caesionidae 烏尾鮗科	*Caesio caerulaureus*	烏尾鮗		+	+	+	
	Pterocaesio digramma	雙帶鱗鰭烏尾鮗		+			
Chaetodontidae 蝴蝶魚科	*Chaetodon argentatus*	銀身蝴蝶魚				+	+
	Chaetodon auriga	揚旛蝴蝶魚		+			
	Chaetodon auripes	耳帶蝴蝶魚			+	+	+
	Chaetodon baronessa	曲紋蝴蝶魚	+				
	Chaetodon bennetti	本氏蝴蝶魚	+				
	Chaetodon citrinellus	胡麻斑蝴蝶魚	+			+	
	Chaetodon ephippium	鞍斑蝴蝶魚				+	
	Chaetodon kleinii	克氏蝴蝶魚	+	+	+	+++	+
	Chaetodon lunulatus	弓月蝴蝶魚			+		+
	Chaetodon lunula	月斑蝴蝶魚		+			
	Chaetodon melannotus	黑背蝴蝶魚	+		++		+
	Chaetodon speculum	鏡斑蝴蝶魚	+				+
	Chaetodon trifascialis	川紋蝴蝶魚	+				
	Chaetodon vagabundus	飄浮蝴蝶魚	+		+	+	
	Chaetodon xanthurus	紅尾蝴蝶魚					+
	Chaetodon punctatofasciatus	點斑橫帶蝴蝶魚	+		+		+
	Forcipiger flavissimus	黃鑷口魚	+				
	Heniochus varius	黑身立旗鯛					+
Cirrhitidae 魚翁科	*Paracirrhites forsteri*	福氏副魚翁		+	+	+	
Haemulidae 石鱸科	*Plectorhinchus vittatus*	條斑胡椒鯛	+				+
Holocentridae 金鱗魚科	*Myripristis kuntee*	康德鋸鱗魚					++
	Sargocentron caudomaculatum	尾斑棘鱗魚	+	+	+	+	+
	Sargocentron diadema	黑鰭棘鱗魚					+
	Neoniphon sammara	莎姆金鱗魚			+		+
Labridae 隆頭魚科	*Anampses meleagrides*	北斗阿南魚	+	+	+		
	Anampses twistii	雙斑阿南魚				+	+
	Bodianus mesothorax	中胸狐鯛		+	+	+	++
	Cheilinus trilobatus	三葉唇魚	+	+	+		
	Cirrhilabrus cyanopleura	藍身絲鰭鸚鯛				+	+
	Cirrhilabrus melanomarginatus	黑緣絲鰭鸚鯛				+	
	Coris aygula	紅喉盔魚	+		+		
	Coris gaimard	蓋馬氏盔魚	+			+	
	Gomphosus varius	雜色尖嘴魚	+		+	+	
	Labroides bicolor	二色裂唇魚				+	
	Labroides dimidiatus	裂唇魚	+	+	+	+	+
	Halichoeres hortulanus	雲斑海豬魚	+		+	+	
	Halichoeres marginatus	緣鰭海豬魚			+		
	Halichoeres melanochir	黑腕海豬魚	+			+	
	Halichoeres prostopeion	黑額海豬魚		+			+

續表 5-16 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：111 年 8 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
	Halichoeres trimaculatus	三斑海豬魚		+			
	Pseudocheilinus octotaenia	八帶擬唇魚					+
	Stethojulis trilineat	三線紫胸魚					+
	Hologymnosus doliatu	狹帶全裸鸚鯛				+	
	Macropharyngodon meleagri	珠斑大咽齒鯛				+	
	Pteragogus enneacanthus	九棘長鰭鸚鯛				+	
	Stethojulis bandanensis	黑星紫胸魚			+	+	
	Thalassoma amblycephalus	鈍頭錦魚	++++			+++	
	Thalassoma hardwickii	哈氏錦魚	+	+	+	+	
	Thalassoma jansenii	詹氏錦魚				+	
	Thalassoma lutescens	黃衣錦魚	++		+	++	+
	Thalassoma lunare	新月錦魚		+		++++	
Lutjanidae 笛鯛科	*Lutjanus fulvus*	黃足笛鯛	+	+	+		+
	Lutjanus gibbus	隆背笛鯛		+			
	Lutjanus quinquelineatus	五線笛鯛		+		+	
	Lutjanus decussatus	交叉笛鯛				+	
	Macolor niger	黑背羽鰓笛鯛		+			+
Monacanthidae 單棘魨科	*Cantherhines dumerilii*	杜氏刺鼻單棘魨		+			
Mullidae 羊魚科	*Mulloidichthys falvolineatus*	黃帶擬鬚鯛	+		+		
	Mulloidichthys vanicolensis	金帶擬鬚鯛				+++	
	Parupeneus barberinoides	鬚海緋鯉					+
	Parapeneus barberinus	單帶海緋鯉					+
	Parapeneus multifasciatus	多帶海緋鯉		+	+	+	
Nemipteridae 金線魚科	*Scolopsis bilineatus*	雙帶眶棘鱸	+			+	+
	Scolopsis ciliata	黃點赤尾冬		+			
	Scolopsis monogramma	單帶眶棘鱸			+		
	Scolopsis trilineata	三帶眶棘鱸				+	
	Scolopsis vosmeri	伏氏眶棘鱸		+			
Pempheridae 擬金眼鯛科	*Pempheris oualensis*	烏伊蘭擬金眼鯛	+	+			+
Pinguipedidae 虎鰔科(擬鱚科)	*Parapercis clathrata*	四斑擬鱸		+			+
	Parapercis millepunctata	雪點擬鱸				+	
	Parapercis pacifica	太平洋擬鱸		+	+		
Pomacanthidae 蓋刺魚科	*Centropyge vrolickii*	伏羅式蓋刺魚	+	+	+	+	+
	Pomacanthus imperator	條紋蓋刺魚					+
	Pomacanthus semicirculatus	疊波蓋刺魚			+		+
	Pygoplites diacanthus	甲冑魚	+				+
Pomacentridae 雀鯛科	*Amblyglyphidodon curacao*	橘鈍寬刻齒雀鯛					++
	Abedefduf vaigiensis	條紋豆娘魚	++++	++++		+	
	Abudefduf sexfasciatus	六線豆娘魚	++	++++			
	Amphiprion clarkii	克氏雙鋸魚		+	+		
	Chromis fumea	燕尾光鰓雀鯛	+++				
	Chromis lepidolepis	細鱗光鰓雀鯛	++++	++		+	+
	Chromis margaritifer	二色光鰓雀鯛	++++	++	++++	++++	++++
	Chromis virides	藍綠光鰓雀鯛	++++	++++			
	Chromis weberi	魏氏光鰓雀鯛	++++		+		
	Chromis xanthura	黃尾光鰓雀鯛		+			+
	Dascyllas aruanus	三帶圓雀鯛		++++			
	Dascyllas reticulatus	網紋圓雀鯛	++++	++++			+++
	Dascyllas trimaculatus	三斑圓雀鯛	++	++++	+	+	++
	Neoglyphidodon melas	黑副雀鯛	+	++++	+	+	
	Neoglyphidodon nigroris	黑褐副雀鯛		+	+		
	Plectroglyphidodon dickii	迪克氏固曲齒鯛	+				

續表 5-16 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：111 年 8 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
	Plectroglyphidodon johnstonianus	約島式固曲齒鯛				+	
	Plectroglyphidodon lacrymatus	珠點固曲齒鯛		+	+	+	
	Pomacentrus vaiuli	王子雀鯛			+	+	++
	Pomacentrus coelestis	霓虹雀鯛	+		+	+	
	Pomacentrus philippinus	菲律賓雀鯛	+	+	++	++	++
	Pomacentrus pavo	青玉雀鯛				+	
	Stegastes fasciolatus	藍紋高身雀鯛				++	
Pseudochromidae 准雀鯛科	*Labracinus cyclophthalmus*	圓眼戴氏魚		+			+
Ptereleotridae 凹尾塘鱧科	*Ptereleotris evides*	黑尾凹尾塘鱧				+	
Scaridae 鸚哥魚科	*Chlorurus bowersi*	鮑氏綠鸚哥魚	+				
	Scarus festivus	橫紋鸚哥魚	+				
	Scarus forsteni	福氏鸚哥魚	+	+	+	+	+
	Scarus hypselopterus	爪哇鸚哥魚			++++		++++
	Scarus oviceps	姬鸚哥魚			+	+	
	Scarus psittacus	棕吻鸚哥魚	+				
	Scarus rubroviolaceus	紅紫鸚哥魚				++	++
	Scarus schlegeli	史氏鸚哥魚	+	+	+	+	
Scorpaenidae 鮋科	*Pterois volitans*	魔鬼簑鮋				+	
Serranidae 鮨科	*Cephalopholis urodeta*	尾紋九刺鮨	+	+	+	+	+
Tetraodontidae 四齒魨科	*Canthigaster valentini*	瓦氏尖鼻魨	+	+			+
Tripterygiidae 三鰭鰎科	*Helcogramma striata*	縱帶彎線鰎	+				+
Zanclidae 角蝶魚科	*Zanclus cornutus*	角鑲魚	++	+	+	+	+

表 5-17 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：111 年 11 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
Acanthuridae 刺尾鯛科	*Acanthurus dussumieri*	杜氏刺尾鯛	+	+		+	
	Acanthurus lineatus	線紋刺尾鯛		+			
	Acanthurus nigrofuscus	褐斑刺尾鯛	+++	++++	++++	++++	++
	Acanthurus pyroferus	火紅刺尾鯛					+
	Ctenochaetus binotatus	雙斑櫛齒刺尾鯛	++	++++	++	+	+++
	Naso lituratus	黑背鼻魚		++			
	Naso unicornis	單角鼻魚	+++				
	Zebrasoma scopas	小高鰭刺尾鯛	+	+++	+	+	
	Zebrasoma veliferum	高鰭刺尾鯛		+			
Apogonidae 天竺鯛科	*Cheilodipterus quinquelineatus*	五線巨齒天竺鯛	++				
	Ostorhinchus angustatus	寬帶天竺鯛	+				
Aulostomidae 管口魚科	*Aulostomus chinensis*	中華管口魚		+			
Balistidae 鱗鮕科	*Melichthys vidua*	黑邊角鱗鮕			+		
	Sufflamen chrysopterus	金鰭鼓氣鱗鮕			+	+	+
Blenniidae 鰌科	*Meiacanthus grammistes*	黑帶稀棘鰌		+	+	+	++++
Caesionidae 烏尾鮗科	*Caesio caerulaureus*	烏尾鮗	++++	++++			
	Caesio teres	黃藍背烏尾鮗					+
	Pterocaesio digramma	雙帶鱗鰭烏尾鮗		++++	+	+	++++
Chaetodontidae 蝴蝶魚科	*Chaetodon argentatus*	銀身蝴蝶魚			+	+	+
	Chaetodon auriga	揚旛蝴蝶魚	+	+			
	Chaetodon auripes	耳帶蝴蝶魚	+	+	+		+
	Chaetodon baronessa	曲紋蝴蝶魚		+			
	Chaetodon bennetti	本氏蝴蝶魚	+				
	Chaetodon citrinellus	胡麻斑蝴蝶魚		+	+	+	
	Chaetodon ephippium	鞍斑蝴蝶魚			+		
	Chaetodon kleinii	克氏蝴蝶魚	+	++++	+	++	++
	Chaetodon lunulatus	弓月蝴蝶魚	++	+		+	
	Chaetodon lunula	月斑蝴蝶魚					+
	Chaetodon melannotus	黑背蝴蝶魚		+	+		+
	Chaetodon plebeius	藍斑蝴蝶魚		+			
	Chaetodon speculum	鏡班蝴蝶魚	+		+	+	+
	Chaetodon trifascialis	川紋蝴蝶魚		+		+	+
	Chaetodon unimaculatus	一點蝴蝶魚		+			+
	Chaetodon vagabundus	飄浮蝴蝶魚	+	+			+
	Chaetodon xanthurus	紅尾蝴蝶魚			+		
	Chaetodon punctatofasciatus	點斑橫帶蝴蝶魚			++		+
	Forcipiger flavissimus	黃鑷口魚		+			+
	Hemitaurichthys polylepis	多鱗霞蝶魚			+		
	Heniochus varius	黑身立旗鯛		+			
Cirrhitidae 魚翁科	*Paracirrhites forsteri*	福氏副魚翁		+		+	
	Cirrhitichthys falco	鷹金魚翁			+		
Gobiidae 鰕虎科	*Amblygobius phalaena*	尾斑鈍鯊					+
	Valenciennea strigata	紅帶范氏塘鱧				+	
Haemulidae 石鱸科	*Plectorhinchus lessonii*	雷氏胡椒鯛			+		
	Plectorhinchus vittatus	條斑胡椒鯛		+			+
Holocentridae 金鱗魚科	*Myripristis kuntee*	康德鋸鱗魚		++++			
	Neoniphon sammara	莎姆金鱗魚		+			
Labridae 隆頭魚科	*Anampses meleagrides*	北斗阿南魚	+		+	+	+
	Anampses twistii	雙斑阿南魚	+	+	+		+
	Bodianus mesothorax	中胸狐鯛	+	+	+	+	+
	Cheilinus trilobatus	三葉唇魚	+		+		+
	Cirrhilabrus cyanopleura	藍身絲鰭鸚鯛	++++		++++		++++

續表 5-17 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：111 年 11 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
	Cirrhilabrus temminckii	丁氏絲鰭鸚鯛				+	+
	Coris aygula	紅喉盔魚	+				+
	Coris dorsomacula	背斑盔魚		+	+	+	
	Gomphosus varius	雜色尖嘴魚	+	+	+	+	+
	Labrichthys unilineatus	單線突唇魚				+	
	Labroides bicolor	二色裂唇魚	+				+
	Labroides dimidiatus	裂唇魚		+		++	+
	Halichoeres hortulanus	雲斑海豬魚	+	+++	+	++	+
	Halichoeres nigrescens	黑帶海豬魚	++++				
	Stethojulis trilineata	三線紫胸魚				+	
	Hemigymnus fasciatus	條紋厚唇魚		+			
	Hemigymnus melapterus	黑鰭半裸魚				+	
	Oxycheilinus unifasciatus	單帶尖唇魚			+		
	Pteragogus enneacanthus	九棘長鰭鸚鯛			+		
	Thalassoma amblycephalus	鈍頭錦魚		++++	++++	+++	+
	Thalassoma hardwickii	哈氏錦魚	++++	+	+	++	+
	Thalassoma jansenii	詹氏錦魚			+	+	
	Thalassoma lutescens	黃衣錦魚	+	++++	+++	++++	+++
	Thalassoma lunare	新月錦魚	+		+	+	
Lutjanidae 笛鯛科	*Lutjanus bohar*	白斑笛鯛	+				
	Lutjanus fulvus	黃足笛鯛	+	+	+	+	
	Lutjanus monostigma	單斑笛鯛	+				
	Lutjanus decussatus	交叉笛鯛	+				
	Macolor niger	黑背羽鰓笛鯛		+			
Kyphosidae 舵魚科	*Kyphosus lembus*	蘭勃舵魚		+			
Monacanthidae 單棘鮄科	*Cantherhines dumerilii*	杜氏刺鼻單棘鮄		+	+		
Mullidae 羊魚科	*Mulloidichthys falvolineatus*	黃帶擬鬚鯛	++++			+	
	Mulloidichthys vanicolensis	金帶擬鬚鯛		+	++++		
	Parupeneus ciliatus	短鬚海緋鯉				+	
	Parapeneus indicus	印度海緋鯉	+				
	Parapeneus multifasciatus	多帶海緋鯉	+		+	+	+
Nemipteridae 金線魚科	*Scolopsis bilineatus*	雙帶眶棘鱸	+	+++		+	+
	Scolopsis ciliata	黃點赤尾冬	++				
	Scolopsis monogramma	單帶眶棘鱸			+	+	
Ostraciidae 箱鮄科	*Ostracion meleagris*	米點箱鮄			+		
Pempheridae 擬金眼鯛科	*Pempheris oualensis*	烏伊蘭擬金眼鯛		++			+
Pinguipedidae 虎鰔科(擬鱲科)	*Parapercis clathrata*	四斑擬鱸	+	+			
	Parapercis millepunctata	雪點擬鱸				+	
Pomacanthidae 蓋刺魚科	*Centropyge vrolickii*	伏羅式蓋刺魚		+	+	+	+
	Pomacanthus imperator	條紋蓋刺魚		+			+
	Pomacanthus semicirculatus	疊波蓋刺魚	+				
	Pygoplites diacanthus	甲尻魚			+		
Pomacentridae 雀鯛科	*Amblyglyphidodon curacao*	橘鈍寬刻齒雀鯛	++++				
	Amblyglyphidodon aureus	黃背寬刻齒雀鯛	+				
	Abedefduf vaigiensis	條紋豆娘魚	++++	++++		++++	++++
	Abudefduf sexfasciatus	六線豆娘魚	++++				
	Amphiprion clarkii	克氏雙鋸魚		+	+	+	
	Chromis margaritifer	二色光鰓雀鯛	++++	++++	++++	++++	++++
	Chromis ovatiformes	卵形光鰓雀鯛			+		
	Chromis ternatensis	三葉光鰓雀鯛	+				
	Chromis virides	藍綠光鰓雀鯛	++++				
	Chromis weberi	魏氏光鰓雀鯛			++	++++	+

續表 5-17 第三核能發電廠附近海域各測站魚類相及魚類豐度之調查　　調查日期：111 年 11 月

+稀少(1-3 隻)，++少(4-6 隻)，+++豐富(7-9 隻)，++++極豐富(10 隻以上)

科名	學名	中文名稱	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
	Chromis xanthura	黃尾光鰓雀鯛					+
	Chrysiptera rex	雷克斯刻齒雀鯛					+
	Dascyllas reticulatus	網紋圓雀鯛	++++	++++	++++	+++	++++
	Dascyllas trimaculatus	三斑圓雀鯛	++	++++			++
	Neoglyphidodon melas	黑副雀鯛	++++	++	+++	++++	+
	Neoglyphidodon nigroris	黑褐副雀鯛	+++		+	+	+
	Plectroglyphidodon johnstonianus	約島式固曲齒鯛		+	+	+	
	Plectroglyphidodon lacrymatus	珠點固曲齒鯛	+	+	+		+
	Pomacentrus vaiuli	王子雀鯛				+	+
	Pomacentrus coelestis	霓虹雀鯛		+	+	++++	+
	Pomacentrus lepidogenys	頰鱗雀鯛			+		+
	Pomacentrus moluccensis	摩鹿加雀鯛	+				
	Pomacentrus philippinus	菲律賓雀鯛	+	++++	++	+	
	Pomacentrus pavo	青玉雀鯛		+			
	Pomacentrus bankanensis	班卡雀鯛		+			
	Stegastes fasciolatus	藍紋高身雀鯛		+			
Pseudochromidae 准雀鯛科	*Labracinus cyclophthalmus*	圓眼戴氏魚	+	+			
Ptereleotridae 凹尾塘鱧科	*Ptereleotris evides*	黑尾凹尾塘鱧			+	+	+
	Nemateleotris magnifica	絲鰭線塘鱧					+
Scaridae 鸚哥魚科	*Cetoscarus bicolor*	雙色鯨鸚哥魚					+
	Scarus festivus	橫紋鸚哥魚			++		
	Scarus forsteni	福氏鸚哥魚	+	+	+		
	Scarus ghobban	藍點鸚哥魚	+				
	Scarus hypselopterus	爪哇鸚哥魚	+	+			
	Scarus oviceps	姬鸚哥魚		+	+		
	Scarus psittacus	棕吻鸚哥魚		+		++	+
	Scarus rubroviolaceus	紅紫鸚哥魚	+	+	+		++
	Scarus schlegeli	史氏鸚哥魚	+	++		+	++
Serranidae 鮨科	*Pseudanthias squamipinnis*	絲鰭擬花鮨		+	++++		
Tetraodontidae 四齒魨科	*Canthigaster valentini*	瓦氏尖鼻魨	+	+	+		+
	Arothron manilensis	菲律賓叉鼻魨	+				
Zanclidae 角蝶魚科	*Zanclus cornutus*	角鑲魚	++++	++	+	+	+

表 5-18 第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚類相及後壁湖魚類相一覽表(民國 111 年 4 次調查)

＊表珊瑚礁魚類　※表魚市場所漁獲種類

科名	學名	中文名稱	111/2	111/5	111/8	111/11
Acanthuridae 刺尾鯛科	*Acanthurus bleekeri*	布氏刺尾鯛				※
	Acanthurus dussumieri	杜氏刺尾鯛	*※	*※	*※	*※
	Acanthurus japonicus	日本刺尾鯛		*		
	Acanthurus lineatus	線紋刺尾鯛	*	*		*
	Acanthurus mata	後刺尾鯛		*	※	※
	Acanthurus nigrofuscus	褐斑刺尾鯛	*	*	*	*
	Acanthurus pyroferus	火紅刺尾鯛	*	*		*
	Ctenochaetus binotatus	雙斑櫛齒刺尾鯛	*	*	*	*
	Ctenochaetus striatus	連紋櫛齒刺尾鯛		※		
	Naso lituratus	黑背鼻魚	*	*	*	*
	Naso unicornis	單角鼻魚	*		*	*
	Zebrasoma scopas	小高鰭刺尾鯛	*	*	*	*
	Zebrasoma veliferum	高鰭刺尾鯛		*		*
Apogonidae 天竺鯛科	*Cheilodipterus artus*	縱帶巨齒天竺鯛	*			
	Cheilodipterus quinquelineatus	五線巨齒天竺鯛				*
	Ostorhinchus angustatus	寬帶鸚天竺鯛			*	*
Aulostomidae 管口魚科	*Aulostomus chinensis*	中華管口魚	*	*	*	*
Balistidae 鱗鮋科	*Balistapus undulatus*	波紋鈎鱗鮋		*	*	
	Melichthys vidua	黑邊角鱗鮋		*		*
	Sufflamen chrysopterus	金鰭鼓氣鱗鮋				*
Blenniidae 鰕科	*Aspidontus dussumieri*	杜氏盾齒鰕		*		
	Meiacanthus grammistes	黑帶稀棘鰕	*	*	*	*
Caesionidae 烏尾鮗科	*Caesio caerulaureus*	烏尾鮗	*	*	*	*
	Caesio teres	黃藍背烏尾鮗				*
	Pterocaesio digramma	雙帶鱗鰭烏尾鮗	*※	*※	*※	*※
Carangidae 鰺科	*Caranx ignobilis*	浪人鰺	*	*		
	Caranx melampygus	藍鰭鰺		*		
	Elagatis bipinnulata	雙帶鰺			※	
	Seriola dumerili	紅鉤鰺	※	※	※	※
	Trachinotus blochii	布氏鯧鰺				※
Chaetodontidae 蝴蝶魚科	*Chaetodon argentatus*	銀身蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon auriga	揚旛蝴蝶魚	*		*	*
	Chaetodon auripes	耳帶蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon baronessa	曲紋蝴蝶魚			*	*
	Chaetodon bennetti	本氏蝴蝶魚			*	*
	Chaetodon citrinellus	胡麻斑蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon ephippium	鞍斑蝴蝶魚	*		*	*
	Chaetodon kleinii	克氏蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon lunula	月斑蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon lunulatus	弓月蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon melannotus	黑背蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon ornatissimus	華麗蝴蝶魚		*		
	Chaetodon plebeius	藍斑蝴蝶魚	*	*		*
	Chaetodon punctatofasciatus	點斑橫帶蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon speculum	鏡班蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon trifascialis	川紋蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon unimaculatus	一點蝴蝶魚	*	*		*
	Chaetodon vagabundus	飄浮蝴蝶魚	*	*	*	*
	Chaetodon xanthurus	紅尾蝴蝶魚	*	*	*	*
	Forcipiger flavissimus	黃鑷口魚	*	*	*	*
	Hemitaurichthys polylepis	多鱗霞蝶魚				*
	Heniochus acuminatus	白吻雙帶立旗鯛	*	*		
	Heniochus monoceros	烏面立旗鯛	*			

續表 5-18 第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚類相及後壁湖魚類相一覽表(民國 111 年 4 次調查)

＊表珊瑚礁魚類　※表魚市場所漁獲種類

科名	學名	中文名稱	111/2	111/5	111/8	111/11
	Heniochus varius	黑身立旗鯛		*	*	*
Cirrhitidae 魚翁科	*Cirrhitichthys falco*	鷹金魚翁		*		*
	Paracirrhites arcatus	副翁	*			
	Paracirrhites forsteri	福氏副翁	*	*	*	*
Coryphaenidae 鱰科	*Coryphaena hippurus*	鬼頭刀		※		※
Diodontidae 二齒魨科	*Diodon holocanthus*	六斑二齒魨	*※	*※	※	※
	Diodon hystrix	密斑二齒魨		※		
Exocoetidae 飛魚科	*Cheilopogon cyanopterus*	黑鰭飛魚		※		
	Cheilopogon unicolor	白鰭飛魚		※		
	Cypselurus poecilopterus	斑鰭飛魚		※		
Gobiidae 鰕虎科	*Amblygobius phalaena*	尾斑鈍鯊				*
	Valenciennea strigata	紅帶范氏塘鱧		*		*
Haemulidae 石鱸科	*Plectorhinchus lessonii*	雷氏胡椒鯛	*※	*		*
	Plectorhinchus lineatus	條紋胡椒鯛			※	※
	Plectorhinchus vittatus	條斑胡椒鯛		※	*	*
Holocentridae 金鱗魚科	*Myripristis kuntee*	康德鋸鱗魚	*	※	*※	*
	Neoniphon sammara	莎姆金鱗魚		*	*	*
	Sargocentron caudomaculatum	尾斑棘鱗魚	*	*	*	
	Sargocentron diadema	黑鰭棘鱗魚			*※	
	Sargocentron spiniferum	尖吻棘鱗魚		*		
Istiophoridae 正旗魚科	*Istiophorus platypterus*	雨傘旗魚				※
Kyphosidae 舵魚科	*Kyphosus lembus*	蘭勃舵魚	*	※		*
Labridae 隆頭魚科	*Anampses meleagrides*	北斗阿南魚	*	*	*	*
	Anampses twistii	雙斑阿南魚	*	*	*	*
	Bodianus axillaris	腋斑狐鯛	*			
	Bodianus diana	對斑狐鯛	*	*		
	Bodianus mesothorax	中胸狐鯛	*	*	*	*
	Cheilinus trilobatus	三葉唇魚	*	*※	*	*※
	Cirrhilabrus cyanopleura	藍身絲鰭鸚鯛	*	*	*	*
	Cirrhilabrus melanomarginatus	黑緣絲鰭鸚鯛			*	
	Cirrhilabrus temminckii	丁氏絲鰭鸚鯛		*		*
	Coris aygula	紅喉盔魚			*	*
	Coris dorsomacula	背斑盔魚		*		*
	Coris gaimard	蓋馬氏盔魚		*	*	
	Gomphosus varius	雜色尖嘴魚	*	*	*	*
	Halichoeres hortulanus	雲斑海豬魚	*	*	*	*
	Halichoeres marginatus	緣鰭海豬魚			*	
	Halichoeres melanochir	黑腕海豬魚			*	
	Halichoeres nebulosus	雲紋海豬魚	*			
	Halichoeres nigrescens	黑帶海豬魚				*
	Halichoeres prostopeion	黑額海豬魚	*	*	*	
	Halichoeres scapularis	頸帶海豬魚		*		
	Halichoeres trimaculatus	三斑海豬魚	*		*	
	Hemigymnus fasciatus	條紋厚唇魚	*	*		*
	Hemigymnus melapterus	黑鰭半裸魚		*		*
	Hologymnosus doliatus	狹帶全裸鸚鯛		*	*	
	Labrichthys unilineatus	單線突唇魚	*			*
	Labroides bicolor	二色裂唇魚	*	*	*	*
	Labroides dimidiatus	裂唇魚	*	*	*	*
	Macropharyngodon meleagris	珠斑大咽齒鯛	*	*	*	
	Oxycheilinus unifasciatus	單帶尖唇魚	*	*		*
	Pseudocheilinus octotaenia	八帶擬唇魚			*	

續表 5-18 第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚類相及後壁湖魚類相一覽表(民國 111 年 4 次調查)

＊表珊瑚礁魚類　※表魚市場所漁獲種類

科名	學名	中文名稱	111/2	111/5	111/8	111/11
	Pseudojuloides cerasinus	細尾擬海豬魚		*		
	Pteragogus enneacanthus	九棘長鰭鸚鯛		*	*	*
	Stethojulis bandanensis	黑星紫胸魚			*	
	Stethojulis trilineata	三線紫胸魚			*	*
	Thalassoma amblycephalus	鈍頭錦魚	*	*	*	*
	Thalassoma hardwickii	哈氏錦魚	*	*	*	*
	Thalassoma jansenii	詹氏錦魚	*	*	*	*
	Thalassoma lunare	新月錦魚	*	*	*	*
	Thalassoma lutescens	黃衣錦魚	*	*	*	*
Lethrinidae 龍占魚科	*Lethrinus miniatus*	長吻龍占	*	*※		
	Lethrinus nebulosus	青嘴龍占		※		※
	Lethrinus ornatus	黃帶龍占	※	※	※	
	Lethrinus rubrioperculatus	紅鰓龍占		※		
	Monotaxis grandoculis	異黑鯛		*		
Lutjanidae 笛鯛科	*Etelis coruscans*	長尾濱鯛	※	※	※	※
	Lutjanus argentimaculatus	銀紋笛鯛	※	※	※	※
	Lutjanus bohar	白斑笛鯛				*
	Lutjanus boutton	藍帶笛鯛		*		
	Lutjanus decussatus	交叉笛鯛		*	*	*
	Lutjanus fulvus	黃足笛鯛	*	*	*	*※
	Lutjanus gibbus	隆背笛鯛	※	※	*※	※
	Lutjanus lutjanus	正笛鯛	※	※		
	Lutjanus monostigma	單斑笛鯛		*		*
	Lutjanus kasmira	四線笛鯛	※			
	Lutjanus quinquelineatus	五線笛鯛	※	*※	*※	※
	Lutjanus rivulatus	海雞母笛鯛	※	※	※	※
	Lutjanus vitta	縱帶笛鯛	*			
	Macolor niger	黑背羽鰓笛鯛	*	*	*	*
	Paracaesio caeruleus	藍色擬烏尾冬		※	※	
	Paracaesio xanthurus	黃擬烏尾冬			※	
Monacanthidae 單棘魨科	*Aluterus scriptus*	長尾革單棘魨	*			※
	Cantherhines dumerilii	杜氏刺鼻單棘魨	*	*	*	*
Mullidae 羊魚科	*Mulloidichthys falvolineatus*	黃線擬鬚鯛	*	*	*	*
	Mulloidichthys vanicolensis	金帶擬鬚鯛	*	*	*※	*
	Parapeneus barberinus	單帶海緋鯉		*	*	
	Parapeneus indicus	印度海緋鯉		*※		*
	Parapeneus multifasciatus	多帶海緋鯉	*	*	*※	*※
	Parupeneus barberinoides	鬚海緋鯉			*	
	Parupeneus ciliatus	短鬚海緋鯉	*	*		*
	Parupeneus spilurus	大型海緋鯉	※			
	Upeneus tragula	黑斑緋鯉	*			
Muraenidae 海鰻科	*Gymothorax favagircus*	黑斑裸胸鯙	※	※	※	※
	Gymnothorax javanicus	爪哇裸胸鯙		*		
Nemipteridae 金線魚科	*Scolopsis bilineatus*	雙帶眶棘鱸	*	*	*	*
	Scolopsis ciliata	黃點赤尾冬	*	*	*	*
	Scolopsis lineata	線紋眶棘鱸	*	*		
	Scolopsis monogramma	單帶眶棘鱸		※	*	*
	Scolopsis trilineata	三帶眶棘鱸			*	
	Scolopsis vosmeri	伏氏眶棘鱸	*		*	
	Scolopsis xenochrous	欖斑赤尾冬	*			
Oplegnathidae 石鯛科	*Oplegnathus punctatus*	斑石鯛	※	※	※	
Ostraciidae 箱魨科	*Ostracion cubicus*	粒突箱魨	*			
	Ostracion meleagris	米點箱魨				*

續表 5-18 第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚類相及後壁湖魚類相一覽表(民國 111 年 4 次調查)

＊表珊瑚礁魚類　※表魚市場所漁獲種類

科名	學名	中文名稱	111/2	111/5	111/8	111/11
Pempheridae 擬金眼鯛科	*Pempheris oualensis*	烏伊蘭擬金眼鯛	*	*	*	*
Pinguipedidae 虎鰔科(擬鱾科)	*Parapercis clathrata*	四斑擬鱸		*	*	*
	Parapercis millepunctata	雪點擬鱸	*	*	*	*
	Parapercis pacifica	太平洋擬鱸	*	*	*	
Pomacanthidae 蓋刺魚科	*Centropyge vrolickii*	伏羅式蓋刺魚	*	*	*	*
	Pomacanthus imperator	條紋蓋刺魚	*	*	*	*
	Pomacanthus semicirculatus	疊波蓋刺魚	*	*※	*	*
	Pygoplites diacanthus	甲冗魚	*	*	*	*
Pomacentridae 雀鯛科	*Abedefduf vaigiensis*	條紋豆娘魚	*	*	*	*※
	Abudefduf sexfasciatus	六線豆娘魚	*		*	*
	Amblyglyphidodon aureus	黃背寬刻齒雀鯛				*
	Amblyglyphidodon curacao	橘鈍寬刻齒雀鯛	*	*	*	*
	Amphiprion clarkii	克氏雙鋸魚	*	*	*	*
	Amphiprion frenatus	白條雙鋸魚	*			
	Chromis delta	三角光鰓雀鯛	*			
	Chromis fumea	燕尾光鰓雀鯛			*	
	Chromis lepidolepis	細鱗光鰓雀鯛	*		*	
	Chromis margaritifer	二色光鰓雀鯛	*	*	*	*
	Chromis ovatiformes	卵形光鰓雀鯛				*
	Chromis ternatensis	三葉光鰓雀鯛	*	*		*
	Chromis virides	藍綠光鰓雀鯛	*	*	*	*
	Chromis weberi	魏氏光鰓雀鯛	*	*	*	*
	Chromis xanthura	黃尾光鰓雀鯛		*	*	*
	Chrysiptera rex	雷克斯刻齒雀鯛	*			*
	Dascyllas aruanus	三帶圓雀鯛	*	*	*	
	Dascyllas reticulatus	網紋圓雀鯛	*	*	*	*
	Dascyllas trimaculatus	三斑圓雀鯛	*	*	*	*
	Neoglyphidodon melas	黑副雀鯛	*	*	*	*
	Neoglyphidodon nigroris	黑褐副雀鯛	*	*	*	*
	Plectroglyphidodon dickii	迪克氏固曲齒鯛			*	
	Plectroglyphidodon johnstonianus	約島式固曲齒鯛	*	*	*	*
	Plectroglyphidodon lacrymatus	珠點固曲齒鯛	*	*	*	*
	Pomacentrus bankanensis	班卡雀鯛		*		*
	Pomacentrus chrysurus	白尾雀鯛	*	*		
	Pomacentrus coelestis	霓虹雀鯛	*	*	*	*
	Pomacentrus lepidogenys	頰鱗雀鯛		*		*
	Pomacentrus moluccensis	摩鹿加雀鯛				*
	Pomacentrus pavo	青玉雀鯛			*	*
	Pomacentrus philippinus	菲律賓雀鯛	*	*	*	*
	Pomacentrus tripunctatus	三斑雀鯛	*			
	Pomacentrus vaiuli	王子雀鯛	*	*	*	*
	Stegastes fasciolatus	藍紋高身雀鯛	*		*	*
Priacanthidae 大眼鯛科	*Cookeolus japonicus*	日本紅目大眼鯛			※	
	Priacanthus hamrur	寶石大眼鯛	*	*※	※	
	Priacanthus macracanthus	大棘大眼鯛	*			
Pseudochromidae 准雀鯛科	*Labracinus cyclophthalmus*	圓眼戴氏魚	*	*	*	*
Ptereleotridae 凹尾塘鱧科	*Nemateleotris magnifica*	絲鰭線塘鱧	*	*		*
	Ptereleotris evides	黑尾凹尾塘鱧		*	*	*

續表 5-18 第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚類相及後壁湖魚類相一覽表(民國 111 年 4 次調查)

＊表珊瑚礁魚類　※表魚市場所漁獲種類

科名	學名	中文名稱	111/2	111/5	111/8	111/11
Salmonidae 鮭科	*Oncorhynchus keta*	鮭魚	※	※	※	※
Scaridae 鸚哥魚科	*Cetoscarus bicolor*	雙色鯨鸚哥魚				*
	Chlorurus bowersi	鮑氏綠鸚哥魚			*	
	Chlorurus sordidus	藍頭綠鸚哥魚		*		
	Scarus festivus	橫紋鸚哥魚	*	*	*	*
	Scarus forsteni	福氏鸚哥魚	*	*※	*	*
	Scarus frenatus	網紋鸚哥魚	*			
	Scarus ghobban	藍點鸚哥魚	*※	※	※	*※
	Scarus oviceps	姬鸚哥魚			*	*
	Scarus psittacus	棕吻鸚哥魚			*	*
	Scarus rivulatus	雜紋鸚哥魚	*※	※	※	※
	Scarus rubroviolaceus	紅紫鸚哥魚	*※	*※	*※	*※
	Scarus schlegeli	史氏鸚哥魚	*※	*※	*※	*※
Scombridae 鯖科	*Acanthocybium solandii*	棘鰆	※	※	※	※
	Thunnus albacares	黃鰭鮪	※	※	※	※
Scatophagidae 金錢魚科	*Scatophagus argus*	金錢魚		※		
Scorpaenidae 鮋科	*Helicolenus hilgendorfi*	無鰾鮋	※	※	※	
	Synanceia verrucosa	玫瑰毒鮋	※	※		
	Pterois volitans	魔鬼簑鮋	*		*	
Serranidae 鮨科	*Anyperodon leucogrammicus*	白線光腭鱸		※		
	Cephalopholis miniata	青星九刺鮨	※		※	※
	Cephalopholis spiloparaea	黑緣九刺鮨	※		※	※
	Cephalopholis urodeta	尾紋九刺鮨	*	*	*	
	Epinephelus coioides	點帶石斑魚	※		※	
	Epinephelus fuscoguttatus ♀* *Epinephelus lanceolatus* ♂	龍虎斑	※	※	※	※
	Epinephelus hexagonatus	六角石斑魚		※		
	Holanthias borbonius	粗斑花鱸			※	
	Gracila albomarginata	白邊纖齒鱸				※
	Pseudanthias squamipinnis	絲鰭擬花鮨	*	*		*
	Variola albimarginata	白緣星鱠				※
	Variola louti	星鱠	※	※	※	※
Tetraodontidae 四齒魨科	*Arothron manilensis*	菲律賓叉鼻魨				*
	Canthigaster valentini	瓦氏尖鼻魨	*	*	*	*
Trichiuridae 帶魚科	*Trichiurus lepturus*	白帶魚	※	※	※	※
Tripterygiidae 三鰭鰕科	*Helcogramma striata*	縱帶彎線鰕		*	*	
Siganidae 藍子魚科	*Siganus guttatus*	點藍子魚		※		
Sphyraenidae 金梭魚科	*Sphyraena barracuda*	巴拉金梭魚				※
Zanclidae 角蝶魚科	*Zanclus cornutus*	角鐮魚	*	*	*	*

表 5-19 民國 111 年第三核能發電廠附近海域各測站魚類相之調查

◎表示未受溫排水影響及受溫排水影響區均可發現之種類　　調查日期：111 年 2 月、5 月、8 月及 11 月

科名	學名	中文名稱		測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
Acanthuridae 刺尾鯛科	*Acanthurus dussumieri*	杜氏刺尾鯛	◎	*	*	*	*	
	Acanthurus japonicus	日本刺尾鯛		*				
	Acanthurus lineatus	線紋刺尾鯛	◎	*	*		*	
	Acanthurus mata	後刺尾鯛		*				
	Acanthurus nigrofuscus	褐斑刺尾鯛	◎	*	*	*	*	*
	Acanthurus pyroferus	火紅刺尾鯛	◎	*		*		*
	Ctenochaetus binotatus	雙斑櫛齒刺尾鯛	◎	*	*	*	*	*
	Naso lituratus	黑背鼻魚	◎	*	*	*	*	
	Naso unicornis	單角鼻魚	◎	*	*		*	
	Zebrasoma scopas	小高鰭刺尾鯛	◎	*	*	*	*	*
	Zebrasoma veliferum	高鰭刺尾鯛		*	*			
Apogonidae 天竺鯛科	*Cheilodipterus artus*	縱帶巨齒天竺鯛		*				
	Cheilodipterus quinquelineatus	五線巨齒天竺鯛		*				
	Ostorhinchus angustatus	寬帶鸚天竺鯛	◎	*				*
Aulostomidae 管口魚科	*Aulostomus chinensis*	中華管口魚	◎	*	*	*		
Balistidae 鱗鮕科	*Balistapus undulatus*	波紋鈎鱗鮕	◎	*				*
	Melichthys vidua	黑邊角鱗鮕				*	*	
	Sufflamen chrysopterus	金鰭鼓氣鱗鮕				*	*	*
Blenniidae 鰨科	*Aspidontus dussumieri*	杜氏盾齒鰨					*	
	Meiacanthus grammistes	黑帶稀棘鰨	◎	*	*	*	*	*
Caesionidae 烏尾鮗科	*Caesio caerulaureus*	烏尾鮗	◎	*	*	*	*	*
	Caesio teres	黃藍背烏尾鮗						*
	Pterocaesio digramma	雙帶鱗鰭烏尾鮗	◎	*	*	*	*	*
Carangidae 鯵科	*Caranx ignobilis*	浪人鰺	◎	*				*
	Caranx melampygus	藍鰭鰺					*	
Chaetodontidae 蝴蝶魚科	*Chaetodon argentatus*	銀身蝴蝶魚				*	*	*
	Chaetodon auriga	揚旛蝴蝶魚	◎	*	*			
	Chaetodon auripes	耳帶蝴蝶魚	◎	*	*	*	*	*
	Chaetodon baronessa	曲紋蝴蝶魚		*	*			
	Chaetodon bennetti	本氏蝴蝶魚		*				
	Chaetodon citrinellus	胡麻斑蝴蝶魚	◎	*	*	*	*	*
	Chaetodon ephippium	鞍斑蝴蝶魚		*	*	*	*	
	Chaetodon kleinii	克氏蝴蝶魚	◎	*	*	*	*	*
	Chaetodon lunula	月斑蝴蝶魚		*	*		*	*
	Chaetodon lunulatus	弓月蝴蝶魚	◎	*	*	*	*	*
	Chaetodon melannotus	黑背蝴蝶魚	◎	*	*	*	*	*
	Chaetodon ornatissimus	華麗蝴蝶魚					*	
	Chaetodon plebeius	藍斑蝴蝶魚	◎		*	*		
	Chaetodon punctatofasciatus	點斑橫帶蝴蝶魚	◎	*	*	*	*	*
	Chaetodon speculum	鏡斑蝴蝶魚	◎	*	*	*	*	*
	Chaetodon trifascialis	川紋蝴蝶魚	◎	*	*	*	*	*
	Chaetodon unimaculatus	一點蝴蝶魚	◎	*	*		*	*
	Chaetodon vagabundus	飄浮蝴蝶魚	◎	*	*	*	*	*
	Chaetodon xanthurus	紅尾蝴蝶魚	◎	*	*	*	*	*
	Forcipiger flavissimus	黃鑷口魚	◎	*	*	*	*	*
	Hemitaurichthys polylepis	多鱗霞蝶魚				*		
	Heniochus acuminatus	白吻雙帶立旗鯛	◎		*	*	*	
	Heniochus monoceros	烏面立旗鯛			*			*
	Heniochus varius	黑身立旗鯛	◎	*	*	*		*

續表 5-19 民國 111 年第三核能發電廠附近海域各測站魚類相之調查

◎表示未受溫排水影響及受溫排水影響區均可發現之種類　　調查日期：111 年 2 月、5 月、8 月及 11 月

科名	學名	中文名稱		測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
Cirrhitidae 魚翁科	*Cirrhitichthys falco*	鷹金魚翁				*		
	Paracirrhites arcatus	副魚翁					*	
	Paracirrhites forsteri	福氏副魚翁	◎	*	*	*	*	
Diodontidae 二齒魨科	*Diodon holocanthus*	六斑二齒魨				*	*	
Gobiidae 鰕虎科	*Amblygobius phalaena*	尾斑鈍鯊						*
	Valenciennea strigata	紅帶范氏塘鱧	◎		*		*	
Haemulidae 石鱸科	*Plectorhinchus lessonii*	雷氏胡椒鯛	◎	*	*	*		*
	Plectorhinchus vittatus	條斑胡椒鯛	◎	*	*			*
Holocentridae 金鱗魚科	*Myripristis kuntee*	康德鋸鱗魚	◎	*	*	*		*
	Neoniphon sammara	莎姆金鱗魚	◎		*	*		*
	Sargocentron caudomaculatum	尾斑棘鱗魚	◎	*	*	*	*	*
	Sargocentron diadema	黑鰭棘鱗魚						*
	Sargocentron spiniferum	尖吻棘鱗魚			*			
Kyphosidae 舵魚科	*Kyphosus lembus*	蘭勃舵魚			*			
Labridae 隆頭魚科	*Anampses meleagrides*	北斗阿南魚	◎	*	*	*	*	*
	Anampses twistii	雙斑阿南魚	◎	*	*	*	*	*
	Bodianus axillaris	腋斑狐鯛						*
	Bodianus diana	對斑狐鯛	◎		*		*	
	Bodianus mesothorax	中胸狐鯛	◎	*	*	*	*	*
	Cheilinus trilobatus	三葉唇魚	◎	*	*	*	*	*
	Cirrhilabrus cyanopleura	藍身絲鰭鸚鯛	◎	*	*	*	*	*
	Cirrhilabrus melanomarginatus	黑緣絲鰭鸚鯛					*	
	Cirrhilabrus temminckii	丁氏絲鰭鸚鯛	◎		*		*	*
	Coris aygula	紅喉盔魚	◎	*		*		*
	Coris dorsomacula	背斑盔魚	◎	*	*	*	*	
	Coris gaimard	蓋馬氏盔魚	◎	*	*		*	
	Gomphosus varius	雜色尖嘴魚	◎	*	*	*	*	*
	Halichoeres hortulanus	雲斑海豬魚	◎	*	*	*	*	*
	Halichoeres marginatus	緣鰭海豬魚				*		
	Halichoeres melanochir	黑腕海豬魚	◎	*			*	
	Halichoeres nebulosus	雲紋海豬魚		*				
	Halichoeres nigrescens	黑帶海豬魚		*				
	Halichoeres prostopeion	黑額海豬魚	◎		*	*		*
	Halichoeres scapularis	頸帶海豬魚						*
	Halichoeres trimaculatus	三斑海豬魚	◎	*	*		*	
	Hemigymnus fasciatus	條紋厚唇魚	◎		*	*	*	
	Hemigymnus melapterus	黑鰭半裸魚	◎	*			*	
	Hologymnosus doliatus	狹帶全裸鸚鯛					*	
	Labrichthys unilineatus	單線突唇魚	◎		*		*	*
	Labroides bicolor	二色裂唇魚	◎	*			*	*
	Labroides dimidiatus	裂唇魚	◎	*	*	*	*	*
	Macropharyngodon meleagris	珠斑大咽齒鯛	◎	*	*	*	*	
	Oxycheilinus unifasciatus	單帶尖唇魚	◎	*		*	*	*
	Pseudocheilinus octotaenia	八帶擬唇魚						*
	Pseudojuloides cerasinus	細尾擬海豬魚			*			
	Pteragogus enneacanthus	九棘長鰭鸚鯛				*	*	
	Stethojulis bandanensis	黑星紫胸魚				*	*	

續表 5-19 民國 111 年第三核能發電廠附近海域各測站魚類相之調查

◎表示未受溫排水影響及受溫排水影響區均可發現之種類　　調查日期：111 年 2 月、5 月、8 月及 11 月

科名	學名	中文名稱		測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
	Stethojulis trilineata	三線紫胸魚					*	*
	Thalassoma amblycephalus	鈍頭錦魚	◎	*	*	*	*	*
	Thalassoma hardwickii	哈氏錦魚	◎	*	*	*	*	*
	Thalassoma jansenii	詹氏錦魚	◎	*	*	*	*	
	Thalassoma lunare	新月錦魚	◎	*	*	*	*	*
	Thalassoma lutescens	黃衣錦魚	◎	*	*	*	*	*
Lethrinidae 龍占魚科	*Lethrinus miniatus*	長吻龍占	◎	*				*
	Monotaxis grandoculis	異黑鯛	◎	*			*	
Lutjanidae 笛鯛科	*Lutjanus bohar*	白斑笛鯛		*				
	Lutjanus boutton	藍帶笛鯛						*
	Lutjanus decussatus	交叉笛鯛	◎	*			*	
	Lutjanus fulvus	黃足笛鯛	◎	*	*	*	*	*
	Lutjanus gibbus	隆背笛鯛			*			
	Lutjanus monostigma	單斑笛鯛	◎	*				*
	Lutjanus quinquelineatus	五線笛鯛	◎		*		*	*
	Lutjanus vitta	縱帶笛鯛		*				
	Macolor niger	黑背羽鰓笛鯛	◎		*	*	*	*
Monacanthidae 單棘魨科	*Aluterus scriptus*	長尾革單棘魨		*				
	Cantherhines dumerilii	杜氏刺鼻單棘魨	◎	*	*	*	*	
Mullidae 羊魚科	*Mulloidichthys falvolineatus*	黃帶擬鬚鯛	◎	*		*	*	
	Mulloidichthys vanicolensis	金帶擬鬚鯛	◎	*	*	*	*	*
	Parapeneus barberinus	單帶海緋鯉					*	*
	Parapeneus indicus	印度海緋鯉	◎	*				*
	Parapeneus multifasciatus	多帶海緋鯉	◎	*	*	*	*	*
	Parupeneus barberinoides	鬚海緋鯉						*
	Parupeneus ciliatus	短鬚海緋鯉	◎	*		*	*	*
	Upeneus tragula	黑斑緋鯉		*				
Muraenidae 海鰻科	*Gymnothorax javanicus*	爪哇裸胸鯙		*				
Nemipteridae 金線魚科	*Scolopsis bilineatus*	雙帶眶棘鱸	◎	*	*	*	*	*
	Scolopsis ciliata	黃點赤尾冬	◎	*	*			*
	Scolopsis lineata	線紋眶棘鱸		*				
	Scolopsis monogramma	單帶眶棘鱸				*	*	
	Scolopsis trilineata	三帶眶棘鱸					*	
	Scolopsis vosmeri	伏氏眶棘鱸		*	*			
	Scolopsis xenochrous	攬斑赤尾冬	◎	*		*		
Ostraciidae 箱魨科	*Ostracion cubicus*	粒突箱魨			*			
	Ostracion meleagris	米點箱魨				*		
Pempheridae 擬金眼鯛科	*Pempheris oualensis*	烏伊蘭擬金眼鯛	◎	*	*	*		*
Pinguipedidae 虎鰶科(擬鰏科)	*Parapercis clathrata*	四斑擬鱸	◎	*	*		*	*
	Parapercis millepunctata	雪點擬鱸	◎		*		*	
	Parapercis pacifica	太平洋擬鱸	◎	*	*	*		*
Pomacanthidae 蓋刺魚科	*Centropyge vrolickii*	伏羅式蓋刺魚	◎	*	*	*	*	*
	Pomacanthus imperator	條紋蓋刺魚	◎	*	*	*	*	*
	Pomacanthus semicirculatus	疊波蓋刺魚	◎	*	*	*	*	*
	Pygoplites diacanthus	甲冑魚	◎	*	*	*	*	*
Pomacentridae 雀鯛科	*Abedefduf vaigiensis*	條紋豆娘魚	◎	*	*		*	*
	Abudefduf sexfasciatus	六線豆娘魚		*	*			

續表 5-19 民國 111 年第三核能發電廠附近海域各測站魚類相之調查

◎表示未受溫排水影響及受溫排水影響區均可發現之種類　　調查日期：111 年 2 月、5 月、8 月及 11 月

科名	學名	中文名稱		測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
	Amblyglyphidodon aureus	黃背寬刻齒雀鯛		*				
	Amblyglyphidodon curacao	橘鈍寬刻齒雀鯛	◎	*				*
	Amphiprion clarkii	克氏雙鋸魚	◎	*	*	*	*	*
	Amphiprion frenatus	白條雙鋸魚	◎	*		*		
	Chromis delta	三角光鰓雀鯛						*
	Chromis fumea	燕尾光鰓雀鯛		*				
	Chromis lepidolepis	細鱗光鰓雀鯛	◎	*	*	*	*	*
	Chromis margaritifer	二色光鰓雀鯛	◎	*	*	*	*	*
	Chromis ovatiformes	卵形光鰓雀鯛				*		
	Chromis ternatensis	三葉光鰓雀鯛		*		*	*	
	Chromis virides	藍綠光鰓雀鯛	◎	*	*	*		*
	Chromis weberi	魏氏光鰓雀鯛	◎	*	*	*	*	*
	Chromis xanthura	黃尾光鰓雀鯛	◎	*	*			*
	Chrysiptera rex	雷克斯刻齒雀鯛					*	*
	Dascyllas aruanus	三帶圓雀鯛	◎	*	*			*
	Dascyllas reticulatus	網紋圓雀鯛	◎	*	*	*	*	*
	Dascyllas trimaculatus	三斑圓雀鯛	◎	*	*	*	*	*
	Neoglyphidodon melas	黑副雀鯛	◎	*	*	*	*	*
	Neoglyphidodon nigroris	黑褐副雀鯛	◎	*	*	*	*	*
	Plectroglyphidodon dickii	迪克氏固曲齒鯛		*				
	Plectroglyphidodon johnstonianus	約島式固曲齒鯛	◎	*	*	*	*	
	Plectroglyphidodon lacrymatus	珠點固曲齒鯛	◎	*	*	*	*	*
	Pomacentrus bankanensis	班卡雀鯛			*		*	
	Pomacentrus chrysurus	白尾雀鯛	◎		*			*
	Pomacentrus coelestis	霓虹雀鯛	◎	*	*	*	*	*
	Pomacentrus lepidogenys	煩鱗雀鯛				*		*
	Pomacentrus moluccensis	摩鹿加雀鯛		*				
	Pomacentrus pavo	青玉雀鯛	◎		*		*	
	Pomacentrus philippinus	菲律賓雀鯛	◎	*	*	*	*	*
	Pomacentrus tripunctatus	三斑雀鯛					*	
	Pomacentrus vaiuli	王子雀鯛	◎		*	*	*	*
	Stegastes fasciolatus	藍紋高身雀鯛	◎	*	*		*	
Priacanthidae 大眼鯛科	*Priacanthus hamrur*	寶石大眼鯛				*		
	Priacanthus macracanthus	大棘大眼鯛	◎			*		
Pseudochromidae 准雀鯛科	*Labracinus cyclophthalmus*	圓眼戴氏魚	◎	*	*		*	*
Ptereleotridae 凹尾塘鱧科	*Nemateleotris magnifica*	絲鰭線塘鱧	◎		*		*	*
	Ptereleotris evides	黑尾凹尾塘鱧	◎	*	*	*	*	*
Scaridae 鸚哥魚科	*Cetoscarus bicolor*	雙色鯨鸚哥魚						*
	Chlorurus bowersi	鮑氏綠鸚哥魚		*				
	Chlorurus sordidus	藍頭綠鸚哥魚		*	*			
	Scarus festivus	橫紋鸚哥魚	◎	*	*	*	*	*
	Scarus forsteni	福氏鸚哥魚	◎	*	*	*	*	*
	Scarus frenatus	網紋鸚哥魚				*		
	Scarus ghobban	藍點鸚哥魚	◎	*		*	*	
	Scarus oviceps	姬鸚哥魚	◎		*	*	*	
	Scarus psittacus	棕吻鸚哥魚	◎	*	*		*	*
	Scarus rivulatus	雜紋鸚哥魚					*	*

續表 5-19 民國 111 年第三核能發電廠附近海域各測站魚類相之調查

◎表示未受溫排水影響及受溫排水影響區均可發現之種類　　調查日期：111 年 2 月、5 月、8 月及 11 月

科名	學名	中文名稱		測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
	Scarus rubroviolaceus	紅紫鸚哥魚	◎	*	*	*	*	*
	Scarus schlegeli	史氏鸚哥魚	◎	*	*	*	*	*
Scorpaenidae 鮋科	*Pterois volitans*	魔鬼簑鮋	◎		*		*	
Serranidae 鮨科	*Cephalopholis urodeta*	尾紋九刺鮨	◎	*	*	*	*	*
	Pseudanthias squamipinnis	絲鰭擬花鮨	◎	*	*	*	*	*
Tetraodontidae 四齒魨科	*Arothron manilensis*	菲律賓叉鼻魨		*				
	Canthigaster valentini	瓦氏尖鼻魨	◎	*	*	*	*	*
Tripterygiidae 三鰭鰕科	*Helcogramma striata*	縱帶彎線鰕	◎	*	*			*
Zanclidae 角蝶魚科	*Zanclus cornutus*	角鑷魚	◎	*	*	*	*	*

表 5-20 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 2 月各測站魚類相之相似度

採樣日期	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
測站 1	1.00				
測站 2	0.30	1.00			
測站 3	0.31	0.33	1.00		
測站 4	0.27	0.38	0.36	1.00	
測站 5	0.17	0.28	0.30	0.36	1.00

表 5-21 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 5 月各測站魚類相之相似度

採樣日期	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
測站 1	1.00				
測站 2	0.38	1.00			
測站 3	0.43	0.28	1.00		
測站 4	0.30	0.34	0.31	1.00	
測站 5	0.19	0.18	0.20	0.14	1.00

Jaccard coefficient

表 5-22 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 8 月各測站魚類相之相似度

採樣日期	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
測站 1	1.00				
測站 2	0.29	1.00			
測站 3	0.38	0.36	1.00		
測站 4	0.31	0.27	0.38	1.00	
測站 5	0.28	0.27	0.30	0.24	1.00

Jaccard coefficient

表 5-23 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 11 月各測站魚類相之相似度

採樣日期	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
測站 1	1.00				
測站 2	0.33	1.00			
測站 3	0.29	0.36	1.00		
測站 4	0.29	0.36	0.44	1.00	
測站 5	0.33	0.38	0.40	0.41	1.00

Jaccard coefficient

表 5-24 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 4 次調查各測站魚類相之相似度

採樣日期	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
測站 1	1.00				
測站 2	0.60	1.00			
測站 3	0.52	0.56	1.00		
測站 4	0.52	0.62	0.58	1.00	
測站 5	0.53	0.57	0.51	0.50	1.00

Jaccard coefficient

表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Acanthuridae 刺尾鯛科																															
Acanthurus bariene	肩斑刺尾鯛		＊		＊	＊	※	※			＊※	※	＊※	＊※	＊※	＊	＊※	※	※	＊※	＊※	＊	＊※	＊※	＊※	＊		＊	＊※	＊※	
Acanthurus bleekeri	布氏刺尾鯛										※	※	※	※	※	※	＊※	※	※	※	※		＊			※		※		※	※
Acanthurus dussumieri	杜氏刺尾鯛		＊	＊	＊		※	＊※	※	※	※	※	＊※	※	＊※	＊※	＊※	※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※
Acanthurus japonicus	日本刺尾鯛					＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊			＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊
Acanthurus leucopareius	白斑刺尾鯛				＊		＊																								
Acanthurus lineatus	線紋刺尾鯛		＊	＊	＊	＊	＊※		※	＊※	※	＊※	＊※	＊※	＊	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊	＊※	＊	＊	＊※	＊※	＊※	＊
Acanthurus maculiceps	頭斑刺尾鯛																＊			＊	＊	※	※		※	＊		＊			
Acanthurus mata	後刺尾鯛		＊	＊		＊	＊※		＊※	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊※	＊※	＊※		＊		※			＊※	＊※	※	＊※
Acanthurus nigricans	黑刺尾鯛													＊			＊														
Acanthurus nigricauda	黑尾刺尾鯛				＊		※	＊		※					＊					＊※	＊	＊		＊						＊	
Acanthurus nigrofuscus	褐斑刺尾鯛		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊
Acanthurus olivaceus	一字刺尾鯛	＊	＊				※				※				＊※		※		＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊			＊	
Acanthurus pyroferus	火紅刺尾鯛			＊	＊	＊	＊			＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	※		＊				＊	＊			＊	＊	＊	＊
Acanthurus thompsoni	黃尾刺尾鯛																							＊		＊			＊		
Acanthurus triostegus	綠刺尾鯛		＊	＊								※		＊	＊		＊	＊	＊		＊	＊	＊	※	＊		＊	※			
Acanthurus xanthopterus	黃鰭刺尾鯛		＊	＊	＊		＊		＊	＊※		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊			＊		＊※	＊	＊			
Ctenochaetus binotatus	雙斑櫛齒刺尾魚			＊	＊	＊	＊				＊	＊	※		＊		＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Ctenochaetus striatus	連紋櫛齒刺尾魚		＊		＊		＊	＊※	＊※	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊※	＊	＊		※	＊※	＊	※
Naso anngualtus	短角天狗鯛	＊															※								＊						
Naso brevirostris	短喙鼻魚							※						＊		※								＊		＊					
Naso hexacanthus	六棘鼻魚	＊		＊			＊	＊	＊	＊	＊			＊	※		＊※	＊※	＊	＊	＊	＊		＊					＊※		
Naso lituratus	黑背鼻魚			＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Naso lopezi	老氏鼻魚										※				※																
Naso unicornis	單角鼻魚				＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊※	＊※	＊	＊※	＊	＊	＊	＊※	＊	＊※	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊
Naso reticulatus	網紋鼻魚																	※													
Prionurus scalprus	三棘天狗鯛				＊		＊					＊	＊※				＊	※		＊											
Prionurus scalprum	鋸尾鯛																						＊								
Zebrasoma flavescens	黃高鰭刺尾鯛																			＊	＊		＊		＊	＊	＊			＊	
Zebrasoma scopas	小高鰭刺尾鯛		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊
Zebrasoma veliferum	高鰭刺尾鯛						＊					＊	＊			＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊		＊	＊
Albulidae 狐鰮科																															

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Albula vulpes	狐鰄	＊																													
Aluteridae 革鮏科																															
Paraluteres prionurus	鋸尾單角鮏		＊																												
Apogonidae 天竺鯛科																															
Apogon angustatus	寬帶天竺鯛				＊		＊										＊					＊									
Apogon apogonides	正天竺鯛						＊																								
Apogon aureus	黃天竺鯛																				＊	＊									
Apogon chrysotaenia	多線天竺鯛		＊				＊						＊						＊			＊									
Apogon compressus	裂帶天竺鯛																									＊					
Apogon cookii	庫氏天竺鯛																			＊											
Apogon cyanosoma	金線天竺鯛												＊						＊												
Apogon exostigma	單線天竺鯛												＊													＊					
Apogon fraenatus	棘眼天竺鯛																									＊					
Apogon kallopterus	棘頭天竺鯛							＊	＊												＊										
Apogon niger	黑天竺鯛																	＊													
Apogon nigrofasciatus	黑帶天竺鯛																			＊	＊										
Apogon notatus	雙點天竺鯛													＊																	
Apogon properupta	黃帶天竺鯛																			＊						＊					
Apogon taeniophorus	褐帶天竺鯛						＊																								
Apogon sp.	天竺鯛															＊															
Archamia lineolata	原長崎天竺鯛														＊																
Cheilodipterus artus	縱帶巨齒天竺鯛																									＊		＊	＊	＊	＊
Cheilodipterus intermedius	中間巨齒天竺鯛																				＊										
Cheilodipterus macrodon	巨齒天竺鯛				＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊※	＊	＊			＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊						
Cheilodipterus quinquelinentus	五線巨齒天竺鯛						＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊			＊	＊	＊	＊	＊							＊
Cheilodipterus sp.	天竺鯛	＊													＊			＊										＊			
Cheilodipterus subulatus	圓鰓蓋天竺鯛								※																						
Ostorhinchus apogonoides	短齒天竺鯛																			※											
Ostorhinchus angustatus	寬帶鸚天竺鯛																														＊
Pristiapogon fraenatus	棘眼天竺鯛																				＊	＊									
Rhabdamia cypselurus	短箭天竺鯛											＊	＊																		
Rhabdamia gracilis	箭天竺鯛																					＊									
Aracanidae 六棱箱鮏科																															
Kentrocapros aculeatus	棘箱鮏				＊																										
Atherinidae 銀漢魚科																															
Hypoatherina woodwardi	伍氏銀漢魚												＊																		

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Aulopodidae 仙女魚科																															
Aulopus japonicus	仙女魚												※																		
Aulostomidae 管口魚科																															
Aulostomus chinensis	中華管口魚		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊
Balistidae 鱗鮋科																															
Aluterus scriptus	長尾革單棘鮋																							＊							
Balistapus undulatus	玻紋鈎鱗鮋								＊						＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Balistoides conspicillum	花斑擬鱗鮋				＊		＊					＊		＊		＊			＊	＊				＊					※		
Balistoides viridescens	褐擬鱗鮋									＊			＊	＊		＊	＊			＊	＊		＊	＊※	＊	＊	＊	＊※	＊	＊※	
Melichthys vidua	黑邊角鱗鮋			＊	＊				＊	＊		＊	＊	＊						＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊		＊	＊	＊
Odonus niger	紅牙鱗鮋																				※							※			
Paraluteres prionurus	副革單棘鮋				＊								＊																		
Pseudobalistes flavimarginatus	黃緣副鱗鮋												＊	＊	＊	＊		＊		＊			＊	＊					※	※	
Pseudobalistes fuscus	黑副鱗鮋				＊								※																		
Rhinecanthus rectangulus	斜帶錙鱗鮋		＊															＊													
Rhinecanthus verrucosus	毒吻棘鮋																				＊										
Sufflamen bursa	鼓氣鱗鮋				＊				＊	＊			＊							＊		＊									
Sufflamen chrysopterus	金鰭鼓氣鱗鮋	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Sufflamen fraenatus	黃紋鼓氣鱗鮋			＊		＊	＊	＊	＊	＊		＊			＊	＊	＊	＊	＊												
Oxymonacanthus longirostris	尖吻單棘鮋															＊															
Belonidae 鶴鱵科																															
Strongylura leiura	台灣圓尾鶴鱵								※					＊				※													
Tylosurus crocodilus	鱷形叉尾鶴鱵								＊	※	＊	※		＊				＊			※	※	※		※			＊		＊	
Tylosurus melanotus	叉尾鶴鱵	＊									※					※	※														
Berycidae 金眼鯛科																															
Beryx splendens	紅金眼鯛																	※													
Centroberyx rubicaudus	紅尾棘金眼鯛										※		※																	※	
Blenniidae 鰨科																															
Aspidontus dussumieri	杜氏劍齒鰨						＊	＊							＊											＊					＊
Aspidontus taeniatus	縱帶劍齒鰨		＊		＊							＊		＊	＊					＊	＊									
Ecsenius namiyei	江島氏無鬚鰨															＊															
Ecsenius yaeyamaensis	八重山無鬚鰨																			＊	＊										
Exallias brevis	短多鬚鰨						＊																								
Meiacanthus grammistes	黑帶稀棘鰨			＊	＊	＊			＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Petroscirtes breviceps	短頭跳岩鰨																				＊										
Plagiotremus rhinorhynchos	粗吻橫口鰨																				＊										

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Plagiotremus tapeinosoma	黑帶橫口鰎													＊	＊							＊					＊				
Salarias fasciatus	細紋唇齒鰎																				＊										
Bothidae 鮃科																															
Pseudorhombus duplicocellatus	重點斑鮃																	＊													
Bramidae 烏鯧科																															
Brama japonica	日本烏鯧											※																			
Eumegistus illustris	真烏鯧																											※	※		
Caesionidae 烏尾鮗科																															
Caesio caerulaureus	烏尾鮗		＊			＊	＊			＊※		＊	※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	※		＊※	＊※	＊※	＊	＊	＊※	＊※	＊	＊	＊	＊
Caesio chrysopterus	金帶烏尾鮗			＊			※										※														
Caesio cuning	赤腹鳥尾鮗									＊	＊		※			※															
Caesio lunaris	花尾烏尾鮗		＊						＊	＊																					
Caesio teres	黃藍背烏尾鮗			＊	＊		＊	＊	※	＊		＊	＊	＊			＊			＊					＊	＊			＊	＊
Pterocaesio digramma	雙帶鱗鰭烏尾鮗		＊	＊	＊	＊	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊	＊※	＊	＊※	＊※	＊	＊※
Pterocaesio tie	蒂爾烏尾鮗		＊	＊			＊		＊								＊	＊※	＊※	＊※	※										
Callionymidae 鼠魚銜魚科																															
Diplogrammus xenicus	雙線鼠魚銜魚				＊					＊	＊	＊																			
Carangidae 鰺科																															
Atropus atropos	溝鰺																	※													
Carangoides ferdau	印度平鰺														＊						※										
Carangoides fulvoguttatus	星點若鰺																									※					
Carangoides gymnostethus	裸胸若鰺																							※							
Carangoides malabaricus	瓜子鰺														※					※											
Carangoides orthogrammus	直線平鰺								＊										＊												
Caranx ignobilis	浪人鰺								※						＊※			※					※	※	※			＊	＊	＊	＊
Caranx lugubris	闊步鰺						※	※																							
Caranx melampygus	藍鰭鰺	＊						※		＊			＊			＊	＊			＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊
Caranx papuensis	巴布亞鰺												※																		
Caranx sexfasciatus	六帶鰺						※														※		※								
Decapterus kurroides	無斑圓鰺											※	※	※	※		※	※	※			※	※								
Decapterus maruadsi	藍圓鰺							※	※				※		※				＊			※										
Decapterus macrosoma	長身圓鰺						※																								
Elagatis bipinnulatus	雙帶鰺							※					※	※	＊※		※	※			※		※	※	※			※			※
Parastromateus niger	烏鰂																												※		
Pseudocaranx dentex	黃帶擬鰺																													＊	

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Scomberoides commersonianus	大口逆溝鯵												※																		
Scomberoides lysan	逆溝鯵	＊																													
Seriola dumerili	紅鮸鯵						※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	＊※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
Trachinotus blochii	布氏鯧鯵																											※	※		※
Ulua mentalia	絲口鯵								※																						
Carcharhinidae 真鯊科																															
Carcharhinus obscurus	灰色白眼鮫							※	※	※																					
Carcharhinus brachyurus	短尾白眼鮫									※																					
Carcharhinus longimanus	長鰭鯖鯊																							※							
Carcharhinus sarrah	沙拉白眼鮫						※		※																						
Galeocerdo cuvier	鼬鮫							※	※																						
Centriscidae 蝦魚科																															
Centriscus sentatus	蝦魚						＊						＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊									
Centrolophidae 長鰺科																															
Psenopsis anomala	刺鰺								※	※				※								※									
Centropomidae 鋸蓋魚科																															
Lates calcarifer	尖吻鱸																	※													
Chaetodontidae 蝴蝶魚科																															
Chaetodon argentatus	銀身蝴蝶魚		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Chaetodon auriga	揚旛蝴蝶魚		＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Chaetodon auripes	耳帶蝴蝶魚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊
Chaetodon baronessa	曲紋蝴蝶魚																＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊			＊	＊
Chaetodon bennetti	本氏蝴蝶魚				＊						＊										＊	＊	＊						＊		＊
Chaetodon citrinellus	胡麻斑蝴蝶魚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Chaetodon ephippium	鞍斑蝴蝶魚				＊	＊	＊				＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊
Chaetodon guentheri	貢氏蝴蝶魚				＊																										
Chaetodon kleinii	克氏蝴蝶魚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊※	＊※	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Chaetodon lineolatus	紋身蝴蝶魚			＊													＊				※									※	
Chaetodon lunulatus	弓月蝴蝶魚		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Chaetodon lunula	月斑蝴蝶魚					＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Chaetodon melannotus	黑背蝴蝶魚			＊	＊	＊	＊	＊	＊	※	＊	＊		＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Chaetodon meyeri	麥氏蝴蝶魚		＊												＊																
Chaetodon octofasciatus	八帶蝴蝶魚																									＊					
Chaetodon ornatissimus	華麗蝴蝶魚				＊	＊	＊	＊	＊	＊							＊			＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊				＊
Chaetodon plebeius	藍斑蝴蝶魚		＊	＊	＊		＊	＊						＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊		＊
Chaetodon punctatofasciatus	點斑橫帶蝴蝶魚		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Chaetodon rafflecii	雷氏蝴蝶魚															＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊		＊	
Chaetodon reticulatus	網紋蝴蝶魚													＊														＊			
Chaetodon selene	彎月蝴蝶魚			＊																											
Chaetodon speculum	鏡斑蝴蝶魚	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Chaetodon trifascialis	川紋蝴蝶魚	＊		＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊			＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Chaetodon ulietensis	烏利蝴蝶魚		＊	＊		＊								＊			＊			＊			＊		＊		＊		＊	
Chaetodon unimaculatus	一點蝴蝶魚		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Chaetodon vagabundus	飄浮蝴蝶魚			＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊
Chaetodon wiebeli	魏氏蝴蝶魚		＊		＊										＊														＊	＊	
Chaetodon xanthurus	紅尾蝴蝶魚			＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊				＊	＊	＊	＊
Coradion chrysozonus	金斑少女魚													＊																	
Chaetodontoplus personifer	單面荷包魚				＊																										
Forcipiger flavissimus	黃鑷口魚		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Hemitaurichthys polylepis	多鱗霞蝶魚				＊			＊	＊		＊	＊		＊			＊				＊		＊		＊	＊		＊			＊
Heniochus acuminatus	白吻雙帶立旗鯛		＊	＊	＊		＊※	＊	＊※	＊		＊	＊※	※＊	※	＊		＊※	＊※	＊※	＊		＊	＊	＊	＊		＊	＊※	＊	＊
Heniochus chrysostomus	三帶立旗鯛							＊				＊		＊			＊		＊	＊			＊	＊		＊		＊	＊	＊	
Heniochus monoceros	烏面立旗鯛									＊	※	※			＊	＊	＊※									＊			＊	＊	＊
Heniochus singularius	單棘立旗鯛			＊				＊	＊		＊	＊	＊	＊						＊	＊		＊	＊	＊	＊		＊			
Heniochus varius	黑身立旗鯛		＊		＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Holacanthus trimaclatus	三斑刺鰎魚		＊																												
Chanidae 虱目魚科																															
Chanos chanos	虱目魚														※			※			※										
Cheilodactylidae 唇指科																															
Cheilodactylus zonatus	花尾唇指																							※							
Cichlidae 麗魚科																															
Oreochromis niloticus	尼羅口孵非鯽																							※							
Cirrhitidae 魚翁科																															
Cirrhitichthys aprinus	橫帶鷹斑鯛											＊					＊														
Cirrhitichthys falco	鷹金魚翁		＊			＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊		＊			＊		＊※				＊	＊
Cirrhitichthys oxycephalus	尖鰭金魚翁			＊		＊	＊						＊		＊	＊	＊						＊		＊					＊	
Cirrhitus pinnulatus	魚翁								※				＊※	＊				※	※												＊
Paracirrhites arcatus	副魚翁				＊			＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊			＊	＊					＊		
Paracirrhites forsteri	福氏副魚翁		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊※	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊※	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Clupeidae 鯡科																															
Sardinella gibbosa	隆背小砂丁						※																								
Congridae 糯鰻科																															

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Conger japonicus	日本糯鰻																					※									
Conger cinereus	灰糯鰻																											※			
Coryphaenidae 鬼頭刀科																															
Coryphaena hippurus	鬼頭刀						※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※		※	※	※	※	※	※	※		※	※	※	※
Dactylopteridae 飛角魚科																															
Dactyloptena orientalis	東方飛角魚												※																		
Dasyatidae 魟科																															
Dasyatis bennetti	黃土魟													※																	
Neotrygon kuhlii	古氏土魟																					＊							※		
Diodontidae 二齒鮭科																															
Diodon eydouxii	愛氏二齒鮭						※						※				※						※								
Diodon holocanthus	六斑二齒鮭				＊		＊					＊		＊			＊	＊	＊	＊	＊				＊	※		※	※	※	＊※
Diodon hystrix	密斑二齒鮭		＊											＊			＊					＊						※		※	※
Diodon liturosus	紋二齒鮭		＊																											＊	
Echeneidae 印魚科																															
Echeneis naucrates	長印魚	＊																		＊		＊				＊					
Engranlididae 鯷科																															
Thryssa hamiltonii	漢氏綾鯷						※																								
Ephippidae 燕魚科																															
Platax boersii	波氏燕魚				＊				※	※		※						＊	※	＊				＊				＊			
Platax orbicularis	圓眼燕魚																						※	※		※	※			＊	
Platax teria	尖翅燕魚				＊								※		＊	＊								※							
Exocoetidae 飛魚科																															
Cypselurus cyanopterus	黑鰭飛魚											※											※	※	※	※		※	※	※	※
Cypselurus unicolor	白鰭飛魚									※	※		※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※		※	※	※	※
Cypselurus poecilopterus	斑鰭飛魚																					※	※	※	※	※		※	※	※	※
Fistulariidae 馬鞭魚科																															
Fistularia commersonii	康氏馬鞭魚				＊												＊	＊		＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊				
Fistularia petimba	鱗馬鞭魚																													※	
Gadidae 鱈科																															
Plectropomus oligacanthus	點線鰓棘鱸												※																		
Gempylidae 帶鰆科																															
Rurettas pretiosus	薔薇帶鰆						※	※	※						※																
Gerreidae 鑽嘴魚科																															
Gerres abbreviatus	短鑽嘴魚																				※										
Gobiidae 鰕虎科																															

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Amblyeleotris fasciata	條紋鈍鰕虎											＊	＊																		
Amblyeleotris guttata	斑點鈍鰕虎							＊					＊	＊						＊											
Amblyeleotris periophthalma	黑斑鈍鰕虎												＊	＊	＊	＊		＊				＊	＊								
Amblyeleotris wheeleri	紅紋鈍鰕虎																			＊	＊		＊	＊		＊			＊	＊	
Amblygobius albimaculatus	環帶鰕虎							＊				＊																			
Amblygobius phalaena	尾斑鈍鰕虎												＊			＊				＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊		＊	＊	＊
Bryaninops natans	海鞭鰕虎														＊																
Cryptocentrus nigrocellatus	眼斑猴鰕虎																		＊												
Fusigobius duospilus	裸頸植鰕虎																				＊			＊							
Istigobius campbelli	康培氏銜鰕虎																				＊										
Istigobius decoratus	華麗銜鰕虎																	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊					
Istigobius goldmanni	戈氏銜鰕虎																							＊	＊						
Istigobius ornatus	裝飾銜鰕虎												＊			＊		＊						＊							
Gnatholepis scapulostigma	眼帶鰕虎												＊																		
Macrodontogobius wilburi	威氏壯牙鰕虎																					＊									
Mahidoria mystacina	大口鰕虎													＊																	
Trimma grammistes	斑馬紋磨鰕虎																＊														
Tomiyamichthys alleni	亞倫氏富山鰕虎																				＊	＊									
Valenciennea helsdingenii	雙帶塘鱧																		＊												
Valenciennea sexguttata	六點范氏塘鱧												＊						＊			＊				＊	＊				
Valenciennea strigata	紅帶范氏塘鱧								＊									＊	＊		＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊		＊	＊
Haemulidae 石鱸科																															
Diagramma pictum	密點少棘胡椒鯛																				＊	＊	＊	＊※		＊	＊			＊	
Hapalogenys nitens	髭鯛																※														
Parapristipoma trilineatum	三線雞魚								※					※		※	※	※					※					※	※	※	
Plectorhinchus chaetodonoides	斑胡椒鯛									※	※	＊	※	＊※	＊		＊※	※		＊				※							
Plectorhinchus cinctus	花軟唇											※				＊							＊								
Plectorhinchus celebicus	南洋石鱸													※			※														
Plectorhinchus diagrammus	雙帶石鱸				＊		＊※	＊※	＊※	※	※	※	＊※	＊※	＊※	＊	＊	＊※	＊※	＊			※			※					
Plectorhinchus flavomaculatus	黃點胡椒鯛						＊※	＊	＊		＊※		※			※	＊※	＊※	＊		※		※			※					
Plectorhinchus gibbosus	駝背胡椒鯛								※							※									※						
Plectorhinchus goldmanni	斜帶石鱸							※		※	※		※	※	※		※	＊※			※		※								
Plectorhinchus lessonii	雷氏胡椒鯛																				＊※	＊	＊※	＊※		＊		※	＊※	＊※	＊※
Plectorhinchus lineatus	條紋胡椒鯛					＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊※	＊※	※	＊	＊	＊※	＊※	＊※		＊	＊※	＊	＊※	※	※	※	＊※	＊※
Plectorhinchus pictus	胡椒鯛							＊※	＊※							＊	※			＊											
Plectorhinchus picus	暗點胡椒鯛	＊					※	＊		＊	※		※	※		※	＊	＊	＊	＊※	＊※	＊	＊※	＊※		＊		※	＊		

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Plectorhinchus schotaf	灰石鱸										＊																				
Plectorhinchus vittatus	條斑胡椒鯛																						＊	＊※	＊			※		※	※
Hemiramphidae 鱵科																															
Hyporhamphus dussumieri	杜氏下鱵				＊										＊						※	※									
Heterodontidae 異齒鮫科																															
Heterodontus zebra	斑紋異齒鮫														※																
Holocentridae 金鱗魚科																															
Myripristis adusta	焦黑鋸鱗魚																		＊	＊		＊	＊		＊	＊		＊			
Myripristis berndti	凸頜松毬										※		※	※				※		※	※	※	※								
Myripristis botche	柏氏鋸鱗魚																							＊	＊						
Myripristis chryseres	黃鰭松毬												※				※					※	※								
Myripristis formosa	台灣松毬																				＊		＊			＊				＊	
Myripristis greenfieldi	格氏松毬																			＊											
Myripristis herndti	伯特氏松毬							＊	＊			※							＊												
Myripristis kuntee	康德鋸鱗魚						＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊※	＊	＊	＊	＊※	＊※	＊	＊	＊※	＊※	＊※	＊※
Myripristis melanosticta	黑斑松毬							※	※	※	＊※	＊	＊		※	※	※	＊		※											
Myripristis murdjan	赤松毬																				※					＊※		＊			
Myripristis seychellensis	塞昔耳松毬									※																					
Myripristis violacea	紫鋸鱗魚																											＊		＊	
Myripristis vittata	赤鰓鋸鱗魚																	※					※								
Nemipterus thosaporni	黃緣金線																※														
Nemipterus zysron	姬金線魚																※														
Neoniphon opercularis	黑鰭金鱗魚																									＊		＊			※
Neoniphon sammara	莎姆金鱗魚						＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Ostichthys japonicus	金鱗魚						＊																								
Ostichthys sheni	沈氏骨鱗魚																						※								
Sargocentron caudomaculatum	尾斑棘鱗魚												＊	＊				＊	＊	＊	＊※		＊	＊	＊	＊※	＊※	＊	＊	＊	＊
Sargocentron cornutum	點鰭棘鱗魚																						※								
Sargocentron diadema	黑鰭棘鱗魚	＊					＊	＊	＊		＊			※		＊	※	※		＊※	＊※	※	＊	＊	＊	＊※	＊※	※	※	※	＊
Sargocentron ensifer	劍棘鱗魚																					※				※					
Sargocentron ittodai	銀帶棘鱗魚						＊														※		＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	
Sargocentron melanospilos	黑點棘鱗魚										※			※				※					※							＊	
Sargocentron praslin	紅線棘鱗魚																＊														
Sargocentron rubrum	黑帶棘鱗魚												※	※	※		＊※	※			＊	※	※					※			
Sargocentron spinosissimus	刺棘鱗魚																				※										
Sargocentron spiniferum	尖吻棘鱗魚									※	※			＊※			※	※		※	＊	※	※	＊		＊※			＊	＊	＊

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Sargocentron tiere	赤鰭棘鱗魚						※											※		※			※								
Istiophoridae 正旗魚科																															
Istiophorus platypterus	雨傘旗魚										※	※	※	※	※	※			※		※			※	※						※
Makaira mazara	黑皮旗魚												※																		
Tetrapterus audax	紅肉旗魚											※																			
Kyphosidae 舵魚科																															
Girella mezia	黃帶瓜子鱲											＊																			
Girella melanichthys	黑瓜子鱲													※	※																
Girella punctata	瓜子鱲												※																		
Kyphosus bigibbus	南方舵魚							＊※	＊※	※		＊※	＊			＊					※			※							
Kyphosus cinerascens	天竺舵魚				＊	＊								＊※	※		※	※			※	※	※	※						＊	
Kyphosus lembus	蘭勃舵魚						＊					※	※	※	※	※	＊※	※	※	※		＊※	※	※		※	※	＊※	＊※	※	＊※
Labridae 隆頭魚科																															
Anampses caeruleopunctatus	青斑阿南魚				＊		＊	＊	＊					＊			＊	＊		＊	＊		※	＊※	＊	＊		＊	＊		
Anampses geographicus	蟲紋阿南魚										＊																	＊			
Anampses melanurus	烏尾阿南魚													＊							＊					＊	＊				
Anampses meleagrides	黃尾阿南魚			＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊			＊	＊	＊	＊
Anampses neoguinaicus	新幾內亞鸚鯛					＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊			＊			＊		＊	＊				＊		＊	
Anampses twistii	雙斑阿南魚		＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊
Bodianus axillaris	腋斑狐鯛			＊		＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊		＊		＊※			＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Bodianus bilunulatus	雙帶狐鯛						※										＊		※		※		※		※			※	※		
Bodianus bimaculatus	雙斑狐鯛																				＊		＊	＊	＊						
Bodianus diana	對斑狐鯛					＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊			＊	＊※		＊		＊※	＊	＊	＊		＊		＊	＊	＊	＊
Bodianus izuensis	伊津狐鯛																				※										
Bodianus leucosticticus	點帶狐鯛							※		※										※	※							※			
Bodianus masudai	益田氏狐鯛																									※	※				
Bodianus mesothorax	中胸狐鯛		＊		＊		＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Bodianus perditio	黃斑狐鯛			＊		＊	※	＊						＊		＊					※										
Bodianus sp.	狐鯛							※																							
Cheilinus bimaculatus	雙斑唇魚				＊																										
Cheilinus celebicus	西里伯斯鸚鯛												＊	＊																	
Cheilinus chlorourus	綠尾唇魚					＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊		＊		＊	＊		＊				＊	
Cheilinus diagrammus	二點唇魚		＊		＊		＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊			＊※	＊	※	※										
Cheilinus fasciatus	橫帶唇魚						＊						＊	＊		＊					＊		＊	＊		＊	＊			＊	
Cheilinus oxycephalus	尖頭鸚鯛		＊				＊	＊	＊	＊										＊										
Cheilinus rhodochrous	單帶鸚鯛										＊	＊			＊		＊※														

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Cheilinus trilobatus	三葉唇魚										＊	＊		＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊※	＊	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※
Cheilinus undulates	曲紋唇魚					＊																			＊				＊	
Cheilinus unifasciatus	單帶唇魚		＊		＊		＊※		＊	＊				＊		＊		※													
Cheilio inermis	管唇魚					＊	＊					＊												＊			＊			＊	
Choerodon anchorago	楔斑豬齒魚					＊																									
Choerodon azurio	藍豬齒魚				＊		※	※	※		※		※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※		※	※			
Choerodon fasciatus	七帶豬齒魚				＊	＊	＊						＊				＊		＊				＊								
Choerodon gymnogenys	紫紋豬齒魚																							※		※					
Choerodon jordani	喬氏豬齒魚																				※								※		
Choerodon robustus	粗豬齒魚										＊	※					※		※	※			※								
Choerodon schoenleini	邵氏豬齒魚														＊						＊※					＊					
Choerodon zamboanage	杜邦寒鯛						※																								
Cirrhilabrus cyanopleura	藍身絲鰭鸚鯛		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Cirrhilabrus exquistus	艷麗絲鰭鸚鯛												＊	＊	＊	＊				＊	＊		＊	＊	＊			＊	＊	＊	
Cirrhilabrus lunatus	新月絲鰭鸚鯛																							＊		＊		＊		＊	
Cirrhilabrus melanomarginatus	黑緣絲鰭鸚鯛										＊		＊		＊			＊			＊					＊	＊	＊		＊	＊
Cirrhilabrus temminckii	丁氏絲鰭鸚鯛				＊														＊											＊	＊
Cirrhilabrus rubimarginatus	紅緣絲鰭鸚鯛				＊													＊						＊	＊					＊	
Coris aygula	紅喉盔魚				＊		＊	＊		＊			＊	＊			＊	＊		＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Coris batuensis	巴都盔魚																				＊										
Coris dorsomacula	背斑盔魚		＊			＊			＊				＊	＊		＊※	※	※			＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Coris gaimard	蓋馬氏盔魚				＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊		＊※	＊		＊	＊	＊※	＊※	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊
Coris musume	黑帶盔魚																				※										
Coris picta	斑盔魚						※								※																
Epibulus insidiator	伸口魚																						＊			＊	＊				
Gomphosus varius	雜色尖嘴魚		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Halichoeres biocellatus	雙斑儒艮鯛			＊	＊	＊	＊						＊	＊		＊	＊				＊										
Halichoeres centiguserus	石斑海豬魚		＊																												
Halichoeres chrysus	黃身海豬魚				＊	＊	＊				＊	＊	＊					＊	＊	＊			＊	＊		＊			＊		
Halichoeres hartzfeldii	哈氏海豬魚									＊			＊			※					※										
Halichoeres hortulanus	雲斑海豬魚		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Halichoeres margaritaceus	斑點海豬魚					＊																	＊							＊	
Halichoeres marginatus	絲鰭海豬魚									＊		＊		＊			＊						＊						＊		＊
Halichoeres melanochir	黑腕海豬魚		＊		＊			＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊				＊		＊			＊				＊
Halichoeres melanurus	黑尾海豬魚																				＊										
Halichoeres nebulosus	雲紋海豬魚			＊								＊				＊	＊		＊		＊				＊				＊	＊	＊

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Halichoeres nigrescens	黑帶海豬魚																														＊
Halichoeres orientalis	東方海豬魚																			＊						＊					
Halichoeres ornatissimus	飾妝海豬魚				＊	＊	＊																								
Halichoeres poecilopterus	花翅儒艮鯛											＊		＊																	
Halichoeres prostopeion	黑額海豬魚													＊	＊	＊	＊	＊			＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Halichoeres scapularis	頸帶海豬魚						＊			＊	＊			＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊
Halichoeres trimaculatus	三斑海豬魚					＊	＊		＊	＊	＊	＊		＊※	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Hemigymnus fasciatus	條紋厚唇魚			＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊		※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊※	＊			＊		＊		＊	＊
Hemigymnus melapterus	黑鰭半裸魚	＊			＊	＊	＊		＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊			＊		＊	＊			＊		＊	＊	＊
Hologymnosus annulatus	環紋全裸鸚鯛				＊	＊	＊				＊		＊	＊※	＊		＊※		※	※	※	＊				＊				＊	
Hologymnosus doliatus	狹帶全裸鸚鯛					＊	＊	＊	＊	＊		＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊				＊				＊	＊		＊
Hologymnosus rhodonotus	玫瑰全裸鸚鯛																					＊									
Iniistius baldwini	巴氏項鰭魚																							＊						※	
Labroides bicolor	二色裂唇魚				＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Labroides dimidiatus	裂唇魚		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Labrichthys unilineatus	單線突唇魚														＊											＊		＊	＊	＊	＊
Labropsis manabei	曼氏褶唇魚			＊		＊		＊					＊	＊		＊					＊						＊				
Macropharyngodon meleagris	朱斑大咽齒魚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊			＊	＊	＊
Macropharyngodon negrosensis	黑曲齒鸚鯛		＊											＊	＊																
Macropharyngodon sp.	曲齒鸚鯛	＊																													
Novaculichthys taeniurus	帶尾新隆魚							＊						＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊					＊			
Oxycheilinus bimaculatus	雙斑尖唇魚																			＊	＊	＊	＊	＊				＊	＊		
Oxycheilinus digramma	雙線尖唇魚																				＊	＊					＊	＊	＊	＊	
Oxycheilinus unifasciatus	單帶尖唇魚																						＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Parajulis poecilepterus	花鰭副海豬魚																										＊			＊	
Pseudocaris yamashiroi	擬盔魚													＊	＊		＊														
Pseudocaris sp.	擬鸚鯛											＊																			
Pseudocheilinus evanidus	姬擬唇魚				＊		＊							＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	
Pseudocheilinus hexataenia	六帶擬唇魚					＊	＊	＊					＊	＊		＊	＊	＊		＊			＊							＊	
Pseudocheilinus octotaenia	條紋擬唇魚				＊			＊	＊						＊						※				＊						＊
Pseudodax moluccanus	摩鹿加擬鸚鯛					＊															＊										
Pseudojuloides cerasina	擬海豬魚													＊	＊					＊	＊										＊
Pseudolobrus japonicus	日本擬隆頭魚						※					※																			
Pteragogus enneacanthus	九棘長鰭鸚鯛																				＊	＊	＊	＊	＊	＊					＊
Pteragogus flagellifera	長鰭鸚鯛		＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊									
Stethojulis bandanensis	黑星紫胸魚				＊						＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Stethojulis interruptus	斷紋紫胸魚				＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊																	
Stethojulis strigiventer	虹紋紫胸魚																				＊	＊						＊			
Stethojulis trilineata	三線紫胸魚				＊									＊	＊	＊	＊	＊					＊	＊	＊	＊			＊	＊	＊
Thalassoma amblycephalus	鈍頭錦魚		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Thalassoma cupido	環帶錦魚																							＊							
Thalassoma fuscum	柵紋錦魚		＊																												
Thalassoma hardwickii	哈氏錦魚		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊
Thalassoma hebraicum	海布拉錦魚		＊																												
Thalassoma jansenii	詹氏錦魚		＊	＊			＊		＊	＊	＊	＊	＊※	＊			＊※	※	＊	＊※	＊		＊	＊	＊	＊		＊	＊※	＊	＊
Thalassoma lunare	新月錦魚		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊	＊※	＊※	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊
Thalassoma lutescens	黃衣錦魚		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Thalassoma purpureum	紫錦魚		＊	＊														※			＊								＊※	
Thalassoma quinquevittatum	五帶錦魚		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※		＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	
Thalassoma trilobatum	三葉錦魚		＊	＊						＊					※		＊			＊										
Xyrichtys evides	麗虹彩鯛														※																
Xyrichtys twistii	雙斑虹彩鯛											※			※																
Xyrichtys woodi	伍氏虹彩鯛										＊※	※		＊	＊	＊			＊											
Xyrichtys pavo	巴父虹彩鯛														※	※															
Leiognathidae 鰏科																															
Leiognathus equulus	短棘鰏																					※	※	※							
Lethrinidae 龍占魚科																															
Gnathodentex aurolineatus	金帶鯛										＊		＊							＊	※	＊					＊			＊	
Gymnocranius euanus	真白鱲																				※										
Gymnocranius griseus	灰白鱲						※				※			＊	※	※		＊※		※			＊※	＊※							
Gymnocranius japonicus	日本白鱲								※				※			※			※	※											
Gymnocranius sp.	龍占	＊																													
Lethrinus atkinsoni	阿氏龍占魚																					※									
Lethrinus haematopterus	正龍占				＊				※				※		＊		＊		※	※	※										
Lethrinus harak	單斑龍占	＊			＊						＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊※	＊	＊	＊※	＊	※	＊※	＊	＊		＊	＊		
Lethrinus lentjans	烏帽龍占															＊			＊											
Lethrinus mahsena	白點龍占						※						※	※			※	※													
Lethrinus mahsenoides	磯龍占									※							※		※												
Lethrinus miniatus	長吻龍占							※	※			※			＊	＊	＊	＊※			※				＊※	＊		＊※	＊	＊※	＊※
Lethrinus nebulosus	青嘴龍占				＊	＊	※	※				※	※	＊	＊※	※	＊※	＊※		＊※	＊	＊※	＊※	＊※	＊	※		＊※	＊※		※
Lethrinus obsoletus	橘帶龍占																						＊	＊※							
Lethrinus ornatus	黃帶龍占								※				※						＊	＊※	＊	＊	※	※		※		※		※	※

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Lethrinus olivaceus	尖吻龍占																				＊※	＊※	＊※	＊※		※	＊※	＊			
Lethrinus rubrioperculatus	紅鰓龍占												※	※	※	※		※	※	※	※	※	※	※	※	※		＊※	※	※	※
Lethrinus semicinctus	長身龍占					＊	※											※		※	※										
Monotaxis grandoculis	異黑鯛				＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊※	＊
Lutjanidae 笛鯛科																															
Aphareus furcatus	欖色細齒笛鯛						＊				＊													※							
Aphareus rutilans	銹色細齒笛鯛													※	※							※	※						※	※	
Aprion virescens	藍笛鯛		＊						※			※						※	＊				＊			＊					
Etelis carbunculus	濱鯛							※	※	※	※						※														
Etelis coruscans	長尾濱鯛						※	※		※	※		※	※	※	※	※	※	※		※	※	※	※	※	※		※		※	※
Etelis radiosus	大口濱鯛						※									※															
Lutjanus argentimaculatus	銀紋笛鯛																											※	※	※	※
Lutjanus bengelenis	孟加拉笛鯛						※				※		※	※		※	※			※	※	※	※	※			※			※	※	
Lutjanus bohar	白斑笛鯛																			＊	＊		＊			＊		＊	＊	＊	＊
Lutjanus boutton	藍帶笛鯛						※				※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	＊※	※	※	※	＊※	＊		※		※	＊
Lutjanus carponotatus	胸斑笛鯛						＊			※	※				※			※	※					※							
Lutjanus decussates	交叉笛鯛									※	※	※		※			＊			＊※	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※		＊	＊
Lutjanus dodecanthoides	斜帶笛鯛													※		※	＊	＊※	＊※	※											
Lutjanus erythropterus	赤鰭笛鯛											※							※		※		※		※						
Lutjanus fulviflamma	火斑笛鯛				＊		※	※		※	※	＊※	※	※	＊※	※	＊※	＊	＊	＊※	＊※	＊※	＊※	＊	＊※	＊		※	＊※	＊※	
Lutjanus fulvus	黃足笛鯛			＊	＊		＊	＊	＊	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊	＊※	＊※	＊	＊	＊※	＊	＊	＊※	＊※
Lutjanus gibbus	隆背笛鯛						※	※	※	※	＊※	※	※	※	＊※	※	※	※	※	※	＊※	※	＊※	※	※	※		※	※	※	＊※
Lutjanus kasmira	四線笛鯛		＊		＊		＊	＊※	＊	＊※	＊※	＊※	＊			＊※	＊※	＊※	＊※	＊	＊※	※	＊※	＊※		＊※		※	＊	※	※
Lutjanus lutjanus	正笛鯛						※		※		※	＊	※				※	※	※	※	※	＊※	※	※		＊※		※	※	※	※
Lutjanus malabricus	摩拉巴笛鯛											※		※				※											※		
Lutjanus monostigma	單斑笛鯛				＊										＊						＊	＊	＊	※	※		＊※	＊※	＊	＊	＊	＊
Lutjanus quinquelineatus	五線笛鯛						＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊※	＊※			＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※
Lutjanus rivulatus	海雞母笛鯛						＊	※	※	※	※	※	※	※	＊※	＊※	※	※	＊※	※	※	※	※	＊※		※	※	※	＊※	※	※
Lutjanus russelli	羅氏笛鯛						※	＊※	＊	※	＊	＊	＊	＊	※	＊		＊													
Lutjanus stellatus	白星笛鯛						※			＊※	※	※			＊		※	※	＊※	＊			※	※							
Lutjanus vitta	縱帶笛鯛									＊		※	※			※	※	＊※	※		※	※				＊					＊
Macolor macularis	斑點羽鰓笛鯛																													＊	
Macolor maculatus	斑點笛鯛					＊	＊		＊	＊		＊		＊			＊	＊	＊	＊			＊			＊				＊	
Macolor niger	黑背羽鰓笛鯛				＊		＊	＊	＊			＊	＊	＊		＊	＊	＊			＊								＊	＊	＊
Paracaesio caeruleus	藍色擬烏尾冬								※	※	※		※	※	※	＊※	※	※	※	※	※		※		※	※	※	※	※	※	※
Paracaesio kusakarii	橫帶擬烏尾冬										※		※	※			※	※			※		※								

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Paracaesio xanthurus	黃擬烏尾冬						※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	＊※	※		※	※		※		※					※	※
Pinjalo pinjalo	斜鱗笛鯛						※												※												
Pristipomoides argyrogrammicus	藍紋姬鯛																					※	※	※							
Pristipomoides auricilla	黃尾姬鯛						※																								
Pristipomoides filamentosus	絲鰭姬鯛									※	※		※	※	※	※	※				※			※	※					※	
Pristipomoides multidens	黃吻姬鯛														※						※										
Pristipomoides sieboldii	姬鯛								※							※															
Pterocaesio tile	蒂爾烏尾冬															※															
Tropidinius amoenus	花笛鯛						※			※	※		※						※	※											
Tropidinius zonatus	橫帶花笛鯛							※				※																			
Symphorus nematophorus	曳絲笛鯛																				※										
Malacanthidae 軟棘魚科																															
Malacanthus brevirostris	短吻軟棘魚													※				※		※	※										
Megalopidae 大眼海鰱科																															
Megalops cyprinoides	大眼海鰱	＊																													
Mobulidae 蝠魟科																															
Mobula diabolus	姬蝠魟									※																					
Mobula formosana	台灣蝠魟										※																				
Molidae 翻車鮕科																															
Mola mola	翻車鮕									※			※																		
Monacanthidae 單棘鮕科																															
Aluterus monoceros	單角革單棘鮕								※	※			※	※			※														
Aluterus scriptus	長尾革單棘鮕	＊									＊				＊								＊						※	※	＊※
Amanses scopes	美單棘鮕									※					＊			＊												
Cantherhines dumerilii	杜氏刺鼻單棘鮕						＊	＊		＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊
Cantherhines fronticinctus	額斑刺鼻單棘鮕						＊			※																					
Cantherhines pardalis	細斑刺鼻單棘鮕													＊				＊					＊				＊			＊	
Paraluteres prionurus	副革單棘鮕				＊							＊	＊	＊																	
Pervagor janthinosoma	紅尾前角單棘鮕												＊										＊								
Mugilidae 鯔科																															
Chelon macrolepis	大鱗鯷																							※						※	
Mugil cephalus	鯔											＊				＊			＊									※			
Valamugil seheli	薛氏凡鯔																			＊				＊							
Mullidae 鬚鯛科																															
Mulloidichthys falvolineatus	黃線擬鬚鯛		＊	＊									※	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊		＊※	＊
Mulloidichthys vanicolensis	金帶擬鬚鯛	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊				＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊※	＊	＊※	＊	＊※	＊※

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Parapeneus barberinoides	鬚海緋鯉												＊					＊	※		＊※		＊	＊		＊					＊
Parapeneus barberinus	單帶海緋鯉						＊※		＊	＊※		＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	※	＊		＊
Parapeneus bifasciatus	雙帶海緋鯉			＊				＊	＊	※									＊	＊						＊	＊				
Parapeneus chrysopleuron	紅帶海緋鯉						※				※	※	※	※	※	※		※		※	※										
Parapeneus ciliatus	短鬚海緋鯉			＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊			＊	＊	＊		＊		＊※	＊
Parapeneus cyclostomus	圓口海緋鯉						※		＊			※	＊		※	＊		※	＊	※	※	＊	＊	＊	＊	＊※			＊	＊	
Parapeneus indicus	印度海緋鯉			＊	＊	＊	＊※	＊※	＊※	※	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊※	＊		＊※	＊		＊※
Parapeneus multifasciatus	多帶海緋鯉	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊※	＊※	＊	＊	＊※	＊※	＊※	＊	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊	＊※	＊※
Parapeneus pleurostigma	黑斑海緋鯉						※									＊				＊	※		＊								
Parapeneus spilurus	大型海緋鯉						※		※		※	※	※	※	※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※		＊※	※	※	※	＊	※	※	※	※
Parapeneus trigasciatus	三帶海鯡鯉											※						※		※	※										
Upeneus japonicus	日本緋鯉																				＊		＊								
Upeneus moluccensis	麻六甲緋鯉						※																								
Upeneus tragula	黑斑緋鯉						＊	＊	＊					＊		＊		＊	＊	＊		＊		＊	＊			＊	＊	＊	＊
Upeneus vittatus	多帶緋鯉						＊	＊	＊													＊		＊							
Muraenesocidae 海鰻科																															
Muraenesox bagio	百吉海鰻																※														
Muraenesox cinereus	灰海鰻							※				※																			
Muraenidae 鰻科																															
Echidna nebulosa	星帶蝮鰻																								＊						
Echidna polyzona	多環蝮鰻														※																
Gymnothorax albimarginatus	白緣裸胸鰻																						※								
Gymnothorax berndti	班第氏裸胸鰻																			※											
Gymnothorax chilospilus	雲紋裸胸鰻																						※								
Gymnothorax eurostus	黴身裸胸鰻																						＊								
Gymnothorax favagircus	黑斑裸胸鰻						※	※	※	※	※	※	※		※	※	＊※	※	※	※	※	＊※	※	※		※		※		※	※	※
Gymnothorax fimbriatus	花鰭裸胸鰻									※						※								※							
Gymnothorax flavimarginatus	黃邊鰭裸胸鰻									※																					
Gymnothorax javanicus	爪哇裸胸鰻									※							＊		＊				※	※							＊
Gymnothorax meleagris	白口裸胸鰻		＊			＊																									
Gymnothorax neglectus	細花斑裸胸鰻																				※										
Gymnothorax rueppelliae	寬帶裸胸鰻						＊																								
Rhinomuraena quaesita	黑身管鼻鰻																			＊											
Siderea picta	花斑星裸胸鰻												＊																		
Uropterygius macrocephalus	巨頭鰭尾鰻								※																						
Nemipteridae 金線魚科																															

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Nemipterus furcosus	紅金線魚										※																				
Nemipterus japonicus	日本金線魚																			※											
Nemipterus peronii	裴氏金線魚								※												※										
Nemipterus zysron	姬金線魚								※						※					※											
Nemipterus virgatus	金線魚																			※											
Parascolopsis eriomma	寬帶副眶棘鱸						※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	＊※	※	※	※	※		
Parascolopsis inermis	橫帶赤尾冬						※					※																			
Pentapodus aureofasciatus	黃帶錐齒鯛																				＊										
Pentapodus nagasabiensis	長崎錐齒鯛										※		※	＊	※	＊※	＊※	※	※												
Scolopsis affinis	烏面赤尾冬		＊		＊	＊					＊		＊	＊				＊		＊	＊			＊※	＊		＊	＊	＊		
Scolopsis bilineatus	雙帶眶棘鱸	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊
Scolopsis cancellatus	柵紋眶棘鱸		＊																												
Scolopsis ciliata	黃點赤尾冬																			＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊
Scolopsis lineata	線紋眶棘鱸			＊									＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Scolopsis monogramma	單帶眶棘鱸							＊			※	※				＊			＊			＊		＊	＊			＊	＊※	＊	＊※
Scolopsis trilineatus	三帶赤尾冬									＊							＊	＊		＊	＊		＊	＊	＊			＊	＊	＊	＊
Scolopsis vosmeri	白頸赤尾冬						※			※						＊※		＊※			＊※	＊		※	※						＊
Scolopsis xenochrous	欖斑赤尾冬														※			※			※			※	※				＊	＊	＊
Scolopsis xenochrous	黃帶赤尾冬																													＊	
Oplegnathidae 石鯛科																															
Oplegnathus fasciatus	條石鯛														＊													※			
Oplegnathus punctatus	斑石鯛						※						※		※							＊	※					※		※	※
Ophichthidae 蛇鰻科																															
Myrichthys colubrinus	竹節花蛇鰻						＊										＊	＊			＊		＊								
Ophidiidae 鼬鰍科																															
Brotula multibar	多鬚鼬魚																			※											
Hoplobrotula armata	棘鼬																				※										
Orectolobidae 鬚鮫科																															
Orectolobus japonicus	日本鬚鮫	＊																													
Ostracidae 鎧魨科																															
Lactoria fronasini	福氏角箱魨		＊															＊													
Ostracion cubicus	粒突箱魨			＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊				＊	＊
Ostracion meleagris	米點箱魨			＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊			＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊			＊	＊	＊	＊
Pempheridae 擬金眼鯛科																															
Pempheris oualensis	烏伊蘭擬金眼鯛		＊										＊	＊	＊		＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊			＊	＊	＊	＊

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Pempheris vanicolensis	黑緣擬金眼鯛		＊				＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊						＊	＊	＊		＊			＊	＊	＊	＊		
Pentacerotidae 五棘鯛科																															
Evistias acutirostris	尖吻棘魚												※																		
Pinguipedidae 虎鰶科(擬鱾科)																															
Parapercis cephalopunctata	頭斑虎鰶		＊	＊	＊	＊		＊		＊	＊		＊	＊	＊	※	＊		＊											
Parapercis clathrata	四斑擬鱸		＊	＊			＊	＊	＊	＊※	＊	※	＊	＊※		＊※	※	＊※	＊		＊※	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊
Parapercis cylindrica	圓擬鱸		＊		＊		＊	＊	＊	＊			＊		＊	＊	＊				＊	＊	＊			＊					
Parapercis kamoharai	蒲原氏擬鱸												※	＊	＊	※	＊		※		※										
Parapercis millepunctata	雪點擬鱸																			＊		＊		＊		＊		＊	＊	＊	＊
Parapercis multifasciata	多橫斑擬鱸																※		※	※											
Parapercis pacifica	太平洋擬鱸	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Parapercis somaliensis	索馬利虎鰶						※		※	※	※	※																			
Parapercis tetracantha	四棘擬鱸				＊	＊		＊	＊	＊※	＊	＊		＊	＊			※		＊※	＊※		＊		※					
Parapercis xanthozona	紅帶擬鱸											＊					＊		＊			＊								
Platycephalidae 牛尾魚科																															
Ratabulus megacephalus	花大眼牛尾魚	＊																													
Plesiopidae 七夕魚科																															
Calloplesiops altivelis	瑰麗七夕魚											＊																			
Plotosidae 鰻鯰科																															
Plotosus anguillaris	鰻鯰	＊															＊		＊												
Polymixiidae 鬚銀眼鯛科																															
Polymixia berndti	貝氏鬚銀眼鯛								※									※													
Polynemidae 馬鮁科																															
Eleutheronema rhadinum	多鱗四指馬鮁																							※	※			※	※	※	
Pomacanthidae 蓋刺魚科																															
Apolemicthys trimaculatus	三點阿波魚												※												＊						
Centropyge bicolor	二色刺尻魚																					＊		＊	＊				＊	＊	
Centropyge bispinosus	雙棘蓋刺魚				＊					＊	＊	＊	＊			＊							＊				＊				
Centropyge ferrugata	鏽紅刺尻魚												＊		＊	＊					＊			＊						＊	
Centropyge heraldi	海爾蓋刺魚						＊																								
Centropyge tibicen	白斑刺尻魚		＊												＊	＊							＊			＊					
Centropyge vrolickii	福氏刺尻魚		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Genicanthus semifasciatus	半紋背頰刺魚																			※											
Pomacanthus diacanthus	錦紋蓋刺魚												＊		＊	＊	＊					＊									
Pomacanthus imperator	條紋蓋刺魚			＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊		＊※	＊※	＊※	＊	＊※		＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Pomacanthus semicirculatus	疊波蓋刺魚		＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊※	＊※	＊※	＊※	＊	＊	＊	＊※	＊※	＊	＊		＊※	＊※	＊	＊※

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Pomacanthus sexstriatus	六帶蓋刺魚																		＊												
Pygoplites diacanthus	甲冑魚				＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊
Pomacentridae 雀鯛科																															
Abudefduf bengalensis	孟加拉雀鯛												＊																		
Abudefduf dicki	弧帶豆娘魚		＊																												
Abudefduf leucogaster	白腹豆娘魚		＊																												
Abudefduf lorenzi	勞倫氏雀鯛				＊														※												
Abudefduf notatus	黃尾雀鯛																					＊									
Abudefduf sordidus	梭地豆娘魚																								＊	＊					
Abudefduf septemfasciatus	七帶雀鯛			＊																											
Abudefduf sexfasciatus	六線雀鯛		＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊※	＊		＊	＊	＊		＊※	＊
Abudefduf vaigiensis	條紋豆娘魚		＊	＊	＊	＊	＊※	＊※	＊※	＊※	＊	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊	＊※	＊※	＊	＊	＊	＊※	＊※
Amblyglyphidodon aureus	黃背寬刻齒雀鯛					＊		＊	＊	＊		＊		＊			＊			＊	＊		＊	＊				＊	＊	＊	＊
Amblyglyphidodon curacao	橘鈍寬刻齒雀鯛				＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Amblyglyphidodon ternatensis	綠身寬刻齒雀鯛					＊								＊					＊												
Amblyglyphidodon leucogaster	白腹寬刻齒雀鯛				＊	＊	＊				＊	＊	＊								＊							＊	＊	＊	
Amphiprion clarkii	克氏雙鋸魚		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Amphiprion frenatus	白條雙鋸魚												＊						＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊		＊	＊	＊	＊
Amphiprion ocellaris	眼斑雙鋸齒雀鯛				＊																										
Amphiprion perideraion	粉紅雙鋸魚				＊	＊	＊	＊	＊			＊														＊					
Cheiloprion labiatus	厚唇雀鯛																									＊		＊			
Chromis alleni	亞倫氏光鰓雀鯛																				＊									＊	
Chromis analis	黃光鰓雀鯛																＊※														
Chromis atripectoralis	黑腋光鰓雀鯛				＊							＊										＊								＊	
Chromis atripes	黑鰭光鰓雀鯛					＊	＊	＊	＊	＊			＊	＊		＊※			＊					＊							
Chromis chrysura	短身光鰓雀鯛		＊	＊	＊	＊			＊	＊	＊						＊				＊			＊	＊	＊					
Chromis delta	三角光鰓雀鯛																									＊	＊		＊		＊
Chromis fumea	燕尾光鰓雀鯛																														＊
Chromis flavomaculata	黃斑光鰓雀鯛			＊	＊																			＊							
Chromis lepidolepis	細鱗光鰓雀鯛		＊			＊					＊	＊	＊※		＊	＊	＊		＊					＊		＊				＊	＊
Chromis margaritifer	二色光鰓雀鯛		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Chromis notata	斑鰭光鰓雀鯛					＊	＊			＊	＊				＊			＊													
Chromis ovatiformis	卵形光鰓雀鯛							＊	＊	＊			＊	＊												＊		＊			＊
Chromis retrofasciata	黑帶光鰓雀鯛		＊		＊	＊																									
Chromis rex	雷克斯刻齒雀鯛																							＊					＊	＊	
Chromis sp.	光鰓雀鯛														＊																

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Chromis ternatensis	三葉光鰓雀鯛		＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Chromis vanderbilti	凡氏光鰓雀鯛																				＊			＊					＊		
Chromis virides	藍綠光鰓雀鯛						＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Chromis weberi	魏氏光鰓雀鯛			＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊			＊				＊				＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊
Chromis xanthura	黃尾光鰓雀鯛													＊	＊		＊	＊	＊						＊	＊		＊	＊	＊	＊
Chrysiptera biocellatus	三點刻齒雀鯛			＊																											
Chrysiptera cyaneus	藍刻齒雀鯛											＊																			
Chrysiptera leucopoma	雙白帶刻齒雀鯛			＊					＊																						
Chrysiptera rex	雷克斯刻齒雀鯛						＊	＊	＊					＊	＊	＊	＊									＊	＊	＊			＊
Chrysiptera rollandi	羅氏刻齒雀鯛																					＊						＊			
Chrysiptera starcki	史氏刻齒雀鯛												＊						＊												
Chrysiptera unimaculata	單斑刻齒雀鯛																				＊			＊	＊			＊			
Dascyllas aruanus	三帶圓雀鯛		＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊				＊	＊	＊	＊
Dascyllas melanurus	黑尾圓雀鯛						＊												＊										＊		
Dascyllas reticulatus	網紋圓雀鯛		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Dascyllas trimaculatus	三斑圓雀鯛		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊※	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Neoglyphidodon melas	黑副雀鯛				＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Neoglyphidodon nigroris	黑褐副雀鯛		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Neopomacentrus cyanomos	新雀鯛																＊														
Plectroglyphidodon dickii	迪克氏固曲齒鯛			＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊					＊	＊				＊
Plectroglyphidodon johnstonianus	約島氏固曲齒鯛					＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊
Plectroglyphidodon lacrymatus	珠點固曲齒鯛				＊	＊		＊		＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊
Plectroglyphidodon leucozona	白帶固曲齒鯛									＊											＊										
Pomacentrus alexanderae	胸斑雀鯛																									＊	＊	＊	＊	＊	
Pomacentrus amboinensis	安邦雀鯛				＊	＊	＊												＊	＊			＊	＊						＊	
Pomacentrus bankanensis	斑卡雀鯛			＊												＊	＊				＊	＊								＊
Pomacentrus chrysurus	白尾雀鯛				＊						＊			＊	＊	＊	＊			＊	＊	＊	＊	＊		＊		＊	＊	＊	＊
Pomacentrus coelestis	霓虹雀鯛		＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Pomacentrus lepidogenys	頰鱗雀鯛		＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊						＊	＊	＊	＊
Pomacentrus leucozons	白帶雀鯛		＊	＊																											
Pomacentrus moluccensis	摩鹿加雀鯛				＊	＊	＊	＊	＊					＊	＊	＊		＊	＊		＊										＊
Pomacentrus nagasakiensis	長崎雀鯛																													＊	
Pomacentrus nigromarginatus	黑鰭緣雀鯛													＊							＊										
Pomacentrus opisthostigma	腋斑雀鯛														＊	＊	＊														
Pomacentrus pavo	青玉雀鯛			＊			＊			＊	＊			＊			＊						＊						＊		＊
Pomacentrus philippinus	菲律賓雀鯛				＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊			＊	＊	＊	＊

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Pomacentrus stigma	泰布拉雀鯛																					＊									
Pomacentrus tripunctatus	三斑雀鯛									＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊								＊		＊		＊	＊
Pomacentrus vaiuli	王子雀鯛		＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊
Stegases fasciolatus	藍紋高身雀鯛				＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊	＊		＊※	＊		＊		＊	＊				＊	＊	＊	＊
Stegases altus	羽高身雀鯛				＊																										
Stegases nigricans	黑真雀鯛									＊	＊							＊	＊	＊											
Priacanthidae 大眼鯛科																															
Cookeolus boops	紅目大眼鯛						＊※			※		※		※	※	※						※									
Cookeolus japonicus	日本紅目大眼鯛																								※				※	※	※
Priacanthus blochii	斑鰭大眼鯛													※				※				＊									
Priacanthus cruentatus	血斑大眼鯛												※		＊			＊													
Priacanthus hamrur	寶石大眼鯛	＊						※	※	※							＊	＊	※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※
Priacanthus macracanthus	大棘大眼鯛		＊						※		※							＊	※	※	※	※	※							＊	＊
Pristigenys niphonia	大鱗大眼鯛												※			※	※														
Pristigenys sagittarius	高背大眼鯛																							※		※					
Pseudochromidae 擬雀鯛科																															
Labracinus cyclophthalmus	圓眼戴氏魚		＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊※	＊	＊※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Pseudochromis cyanotaenia	藍帶准雀鯛														＊		＊														
Ptereleotridae 凹尾塘鱧科																															
Nemateleotris magnificus	絲鰭線塘鱧		＊		＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊		＊	＊	＊	＊
Ptereleotris evides	瑰麗塘鱧		＊	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊
Ptereleotris microlepis	細鱗凹尾塘鱧																				＊										
Rachycentridae 海鱸科																															
Rachyentron canadum	海鱸									※	※	※		※	※	※															
Salmonidae 鮭科																															
Oncorhynchus keta	鮭魚												※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
Scaridae 鸚哥魚科																															
Bolbometopon muricatum	隆頭鸚哥魚														＊※	＊			※			※							※		
Calotomus calorinus	卡羅鸚鯉	＊														＊※	＊	＊				※	※								
Cetoscarus bicolor	雙色鯨鸚哥魚				＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊				※	＊	＊	＊		＊		＊	＊		＊
Cetoscarus bowersi	鮑氏鸚哥魚		＊					＊	※			※					＊	※	※	＊	※					＊		※	※		＊
Chlorurus microrhinos	小鼻綠鸚哥魚																									＊					
Chlorurus oedema	瘤綠鸚哥魚																				※		※								
Chlorurus japanensis	日本綠鸚哥魚																							※							
Chlorurus sordidus	白斑鸚哥魚				＊	＊	＊			＊※	＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊	＊	＊※	＊※	＊※		＊	＊	＊	＊	＊※	＊	＊※	＊	＊	＊
Hipposcarus longiceps	長吻鸚哥魚					＊	＊		＊	＊	＊	＊		※	＊	＊	＊	＊※	＊				＊			＊					

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Scarus atropectoralis	紅鸚哥魚								※		※		※																		
Scarus chameleon	藍臀鸚哥魚																							＊					＊		
Scarus chlorodon	綠鸚哥魚				＊																										
Scarus dimidiatus	新月鸚哥魚							＊	＊		＊				※	＊			※	※	※		※	＊		※	※			＊	
Scarus festivus	橫紋鸚哥魚						＊※		※	※		※								＊	＊※	＊	＊	＊		＊※	＊※	＊※		＊※	＊
Scarus forsteni	福氏鸚哥魚					＊	＊※	＊※	＊	＊	＊※	＊	＊※	＊	＊※	＊	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※
Scarus frenatus	黃鸚哥魚					＊	※	※				※		＊							※								＊		＊
Scarus ghobban	藍點鸚哥魚	＊					＊※	※	※	＊※	＊※	※	※	※	※	＊※	＊※	※	※	＊※	＊※	※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※
Scarus gibbus	鈍頭鸚哥魚						＊※		※	※		＊※	＊			＊		＊	＊	＊			＊								
Scarus globiceps	蟲紋鸚哥魚									※				＊※	＊※	※		＊※			＊				※	＊※					
Scarus hypselopterus	爪哇鸚哥魚																			＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
Scarus lunula	彎月鸚哥魚									※																					
Scarus niger	頸斑鸚哥魚			＊	＊	＊	＊							＊※	＊	＊	＊	＊		※			※	＊※	※	＊					
Scarus ocdema	疣鸚哥魚					＊								＊	※																
Scarus oviceps	姬鸚哥魚		＊	＊	＊		＊		＊	＊	＊	＊	＊	※＊	＊	＊※	＊	＊	＊※			※						＊	＊※	＊	＊
Scarus oviforns	卵頭鸚哥魚						※														※					＊					
Scarus prasiognathos	綠頜鸚哥魚		＊					※		※	＊	※					※	＊	＊※	＊	＊※	＊※	＊※	＊※		＊	＊	※		※	
Scarus psittacus	棕吻鸚哥魚					＊	＊※					＊	＊	＊※	＊※	＊	＊※	＊※	＊※		＊				＊	＊		※	＊	※	＊
Scarus pyrrhurus	紅尾鸚嘴魚		＊		＊	＊						※						※	※	※								※			
Scarus rivulatus	雜紋鸚哥魚											※		※	※	※	※	※	※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※
Scarus rubroviolaceus	紅紫鸚哥魚		＊		＊	＊	＊	＊※			※	＊※	※	＊※	＊※	※	＊※	※	＊※	＊	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	※	＊	＊※	＊※	＊※
Scarus schlegeli	史氏鸚哥魚	＊				＊	＊	＊	＊	＊※	＊※	＊	＊※	＊※	＊※	＊※	＊	＊	※	＊※	＊※	※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※
Scarus spinus	刺鸚哥魚																						※		＊						
Scarus tricolor	一字鸚哥魚	＊																													
Scatophagidae 金錢魚科																															
Scatophgus argus	金錢魚																	※						※						※	※
Sciaenidae 石首魚科																															
Atrobucca nibe	黑域																	※													
Argyrosomus japonicus	日本銀身魚或																												※		
Larimichthys crocea	大黃魚																							※							
Scombridae 鯖科																															
Acanthocybium solandii	棘鰆						※		※	※	※	※		※	※		※	※	※	※	※		※	※	※	※	※					※
Auxis thazard	扁花鰹										※	※	※	※		※	※					※	※								
Euthynnu affinis	巴鰹							※	※	※		※	※			※															
Euthynnu pelamis	正鰹						※		※	※	※	※	※	※						※				※	※						
Rastrelliger faughni	富氏金帶花鯖																※														

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Rastrelliger kanagurta	金帶花鯖																							※							
Sarda orieneails	東方齒鰆						※									※	※				※										
Scomber australasiaus	花腹鯖							※															※								
Scomber japonicus	白腹鯖							※	※			※			※		※														
Scomberomorus commerson	鰆												※																		
Scomberomorus guttatus	台灣馬加鰆						※															※	※								
Scomberomorus koreanus	高麗馬加鰆						※																								
Thunnus alalunga	長鰭鮪											※																			
Thunnus tonggol	長腰鮪																						※								
Thunnus albacares	黃鰭鮪						※	※	※	※	※	※	※		※		※	※	※	※			※	※				※				※
Scorpaenidae 鮋科																															
Ablabys taenianotus	長絨鮋														＊																
Dendrochirus zebra	斑馬紋多臂簑鮋			＊						＊			＊	＊	＊		＊			＊			＊							＊	
Helicolenus hilgendorfi	無鰾鮋									※	※	※	※	※	※	※	※		※	※	※	※	※	※	※	※	※		※	※	※
Inimicus japonicus	日本鬼鮋																		＊												
Odontanthias borbonius	花斑金花鱸																				※										
Parascorpaena mossambica	莫三鼻克圓鱗鮋																			＊		＊		＊		＊					
Parascorpaena mcadamsi	斑翅圓鱗鮋																						＊								
Pterois antennata	觸角簑鮋							＊	＊		＊	＊	＊			＊	＊	＊		＊	＊	＊		＊				＊	＊	＊	
Pterois lunulata	環紋簑鮋																											※			
Pterois picta	花彩圓鱗鮋																						※								
Pterois radiatus	軸紋簑鮋			＊											＊			＊		＊	＊	＊		＊			＊			＊	
Pterois volitans	魔鬼簑鮋											＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊※		＊	＊	＊		＊	＊
Scorpaenopsis diabolus	駝背石狗公				＊																										
Scorpaenopsis cirrosa	鬼石狗公						※								※	＊※				＊		＊									
Scorpaena izensis	伊豆鮋																				※										
Scorpaena miostoma	小口鮋																											※			
Scorpaena noglecta	絡鰓鮋						※							※																	
Scorpaena ornaria	斑鰭鮋										※	※		※																	
Scorpaenodes parripinnis	短翅小鮋						※	※	※					※															※			
Sebastiscus albofasciatus	白條紋石狗公										※																				
Sebastiscus tertius	三色石狗公										※									※											
Synanceia verrucosa	玫瑰毒鮋	＊																											※	※	※
Serranidae 鮨科																															
Aethaloperca rogaa	煙鱠							※	※										※												
Anthias elongatus	長花鮨														※	※				※											

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Anthias fasciatus	條紋花鮨						※										※														
Anthias pascalus	厚唇花鱸							＊※	＊																						
Anthias squamipinnis	金花鮨																※														
Anthias truncatus	截尾花鮨					＊																									
Anyperodon leucogrammiaus	白線光腭鱸						※	※	※					※	※	※	※	※	※			※	※	※				※	※	※	※
Caprodon schlegeli	許氏菱齒花鮨						※								※									※							
Cephalopholis analis	紅點九刺鮨						※				※						※			※	※		※	※	※						
Cephalopholis argus	斑點九刺鮨						※	※	※						※	※	※	※	※	※	※	＊※	※	※	※	＊※	＊※	※		＊※	
Cephalopholis aurantia	橙點九刺鮨																				※		※								
Cephalopholis boenack	橫紋九刺鮨		＊	＊			※									＊			※										※		
Cephalopholis igarashiensis	伊加拉九刺鮨																					※									
Cephalopholis miniata	青星九刺鮨					＊	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	＊※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
Cephalopholis pachycentron	橫帶九刺鮨		＊																												
Cephalopholis sexmaculatus	六斑九刺鮨						※	※					※	※		※			※	※		※									
Cephalopholis sonnerati	宋氏九刺鮨										※						※			※	※		※			※			※		
Cephalopholis spiloparaeus	黑緣九刺鮨						※					※			※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※		※	※	※	※
Cephalopholis urodeta	尾紋九刺鮨		＊		＊	＊	＊※	＊※	＊	※	＊	＊※	＊	＊	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊	＊	＊	＊	＊
Chelidoperca hirundinacea	小花鱸																	※													
Chelidoperca pleurospilus	黑點小花鱸														※		※														
Chromileptes altivelis	駝背鱸														＊				※												
Diploprion bifasciaus	雙帶鱸															＊						＊	＊			＊					
Epinephelus akaara	赤點石斑魚																			※										＊	
Epinephelus amblycephalus	鑲點石斑魚																	＊	※												
Epinephelus areolatus	寶石石斑魚																				※				※			※	※	※	
Epinephelus awoara	青石斑魚									※				※	※	※									※						
Epinephelus bleekeri	布氏石斑魚						※					※	※	※＊	※	※	※	※	※			※	※	※	※	※			※	※	
Epinephelus caeruleopunctatus	藍點石斑魚									＊																					
Epinephelus chlorostigma	密點石斑魚														※				※		※										
Epinephelus coioides	點帶石斑魚							※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	＊※	※	※	※	※	※
Epinephelus epistictus	小紋石斑魚																			※											
Epinephelus fasciatus	橫帶石斑魚					＊	※	※	＊※	※	※	※	＊	＊※	＊※	＊※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	＊※	※	※	＊※	＊※	
Epinephelus fuscoguttatus	棕點石斑																									※	※				
Epinephelus hexagonatus	六角石斑魚							＊※					※	＊※	＊※	＊※	※	※	※	＊※	＊※					＊			※	＊	※
Epinephelus lanceolatus	鞍帶石斑																				※	※									
Epinephelus fuscoguttatus♀* *Epinephelus lanceolatus*♂	龍虎斑																											※	※	※	※

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Epinephelus maculatus	花點石斑魚						※	※					※	※	※	＊	＊	＊			＊	＊	＊	＊		＊					
Epinephelus malabaricus	瑪拉巴石斑魚							※				※			※				＊※	※	※	※	※	※	※		＊	＊※			
Epinephelus melanostigma	黑點石斑魚													※			※														
Epinephelus merra	網紋石斑魚						※	※		※	※			＊							※	＊	＊						＊		
Epinephelus morrhua	吊橋石斑魚						※	※								※															
Epinephelus poecilonotus	琉璃石斑魚								※																						
Epinephelus radiatus	雲紋石斑魚											※	※	※	※					※											
Epinephelus retouti	雷拖氏石斑魚															※						※				※					
Epinephelus rivulatus	霜點石斑魚						※																								
Epinephelus trimaculatus	三斑石斑魚							※	※	※	※	※						※													
Grammistes sexlineatus	六線黑鱸	＊												＊				＊			＊	＊	＊		＊						
Gracila albomarginata	白邊纖齒鱸																						※	※							※
Holanthias borbonius	粗斑花鱸						※	※	※	※	※	※	※		※	※	※			※	※										※
Holanthias chrysostictus	金帶粗斑花鱸						※			※		※	※		※	※				※											
Holanthias katayamai	片山花鱸						※	※	※		※																				
Liopropoma aragai	荒賀氏鱠														※		※	※	※												
Odontanthias borbonius	黃斑齒花鮨																				※	※						※	※		
Odontanthias unimaculatus	單斑齒花鮨		＊																							※					
Plectranthias cooperi	庫伯氏花鱸				＊	＊																									
Plectranthias yamakawai	山川氏棘花鱸						※																								
Plectranthias japonicus	日本棘花鱸																						※								
Plectropomus bicolor	二色花鱸				＊	＊										＊															
Plectropomus laevis	橫斑刺鰓鮨		＊		＊								＊							※						＊					
Plectropomus leopardus	花斑刺鰓鮨						※							＊※					※	※	※		※	※							
Pseudanthias elongatus	長擬花鱸																				※										
Pseudanthias pleurotaenia	側帶擬花鮨																				＊		＊								
Pseudanthias pascalus	厚唇擬花鱸																＊								＊	＊			＊	＊	
Pseudanthias squamipinnis	絲鰭擬花鮨		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Sacura margaritaceus	珠斑花鱸						※										※														
Saloptia powelli	褒氏貧鱠																			※		※									
Variola albimarginatus	白緣星鱠		＊				※	※	※	※	※	※		※	※	※	※	※	※	※	※	※	＊※	※	※	※	※	※	※	※	※
Variola louti	星鱠				＊		※	※	※	※	※		※	※	＊※	※	※	※	※	※	※		※	※	※	※		※	※	※	※
Siganidae 藍子魚科																															
Siganus argenteus	銀藍子魚				＊		※	※				※		※	＊※		＊	＊								※					
Siganus canaliculatus	長鰭藍子魚							※	※		※	※	※	※	＊※	＊※	※	※	＊※	※											
Siganus fusescens	褐藍子魚						※	※	※	※	※	＊		＊		※	＊※		※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊※	＊	＊					

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Siganus guttatus	點藍子魚					＊				※					＊											＊					※
Siganus javus	爪哇藍子魚																									＊					
Siganus spinus	黑藍子魚													＊							＊					＊	＊				
Siganus unimaculatus	單斑藍子魚											＊																			
Siganus virgatus	藍帶臭肚魚																													＊	
Siganus vermiculatus	蟲紋臭都魚	＊															＊	＊※	＊												
Solenostomidae 剃刀魚科																															
Solenostomus cyanopterus	藍鰭剃刀魚																				＊										
Soleidae 鰨科																															
Heteromycteris matsubarai	松原氏鉤嘴鰨																			※											
Pardachirus pavoninus	豹鰨													※																	
Sparidae 鯛科																															
Acanthopagrus bagius	灰鰭鯛						※					※		※				※													
Dentex hypselosomus	黃背牙鯛								※							※													※		
Evynnis cardinalis	紅鋤齒鯛																						※								
Monotaxis grandoculis	單列齒鯛		＊																												
Sparus sarba	黃錫鯛																	※													
Sphyraenidae 金梭魚科																															
Sphyraena acutipinnis	尖鰭金梭魚						※		※			※			＊※		※														
Sphyraena barracuda	巴拉金梭魚										＊							＊			＊				＊			※			※
Sphyraena flavicauda	黃尾金梭魚												＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊					
Sphyraena forsteri	大眼金梭魚																									＊					
Sphyraena japonica	日本金梭魚																									＊	＊				
Sphyraena jello	斑條金梭魚						※									＊※	※						※								
Sphyraena nigripinnis	黑鰭金梭魚							※		※																					
Sphyraena puthamial	布氏金梭魚						※	※				※	＊※		＊※										※				※		
Symphysanodontidae 片山花鯛科																															
Symphysanodon katayamai	片山花鯛				＊								※																		
Syngnathidae 海龍科																															
Doryrhamphus dactyliophorus	黑環海龍				＊								＊							＊	＊		＊								
Synodontidae 狗母魚科																															
Saurida gracilis	細蛇鰡	＊																			＊										
Synodus capricornis	羊角狗母																			※											
Synodus rubomarmoratus	紅花斑狗母												＊			※	＊※														
Synodus ulae	紅斑狗母											※	※		＊※		※														

續表 5-25 民國 82 年至 111 年第三核能發電廠附近海域魚類相調查　　(＊代表珊瑚礁魚類※代表後壁湖漁獲)

種名	中文名稱	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Synodus variegatus	花斑狗母												＊	＊	＊※	※	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊			＊		
Trachinocephalus myops	大頭花桿狗母												※																		
Terapontidae 雞魚科																															
Pelatus cornutus	四線雞魚	＊																													
Terapon theraps	條紋鰏																※														
Tetraodontidae 四齒鮐科																															
Arothron hispidus	紋腹叉鼻鮐				＊		＊	＊	＊		＊	＊		＊		＊			＊	＊	＊	＊	＊	＊※					＊	※	
Arothron manilensis	菲律賓叉鼻鮐																								＊					※	＊
Arothron mappa	輻紋叉鼻鮐																											＊			
Arothron meleagris	白點叉鼻鮐		＊							＊										＊	＊					＊	＊				
Arothron nigropunctatus	黑斑叉鼻鮐		＊					＊		＊	＊	＊			＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊		＊			＊		
Arothron reticularis	網斑叉鼻鮐																			＊										＊	
Arothron stellatus	星斑叉鼻鮐			＊	＊												＊	＊	＊			＊				＊		＊			
Canthigaster axiologus	三帶尖鼻鮐																				＊	＊									
Canthigaster bennetti	笨氏尖鼻鮐																								＊						
Canthigaster compressus	扁背尖鼻鮐															＊															
Canthigaster coronata	冠帶扁背鮐				＊						＊																				
Canthigaster solandri	索氏尖鼻鮐																			＊				＊		＊	＊				
Canthigaster valentini	瓦氏尖鼻鮐		＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
Lagocephalus sceleratus	兇兔頭鮐					＊																									
Trachipteridae 粗鰭魚科																															
Trachipterus trachypterus	粗鰭魚																				※										
Trichiuridae 帶魚科																															
Trichiurus lepturus	白帶魚														※	※														※	※
Tripterygiidae 三鰭鰏科																															
Helcogramma striatus	條紋黑罩三鰭鰏																＊	＊	＊	＊		＊									
Helcogramma striata	縱帶彎線鰏																						＊			＊			＊		＊
Xiphiidae 劍旗魚科																															
Xiphias gladius	劍旗魚						※	※		※		※										※									
Zanclidae 角蝶魚科																															
Zanclus cornutus	角鑲魚	＊	＊	＊		＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊




圖 5-1　82 年度第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚類相觀測地點




圖 5-2　83 及 84 年度第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚類相觀測地點




圖 5-3　85 年至 111 年調查第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚類相觀測地點




圖 5-4 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 4 次調查珊瑚礁魚類相組成百分比




圖 5-5 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 4 次調查魚類相頻度圖




圖 5-6 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 4 次調查各測站珊瑚礁魚類相組成百分比




圖 5-7 第三核能發電廠附近海域民國 110 年 4 次調查各測站珊瑚礁魚類相頻度圖




圖 5-8 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 4 次調查珊瑚礁魚類相組成百分比




圖 5-9 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 4 次調查魚類相頻度圖




圖 5-10 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 4 次調查各測站珊瑚礁魚類相組成百分比




圖 5-11 第三核能發電廠附近海域民國 111 年 4 次調查各測站珊瑚礁魚類相頻度圖




圖 5-12 第三核能發電廠附近海域民國 89 年至 111 年調查各測站珊瑚礁魚尾數變動情形




圖 5-13 第三核能發電廠附近海域民國 89 年至 111 年調查珊瑚礁魚類種類數的變動情形




圖 5-14 第三核能發電廠附近海域歷年各季刺尾鯛科、蝴蝶魚科、隆頭魚科及雀鯛科珊瑚礁魚類相累積組成百分比




圖 5-15 第三核能發電廠附近海域歷年各季珊瑚礁魚類刺尾鯛科、蝴蝶魚科、隆頭魚科及雀鯛科之魚種數變動情形




圖 5-16 第三核能發電廠附近海域歷年各測站刺尾鯛科、蝴蝶魚科、隆頭魚科及雀鯛科珊瑚礁魚類相組成百分比




圖 5-17　民國 89-111 年 5 個測站珊瑚礁魚類群聚之二度空間排序




圖 5-18　珊瑚礁魚類在 5 個測站中出現情形

註：1.只在未影響域發現的魚種　2.只在影響域發現的魚種　3.在未影響域及影響域皆可發現的魚種

2.民國 89-111 年調查期間記錄到 648 種珊瑚礁魚類




圖 5-19 珊瑚礁魚類與後壁湖販售魚類年間相似度




圖 5-20 後壁湖魚市場販售魚種數年度變動情形




圖 5-21 後壁湖魚市場販售魚種數之季節變動情形

六、資料庫建置及維護

一、計畫目的與緣起

本計畫 6 個子計畫之調查監測項目涵蓋了非生物環境因子：包括海潮流、水文水質化學性質、海洋生物；生物環境因子：包括基礎生產力，浮游植物與浮游動物、無脊椎動物及魚類等，以及漁場經濟效益之調查、統計及評估等。由於每個子計畫間皆有相當程度的關聯性，在此藉由各子計畫間的聯繫及討論，以期得到更完整之調查監測效益。為求數據能立即提供給其它子計畫主持人及委託單位參考，以及考慮整合作業之時效性，因而成立網站，並將資料儘速建置在網站中，以方便各子計畫間之交互討論。最後之成果除了以整合型報告印出之外，並製作光碟片。

二、研究方法與進度說明

本計畫自民國 82 年迄今已累積了相當成果。由於各子計畫之間的作業互有關聯，因此聯繫工作愈顯得重要，為使各子計畫之成果得以儘快整合，以建置「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查之資料庫建置及維護」，將歷年資料保存於資料庫並做為橫向整合之工具。

本子計畫所建置的網站資料庫，將各子計畫各季的實驗結果、數據上網，快速而有效的連接各個子計畫，展現本計畫之整體成效。

採用方法：

1.將進行中的資料整合：先與各子計畫洽談研究內容要如何展現，要有那些架構，再來製作網頁。網頁建置後，由各子計畫陸續將新的研究成果充填網站的資料。

2.會前討論：在期中、期末檢討會之前，各主持人先進行會前討論，讓彼此之間了解監測的成果，以方便互相引用、佐證。本計畫的 110 年期中討論會在民國 110 年 12 月 15 日於線上舉行，而 111 年期末討論會在民國 111 年 12 月 19 日於線上舉行。

3.檢討會後將綜合討論結果集結成報告。

三、目前研究成果

3.1 海潮流與其他子計畫相關性

海流調查結果顯示，排水口附近海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主，造成海水經常往西南繞過貓鼻頭往西輸送之趨勢。溫排水擴散區域大部份限於排水口附近海域西南側，其擴散範圍在漲潮時段往西南約500～1000 m，退潮時段往東-東南約200～800 m，溫排水大部份分佈於海表層以下水深3 m以內，擴散影響範圍多侷限在距排水口1000 m弧內，空間溫降率自排水口往外至500 m弧內約1°C/100 m。除此以外，核三廠海域近岸海底海溫陡降現象，除了是因為大潮潮流在南灣內引起的湧升流將次表層冷水帶上來所造成外，在呂宋海峽產生的巨大內潮、內波傳入海灣內亦有相當程度的貢獻。湧升帶來的冷水，可能有助於南灣之珊瑚免於海水暖化之衝擊；冷水所含之營養鹽，亦有助於藻類生長，但因南灣海水內外交換甚快，藻類來不及長大即被送至灣外，因此營養鹽利用率不高 (Chen et al., 2004a, 2004b, 2005；Jan and Chen, 2009)。水溫長期觀測資料顯示發現颱風季期間某些颱風經過台灣附近後會造成1～4週長的水溫下降與回升變化，其間動力因素複雜，值得進一步分析。

3.2 水文與水質化學與其他子計畫相關性

3.2.1 水文變化與大尺度海洋環境變化

過去本海域的鹽度大多在南海水以及西菲律賓海水之間變化，然而近幾年卻頻頻觀察到低於歷史記錄的鹽度，如 100 年第 4 次、101 年第 1、3 次、102 年第 4 次，以及 103 年第 3 次，更是創了歷年的新低；鹽度的降低應與南海強降雨，如 100 年 10 月泰國大水災、102 年 11 月海燕颱風重創菲律賓有直接關係。而 103 年第 3 次本海域歷史記錄最低鹽之水團，有可能來自本島淡水的輸入，但由圖 6-2-1 珠江口至台灣海峽衛星葉綠素甲與透明度之圖像，顯示葉綠素甲高值由珠江口沿著陸棚往北擴散至海峽中線，透明度的分佈舌甚至擴散至澎湖群島，此兩種訊號的變化極有可能是較低鹽的沖淡水所致，因此本海域低鹽的訊號亦不排除是由南海水而來。將鹽度距平值

(當月測值-歷年月平均值)對應 PDO，發現彼此之間有明顯正相關，即 PDO 暖相時，本海域鹽度升高，而 PDO 冷相時，鹽度普遍偏低。以季節來看，春、秋、冬季均呼應此正相關，夏季若除去 103 年 8 月的離群值(outlier)，則其正相關性仍然存在(圖 6-2-2)。109 年的冷相卻對應了鹽度較高距平值，然而 110-111 年的冷相又對應了低距平值。

比較 103~106 年 7 月 PDO 暖相以及 99-102、108-111 冷相各測站溫鹽訊號，發現暖相時水團較集中在南海水以及西菲律賓海水之間，而冷相時則南海水的訊號較為明顯(圖 6-2-3)。比較表水 pH 變化，從 83 年平均為 8.106 至 111 年平均為 8.056，下降了 0.050，平均每年降 0.019(圖 6-2-4)，此下降數值大致符合大氣中二氧化碳逐年上升，理論上將造成表面海水每年約下降 0.0017(雷漢杰，2013)。硝酸鹽在 103~108 年 PDO 暖相平均濃度為 0.72±1.20μM(n=149)，而 99-102、108-111 年冷相時硝酸鹽平均濃度分別為 0.34±0.31(n=96)、0.62±0.64(n=72) (圖 6-2-5)，兩者差異是否明顯，還需進一步統計分析。長時間來看，硝酸鹽的距平值與 PDO 指數相關性並不高(P>0.05, 圖 6-2-6)。

3.2.2 電廠大修時水溫變化

當電廠大修時，抽取海水做為冷卻的用量相對減少，此時溫排水的溫度勢必下降，在海域最能直接反應的就是水溫。因此電廠運轉是否造成海域水溫升高， 可以利用電廠大修時的海水溫度與運轉時做一比較。核三廠 82 年後歷次大修起訖時間(計至 111 年 11 月)，電廠大修共 43 次，而採樣共 120 次，大修與採樣時間重疊共 27 次，因此可用此 27 次水溫來探討此一課題。表 6-2-1 是從 82 年 8 月至今春、夏、秋、冬四季 24 站及其他 6 站表水水溫，在電廠正常運轉無大修時與當採樣時正好遇上大修之比較表。24 站無大修期的平均溫度比起大修期高出 0.7、(無夏季資料)、1.6、0.7°C，而其他 6 站則分別是-0.1、(無夏季資料)、0.9、-0.6°C。24 站在春、秋、冬三季均是溫度偏高，而其他 6 站春、冬兩季經由 T-test 比較兩者並不顯著，但秋天平均水溫則高達 0.9°C，此差值經 T-test，P 值<0.01，極為顯著，即秋天的表水溫度在電廠有運轉時南灣水溫明顯較高。

由於本海域位於南海與西菲律賓海的交界處，水文水質受到大環境變化的影響，上述秋天海水表溫在電廠運轉或是大修時之差異是明顯的，是否與大尺度環境有關，而非僅溫排水的改變之單一因素? 將秋天的水溫依正常年、聖嬰年、反聖嬰年區分(表 6-2-2)，以摒除掉大環境變化之差異，可以看到正常年的水溫在電廠運轉時平均溫度為 27.8±0.8 ℃，明顯高於電廠大修時 25.2±1.0 ℃，而聖嬰年、反聖嬰時兩者差異不大。此數據分析似乎透露出電廠之運轉在正常年、秋季時對海域的水溫是有影響。上述乃採用其他 6 站來探討正常年、聖嬰年、反聖嬰年之差異，24 站因受到溫排水的影響而不列入大環境改變的討論。

圖 6-2-7 是無大修與大修時表水水溫距平值圖(以四季為基礎值)，距平值小於 0 表示該次水溫較歷年平均值低，反之則為較平均值高。圖上早期大修時距平值負值大，顯示電廠在無大修時溫度確實會偏低，但後期則差異不大，因此表 6-2-1 的統計資料若加入時間因素，電廠運作是否造成水溫的改變將會更客觀。

3.2.3 溫降的因素

105 年之水溫記錄(位置在出水口右側離岸約 10~20 公尺、水深 9 公尺、15 分鐘記錄一筆)顯示此處水溫呈現振盪現象，除此次外亦有幾次較大的溫降，例如 6 月 9 日、9 月 13 日及 12 月 14 日，均有較大的溫度降低(圖 6-2-8)。比對恆春地區降雨量，6 月 9 日及 9 月 13 日的溫降可能與強降雨以及颱風有關，而 12 月 14 日則可能是內波作用將冷水帶上。綜合而言，本區的較大溫降與強降雨、颱風、內波有密切關係，因此這三個機制的變化將直接影響珊瑚的生長，尤其夏天的溫降更有助於珊瑚免受過熱而白化之傷害。110 年 7/27~8/9 水溫從 29℃降至 21℃，降溫幅度大、延續時間長，歷年少見。此段時間恆春的降雨量高達 815mm，加上低壓渦漩的出現，可能是溫降的主要原因。

3.2.4 營養鹽與植浮相關

營養鹽的年際變化，以民國 89 年 5 及 10 月時較低，此時植浮含量偏高，而 91 年 1 月、5 月以及 104 年 2 月營養鹽含量較高，而植浮含量偏低；101、102 年 5 月硝酸鹽的含量相較往年低了許多，此時觀察到植浮含量有升高的現象，103 年 8 月植浮更是創了歷年新高(圖 6-2-9)；水體中營養鹽含量的變化似乎受控於植浮的利用或是釋出，兩者之間呈現負相關(圖 6-2-10)。

3.2.5 水團的變化與束毛藻關係

為了解束毛藻在南灣海域隨著時間與水文、水質的變化情形，本文將 85 年至今，每次 6 個測站表水數值加以分析，結果顯示春季束毛藻的平均值 230 個/L，夏、秋、冬則分別為 70、42、12 個/L(圖 6-2-11)，季節性變化非常明顯；即春天好發，隨著季節演遞漸漸變少，至冬天降為全年最低。

冬天之所以最低，主要是受到低溫影響所致。Chen 等人(2003)指出在南海海域或西菲律賓海海域束毛藻可以存活的溫度在 25℃或者更高，而本海域冬天的平均溫度僅為 24.4±1.0℃，低於束毛藻可以存活的溫度，因此歷年來在冬季，均未觀測到高密度的束毛藻生長，數量分佈在 0～43 個/L 之間，平均僅為 12±12 個/L。到了春天，本海域平均溫度升至 27.2±1.2℃，束毛藻數量分佈在 0～1048 個/L 之間，平均高達 230±315 個/L，比冬天高出一個數量級，為四季中最高，且百分比高達 32%，為此海域優勢藻之一。但在春天好發季節中，有時亦有數量頗低的束毛藻出現。經由統計資料顯示，低束毛藻出現時(低於平均值 230 個/L)，其平均溫度為 27.0±1.0℃，較春天平均溫度略低，而高束毛藻數量時，其平均溫度為 27.5±1.2℃，則高於春天平均值。因此春天雖然已屬束毛藻好發季節，但仍受控於溫度是否夠高。除了溫度變因外，營養鹽的高低或是其他非固氮藻類的競爭亦有可能影響了束毛藻的生長。

到了夏天，平均水溫為 29.0±0.5℃。溫度雖然升高，但並不見束毛藻繼續成長，其數量分佈在 0～266 個/L 之間，平均為 70±76 個/L; 此時海域的優勢藻轉為非固氮

藻類(non-N-fixer)，束毛藻百分比從 32%降為 11%，不再扮演此海域的主要角色。秋天溫降，海水表面平均溫度為 27.4±1.0℃，束毛藻百分比持續降為 9%，至冬天束毛藻僅佔所有植浮的 4%而已。

3.2.6 營養鹽與珊瑚生長

子計畫 4 珊瑚成長實驗中的進水口(influ-2)與出水口(efflu)與子計畫 2 水文的 22、24 測站相近，因此可以將兩者拿來比較，以了解彼此之間是否有相關。珊瑚的生長速率以入水口大於出水口(圖 6-2-12a)，而 22、24 站的營養鹽濃度雖互有高低，但大致上仍呈正相關(圖 6-2-12b)；若將兩處的差值拿來進一步比較(圖 6-2-12c)，發現兩者負相關極為顯著(p=0.008)。由於珊瑚生長的主要影響因子除了溫度及營養鹽外，還有人為干擾以及海水混濁程度：在夏、秋時生長趨緩，若遇上颱風甚至死亡，其反應的是生態環境在一段時間的表現；然而營養鹽濃度則是當時的水文水質狀態，圖 6-2-12c 所呈現的負相關是否有其真實關聯，有待進一步推敲。

3.3 浮游生物與其他子計畫相關性

3.3.1 浮游生物與水質及水文之相關性分析

將民國 85 年 7 月至 111 年 11 月止，歷年在本海域所調查的水文資料與經對數轉換後的動物性浮游生物、植物性浮游生物、蟹幼生、蝦幼生、魚卵和仔魚等重要生物因子進行 Pearson correlation coefficients 分析(表 6-3-1)。結果顯示，動物性浮游生物與鹽度、pH、硝酸鹽、磷酸鹽和濁度有顯著的負相關($p<0.05$)，與其他因子則無顯著相關。植物性浮游生物與溫度、pH 和葉綠素甲有顯著正相關($p<0.001$)，但與鹽度、透明度、硝酸鹽、亞硝酸鹽和濁度有顯著負相關($p<0.05$)。蟹幼生與溫度和葉綠素甲有顯著正相關($p<0.01$)，但與鹽度、pH、溶氧、透明度和硝酸鹽有顯著負相關($p<0.05$)。蝦幼生與溶氧有顯著正相關($p<0.05$)，但與溫度、pH、透明度、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽和濁度有顯著負相關($p<0.05$)。魚卵與溫度呈顯著的正相關($p<0.001$)，而與鹽度、溶氧、硝酸鹽及亞硝酸鹽呈現顯著的負相關($p<0.01$)。仔魚與水質的關係，亦與溫度成正相關($p<0.01$)，而與 pH、葉綠素甲、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽和濁度呈現顯著的負相關($p<0.05$)。

3.3.2 浮游生物的時間序列變化與聖嬰現象的關係

從民國 85 年至 111 年 12 月，參考美國 NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) 網站 (http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml)，依聖嬰期需連續 5 個月 ONI (Oceanic Niño Index)指數大於+0.5，而反聖嬰亦須連續 5 個月 ONI 指數小於-0.5，以 111 年 12 月 20 日公佈的聖嬰期及反聖嬰期之年月，為本報告分析之依據。一般而言，當發生聖嬰期即赤道太平洋海溫比平均值為高，而反聖嬰時則較低。熱帶西太平洋的氣流多為沉降，而東太平洋則因受熱而上升。所以聖嬰期時西太平洋容易造成乾旱，而東太平洋則形成多雨的氣候。聖嬰期時在西太平洋海域不僅是海溫的上升，亦會容易造成乾旱進而使海域的鹽度升高，陸源營養鹽的注入減少。在聖嬰及反聖嬰現象反覆出現頻繁時，改變了四季的律動，如聖嬰期時冬季水溫偏高，夏季水溫更熱等，影響海洋生物的自然生長週期。此外，不同浮游生物類別對溫度、鹽度和各種營養鹽的適應程度不同，故造成聖嬰和反聖嬰期時各有不同程度的反應。

核三廠附近海域的植物性浮游生物會在第 3 次(夏季)出現高峯，然而在反聖嬰期間的第 3 次(夏季)高峯測值降低，自 109 年 8 月至今年(111 年)處於反聖嬰期，在 109、110 和 111 年的第 3 次(8 月)觀察到密度均遠低於歷年同季平均值(圖 6-3-1)。動物性浮游生物在 98 年以前有二至三年一次的規律高峯週期，98 年以後在第 2 或 3 次採樣年年出現高峯，並較過去為高，同樣在反聖嬰年第 3 次(夏季)採樣豐度則有偏低的結果，自 109 年第 3 次(夏季)起至今，偏低現象在離岸的對照測站較監測測站更明顯，動物性浮游生物豐度的確較往年同季為低(圖 6-3-2)。具經濟價值的蝦幼生季節性高峯出現在第 2 和 3 次(春夏季)，91 年以前有每兩年一次高豐度週期變化，97 年後每年出現明顯的第 2 和 3 次高峯，並有明顯的季節變化，經統計結果發現其中蝦幼生豐度於反聖嬰期第 3 次採樣豐度會較正常期為低，109、110 和 111 年第 3 次採樣出現較低的情形。蟹幼生為第 3 次(夏季)出現季節性高峯，在第 2 次(春季)採樣如遇聖嬰期豐度降低，在 108 年第 2 次(聖嬰)有豐度偏低情形，97 年以前有每六年出現高豐度週期變化，其後此高峯頻率幾乎年年出現 (圖 6-3-3)。至於魚卵的豐度變化是在第 3 次(夏季)調查會有高峯期，仔魚是在第 2~3 次(春夏季)出現季節性高峯，但由過去資料的統計分析發現第 3 次採樣的仔魚豐度有聖嬰和反聖嬰期顯著較正常期為高，然而僅在 111 年的第 3 次採樣仔魚豐度呈現偏低的現象(圖 6-3-4)。綜合以上，植物性和動物性浮游生物和蝦蟹幼生的豐度，近兩年來的季節性變動震幅趨緩，有別於前些年的大幅震盪，魚卵和仔魚則呈現平穩的季節變化。

3.3.3 歷年束毛藻密度的變化與聖嬰現象的關係

由歷年束毛藻密度來看 (圖 6-3-5)，南灣海域的束毛藻多在第 2 次 (春季) 採樣時呈現明顯的高比例，歷年第 2 次總平均百分比為 37%，並成為本海域中的優勢種。將過去資料依各季次，比較正常、聖嬰和反聖嬰期之差異，經統計分析結果顯示，第 2、3 和 4 次採樣於反聖嬰期的密度明顯較低，近兩年皆為反聖嬰期，其第 2 次採樣的束毛藻屬密度亦較過去正常年同次採樣之平均密度為低。此外，根據文獻報告，束毛藻可作為黑潮水的指標種 (Marumo & Asaoka, 1974)，但由子二計畫的調查結果得知，本期兩年八次採樣的海水偏向南海水，因此本海域中代表黑潮水訊號的束毛藻密度偏低，由此可知本海域束毛藻的密度同時受小尺度的季節變化及大尺度的氣候現象所影響。

3.3.4 歷年浮游生物的變化與氣候指數的關係

參考 NOAA 所公布(截取日期為 111 年 12 月 20 日)之 ONI (Oceanic Niño Index)海洋聖嬰指數、昆士蘭州政府官方網站公布之 SOI (Southern Oscillation Index)南方震盪指數和華盛頓大學官網公布之 PDO (Pacific Decadal Oscillation)太平洋十年振盪指數與歷年經對數轉換後的浮游生物進行 Pearson correlation coefficients 分析 (表 6-3-2)，三項氣候指數中，PDO 與浮游植物有較多的顯著相關，包括植物性浮游生物取對數後密度與二、三和四個月前的 PDO 均有顯著正相關 ($p<0.05$)，當中以三個月 (一季) 的延遲顯著水準和相關係數最高。魚卵取對數後豐度亦與二、三和四個月前 PDO 有顯著正相關 ($p<0.05$)，當中同以三個月 (一季) 的延遲顯著水準和相關係數最高。仔魚取對數後豐度則與當月 PDO 有顯著正相關 ($p<0.05$)。

3.4 底棲動物與其他子計畫相關性

底棲動物著生量可能受水溫與水層中之動物性浮游生物量影響，以子計畫 2—水文水質化學相對測站之水溫，以及子計畫 3—動物及植物性浮游生物相對測站之浮游幼生，89 至 111 年間的資料與底棲動物著生量做迴歸分析（圖 6-4-1 至 6-4-9），結果發現水溫、底棲動物幼生豐度與著生情形，有測站 20 之 3 公尺處水溫、水層表面藤壺幼生數量與石牛溪的藤壺著生量，測站 22 之 3 公尺處水溫與入水口南堤外側(Influ-10) 的藤壺著生量，以及測站 24 之垂直水層的藤壺幼生量與出水口南側小灣的藤壺

著生量有直線迴歸關係，迴歸式分別為為 Y（藤壺著生量）= -0.29 + 0.01X（3 公尺處水溫）（N=78; R^2=0.06, P<0.05），Y（藤壺著生量）= 0.02 + 3.80×10^{-5}X（水層表面藤壺幼生數量）（N=78; R^2=0.05, P<0.05），Y（藤壺著生量）= $4.00 \times 10^{-4} + 2.48 \times 10^{-7}$X（垂直水層的藤壺幼生量）（N=90; R^2=0.18, P<0.001），還有測站 24 之 3 公尺處水溫與出水口南側小灣的多毛蟲著生量呈正向的直線迴歸關係，迴歸式分別為為 Y（多毛蟲著生量）= 0.25 + 0.02X（3 公尺處水溫）（N=88; R^2=0.05, P<0.05），呈現 3 公尺處水溫越高及垂直水層的藤壺幼生量越多，藤壺著生量越高之現象，以及 3 公尺處水溫越高，多毛蟲著生量也越多，其餘無直線迴歸關係，這可能和調查之時間及空間尺度差異有關，因為水溫測量或是浮游幼生的撈取，皆為定點即時紀錄，而底棲動物的著生是 2-3 個月的累進結果。

94 至 111 年間固定橫截線調查分析與營養鹽之迴歸相關性，在各測站之各大類底棲生物覆蓋率大多與營養鹽濃度無相關或相關性不高（決定係數 R^2 介於 0.02-0.06 間），在入、出水口皆以藻類之覆蓋率最高，以子計畫 2—水文水質化學的相對測站之營養鹽與藻類的覆蓋率做直線迴歸分析（表 6-4-1；圖 6-4-10 至 6-4-15），測站 22 對應入水口測線，測站 24 對應出水口南側小灣測線，以藻類覆蓋率為例，在複迴歸分析上入水口藻類與 3 m PO_4、3 m SiO_2 及 10 m NO_3 濃度有關（N=201; R^2=0.20, P<0.05），迴歸式為 Y（algae）= 60.68 – 279.63 PO_4（3m）+ 9.25 SiO_2（3m）+ 10.33 NO_3（10m），PO_4（3m）的斜率係數最大，為負影響，而 SiO_2（3m）與 NO_3（10m）為正影響；而測站 24 之 10 m 的出水口藻類覆蓋率在複迴歸分析上與 PO_4 及 NO_3 濃度有迴歸關係（N=210; R^2=0.10, P<0.05），迴歸式為 Y（algae）= 74.17 – 133.08 PO_4（10m）+ 6.96 NO_3（10m），PO_4（10m）的斜率係數最大，為負影響，而 NO_3（10m）為正影響， NO_3（10m）為正影響。在測站 22 之 PO_4 濃度對入水口之海葵有迴歸關係（N=194; R^2=0.03, P<0.05），為正影響，在複迴歸分析上，海葵與 3m PO_4 及 SiO_2 濃度有迴歸關係（N=201; R^2=0.10, P<0.05），迴歸式為 Y（sea anemone）= 46.01 + 136.91 PO_4（3m） – 7.77 SiO_2（10m）；在測站 22 之 SiO_2 濃度對海綿有迴歸關係（N=201; R^2= 0.02, P<0.05），為正影響，入水口海綿與 3m SiO_2 濃度之迴歸式為 Y（sponge）= 0.67 + 0.41 SiO_2（3m）；入、出水口之珊瑚白化率與營養鹽有正迴歸關係（N=201; R^2=0.11, P<0.05），其中僅

入水口之珊瑚白化率與 SiO_2（10m）及 PO_4（3m）有複迴歸關係，迴歸式為 Y（coral bleaching）= 2.35 + 5.43 SiO_2（10m）– 84.67 PO_4（3m）；大體上有營養鹽高時，海葵、海綿及珊瑚白化覆蓋率越高，藻類的覆蓋率越低之現象，此結果仍顯示營養鹽對藻類及底棲動物覆蓋率有影響（表 6-4-1），需注意其變化情形。

在底棲動物著生量與 92 至 111 年間營養鹽之直線迴歸分析上（表 6-4-2），以相對測站分成入水口、出水口及對照站（SNS），例如多毛蟲與營養鹽有正迴歸關係，在對照測站（SNS）與 0m 之 PO_4 有正相關（N=64; R^2=0.12, P<0.05）；苔蘚蟲與營養鹽為負迴歸關係，在入水口與 0m 之 NO_3 有負相關（N=80; R^2= 0.10, P<0.05）；珊瑚與營養鹽為正迴歸關係，在對照測站（SNS）與 0m 及 3m 之 SiO_2 有正相關（N=65; R^2=0.07-0.09, P<0.05），呈現營養鹽高時，多毛蟲及珊瑚的著生量越多；雖然各測站底棲動物著生量與營養鹽之迴歸關係沒有一致性，以及決定係數 R^2 不高（0.07-0.12），但此結果仍顯示營養鹽對底棲動物著生有影響，需注意其變化情形。

以 110 及 111 年各測站水溫與子計畫 1 海潮流提供的資料比較，出水口南側水深 8 公尺處(Efflu)、出水口南側水深 9 公尺處(Efflu-2)、貓鼻頭(MPT)與 N3C1 (21.93053°N, 120.75111°E；水深 28 公尺；距出水口約 590 公尺)的平均水溫、最高水溫、最低水溫及溫差無顯著差異（ANOVA, Duncan; p>0.05）(圖 6-4-16)；整體而言，出水口南側地區除 3 公尺水深的測站(Efflu-3)外，其餘各測站之水溫與入水口的水溫變化無異，顯示溫排水不影響出水口南側地區 6-8 公尺以深的水溫變化。

由生活廢污水帶入墾丁海域之營養鹽也可能會影響底棲動物的組成，墾丁國家公園海域有墾丁與南灣污水處理廠，可將生活廢污水處理後再排入海域，墾丁廠於 88 年完工，收集墾丁大街及大灣路民生污水，經過生物曝氣處理達到法規排放標準後，於石牛溪西側排放入海；南灣廠於 87 年完工，收集來自後壁湖、大光、南灣等三區域的民生污水，經過生物處理達到法規排放標準後，於南灣遊憩區排放入海。污水下水道 97 年之接管率為 78％，110 年為 80％，十幾年間接管率增加幅度不大，接管率與本計畫調查的固定橫截線底棲生物覆蓋率變化沒有一致性。偶發性污水排放造成南灣黑水事件已發生數次，105 年 5 月底、7 月 22 日、106 年 7 月 5 日及 107 年 5 月 1 日均有相關之新聞報導；但是從相對時間之營養鹽看起來並無異常高值，與入、出水

口固定橫截線上藻類、海葵及海綿之覆蓋率變動情形也沒有一致性；雖然底棲生物之藻類、海葵及海綿覆蓋率與營養鹽有迴歸相關（表 6-4-1），但相關性低（R^2 值 0.02-0.06）。在底棲動物著生量部分，底棲動物著生量與營養鹽迴歸關係 R^2 值介於 0.07-0.12（表 6-4-2），也沒有受到南灣偶發性污水影響的訊號，整體而言，南灣偶發性污水排放事件對固定橫截線底棲生物覆蓋率及底棲動物著生量無明顯影響，這可能是因為調查時間與黑水事件發生的時間點有落差，或入、出水口監測區域不在黑水事件影響範圍所致。

樽海鞘*Pyrosoma atlanticum* Péron,1804是屬於燐海樽目(Pyrosomida)、火體蟲科(Pyrosomatidae)火體蟲屬(*Pyrosoma*)的種類，喜歡生活在溫暖海域，於南灣僅102年8月25日（第3-4次期間）及103年5月22日（第2-3次期間）有大量出現的記錄，103年5月多集中於入水口內北側。102年8月25日事件前有潭美颱風於臺灣東部海域形成（圖6-4-17A；102年8月16日），往常南灣湧昇造成N3C1測站與入水口（Influ-5）水溫下降有延遲2-3小時的現象（圖6-4-17B），但從102年8月17日開始，N3C1測站就有水溫陡降的現象，而入水口（Influ-5）的水溫則無此變化（圖6-4-17B；黑色箭頭所指處），故推測可能是颱風帶動水團流向改變，連帶造成水溫、鹽度、營養鹽或浮游生物與樽海鞘出現變動；103年5月22日事件雖無颱風影響，但也有N3C1測站水溫變化與入水口（Influ-5）不一致的現象（圖6-4-18；黑色箭頭所指處），兩次事件似與水團水流變化有關。子四將入水口（Influ-5）之底棲動物著生量及水溫資料，還有子二測站22的0-10 m水文水質及子三動物性浮游生物相等共59項調查項目，分成樽海鞘出現次別與相關次別進行比對，例如102年8月25日為102年第3次與歷年（92-111年）第3、4次之比較（表6-4-3），兩次的偶發事件雖各有較歷年高或低的觀測項目，以102年8月25日（第3次）為例，觀測項目較歷年低的為溶解性有機氮（DON），但這些差異並無一致性，故目前無明確定論。

近年像水母這類膠質浮游動物大量繁生，造成核電廠進水口處的渦輪機冷卻水管堵塞，讓核電廠停擺的例子已見於以色列、菲律賓、日本、韓國及瑞典等國，不過，2013年10月據Fast Company網站報導，南韓一名科學家發明了一款名為JEROS（Jellyfish Elimination Robotic Swarm）的「水母殺手機器人」，這具機器人利用身上

的GPS系統在海中巡弋搜索，並且利用攝影機鎖定目標物水母，之後，機器人會利用一張網將水母困住，不到3秒鐘，水母立即被機器葉片絞碎，此機器系統一小時內可絞殺高達一噸重的水母，但不清楚是否適合本海域使用。樽海鞘大量出現可能會影響核電廠的營運，故建議核三廠可利用進水口內即時影像監測計畫所得之監測影像，並配合水流水團監測資訊，適時調整機組運作情形，避免發生突發狀況。

3.5 魚類調查與其他子計畫相關性

由海潮流子計畫的資料得知，排水口附近海流以往復之潮流運動及西南淨流為主，其溫排水擴散區域大部份限於排水口附近海域西側，故調查測站受到海流影響較大的區域為測站3及測站4，分析歷年來5個測站主要的魚種平均出現數量及主要魚種出現百比分，其中各測站主要魚種平均出現的相似度介於14.5%~29.4%，顯示5個測站的魚類相更迭頻繁(表6-5-1)，主要優勢種仍有重疊之處，其中二色光鰓雀鯛及裂唇魚是5個測站的都會出現的種類。

由核發處提供核三廠歷年停機維修期間排水量變化資料，機組停機期間輸入到南灣水域溫排放水量減少約一半，應可使溫排水現象減低。比較機組停機維修期間及運轉期間影響域測站3~測站5魚種數和歷次平均值的差異，發現在停機維修期間魚種數高於平均值的機率為39%~56%之間；其中測站3靠近溫排水出水口，在停機維修期間溫水排放減量魚種數高於平均值的機率為39%，小於實際運轉期間44%，顯示溫排水對魚種數的影響不受溫排水減量而增加來游魚種數(圖6-5-1)；比較機組停機維修期間及運轉期間影響域測站魚尾數和平均值的差異，發現歷次影響域在歲修保養期間的魚尾數高於平均值的機率為22%~39%之間，靠近溫排水出水口的測站3在停機維修期間高於平均值22%，小於實際運轉期間31%，顯示溫排水對魚尾數的影響不明顯(圖6-5-2)。比較歷年機組停機維修期間及運轉期間影響域測站珊瑚礁魚類群聚組成，資料顯示影響域測站停機維修期間及運轉期間珊瑚礁魚類群聚組成有重疊現象(圖6-5-3)，顯示溫排水對珊瑚碓魚類群聚組成影響不明顯，係因珊瑚礁魚類主要活動區域在礁石間，而溫排水的影響範圍僅為離排放口500公尺內跟水深3~5公尺之水域，且水溫變動約2度以內。

分析太平洋十年振盪指數(PDO)、海洋聖嬰指數(ONI)及颱風等大環境變動對珊瑚礁魚類的影響，太平洋十年振盪指數(PDO)及海洋聖嬰指數(ONI)與當季珊瑚礁魚種數變動趨勢並不一致(圖6-5-4)。應與調查海域以珊瑚礁魚類為主(刺尾鯛科、蝴蝶魚科、隆頭魚科及雀鯛科)，魚類群聚主要受到礁石環境影響，大環境變動可能影響少部份洄游性魚類。歷年第3季資料顯示，在強烈颱風過後調查魚種數低於平均值(117種)的機率為54.2%，推論可能為珊瑚礁魚類受風浪波動的干擾避離到深水域或受驚嚇隱藏(圖6-5-5)。

本計畫將水文水質 (子二) 3M水層的各項調查資料(硝酸鹽、矽酸鹽、磷酸鹽、亞硝酸鹽、溫度、溶氧、鹽度、葉綠素、透明度、酸鹼值等10個水質參數)利用因素分析進行因素萃取，因酸鹼值屬離群參數，故刪除後再次進行因素萃取，歸納出3個水質變項，共解釋總體水質變異的64.25%。以各成分軸中因子負荷量(factor loadings)大於0.5者作為判斷該軸意義的依據(表6-5-2)，由於水質的測量變數間存在著相關性，比如海水鹽度的測量值中包含著營養鹽(硝酸鹽、矽酸鹽…等)成分，因此進行相關性分析結果，增加「基礎生產力(-)與溶氧」及「鹽度與矽酸鹽」的共變關係，提高了模型的配適度。結合植物性及動物性浮游生物調查(子三)與魚類調查資料，利用結構方程模式預設出3個環境變動的潛在變項(營養鹽、湧升流及基礎生產力)及2個生物變動的潛在變項(浮游生物群聚及魚類群聚)，建構第三核能發電廠附近海域之珊瑚礁生態系之概念模式(圖6-5-6)，表層生態系實證模式中顯示湧升流對浮游植物密度呈負相關，基礎生產力與浮游植物密度呈正相關，營養鹽與浮游動物群聚呈現負相關，湧升流與浮游動物群聚呈現正相關(圖6-5-7)。加入魚類群聚資料後之實證模式顯示計畫區附近海域的營養鹽多寡及基礎生產力的高低與魚類群聚呈現顯著線性關係(圖6-5-8)，硝酸鹽與珊瑚礁魚種數呈現負相關，係因魚類對不喜歡的環境產生避離效果所致(圖6-5-9)，與溫度相關的湧升流對魚類群聚的相關性不顯著，係因影響域內有低溫水湧升時，並未觀察到魚類來游率的增加或減少。本研究利用結構方程式建構第三核能發電廠附近海域生態變動模式，配適度良好，量化了環境對浮游生物及對魚類群聚之直接及間接影響。

3.6 網頁

本網頁架設的主要目的為二，一是將歷年的調查與研究成果公佈網路，提供參與之研究人員與業主參考及查詢，二是將歷年調查資料製作成資料庫，提供參與研究人員立即查詢及相互比對。目前網頁架設於中山大學海洋系之網頁伺服器下：https://npp3.nsysu.edu.tw/，今年度為降低資安風險，改用 https 進行連線，網頁首頁請見圖 6-6-1。現就整個架構敘述之。

3.6.1 基本架構

1、網頁伺服器採用LAMP (Linux+Apache+MySQL+PHP)，加強網頁即時查詢功能，加強會員登入保安，並提供自訂密碼功能。

2、入口網頁區分為研究人員專用網頁及一般民眾之成果展示網頁研究人員，研究人員網頁進入要「網路帳號」與「密碼」以便進入主畫面，一般民眾網頁，則分別就計畫緣起、計畫時程及研究成果說明之。

3、研究人員專區主要提供各項觀測資料的查詢與線上資料繪圖。線上繪圖部份將水文資料、生物資料、海流資料、CTD資料、珊瑚礁魚類資料、海水表溫、海面高度與地轉流資料、氣象衛星雲圖及MODIS水色衛星，建立線上繪圖資料展示。各計畫測站分佈圖、海流資料之漂流浮標查詢、CTD資料、CODAR海流資料查詢等，則以Google Map平台展示其資料概況，讓相關研究人員能藉由此系統，獲取第三核能發電廠及低放貯存場 附近海域之生態調查之完整資訊。除此之外，為方便比較當季各種資料之間的關聯，還提供同一採樣季節資料展示，將在同一季之資料同時展示在同一頁面中。

3.6.2 主選單

首頁部分除提供概觀的水文與動物性浮游生物資料外，亦有各計畫測站分布圖、每季採樣資料。而資料分成採樣資料與外部收集資料兩大類，採樣資料含水文資料查詢、生物資料查詢、海流資料線上繪圖、CTD資料線上繪圖。今年度新增了珊瑚礁魚

類資料。而外部收集資料則有海水表面溫度分佈圖、氣象資料查詢、CODAR海流資料繪圖、AVISO海面高度與地轉流查詢、MODIS海洋水色衛星資料，以下分別說明觀測資料的概況。

3.6.2.1 資料繪圖

資料查詢部分，提供歷年來之水文與海流部分之查詢、CTD資料垂直剖面圖與水平分佈圖查詢等為主。一般資料查詢方法是輸入欲查詢之條件後，系統立即從資料庫系統中比對查詢條件，符合條件者即以圖形輸出，未符合條件者則回應無此資料。此部份之查詢與繪圖系統，部分程式是自行開發，部分程式則是使用免費軟體聯盟 (Free Software Foundation, FSF) 之Plot Plus (PPLUS) 與Generic Mapping Tools (GMT) 等繪圖程式。圖形是低解析度之GIF或JPG格式展示，而使用者若需要高解析度之圖形，亦可下載高解析度之PDF 格式圖檔，使用者只要有Acrobat Reader 程式即可瀏覽該圖檔。

3.6.2.2 首頁

首頁部分展示了水文資料與動物性浮游生物資料歷年時間序列圖，在水文部分，可從圖6-6-2上方選擇想看的測站及其深度，點選資料展示，即畫出溫度、鹽度、pH、溶氧、溶氧飽和度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、矽酸鹽、磷酸鹽、葉綠素甲等十個參數之時間序列，並在其下方，同時提供PDO與SOI指數供使用者參考。在介面操作上，使用者可以點選變數名稱，決定是否將該參數展示於圖上，而將游標移動到圖上時，也會立即展示該點的時間與數值。而圖6-6-2右上角選單功能由左至右說明如下，第一個相機符號可儲存當下的時間序列圖。第二個放大鏡符號後，可在時間序列圖上選取欲查詢之時段。第三個符號是平移，可在已選定的時間間距，在圖上做左右平移。第四跟第五分別是放大跟縮小，可使展示的時間間距變大跟變小。第六跟第七都是恢復成進入網頁時的時間序列預設值。

而動物性浮游生物資料，可從圖6-6-3上方選擇想看的測站，點選資料展示，即會畫出動物性浮游生物量-濕重、動物性浮游生物量-乾重、動物性浮游生物量-排水容積量、動物性浮游生物量-生物沉澱量、動物性浮游生物量-總豐度、動物性浮游生物量-蟹幼生、動物性浮游生物量-蝦幼生、動物性浮游生物量-魚卵等八種參數之時間序列。使用者可以點選各圖框右上方，決定隱藏或將該圖框關閉，而將游標移動到圖上的，也會立即展示該條的時間與數值。而功能選單與前述時間序列圖相似，圖6-6-3中每個圖框右上角都有功能選單，選單功能由左至右說明如下，第一個相機符號可儲存當下的時間序列圖。第二個放大鏡符號後，可在時間序列圖上選取欲查詢之時段。第三個符號是平移，可在已選定的時間間距，在圖上做左右平移。第四跟第五分別是盒狀選擇與套索選擇，都是用於選取圖中要展示的資料。第六跟第七分別是放大跟縮小，可使展示的時間間距變大跟變小。第八跟第九都是恢復成進入網頁時的時間序列預設值。

3.6.2.3 每季採樣資料

為方便比較在同一採樣季節中各種資料之間的關聯，此頁面將各種不同的資料以季節區分，展示在同一頁面中 (圖 6-6-4)，該頁面上方可選擇使用者要看的年度與季別，頁面中同時展示 CTD 水平面溫度分佈圖、海水表面溫度分佈圖、海面高度與地轉流、MODIS 衛星海洋水色分佈圖(aqua)、MODIS 衛星葉綠素分佈圖(aqua)、漂流浮標軌跡、海流時間序列圖、地面天氣圖。

3.6.2.4 水文資料線上繪圖

目前有 16 個參數線上繪圖，分別是溫度、鹽度、pH、溶氧、溶氧飽和度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、矽酸鹽、磷酸鹽、葉綠素甲、動物性浮游生物量-濕重、動物性浮游生物量-乾重、動物性浮游生物量-排水容積量、動物性浮游生物量-生物沉澱量、動物性浮游生物量總豐度、植物性浮游生物量密度，資料已更新至 111 第 4 季，陸續將新增珊瑚成長、軟體動物成長、多毛類成長、苔癬蟲、海鞘、藤壺、珊瑚礁魚類組成、單位努力漁獲量等資料查詢。

選擇水文資料線上繪圖後，即可進入水文資料細項查詢網頁，共有 4 選項：時間序列圖、散射圖、水平分佈圖、水文垂直分布資料查詢。選擇時間序列圖後，會進入圖 6-6-5 之頁面，頁面共有 3 大選項，分別是：請選擇參數量、請選擇參數一、請選擇參數二，如果選擇 2 種參數，溫度及鹽度作圖，點選下一步，會出現如圖 6-6-6 之進階選擇頁，分別顯示起訖時間、溫度軸上下限、鹽度軸上下限、欲繪測站數、測站與深度。若以預設值為例，起訖時間為民國 75 年至 111 年，溫度軸上限為 32 ，溫度軸下限 20 ，鹽度上限為 35psu，鹽度下限為 33.5psu，欲繪測線數為 2，第一條線測站為 st18 之 0 m 的溫度，第二條線測站為 st18 之 0m 處的鹽度繪圖，按繪圖鍵即可得到欲查詢參數及其與 SIO 及 PDO 參數之相互比較，圖檔請見圖 6-6-7。

散射圖可選擇資料參數比較，後有 2 選項，分別是測站及深度，可繪出此 2 測站不同參數資料的比較及其回歸值，頁面請見圖 6-6-8。若以預設值為例，時間以民國 75 年 7 月至 111 年 12 月為起訖時間，分別是繪出 st14 之 0m 溫度與 st14 之 0m 鹽度的比較。如圖 6-6-9 所示。

水平分布圖的部分有 3 選項，分別是：時間、參數與深度，頁面請見圖 6-6-10。若時間為民國 111 年 11 月、深度為 0 m 處的溫度分佈，按繪圖鍵可得圖 6-6-11。

而水文垂直分布資料查詢，是顯示歷年水文資料統計圖表，頁面請見圖 6-6-12。使用者只要輸入年份、選取參數、測站站別，系統即會展示出這段期間的參數，不同深度的資料，按季別及深度排序。若以 2022 年溫度參數、st20 測站為例，顯示結果如下圖 6-6-13 所示。

3.6.2.5 生物資料查詢

選擇生物資料查詢後，即進入生物資料查詢網頁，共 4 選項：浮游生物資料查詢、底棲動物資料查詢、底棲動物各測站時間序列圖、底棲動物各參數繪圖。各項資料已更新至 111 年第 4 季。在浮游生物資料查詢部分，可以輸入起訖時間、季節、參數，去搜尋想要找的資料，表格形式如圖 6-6-14 所示。而底棲動物資料查詢頁面有五個選項，需輸入起訖時間、季節、測站別、生物種類去進行查詢，表格形式如圖 6-6-15 所示。

在底棲生物各測站時間序列圖中 (圖 6-6-16)，可選擇測站，則會繪出該測站藻類、石珊瑚、軟珊瑚、海葵、貝類、棘皮動物、多毛類、海棉、白化珊瑚的覆蓋率之時間序列，除此之外，亦可點擊變數色塊，決定是否顯示該變數於圖上，將游標移至圖上，則會顯示觀測到的數值為多少，功能與首頁中的時間序列圖相似，亦可調整展示時間。頁面下方亦用表格方式展示該測站所觀測到的各項變數之數值 (圖 6-6-17)。

底棲動物各參數繪圖部分以柱狀圖顯示藻類、石珊瑚、軟珊瑚、海葵、貝類、棘皮動物、多毛類、海棉、白化珊瑚等參數的覆蓋率，預設值為展示各種類從有資料至今的時間序列 (圖 6-6-18)，功能與首頁中的時間序列圖相似，亦可調整展示時間，除此之外，也可在頁面上方選擇測站位置繪製出使用者所需之值。

3.6.2.6 海流資料查詢

選擇海流資料查詢後，即進入海流資料查詢網頁，共 5 選項：時間序列圖、流場統計圖、流場季節統計圖、浮標漂流軌跡、資料查詢。各項資料已更新至 111 年第 4 季。在時間序列圖的部分共有 11 選項，分別是：繪圖數、起訖時間、流速軸上下限、溫度軸上下限、以及 6 種圖形可供選擇，計有：流矢圖、溫度圖、東西向流速圖、南北向流速圖、流速圖、流向圖等。如圖 6-6-19 所示。若以預設值為例，將繪出圖 6-6-20，起訖時間為民國 11 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 15 日，流速軸上下限為-80～80 cm/sec，溫度軸上下限為 20~30 °C，由上至下分別是流矢圖、溫度圖、東西向流速圖、南北向流速圖。

而在流場統計圖的部分，共有 2 大選項，分別是：圖形種類與起訖時間。圖形種類計有：流速發生機率圖、流向發生機率圖、玫瑰圖、海流漸進線圖等四種。如圖 6-6-21 所示。若以預設值為例，起訖時間設為民國 111 年 1 月 1 日至 11 年 12 月 15 日，若分別選擇流速發生機率圖、流向發生機率圖、玫瑰圖、海流漸進線圖等 4 種圖形，則其結果分別如圖 6-6-22～6-6-25 所示。

在流場歷年季節統計圖的部分 (圖 6-6-26)，可選擇季節或月份，建立不同類型的統計圖，分別為流場發生機率分佈圖、流向發生機率分佈圖、玫瑰圖。若以預設值為例，選擇季節為第二季，若分別選擇流速發生機率分佈圖、流向發生機率分佈圖、玫瑰圖等 3 種圖形，則其結果分別如圖 6-6-27～6-6-29 所示。

而浮標漂流軌跡部分，將 92~111 年漂流浮標資料建立資料庫，建立漂流浮標軌跡查詢系統，可選擇年別與季節繪圖，查詢介面如圖 6-6-30 所示。如果選擇 2022 年繪圖結果如圖 6-6-31。

資料查詢部分 (圖 6-6-32)，提供完整的海流數據，可在頁面上方選擇起迄時間，則會輸出採樣之海流資料的時間、溫度、流速、流向、東西向速度、南北向速度。

3.6.2.7 CTD 資料線上繪圖

CTD 水平分佈圖選擇介面如圖 6-6-33 所示，此介面中可選擇參數、深度、季別繪圖，如以 111 年第 4 季，3m 之溫度繪圖如圖 6-6-34 所示。

CTD 資訊整合至 Google Map 介面，彙整歷年各測站觀測資料供研究人員查詢，查詢介面見圖 6-6-35。若選擇 C09 測站，111 年溫度參數資料，繪圖結果如圖 6-6-36 所示。

3.6.2.8 珊瑚礁魚類資料

今年度新增珊瑚礁魚類資料的項目，在此項目可以查詢各測站歷年的魚種數量(圖 6-6-37)與魚尾數(圖 6-6-38)。功能與首頁中的時間序列圖相似，亦可調整展示時間。

3.6.2.9 海水表面溫度分佈圖

海表面溫度資料為GHRSST (Group for High Resolution SST) 高解析度海表面溫度衛星遙測資料，資料從2002/06/02至2022年，重新載入資料庫，並開發整合查詢介面，供研究人員運用。該衛星遙測資料頻率為每日一次，其空間解析度約為1公里。

資料庫的查詢頁面會顯示目前最新八天的資料 (圖6-6-39)，亦上方可輸入搜尋時段，找尋使用者在意的時段資料。而點選一張小圖後，則可變成大圖 (圖6-6-40)。前述是快速查詢,若要查詢特殊區域的溫度分佈,可到海面溫度依參數分佈查詢頁面,輸入日期與範圍，即可進行查詢，如圖6-6-41所示。查詢結果如圖6-6-42。而若想要取得原始資料可以進入SST資料下載介面，輸入欲下載資料之日期，並點選下載，就會跳出下載的連結 (如圖6-6-43)，該網頁提供逗點分隔檔案，資料排列方式如圖6-6-44所示。

3.6.2.10 衛星雲圖及氣象資料查詢

颱風對本地區影響甚為重要，故必須建立颱風資料庫。由於中央氣象局已經有非常完整的資料，故本網頁只是提供快速查詢的訊息，與氣象局資料相輔相成，本網頁已建立自 2002 年至 2022 年的衛星雲圖查詢頁面，並更新為 10 分鐘 1 筆資料，日本向日葵衛星，陸續新增各項雲圖，目前擴充至五種雲圖，分別為東亞、台灣、地面天氣圖、台灣真實色影像、東亞真實色影像，使用者可任選 1 種雲圖，依年度及時間查詢。查詢畫面如圖 6-6-45 所示。點選 2022/12/21 20:50 view image 可顯示較大之雲圖及地面天氣圖如圖 6-6-46 所示。

氣象局後壁湖站與鵝鑾鼻資料浮標測站之海象資料查詢,使用者可以選擇起始時間，以得到浪高、浪向、風力、風向、氣溫、氣壓、流速、流向等列表資訊，查詢介面請見圖 6-6-47。

3.6.2.11 CODAR 海流資料查詢

除上述各項海流資料外，尚收集 CODAR 海流資料，供研究人員參考交叉比對。但資料已於 2020 年 12 月 19 日停止更新，故只能查詢 2020 年 12 月 19 日以前的資料。使用者可以輸入時間查詢，海流流速大小以顏色表示如圖 6-6-48 所示。

3.6.2.12 AVISO 海面高度與地轉流查詢

AVISO 海面高度與地轉流查詢介面如圖 6-6-49 所示，使用者可依時間查詢所需的海面高度與地轉流分布圖 (圖 6-6-50)。若要查詢特殊區域的海面高度與地轉流分佈，可到海面高度與地轉流依參數分佈查詢頁面，輸入日期與範圍，即可進行查詢，如圖 6-6-51 所示。查詢結果如圖 6-6-52。而若想要取得原始資料可以進入資料下載介面，輸入欲下載資料之日期，並點選下載，就會跳出下載的連結 (如圖 6-6-53)，該網頁提供逗點分隔檔案，資料排列方式如圖 6-6-54 所示。

3.6.2.13 MODIS 水色衛星資料查詢

MODIS 海洋水色衛星部分提供的提供 aqua、terra、SNPP 三種水色衛星以及 MODIS 海洋葉綠素衛星資料，海洋水色衛星查詢介面如圖 6-6-55，而海洋葉綠素衛星查詢介面如圖 6-6-56，使用者可依時間查詢所需的衛星影像。

四、結論

海流調查結果顯示，排水口附近海流以往復之潮流運動及西南向淨流為主，造成海水經常往西南繞過貓鼻頭往西輸送之趨勢。溫排水擴散區域大部份限於排水口附近海域西南側，其擴散範圍在漲潮時段往西南約500～1000 m，退潮時段往東-東南約200～800 m，溫排水大部份分佈於海表層以下水深3 m以內，擴散影響範圍多侷限在距排水口1000 m弧內，空間溫降率自排水口往外至500 m弧內約1°C/100 m。除此以外，核三廠海域近岸海底海溫陡降現象，除了是因為大潮潮流在南灣內引起的湧升流將次表層冷水帶上來所造成外，在呂宋海峽產生的巨大內潮、內波傳入海灣內亦有相當程度的貢獻。湧升帶來的冷水，可能有助於南灣之珊瑚免於海水暖化之衝擊；冷水所含之營養鹽，亦有助於藻類生長，但因南灣海水內外交換甚快，藻類來不及長大即被送至灣外，因此營養鹽利用率不高 (Chen et al., 2004a, 2004b, 2005；Jan and Chen, 2009)。水溫長期觀測資料顯示發現颱風季期間某些颱風經過台灣附近後會造成1～4週長的水溫下降與回升變化，其間動力因素複雜，值得進一步分析。

本海域水文的改變與聖嬰/反聖嬰現象、太平洋十年期振盪指數等之大尺度海洋事件相關係頗高，例如 92~96 年、103~108 年 PDO 暖相時，溫鹽訊號較集中在南海水以及黑潮水之間，而 99-102、108-111 年冷相時，溫鹽訊號明顯偏向南海水。本區較大的溫降與強降雨、颱風、渦漩有密切關係，這三個機制的變化將直接影響珊瑚的生長，尤其夏天的溫降更有助於珊瑚免受過熱而白化之傷害。pH 值在 PDO 冷、暖相的差異不明顯，研判為大氣二氧化碳增加所造成之海水酸化，與 PDO 相關性不大，而硝酸鹽的距平值與 PDO 指數相關性也不高，因此水質的改變與 PDO 的相關性較小。多年的資料顯示，水體中營養鹽含量的變化似乎受控於植浮的利用或是釋出，兩者之間呈現負相關。束毛藻在本海域的季節性變化非常明顯：春天好發，隨著季節演遞漸漸變少，至冬天低溫時降為全年最低。束毛藻雖然是黑潮水的指標種，但水溫需升高至生長溫度，才能見到束毛藻生長，因此鹽度之單一因素並不能指示束毛藻的出現。

整體而言，核三廠附近海域浮游生物的豐度變動反應大自然的季節變化，夏秋高冬春低，與溫排水的關聯並不顯著，且與多項幾個月前的氣候指數(尤其是 PDO 指數)有顯著正相關性。本期兩年適逢反聖嬰期，植物性和動物性浮游生物、蝦幼生的豐/密度偏低，符合過去經統計檢驗的結果。因此本調查海域浮游生物的豐度變化與大尺度的氣候變遷有較密切的關連，值得未來深入研究。

水溫或底棲動物幼生豐度與底棲動物著生量多無迴歸相關，可能因為無論是水溫測量，或是浮游幼生的撈取，皆為定點即時紀錄，而底棲動物著生是 2-3 個月的累進結果，不同類型調查之時間尺度有差別。固定橫截線調查在入、出水口皆以藻類之覆蓋率最高，分析結果顯示營養鹽低時，藻類覆蓋率增加，當營養鹽高時，海葵及海綿覆蓋率增加，還有珊瑚白化率也變高；各測站底棲動物著生量與營養鹽之迴歸關係沒有一致性，但此結果仍顯示營養鹽對各類底棲動物著生有影響；此外，調查結果未發現受南灣廢污水異常排放影響之訊號。與子計畫一海潮流提供的水深 28 公尺水溫資料比較，出水口南側地區除 3 公尺水深的測站(Efflu-3)外，其餘各測站之水溫與子計

畫一的水溫變化無異，顯示溫排水不影響出水口南側地區 6-8 公尺以深的水溫變化。南灣 102 年 8 月 25 日（第 3-4 次期間）及入水口 103 年 5 月 22 日（第 2-3 次期間）樽海鞘大量出現前後，雖有入水口及灣外水溫變動不一致的現象，但水文水質、動物性浮游生物相、底棲動物著生量及季水溫變化與樽海鞘出現無明確相關，本部分將持續監測探討。

珊瑚礁魚類的分佈可能受到海流、潮汐、水深、地貌、水文、水質、食物來源(浮游生物、底棲生物)、人類活動(放流、垂釣及漁業行為)的影響，呈現測站間群聚組成的差異。本研究參照水質因子、浮游生物及本計畫的調查結果，利用結構方程模式預設出 3 個環境變動的潛在變項(營養鹽、湧升流及基礎生產力)及 2 個生物變動的潛在變項(浮游動物群聚及魚類群聚)，建構第三核能發電廠附近海域之珊瑚礁生態系之概念模式。結構方程式的分析的實證模式顯示營養鹽流對浮游動物群聚的變動呈負相關；營養鹽對魚類群聚為負相關，基礎生產力對魚類群聚則呈現正相關。整體而言，溫排水對第三核能發電廠附近海域魚類相影響小。

五、附表與附圖

表 6-3-1　第三核能發電廠附近海域的浮游生物豐度與水質因子間之相關性分析 (ns : $p > 0.05$, * : $p < 0.05$, ** : $p < 0.01$, *** : $p < 0.001$)

	log ZP	log PP	log C-lar	log S-lar	log F-egg	log F-lar	Temp	Sal	pH	DO	SD	Chl-a	NO_3	NO_2	PO_4	SiO_2	濁度
log ZP	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
log PP	0.046 ns	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
log C-lar	0.362 ***	0.119 ***	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
log S-lar	0.631 ***	0.058 ns	0.457 ***	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
log F-egg	0.308 ***	0.136 ***	0.306 ***	0.081 *	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
log F-lar	0.295 ***	0.033 ns	0.267 ***	0.345 ***	0.217 ***	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temp	0.021 ns	0.251 ***	0.247 ***	-0.079 *	0.414 ***	0.107 **	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sal	-0.089 *	-0.246 ***	-0.235 ***	0.029 ns	-0.201 ***	0.018 ns	-0.583 ***	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
pH	-0.232 ***	0.148 ***	-0.081 *	-0.255 ***	0.041 ns	-0.113 **	0.297 ***	-0.174 ***	1	.	.	.	.	.	.	.	.
DO	0.048 ns	-0.032 ns	-0.139 ***	0.075 *	-0.197 ***	-0.070 ns	-0.406 ***	0.120 **	0.066 ns	1	.	.	.	.	.	.	.
SD	0.020 ns	-0.153 ***	-0.098 **	-0.075 *	0.034 ns	0.064 ns	0.003 ns	0.130 ***	-0.064 ns	-0.124 ***	1	.	.	.	.	.	.
Chl-a	-0.002 ns	0.194 ***	0.111 **	0.053 ns	0.005 ns	-0.086 *	0.026 ns	-0.238 ***	0.067 ns	0.024 ns	-0.361 ***	1	.	.	.	.	.
NO_3	-0.135 ***	-0.224 ***	-0.089 *	-0.102 **	-0.170 ***	-0.095 *	-0.422 ***	0.190 ***	-0.316 ***	-0.023 ns	-0.056 ns	0.047 ns	1	.	.	.	.
NO_2	0.006 ns	-0.081 *	0.006 ns	0.065 ns	-0.094 *	-0.029 ns	-0.279 ***	0.241 ***	-0.150 ***	0.091 *	-0.044 ns	0.060 ns	0.271 ***	1	.	.	.
PO_4	-0.172 ***	-0.009 ns	-0.059 ns	-0.123 ***	-0.062 ns	-0.103 **	-0.290 ***	0.159 ***	0.167 ***	0.116 **	-0.143 ***	0.213 ***	0.332 ***	0.173 ***	1	.	.
SiO_2	-0.049 ns	-0.072 ns	-0.072 ns	-0.130 ***	-0.060 ns	-0.120 **	-0.279 ***	0.005 ns	-0.139 ***	-0.002 ns	-0.064 ns	0.047 ns	0.554 ***	0.176 ***	0.456 ***	1	.
濁度	-0.074 *	-0.157 ***	-0.073 ns	-0.096 *	-0.039 ns	-0.120 **	-0.094 *	0.095 *	0.019 ns	-0.047 ns	-0.106 **	0.058 ns	0.154 ***	0.011 ns	0.087 *	0.028 ns	1

ZP：浮游動物　　NH_3：氨氮
PP：浮游植物　　NO_3-：硝酸鹽
Fegg：魚卵　　NO_2-：亞硝酸鹽
Flar：仔稚魚　　PO_4-：磷酸鹽
Clar：蟹幼生　　SiO_2：矽酸鹽
Slar：蝦幼生　　BOD：生化需氧量
Temp：溫度　　SS：懸浮物
Sal：鹽度　　SD：透明度
pH：pH值
DO：溶氧量
Chl-a：葉綠素a

表 6-3-2　第三核能發電廠附近海域的浮游生物豐度與氣候指數間之相關性分析 (ns : p > 0.05, * : p < 0.05, ** : p < 0.01, *** : p < 0.001)

	logZP	logPP	logClar	logSlar	logFegg	logFlar
logZP	1					
logPP	0.124 ns					
logClar	0.425 ***	0.276 **				
logSlar	0.714 ***	0.143 ns	0.460 ***			
logFegg	0.285 **	0.263 **	0.460 ***	0.185 ns		
logFlar	0.495 ***	0.112 ns	0.413 ***	0.491 ***	0.314 **	
ONI	0.091 ns	0.068 ns	-0.013 ns	-0.018 ns	0.012 ns	0.147 ns
SOI	-0.042 ns	-0.062 ns	-0.065 ns	0.070 ns	-0.141 ns	-0.118 ns
PDO	0.079 ns	0.129 ns	-0.168 ns	-0.082 ns	0.046 ns	**0.199** *
ONI 過一月	0.064 ns	0.080 ns	-0.037 ns	-0.040 ns	0.035 ns	0.131 ns
SOI 過一月	0.087 ns	-0.004 ns	0.187 ns	0.169 ns	0.075 ns	-0.027 ns
PDO 過一月	0.092 ns	0.141 ns	-0.111 ns	-0.043 ns	0.118 ns	0.165 ns
ONI 過二月	0.049 ns	0.093 ns	-0.062 ns	-0.057 ns	0.039 ns	0.130 ns
SOI 過二月	0.078 ns	-0.123 ns	0.022 ns	0.175 ns	-0.091 ns	0.071 ns
PDO 過二月	0.010 ns	**0.263** **	-0.002 ns	-0.082 ns	**0.192** *	0.111 ns
ONI 過三月	0.009 ns	0.091 ns	-0.089 ns	-0.075 ns	0.029 ns	0.110 ns
SOI 過三月	-0.017 ns	-0.055 ns	0.038 ns	0.058 ns	0.017 ns	-0.066 ns
PDO 過三月	-0.002 ns	**0.293** **	0.040 ns	-0.092 ns	**0.252** **	0.115 ns
ONI 過四月	-0.034 ns	0.074 ns	-0.121 ns	-0.108 ns	0.004 ns	0.086 ns
SOI 過四月	0.087 ns	-0.129 ns	0.179 ns	0.096 ns	0.043 ns	-0.003 ns
PDO 過四月	-0.027 ns	**0.231** *	-0.005 ns	-0.165 ns	**0.213** *	0.063 ns

ONI (Oceanic Niño Index): 海洋聖嬰指數
SOI (Southern Oscillation Index):南方震盪指數
PDO (Pacific Decadal Oscillation):太平洋十年振盪指數

log: 取對數
ZP : 浮游動物
PP : 浮游植物
Clar : 蟹幼生
Slar : 蝦幼生
Fegg : 魚卵
Flar : 仔稚魚

表 6-4-1 Station 22 及 Station 24 於 94 -111 年間之營養鹽相對於入水口灣內及出水口南側小灣固定橫截線之底棲生物覆蓋率迴歸關係表。
(x: p>0.05，無顯著迴歸相關)

底棲生物覆蓋率	測站	PO_4			SiO_2			NO_3		
		0m	3m	10m	0m	3m	10m	0m	3m	10m
藻類	入水口	Y=74.25-102.46X; N=210; R^2=0.03	Y=73.94-92.88X; N=209; R^2=0.03	x	x	x	x	x	x	x
	出水口	x	x	Y=72.85-58.98X; N=210; R^2=0.04	x	x	x	x	x	x
珊瑚	入水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	出水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
海葵	入水口	x	Y=34.44+68.07X; N=209; R^2=0.03	x	x	x	x	x	x	x
	出水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
軟珊瑚	入水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	出水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
軟體動物	入水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	出水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
棘皮動物	入水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	出水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
海綿	入水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	出水口	x	x	x	Y=-0.05+0.17X; N=210; R^2=0.02	x	x	x	x	x
珊瑚白化	入水口	x	x	x	x	Y=1.14+3.79X; N=209; R^2=0.04	Y=2.23+2.81X; N=209; R^2=0.06	x	x	Y=7.61+2.80X; N=205; R^2=0.03
	出水口	Y=1.16+22.49X; N=210; R^2=0.03	Y=0.94+27.93X; N=210; R^2=0.04	x	x	x	x	x	x	x

表 6-4-2 Station 20、Station 22 及 Station 24 於 92 -111 年間之營養鹽相對於對照站（SNS）、入水口及出水口南側小灣之底棲動物著生量迴歸關係表。 (x: p>0.05，無顯著迴歸相關)

底棲動物著生量	測站	PO_4			SiO_2			NO_3		
		0m	3m	10m	0m	3m	10m	0m	3m	10m
藤壺	入水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	出水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	對照站(SNS)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
海鞘	入水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	出水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	對照站(SNS)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
苔蘚蟲	入水口	x	x	x	x	x	x	Y=0.14+0.07X; N=80; R^2=0.10	x	x
	出水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	對照站(SNS)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
多毛蟲	入水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	出水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	對照站(SNS)	Y=0.11+1.32X; N=64; R^2=0.12	x	x	x	x	x	x	x	x
軟體動物	入水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	出水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	對照站(SNS)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
珊瑚	入水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	出水口	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	對照站(SNS)	x	x	x	Y=-0.001+0.001X; N=65; R^2=0.07	Y=-0.001+0.001X; N=65; R^2=0.09	x	x	x	x

表 6-4-3 入水口（Influ-2）樽海鞘出現之季別與歷年（92-111 年）相關次別之的底棲動物著生量、水溫資料、測站 22 的水文水質及動物性浮游生物相之觀測項目（註 1）差異比較表。

樽海鞘大量出現之時間	較歷年為高之觀測項目	較歷年為低之觀測項目
102/8/25		
102年第3次 vs. 歷年第3-4次	濁度 (2.2 vs. 0-1.3 NTU) 其他十足類豐度 (12956 vs. 0-4080 個數/1000m^3) 放射蟲豐度 (249789 vs. 0-118621個數/1000m^3) 季平均日溫差 (4.14 vs. 1.34-3.79 ℃)	DON (0.02 vs. 0.04-4.26 mg/L)
103/05/22		
103年第2次 vs. 歷年第2-3次	有孔蟲豐度 (316251 vs. 1756-255925 個數/1000m^3) 頭足類幼生豐度 (1198 vs. 0-1164 個數/1000m^3)	—

註 1：水文水質包含 0-10 m 的溫度、鹽度、 pH、 DO、可見度、 NO_3^-、 NO_2^-、 PO_4^{3-}、 SiO_2、 chl.a、 DON 及 濁度等共 12 項；表層及垂直水層之動物性浮游生物相有夜光蟲、有孔蟲、放射蟲、水母、管水母、櫛水母、枝角類、橈足類幼生、哲水蚤、劍水蚤、猛水蚤、端腳類、大眼幼生、蟹幼生、蝦幼生、糠蝦類、磷蝦類、櫻蝦類、瑩蝦類、其他十足類、介形類、翼足類、異足類、頭足類幼生、二枚貝幼生、毛顎類、有尾類、海樋類、多毛類、藤壺幼生、棘皮動物幼生、魚卵、仔稚魚及其他等共有 34 項；底棲動物包括藤壺、海鞘、苔蘚蟲、多毛蟲、貝類及珊瑚等 6 項；水溫資料有季最高日溫、季最低日溫、季平均日溫、季平均最高日溫、季平均最低日溫、季最大日溫差及季平均日溫差等 7 項。

表6-5-1 各測站主要魚種平均出現數量及魚種相似度百分比

中文名稱	測站內魚種相似度%				
	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
	23.20%	29.42%	17.50%	14.50%	19.91%
一點蝴蝶魚	1.5		1.28	0.59	
二色光鰓雀鯛	15.79	2.34	9.82	1.76	12.54
三帶圓雀鯛		2.65			
三斑圓雀鯛	6.51	8.9	1.82		1.24
三葉光鰓雀鯛	4.94		2.54		6.69
小高鰭刺尾魚	2.74				1.78
弓月蝴蝶魚	1.37		1.75	1.35	1.03
中華管口魚				0.43	
五帶葉鯛	6.38			3.97	
五線笛鯛		30.21			
五線雀鯛	11.59	8.82	1.5		3.47
六線雀鯛			1.46	1.43	
王子雀鯛				0.78	0.87
半環蓋刺魚			0.59		0.9
史氏鸚哥魚			1.03		
四線笛鯛		14.71			
瓦氏尖鼻魨				0.71	
甲尻魚			0.71		0.71
白斑鸚哥魚				1.85	1.07
印度海緋鯉				0.41	
多帶海緋鯉	1.35		1.47	1.29	1.93
耳帶蝴蝶魚	1.65		1.04	0.68	0.91
克氏兔頭魨			0.88	1.18	0.97
克氏海葵魚	1.97		1.49	1.15	2.53
克氏蝴蝶魚	13.91		3.96	1.72	7.91
尾紋九刺鮨	1.12				0.6
杜氏刺尾鯛			1.03	0.75	
沙姆金鱗魚		4.22			
角鑌魚	6.81	4.06	3.22	2.87	5.74
金帶擬羊魚		9.49			
長棘花鮨	28.35		2.96		19.76
哈氏錦魚				0.94	

續表6-5-1 各測站主要魚種平均出現數量及魚種相似度百分比

中文名稱	測站內魚種相似度%				
	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
染色尖嘴魚			1.29	0.71	
約島氏固曲齒鯛				0.62	
胡麻斑蝴蝶魚	1.31		0.74		2.22
烏伊蘭擬金眼鯛		5.78			
烏尾鮗				6.56	
珠點固曲齒鯛				0.96	
高鰭刺尾魚				0.6	
單角鼻魚			1.38	4.35	
揚旛蝴蝶魚		2.06			
絲鰭塘鱧	1.18				
腋斑錦魚	1.94		1.31		1.5
菲律賓雀鯛			0.53	0.76	
裂唇魚	3.54	2.57	1.56	1.24	2.5
鈍頭葉鯛	12.19		7.19	2.71	10.4
雲斑海豬魚	1.25		1.28	0.69	1.5
黃衣錦魚	6.99		5.38	3.56	6.99
黃尾金梭魚			17.26	17.24	
黃足笛鯛		22.13		0.87	
黃線擬鬚鯛		5.24	1.04	2.38	
黑背鼻魚	2.04		1.1		
藍紋高身雀鯛				1.09	
黑帶稀棘鰯			1.01	1.53	0.84
黑副雀鯛		6.62	1.68	1.68	0.91
黑褐副雀鯛		7.6	1.24	2.32	
新月錦魚		2.46			
詹氏葉鯛			1.44		
瑰麗凹尾塘鱧			0.66	0.46	
福氏刺尻魚	1.47		0.81		1.22
福氏鸚哥魚	1.68		1.19		1.5
綠刺尾鯛				5.1	
網紋圓雀鯛		86.56	3.93	4.76	5.85
銀身蝴蝶魚			0.71	0.68	
褐斑刺尾鯛	17.22		8.31	5.15	10.87

續表6-5-1 各測站主要魚種平均出現數量及魚種相似度百分比

中文名稱	測站內魚種相似度%				
	測站 1	測站 2	測站 3	測站 4	測站 5
褐藍子魚		9.44	5.19	6.91	
鞍斑錦魚		2.57	0.93	1.66	
橘鈍寬刻齒雀鯛		16.66		0.68	
圓眼戴氏魚				0.6	
點斑橫帶蝴蝶魚	3.54		1.1	0.72	1.68
藍綠光鰓雀鯛		36.32			
雙帶赤尾冬				0.32	
雙帶鱗鰭烏尾鮗	33.81		16.13	1.66	17.38
鏡斑蝴蝶魚			1.63	3.06	1.09
飄浮蝴蝶魚	1.01	1.78	2.34	1.63	1.75

表6-5-2第三核能發電廠附近海域環境因素分析

水質測項	成份 1	成份 2	成份 3
硝酸鹽	**.821**	.190	-.006
矽酸鹽	**.803**	-.137	.066
磷酸鹽	**.656**	.097	.217
亞硝酸鹽	**.584**	.263	-.010
溫度	-.298	**-.845**	-.005
溶氧	-.092	**.693**	.476
鹽度	.154	**.688**	**-.520**
透明度	-.059	-.128	**-.764**
葉綠素 A	.193	-.100	**.756**
特徵值	2.672	1.723	1.387
變異數(%)	25.014	20.306	18.928
累積變異數(%)	25.014	45.320	**64.248**

表6-2-1 核三廠82年後電廠運轉(無大修)與大修時, 表水水溫之比較表。

	採樣時, 電廠正常運轉(1)		採樣時, 遇大修期間(2)		(1)-(2)	
	#24	其他6站*	#24	其他6站*	#24	其他6站*
春(3~5月)	28.4±1.1, n=18	27.0±1.2, n=102	27.7±1.8, n=14	27.1±1.4, n=78	0.7℃	-0.1℃
夏(6~8月)	30.7±1.3, n=25	29.1±0.7, n=140	-	-	-	-
秋(9~11月)	28.8±1.4, n=19	27.2±1.1, n=106	27.2±1.7, n=11	26.4±1.7, n=60	1.6℃	0.9℃
冬(12~2月)	25.8±1.6, n=24	24.2±1.1, n=135	25.1, n=1	24.8±0.3, n=6	0.7℃	-0.6℃

*其他六站為#12, 18, 20, 21, 22, 23站

表6-2-2 秋季時核三廠在正常年、聖嬰年以及反聖嬰年時正常運轉(無大修)與大修時, 表水水溫之比較表。

	採樣時, 電廠正常運轉	採樣時, 遇大修期間
正常年	27.8±0.8, n=50	25.2±1.0, n=16
聖嬰年	26.5±1.3, n=28	26.9±1.1, n=22
反聖嬰年	27.1±1.1, n=22	26.7±1.9, n=28




圖6-2-1 103年8月珠江口至台灣海峽 (a)衛星葉綠素甲與(b)透明度之圖像。




圖6-2-2 75年7月~111年11月第三核能發電廠附近海域鹽度距平值(當月測值-歷年月平均值)之a)逐年變化圖以及b)不同季節與PDO之相關性。




圖6-2-3 本海域於PDO冷、暖相時之溫鹽變化圖

~pH~




圖6-2-4 本海域表水pH逐年變化圖與PDO 指數之相關性。




圖6-2-5 本海域a)硝酸鹽逐年變化圖以及b)硝酸鹽距平值與PDO之變化圖。




圖6-2-6 本海域a)硝酸鹽以及b)硝酸鹽距平值與PDO 指數之相關性。




圖6-2-7 核三廠82年後電廠正常運轉(紅)與大修時(藍色)表水溫度之距平值圖。




圖6-2-8 南灣海域水溫下降與強降雨, 颱風, 渦漩之關係




圖6-2-9 營養鹽(實線)與表層植浮(虛線)隨著時間之變化圖




圖6-2-10 表層植浮與營養鹽之相關圖




圖6-2-11 東毛藻四季數量之變化




圖6-2-12 珊瑚生長於入、出水口與硝酸鹽濃度之比較




圖 6-3-1　民國 85 年 7 月至 111 年 11 月第三核能發電廠附近海域監測和對照測站植物性浮游生物(>55μm)各大類之密度




圖 6-3-2　民國 85 年 7 月至 111 年 11 月第三核能發電廠附近海域監測和對照測站動物性浮游生物各大類之豐度




圖 6-3-3　民國 85 年 7 月至 111 年 11 月第三核能發電廠附近海域監測和對照測站蝦蟹幼生之豐度




圖 6-3-4　民國 85 年 7 月至 111 年 11 月第三核能發電廠附近海域監測和對照測站魚卵及仔魚之豐度




圖 6-3-5　民國 85 年 7 月至 111 年 11 月第三核能發電廠附近海域束毛藻屬密度之變化




圖 6-4-1 Station 20 (SNS：石牛溪) A.水溫變化與多毛類幼生在附著板著生情形之迴歸關係 (N=78; p>0.05)；B.多毛類在水表層之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係(N=78; p>0.05);C.多毛類在水層中之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係(N=78; p>0.05)。




圖 6-4-2 Station 20 (SNS：石牛溪)A.水溫變化與藤壺幼生在附著板著生情形之迴歸關係(N=78; p<0.05)；B.藤壺在水表層之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係(N=78; p<0.05)；C.藤壺在水層中之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係(N=78; p>0.05)。




圖 6-4-3 Station 20 (SNS：石牛溪) A.水溫變化與軟體動物幼生在附著板著生情形之迴歸關係(N=78; p>0.05)；B.軟體動物在水表層之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係(N=78; p>0.05)；C.軟體動物在水層中之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係(N=78; p>0.05)。




圖 6-4-4 Station 22 (Influ-10：入水口南堤外側)A.水溫變化與多毛類幼生在附著板著生情形之迴歸關係(N=83; p>0.05)；B.多毛類在水表層之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係(N=85; p>0.05)；C.多毛類在水層中之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係(N=85; p>0.05)。

Station 22 (Influ-10：入水口南堤外側)




圖 6-4-5 Station 22 (Influ-10：入水口南堤外側)A.水溫變化與藤壺幼生在附著板著生情形之迴歸關係(N=83; p<0.05)；B.藤壺在水表層之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係(N=85; p>0.05)；C.藤壺在水層中之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係(N=85; p>0.05)。




圖 6-4-6 Station 22 (Influ-10：入水口南堤外側)A.水溫變化與軟體動物幼生在附著板著生情形之迴歸關係(N=83; p>0.05)；B.軟體動物在水表層之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係(N=85; p>0.05)；C.軟體動物在水層中之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係(N=85; p>0.05)。

Station 24 (Efflu：出水口南堤外側小灣水深 8 公尺)




圖 6-4-7 Station 24 (Efflu：出水口南堤外側小灣水深 8 公尺)A.水溫變化與多毛類幼生在附著板著生情形之迴歸關係(N=88; p<0.05)；B.多毛類在水表層之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係(N=90; p>0.05)；C.多毛類在水層中之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係(N=90; p>0.05)。

Station 24 (Efflu：出水口南堤外側小灣水深 8 公尺)




圖 6-4-8 Station 24 (Efflu：出水口南堤外側小灣水深 8 公尺)A.水溫變化與藤壺幼生在附著板著生情形之迴歸關係(N=88; p>0.05)；B.藤壺在水表層之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係(N=90; p>0.05)；C.藤壺在水層中之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係(N=90; p<0.05)。




圖 6-4-9 Station 24 (Efflu：出水口南堤外側小灣水深 8 公尺)A.水溫變化與軟體動物幼生在附著板著生情形之迴歸關係(N=88; p>0.05)；B.軟體動物在水表層之浮游幼生豐度與其在附著板著生情形之迴歸關係(N=90; p>0.05)；C.軟體動物在水層中之浮游幼生豐度與其在附著板著生之迴歸關係(N=90; p>0.05)。






圖 6-4-10 Station 22 (Influ：入水口灣內固定橫截線)A. 水深 0 m 之 PO_4 與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; $p<0.05$)；B.水深 3 m 之 PO_4 與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=209; $p<0.05$)；C.水深 10 m 之 PO_4 與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=209; $p>0.05$)。

Station 22 (Influ：入水口灣內固定橫截線)

A



B



C




圖 6-4-11 Station 22 (Influ：入水口灣內固定橫截線)A.水深 0 m 之 SiO_2 與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; p>0.05)；B.水深 3 m 之 SiO_2 與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=209; p>0.05)；C.水深 10 m 之 SiO_2 與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=209; p>0.05)。

Station 22 (Influ：入水口灣內固定橫截線)




圖 6-4-12 Station 22 (Influ：入水口灣內固定橫截線)A. 水深 0 m 之 NO_3 與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; p>0.05)；B.水深 3 m 之 NO_3 與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=209; p>0.05)；C.水深 10 m 之 NO_3 與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=209; p>0.05)。

Station 24 (Efflu：出水口南側小灣固定橫截線)




圖 6-4-13 Station 24 (Efflu：出水口南側小灣固定橫截線)A. 水深 0 m 之 PO_4 與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; p>0.05)；B. 水深 3 m 之 PO_4 與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; p>0.05)；C.水深 10 m 之 PO_4 與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; p<0.05)。

Station 24(Efflu：出水口南側小灣固定橫截線)




圖 6-4-14 Station 24(Efflu：出水口南側小灣固定橫截線)A. 水深 0 m 之 SiO_2 與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; $p>0.05$)；B.水深 3 m 之 SiO_2 與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=207; $p<0.05$)；C.水深 10 m 之 SiO_2 與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; $p>0.05$)。

Station 24 (Efflu：出水口南側小灣固定橫截線)




圖 6-4-15 Station 24(Efflu：出水口南側小灣固定橫截線)A. 水深 0 m 之 NO_3 與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; p>0.05)；B.水深 3 m 之 NO_3 與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; p>0.05)；C.水深 10 m 之 NO_3 與藻類覆蓋率之迴歸關係(N=210; p>0.05)。






圖 6-4-16 110、111 年各測站水溫與子計畫一海潮流測站 N3C1 的水溫變化。A.110 年；B.111 年。

A.



B.



C.




圖 6-4-17 潭美颱風影響期及 102 年 8 月 25 日樽海鞘大量出現期的水溫變化圖。A.潭美颱風發生路徑及時間；B.潭美颱風影響期（102/08/16-08/20）；C.樽海鞘出現期（102/08/23-08/27）。↑：N3C1（亮藍色）與入水口 Influ-5（淺綠色）水溫變化不一處；↓：樽海鞘出現時間。




圖 6-4-18 103 年 5 月 22 日樽海鞘大量出現前後期的水溫變化圖。↑：N3C1（亮藍色）與入水口 Influ-5（淺綠色）水溫變化不一處；↓：樽海鞘出現時間。




圖6-5-1 機組歲修保養期間及運轉期間測站3~測站5(影響域)珊瑚礁魚種數變動

註：■影響域歲修保養期間




圖6-5-2 機組歲修保養期間及運轉期間測站3~測站5(影響域)珊瑚礁魚尾種數變動

註：■影響域歲修保養期間




圖6-5-3 民國89-109年機組歲修保養期間及運轉期間測站3~測站5(影響域)珊瑚礁魚類群聚組成




圖6-5-4 太平洋十年振盪指數(PDO)與海洋聖嬰指數(ONI)對計畫區附近海域珊瑚礁魚種數距平值




圖6-5-5 颱風期過後第三核能發電廠附近海域珊瑚礁魚種數變動






圖6-5-6 第三核能發電廠附近海域生態系之概念模式



指標類型	本研究實證	建議標準	參考文獻
RMSEA(配適度)	**0.057**	**<0.05(良好配適)** **0.05~0.08(不錯的配適)** **0.08~0.1(中度配適)** **>0.1(不良配適)**	Hair et al. (2006)
卡方/自由度(比值)	**1.722**	**<2 or3 (嚴謹標準)** **<5 (寬鬆標準)**	Carmines & Mclver (1981) Chin & Todd (1995) Hair et al. (1998)
GFI(配適度指標)	**0.941**	**>0.9**	Baumgartner & Homburg(1996) Gefen et al. (2000) Schumacker & Lomax (2004)
AGFI(修正後配適度指標)	**0.899**	**>0.9； >0.8為可接受**	

圖6-5-7 第三核能發電廠附近海域表層生態系之實證模式



指標類型	本研究實證	建議標準	參考文獻
RMSEA(配適度)	**0.055**	**<0.05(良好配適)** **0.05~0.08(不錯的配適)** **0.08~0.1(中度配適)** **>0.1(不良配適)**	Hair et al. (2006)
卡方/自由度(比值)	**1.608**	**<2 or3 (嚴謹標準)** **<5 (寬鬆標準)**	Carmines & Mclver (1981) Chin & Todd (1995) Hair et al. (1998)
GFI(配適度指標)	**0.938**	**>0.9**	Baumgartner & Homburg(1996) Gefen et al. (2000) Schumacker & Lomax (2004)
AGFI(修正後配適度指標)	**0.894**	**>0.9； >0.8為可接受**	

圖6-5-8 第三核能發電廠附近海域生態系之實證模式




圖6-5-9 第三核能發電廠附近海域硝酸鹽與珊瑚礁魚種數的相關性



圖6-6-1 本計畫之網頁首頁。




圖6-6-2 研究人員專區首頁-水文資料歷年時間序列圖。



圖6-6-3 研究人員專區首頁-動物性浮游生物資料歷年時間序列圖。




圖6-6-4 同一採樣季節資料展示頁面示意圖。



圖6-6-5 水文資料線上繪圖之時間序列圖操作介面。

時間序列圖

請輸入下列資料

請選擇繪圖年份起始時間： 1986 年 到 2022 年

請輸入溫度座標軸下限： 20 ℃ 與上限 32 ℃


請輸入欲繪線數 1

第一條線： 測站 st18 深度 0m

第二條線： 測站 st18 深度 0m

繪圖 重設

圖6-6-6 水文資料線上繪圖之時間序列圖進階操作介面。



下載高解析度圖檔(.pdf)

圖6-6-7 查詢參數及其相互比較時間序列圖。




圖6-6-8 散射圖之搜尋介面。




圖6-6-9 st14之0m 溫度與st14之0m 鹽度之散射圖。

水平分布圖


請選擇繪圖年月：民國 111 年 11 月

請選擇參數： 溫度

深 度： 0m

繪圖 重設

圖6-6-10 水平面溫度分佈圖搜尋頁面。



下載高解析度圖檔(.pdf)

圖6-6-11 水平面溫度分佈圖。



圖6-6-12 水文資料查詢列表。




圖6-6-13 水文資料統計圖表。



圖6-6-14 浮游生物資料查詢頁面。



年	季節	種類	站名	位置	覆蓋率
2022-11-15	4	藻類	INF5	入水口灣內南側	80.80
2022-11-15	4	藻類	INF2-1	入水口灣內北側	70.40
2022-11-15	4	藻類	INF2-2	入水口灣內最北側	82.00
2022-11-15	4	藻類	EFF2	出水口南側水深9公尺處	68.00
2022-11-15	4	藻類	MPT	貓鼻頭	61.20
2022-11-15	4	藻類	EFFLU	出水口南側水深8公尺處	76.00
2022-11-15	4	石珊瑚	INF5	入水口灣內南側	56.80
2022-11-15	4	石珊瑚	INF2-1	入水口灣內北側	56.40
2022-11-15	4	石珊瑚	INF2-2	入水口灣內最北側	78.80

圖6-6-15 底棲動物資料查詢頁面。




圖6-6-16 底棲生物各測站時間序列圖頁面一。

年	季節	種類	站名	位置	覆蓋率
2022-11-15	4	軟珊瑚	INF5	入水口灣內南側	1.20
2022-11-15	4	海葵	INF5	入水口灣內南側	28.40
2022-11-15	4	貝類	INF5	入水口灣內南側	1.60
2022-11-15	4	多毛類	INF5	入水口灣內南側	4.80
2022-11-15	4	白化珊瑚	INF5	入水口灣內南側	4.80
2022-11-15	4	石珊瑚	INF5	入水口灣內南側	56.80
2022-11-15	4	海綿	INF5	入水口灣內南側	3.60
2022-11-15	4	熬皮動物	INF5	入水口灣內南側	0.80
2022-11-15	4	藻類	INF5	入水口灣內南側	80.80
2022-08-15	3	海綿	INF5	入水口灣內南側	14.80
2022-08-15	3	熬皮動物	INF5	入水口灣內南側	2.00
2022-08-15	3	軟珊瑚	INF5	入水口灣內南側	0.00
2022-08-15	3	海葵	INF5	入水口灣內南側	28.40
2022-08-15	3	多毛類	INF5	入水口灣內南側	28.80
2022-08-15	3	白化珊瑚	INF5	入水口灣內南側	15.60
2022-08-15	3	藻類	INF5	入水口灣內南側	87.60
2022-08-15	3	石珊瑚	INF5	入水口灣內南側	70.40
2022-08-15	3	貝類	INF5	入水口灣內南側	7.20
2022-05-15	2	多毛類	INF5	入水口灣內南側	0.80
2022-05-15	2	藻類	INF5	入水口灣內南側	81.20


圖6-6-17 底棲生物各測站時間序列圖頁面二。



圖6-6-18 底棲動物各參數繪圖頁面。



圖6-6-19 海流資料之搜尋介面。



下載高解析度圖檔(.pdf)

圖6-6-20 海流資料之時間序列圖。由上至下分別為流矢圖、溫度圖、東西向流速圖、南北向流速圖。




圖6-6-21 流場統計圖之搜尋介面。




圖6-6-22 流速發生機率分佈圖。




圖6-6-23 流向發生機率分佈圖。




圖6-6-24 玫瑰圖。




圖6-6-25 海流漸進線圖。




圖6-6-26流年歷年季節統計圖之搜尋介面。




圖6-6-27 流速發生機率分佈圖。




圖6-6-28 流向發生機率分佈圖。




圖6-6-29 玫瑰圖。



圖6-6-30 浮標漂流軌跡查詢繪圖介面。




圖6-6-31 2022年浮標漂流軌跡繪圖結果。



日期	溫度	流速	流向	東西向速度	南北向速度
2022-11-10 07:30:00	24.13	66.80	274.10	-66.63	4.78
2022-11-10 07:20:00	24.12	61.40	233.40	-49.29	-36.61
2022-11-10 07:10:00	23.98	51.13	233.90	-41.31	-30.13
2022-11-10 07:00:00	23.84	52.24	239.10	-44.83	-26.83
2022-11-10 06:50:00	23.65	49.55	243.40	-44.31	-22.19
2022-11-10 06:40:00	23.67	48.42	235.50	-39.90	-27.43
2022-11-10 06:30:00	23.61	49.56	225.10	-35.11	-34.98
2022-11-10 06:20:00	24.52	55.21	230.20	-42.42	-35.34
2022-11-10 06:10:00	24.37	49.89	236.10	-41.41	-27.83
2022-11-10 06:00:00	23.60	44.12	228.90	-33.25	-29.00
2022-11-10 05:50:00	23.06	42.29	233.90	-34.17	-24.92
2022-11-10 05:40:00	23.06	43.18	229.40	-32.79	-28.10
2022-11-10 05:30:00	23.19	41.20	227.70	-30.47	-27.73
2022-11-10 05:20:00	23.62	41.66	232.30	-32.96	-25.48
2022-11-10 05:10:00	24.07	48.15	222.30	-32.41	-35.61
2022-11-10 05:00:00	23.80	39.64	202.40	-15.11	-36.65
2022-11-10 04:50:00	23.61	33.28	206.60	-14.90	-29.76
2022-11-10 04:40:00	23.39	42.27	224.90	-29.84	-29.94
2022-11-10 04:30:00	23.47	37.88	223.00	-25.83	-27.70
2022-11-10 04:20:00	23.99	48.30	214.40	-27.29	-39.85
2022-11-10 04:10:00	24.88	47.46	209.70	-23.51	-41.23

圖6-6-32 海流資料查詢頁面。



圖6-6-33 CTD水平分佈圖選擇介面。




圖6-6-34 CTD水平分佈圖。




圖6-6-35 CTD資訊與Google Map整合介面。




圖6-6-36 C09測站，110年溫度剖面圖。




圖6-6-37 珊瑚礁魚類各測站歷年魚種數




圖6-6-38 珊瑚礁魚類各測站歷年魚尾數




圖6-6-39 海表面溫度資料快速搜尋介面。




圖6-6-40 海表面溫度資料之大圖。



圖6-6-41 海面溫度分佈查詢頁面。





圖6-6-42 海表面溫度資料。



圖6-6-43 SST資料下載搜尋頁面。



	A	B	C	D	E
1	date	longitude	latitude	temperature	
2	2022/12/19	118	23	19.64	
3	2022/12/19	118	22.99	19.66	
4	2022/12/19	118	22.98	19.69	
5	2022/12/19	118	22.97	19.72	
6	2022/12/19	118	22.96	19.75	
7	2022/12/19	118	22.95	19.77	
8	2022/12/19	118	22.94	19.8	
9	2022/12/19	118	22.93	19.83	
10	2022/12/19	118	22.92	19.86	
11	2022/12/19	118	22.91	19.89	
12	2022/12/19	118	22.9	19.92	
13	2022/12/19	118	22.89	19.95	
14	2022/12/19	118	22.88	19.98	

圖6-6-44 SST資料之逗點分隔檔案頁面。




圖6-6-45 衛星雲圖查詢介面。





圖6-6-46 放大之衛星雲圖。



氣象局海象資料查詢

資料來源：中央氣象局

請輸入時間範圍:

2022/12/21 00:00 - 2022/12/21 23:59

請輸入測站:

後壁湖潮位站

送出 重設

日期	潮高 (公尺)	浪高 (公尺)	浪向 (最大浪高)	波浪週期 (秒)	風力 (m/s)	風力 (級)	風向	陣風 (m/s)	陣風 (級)	海溫 (度)	氣溫 (度)	氣壓 (百帕)	海流 (流向)	流速 (m/s)	流速 (節)
2022-12-31 23:00:00		0.8	135.0	4.9	13.6	6	45.0	16.7	7			1022.2	112.5	0.35	0.68
2022-12-31 22:00:00		0.9	135.0	5.3	13.0	6	45.0	16.3	7			1022.6	112.5	0.47	0.92
2022-12-31 21:00:00		1.1	135.0	5.6	13.8	6	45.0	16.3	7			1022.4	112.5	0.38	0.74
2022-12-31 20:00:00		1.0	112.5	6.3	12.3	6	45.0	15.1	7			1022.1	112.5	0.30	0.59
2022-12-31 19:00:00		0.9	135.0	6.7	11.2	6	45.0	13.7	6			1021.6	90.0	0.17	0.34
2022-12-31 18:00:00		0.9	135.0	6.3	11.6	6	45.0	14.1	7			1021.1	67.5	0.11	0.22
2022-12-31 17:00:00		0.8	112.5	6.0	11.6	6	45.0	14.6	7			1021.2	45.0	0.12	0.23
2022-12-31 16:00:00		0.8	135.0	5.7	12.2	6	45.0	15.2	7			1020.3	0.0	0.22	0.43
2022-12-31 15:00:00		0.7	135.0	5.1	13.5	6	45.0	17.2	8			1020.0	315.0	0.21	0.40
2022-12-31 14:00:00		0.7	157.5	5.2	13.4	6	45.0	16.4	7			1020.1	337.5	0.19	0.37
2022-12-31 13:00:00		0.6	135.0	4.9	12.9	6	45.0	16.1	7			1020.5	22.5	0.16	0.32

圖6-6-47 氣象局鵝鑾鼻資料浮標測站之海象資料查詢介面。




圖6-6-48 CODAR海流資料展示頁面。原網站已於2020年12月19日停止更新。




圖6-6-49 AVISO海面高度與地轉流查詢介面。




圖6-6-50 AVISO海面高度與地轉流分布圖。



圖6-6-51 AVISO海面高度與地轉流分佈查詢頁面。




圖6-6-52 AVISO海面高度與地轉流分佈圖。





圖6-6-53 AVISO海面高度與地轉流原始資料查詢下載介面。



	A	B	C	D	E	F	G
1	date	longitude	latitude	height	u	v	
2	2022/12/21	118.12	22.88	0.2214	-25.6	-23	
3	2022/12/21	118.12	22.62	0.1887	8.76	-29.65	
4	2022/12/21	118.12	22.38	0.2225	28.99	-23.58	
5	2022/12/21	118.12	22.12	0.2293	11.94	-16.15	
6	2022/12/21	118.12	21.88	0.2484	13.08	-2.08	
7	2022/12/21	118.12	21.62	0.2734	46.33	15.63	
8	2022/12/21	118.12	21.38	0.3702	40.86	24.7	
9	2022/12/21	118.12	21.12	0.3984	0.21	31.91	
10	2022/12/21	118.12	20.88	0.3967	-21.85	29.57	
11	2022/12/21	118.12	20.62	0.3554	-46.12	25.29	
12	2022/12/21	118.12	20.38	0.298	-61.11	31.55	
13	2022/12/21	118.12	20.12	0.2244	-60.87	23.16	
14	2022/12/21	118.12	19.88	0.1571	-51.92	14.23	
15	2022/12/21	118.12	19.62	0.1022	-32.34	7.59	
16	2022/12/21	118.12	19.38	0.0797	-22.89	3.14	
17	2022/12/21	118.12	19.12	0.0508	-18.38	5.56	
18	2022/12/21	118.12	18.88	0.0405	-3.04	7.21	

圖6-6-54 AVISO海面高度與地轉流原始資料。



圖6-6-55 MODIS水色衛星資料查詢介面。



圖6-6-56 MODIS海洋葉綠素衛星資料查詢介面。

柒、參考資料

Aharon, P. (1985). Carbon isotope record of late Quaternary coral reefs: possible index of sea surface paleoproductivity, In: ET Sundquist and WS Broecker (eds), The Carbon Cycle and Atmospheric CO_2: Natural Variations Archean to Present. Geophysical Monograph 32, Am. Geophys. Union, Washington, DC, 343-355.

APHA, (1985). Standard method for the examination of water and wastewater. 16th ed. American Public Health Association, New York, U.S.A., 1268 pp.

Bai, Y., T.H. Huang, X.Q. He, S.L. Wang, Y.C. Hsin, C.R. Wu, W.D. Zhai, H.K. Lui, C.T.A. Chen (2015). Intrusion of the Pearl River plume into the main channel of the Taiwan Strait in summer, J. Sea Res., 95: 1-15, doi:0.1016/j.seares.2014.10.003.

Baird, A.H. and P.A. Marshall (2002). Mortality, growth and reproduction in scleractinian corals following bleaching on the Great Barrier Reef, Mar. Ecol. Prog. Ser., 237:133-141.

Barnard, L.A., I.G. Macintyre, and J.W. Pierce (1974). Possible environmental index in tropical reef corals, Nature, 252: 219-220.

Belkin, I.M. and M.A. Lee (2014). Long-term variability of sea surface temperature in Taiwan Strait. Climate Changes, 124: 4, 821-834.

Briand, F.J.P. (1975). Effects of power-plant cooling systems on marine phytoplankton, Mar. Biol., 33: 135-146.

Brook, A.J. and A.L. Baker (1972). Chlorination at power plant: Impact on phytoplankton productivity, Science, 176: 1414-1415.

Buckley, L.J. (1982). Effects of temperature on growth and biochemical composition of larval winter flounder Pseudopleuronectes americanus, Mar. Ecol. Prog. Ser., 8: 181-186.

Bell, P.R.F., I. Elmetri and P. Uwins. (1999). Nitrogen fixation by Trichodesmium spp. in the central and northern Great Barrier Reef lagoon: relative importance of the fixed-nitrogen load, Mar. Ecol. Prog. Ser., 186: 119-126.

Carpenter, E.J., B.B. Peck and S.J. Anderson (1974). Survival of copepods passing througha nuclear power station on north eastern Long Island Sound, U.S.A., Mar. Biol., 24: 49-55.

Chakraborty, S. (1993). Environmental significance of isotopic and trace elemental variations in banded corals, dissertation, Physical Research Lab. Ahmedabad, India, 88 pp.

Chao, S.Y., P.T. Shaw and S.Y. Wu (1996). El Nino modulation of the South China Sea circulation, Prog. Oceanog., 38: 51-93.

Chardy, P. (1989). Assessing biological effects of thermal discharge in the marine environment, La Mer, 27: 100-101.

Chen, C.-C., F.-K. Shiah, H.-J. Lee, K.-Y Lee , P.-J. Meng, S.-J. Kao, Y.-F. Tseng, and C.-L. Chung (2005). Phytoplankton and bacterioplankton biomass, production and turnover in a semi-enclosed embayment with spring tide induced upwelling, Mar. Ecol. Prog. Ser., 304: 91-100.

Chen, C.J., C.C. Lin and Y.M. Lin (1994). Surveillance of indoor and outdoor radon concentrations in Taiwan, Nuc. Sci. J., 31: 117-128.

Chen, C.T. (1981). Oxygen solubility in seawater, In "Solubility Data series, v.7, Oxygen and Ozone", R. Battino, ed. Pergamon Press, 41-55.

Chen, C.T.A., C.T. Liu and S.C. Pai (1994). Transport of oxygen, nutrients and carbonates by the Kuroshio current, Chin. J. Oceanol. Limnol., 12 (3): 220-227.

Chen, C.T.A., C.T. Liu and S.C. Pai (1995). Variations in oxygen, nutrient and carbonate fluxes of the Kuroshio current, La Mer, 33: 161-176.

Chen, C.T.A., B.J. Wang and L.Y. Hsing (2004a). Upwelling and Degree of Nutrient Consumption in Nanwan Bay, Southren Taiwan, J. Mar. Sci. Technol., 12 (5): 442-447.

Chen, C.T.A., L.Y. Hsing, C.L. Liu and S.L. Wang (2004b). Degree of nutrient onsumption of upwelled water in the Taiwan Strait based on dissolved phosphorus or nitrogen, Mar. Chem., 87: 73-86.

Chen, C.T.A.*, S. Jan, T.H. Huang, Y.H. Tseng (2010). Spring of no Kuroshio intrusion in the southern Taiwan Strait, J. Geophys. Res., 115, C08011, doi:10.1029/2009JC005804.

Chen, C.T.A., H.K. Lui, C.H. Hsieh, T. Yanagi, N. Kosugi, M. Ishii, G.C. Gong (2017). Deep oceans may acidify faster than anticipated due to global warming, Nature Climate Change, 7: 890–894.

Chen, C.T.A., T.H. Huang, C.H. Wu, H.Y. Yang, X.Y. Guo (2021). Variability of the nutrient stream near Kuroshio's origin. Scientific Reports, 11, Article number: 5080.

Chen, Y.L.L., H.Y. Chen and Y.H. Lin (2003). Distribution and downward flux of Trichodesmium in the South China Sea as influenced by the transport from the Kuroshio Current, Mar. Ecol. Prog. Ser., 259:47-57.

Cheng, L.Z. and C.T.A. Chen (2004). Features of the fishing ground near the Third Nuclear Power Plant in Taiwan, J. Mar. Sci. Technol., 12 (5): 453-456.

Chu, P.C., S.B. Lu and Y.C. Chen (1997). Temporal and spatial variabilities of the South China Sea surface temperature anomaly, J. Geophys. Res., 102:20937-20955.

Chu, T.Y. (1971). Environmental study of the surrounding waters of Taiwan, Acta Oceanogr. Taiwanica, 1:15-31.

Chou, Y.L., C.T.A. Chen and L.L. Liu (2004). Effects of nuclear power plant thermal effluent on marine sessile invertebrate communities in Southern Taiwan, J. Mar. Sci. Technol., 12 (5): 448-452.

Clarke, G.M. (1993). Fluctuating asymmetry of invertebrate populations as biological indicator of environmental quality, Environ. Poll., 82: 207-211.

Cole, J.E. and R.G. Fairbanks (1991). The Southern Oscillation recorded in the oxygen isotopes of corals from Tarawa Atoll, Paleoceanography, 5: 669-683.

Coutant, C.C. (1976). Thermal effects, J. Water Poll. Control fed., 48: 1486-1544.

Dai, A. (1996). Global Precipitation Variability and Its Relationship with Other Climate Changes, Ph.D. thesis. Columbia University, New York, New York.

Dai, C.F., Chen, G., Inaba, M., Iwao, K., Iwase, F., Kakuma, Y., Kajiwara, K., Kimura, T., Nomura, K., Oki, K., Sakai, K., Shibuno, T., Yamano, H. and Yoshida, M (2002). “Status of coral reefs in East Asia: China, Japan, Korea and Taiwan”, In: Wilkinson, C. (ed) Status of Coral Reefs of theWorld: 2002, p. 153-162, Australian Institute of Marine Science, Townsville, Queensland, Australia.

Dodge, R.E. and J.R. Vaisnys (1975). Hermatypic coral growth banding as environmentalrecorder, Nature, 258: 707-708.

Dunbar, R.B. and G.M. Wellington (1981). Stable isotopes in a branching coral monitor seasonal temperature variation, Nature, 293: 453-455.

Durack, P.J., S.E. Wijffels and R.J. Matear (2012). Ocean salinities reveal strong global water cycle intensification during 1950 to 2000. Science, 336 (6080): 455-458.

Eakin, C.M., G. Liu, A.M. Gomez, J.L. De La Cour, S.F. Heron, W.J. Skirving, E.F. Geiger, K.V. Tirak, and A.E. Strong (2016). Global coral bleaching 2014-2017? Status and an appeal for observations, Reef Encounter 43, 31(1): 20-26.

Emiliani, C., J.H. Husdon, E.A. Shinn and R.Y. George (1978). Oxygen and carbon isotopic growth recorded in a reef coral from the Florida Keys and a deep-sea coral from Blake Plateau, Science, 202: 627-629.

EPA (1979). Handbook for analytical quality control in water and wastewater laboratories, US EPA-600/4-79-019.

Eppley, R.W., E.H. Renger and P.M. Williams (1976). Chlorine reactions with seawater constituents and the inhibition of photosynthesis of natural marine phytoplankton, Estuar. Coast. Mar. Sci., 4: 147 - 161.

Epstein S., R. Buchsbaum, H.A. Lowenstam, and H.C. Urey (1953). Revised carbonate-water isotopic temperature scale, Bull. Geol. Soc. Am., 64: 1315-1326.

Evans, M.S., G.J. Warren, and D.I. Page (1986). The Effects of Power Plant Passage on Zooplankton Morta lities: Eight Years of Study at the Donald C. CookNuclear Plant, Wat. Res., 20 (6): 725-734.

Fairbanks, R.G. and R.E. Dodge (1979). Annual periodicity of the $^{18}O^{16}O$ and $^{13}C^{12}C$ ratios in the coral Montastrea annualaris, Geochim. Cosmochim. Acta, 43(7): 1009-1020.

Fairbanks, R.G. and R.K. Matthews (1979). The Marine oxygen isotope record in Pleistocene coral, Barbados, West Indies. Quat. Res., 10: 181-196.

Fan, K.L. (1982). A study of water masses in Taiwan Strait, Acta Oceanogr. Taiwanica, 13: 140-153.

Fan, K.L. (1985). STD measures in the sea around Taiwan during 1977-1983, Institute of Oceanogr., National Taiwan Univ. Special Pub., 44.

Fan, K.L. (1988). The thermal effluent incident of the third nuclear power plant in outhern Taiwan, Acta Oceanogr. Taiwanica, 20: 117-125.

Fan, K.L. and C.Y. Yu (1981). A study of water masses in the seas of southernmost Taiwan, Acta Oceanogr. Taiwanica, 12: 94-111.

Fan T. Y., B. J. Wu and L.S. Fang (2009). The heterogeneity of temperature change and coral bleaching during abnormally warm summer of 2007 (in preparation).

Gomez, L.S., R.R. Hessler, D.W. Jackson, M.G. Marietta, K.L. Smith Jr., A.A. Yayanos (1981). Environmental studies data base development and data synthesis activities of the US Subseabed Disposal Program. Impacts of Radionuclide Releases into the Marine Environment, 607-628.

Goreau, T.J. (1977). Carbon metabolism in calcifying and photosynthetic organisms: theoretical models based on stable isotope data, Proc. 3rd Int. Coral Reef Symp., Miami, 2: 395-401.

Gouezo, M., D. Olsudong, K. Fabricius, P. Harrison, Yi. Golbuu, and C. Doropoulos (2020). Relative roles of biological and physical processes influencing coral recruitment during the lag phase of reef community recovery, Sci. Rep., 10:2471, doi:10.1038/s41598-020-59111-2.

Hamilton, D.H. Jr., D.A. Flemer and C.W. Keefe (1976). Power plants: Effect of chlorination on estuarine primary production, Science, 169: 197-198.

Hsu, S.-C., C.-A. Huh, C.-Y. Chan, S.-H. Lin, F.-J. Lin and S.-C. Liu (2012) Hemispheric dispersion of radioactive plume laced with fission nuclides from the Fukushima nuclear event. Geophys. Res. Lett. 39, L00G22, doi: 10.1029/2011GL049986.

Huang, J.T., Y.C. Kuo and C.C. Huang (2002). The environmental radiation monitoring around the Maanshan Nuclear Power Plant in Taiwan, in Marine Environment: The past, present and future, ed. C.T.A. Chen, The Fuwen Press, Kaohsiung , 433-447.

Hudson, J.H., E.A. Shinn, R.B. Halley and B. Lidz (1976). Sclerochronology: a tool for interpreting past environments, Geology, 4: 361-364.

Hughes, T. P., J.T. Kerry, A.H. Baird, S.R. Connolly, T.J. Chase, A. Dietzel, T. Hill, A.S. Hoey, M.O. Hoogenboom, M. Jacobson, A. Kerswell, , J.S. Madin, A. Mieog, A.S. Paley, M.S. Pratchett, ,G. Torda and R.M. Woods (2019). Global warming impairs stock–recruitment dynamics of corals. Nature, 568:387-390.

Huh, C.-A., S.-C. Hsu and C.-Y. Lin (2012). Fukushima-derived fission nuclides monitored around Taiwan: Free tropospheric versus boundary layer transport. Earth Planet. Sci. Lett., 319-320: 9-14, doi:10.1016/j.epsl.2011.12.004.

Huh, C.-A., C.-Y. Lin and S.-C. Hsu (2013). Regional dispersal of Fukushima-derived fission nuclides by East Asia monsoon: A synthesis and review. Aerosol and Air Quality Research (in press).

Huh, H.T. (1980). Effects of thermal effluents on marine biota in coastal waters of Korea, Acta Ocean. Tai., 11: 1-9.

IAEA (2003). Determining the suitability of Materials for Disposal at Sea under the London Convention 1972: A Radiological Assessment Procedure (IAEA-TECDOC-1375), 62pp.

IPCC (2014). Fifth Assessment Report.

IPCC (2021). AR6 Climate Change 2021: Impacts, Adaptation and Vulnerability.

Jan, S. and C.T.A. Chen (2009). Potential biogeochemical effects from vigorous internal tides generated in Luzon Strait: A case study at the southernmost coast of Taiwan, Journal of Geophysical Research, 114, C04021, doi:10.1029/2008JC004887.

Jan, R.Q., C.F. Dai and K.H. Chang (1994). Monitoring of hard substrate communities. In:K. J. M. Kramer (ed.), Biomonitoring of Coastal Waters and Estuaries. CRC Press, Boca raton, Florida, 285-307.

Jan, S., C.T.A. Chen, Y.Y. Tu and H.S. Tsai (2004). Physical properties of thermal plumes from a Nuclear Power Plant in the Southernmost Taiwan, Journal of Marine Science and Technology, 12 (5): 433-441.

Jiang, Z.P., J.C. Huang, M. Dai, S.J. Kao, D.J. Hydes, W.C. Chou and S. Jan (2011). Short-term dynamics of oxygen and carbon in productive nearshore shallow seawater systems off Taiwan: Observations and modeling, Limnology and Oceanography, 56(5): 1832-1849.

Jin, Q.H. and H. Wang (2011). Multitime scale variations of sea surface temperature in the China seas based on the HadISST dataset. Acta Oceanologica Sinica, 30 (4): 14-23, doi: 10.1007/s13131-011-0129-0.

Jokiel, P.L. and S.L. Coles (1974). Effects of heated effluent on hermatypic corals at Kahe Point, Oahu. Pacific Science, 28: 1-18.

Jones, R.S., R.H. Randall and M.J. Wilder (1976). Biological impact caused by changes on a tropical reef. U.S. Environmental Protection Angency, Ecological Research Series, EPA-600/3-76-027, 209 pp.

Kimura, T., Dai, C.F., Pae, S., Huang, H., Ang, P.O., Jong, G.J. and Choyce, C. (2004). “Status of coral reefs in easy and north Asia: China, Hong Kong, Taiwan, Korea and Japan”, In: Wilkinson, C. (ed), “Status of Coral Reefs of the World: 2004”, p. 277-301, Australian Institute of Marine Science, Townsville, Queensland, Australia.

Knutson, D.W., R.W. Buddemeier, and S.V. Smith (1972). Coral chronometers: seasonal growth bands in reef corals, Science, 177: 270-272.

Landry, M.R. (1975). Seasonal temperature effects and predicting development rants of marine copepod eggs, Limnol. Oceanog., 20: 434.

Laws, E.A. (1981). Aquatic pollution, New York, 247-280.

Lee, H.-J., S.-Y. Chao, K.-L. Fan (1998). Flood-ebb disparity of tidally induced recirculation eddies in a semi-enclosed basin: Nan Wan Bay, Institute of Oceanography, National Taiwan University.

Lee, H.-J., S.-Y. Chao, K.-L. Fan and N.-K. Liang (1999a). Flood-ebb disparity of tidally induced recirculation eddies in a semi-enclosed basin: Nan Wan Bay. *Continental Shelf Research*, 19: 871-890.

Lee, H.-J., S.Y. Chao, K.L. Fan and T.Y. Kuo (1999b). Tide-induced eddies and pwelling in a semi-enclosed basin: Nan Wan. Estuarine, Coastal and Shelf Sci., 49: 775-787.

Lee, H.-J., S.-Y. Chao, K.-L. Fan, Y.-H. Wang and N.-K. Liang (1997). Tidally induced upwelling in a semi-enclosed basin: Nan Wan Bay. *Journal of Oceanography*, 53: 467-480.

Li, T., Liu, S., Huang, L., Huang, H., Lian, J., Yan, Y., & Lin, S. (2011). Diatom to dinoflagellate shift in the summer phytoplankton community in a bay impacted by nuclear power plant thermal effluent. Marine Ecology Progress Series, 424: 75-85.

Li, W-S and A. Zharkikh (1994). What is the Bootstrap Technique?, Syst. Biol., 43 (3): 424-430.

Lien, R.C., C.T.A. Chen, I.H. Lee and W.D. Liang (2004). 2004年海洋科學成果發表會文摘要, p.22.

Liu, P.-J., P.-J. Meng, L.-L. Liu, J.-T. Wang and M.-Y. Leu (2012). Impacts of human activities on coral reef ecosystems of southern Taiwan: A long-term study, Mar. Pollut. Bull., 64: 1129-1135.

Liu, P.-J., M.-C. Hsin, C.-C. Lu, Y.-H. Huang, T.-Y. Fan, P.-J. Meng, H.-J. Lin (2015). Nutrient enrichment coupled with sedimentation favors sea anemones over corals, PLoS ONE, 10(4):e0125175. doi:10.1371/journal.pone.0125175.

Logan, D.T. and D. Maurer (1975). Diversity of marine invertebrates in a thermal effluent, J. Water Poll. Control Fed., 47: 515.

Lovergrove, T. (1962). The effect of various factors on dry weight values, Rapp. P. V. Reun. Cons. Perm. Int. Explor. Met, 153: 86-91.

Lui, H.K. and C.T.A. Chen (2011). Shifts in limiting nutrients in an estuary caused by mixing and biological activity. Limnology and Oceanography, 56 (3): 989-998, doi: 10.4319/lo.2011.56.3.0989.

Lui, H.K., C.T.A. Chen, W.P. Hou, J.M. Liau, W.C. Chou, Y.L. Wang, C.R. Wu, J. Lee, Y.C. Hsin and Y.Y. Choi (2020). Intrusion of Kuroshio helps to diminish coastal hypoxia in the coast of northern South China Sea, Frontiers in Marine Science, 7:565952.

Mathur, D., T.W. Robbins and E.J. Purdy Jr. (1980). Assessment of Thermal Discharges on Zooplanktom in Conowingo Pond, Pennsylvania. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 7: 937-944.

Marumo, R. and O. Asaoka. (1974). Distribution of pelagic blue-green algae in the north Pacific Ocean, Journal of the Oceanographical Society of Japan, 30: 77-85.

Mazzotti, F.J. (1983). The ecology of crocodylus acutus in Florida, Ph. D. Dissertation, Penn. Stat. Univ., 161 pp.

McConnaughey, T.A. (1989a). 13C and 18O isotopic disequilibria in biological carbonates, I, Patterns. Geochim. Cosmochim. Acta, 53: 151-162.

McConnaughey, T.A. (1989b). 13C and 18O isotopic disequilibria in biological arbonates, II, in vitro simulation of kinetic isotope effects, Geochim. Cosmochim. Acta., 53: 163-171.

Michel, J., W.S. Moore and P.T. King (1981). Gamma x-ray spectrometry for determination of 228Ra and 226Ra in natural waters, Analytical Chem., 53: 1885-1889.

Mitton, J.B. and R.K. Koehn (1976). Morphological adaptation to thermal stress in a marine fish, Fundulus heteroclitus. Biol. Bull., 151: 548-559.

Murray, J.W., J.N. Downs, S. Strom, C.L. Wei, H.W. Jannasch (1989). Nutrient assimilation, export production and 234Th scavenging in the eastern equatorial Pacific, Deep Sea Research, 36: 1471-1489.

Nevo, E., T. Shimony and M. Libni (1977). Thermal selection of allozyme polymorphisms in barnacles, Nature, 267: 699-700.

Newman, M., M.A. Alexander, T.R. Ault, K.M. Cobb, C. Deser, E. di Lorenzo, N.J. Mantua, A.J. Miller, S. Minobe, H. Nakamura, N. Schneider, D.J. Vimont, A.S. Phillips, J.D. Scott and C.A. Smith (2016). The Pacific decadal oscillation, revisited. J. Clim., 29(12):4399-4427.

Nozaki Y., D.M. Rye, K.K. Turekian and R.E. Dodge (1978). A 200 year record of carbon-13 and carbon-14 variations in a Bermuda coral, Geophys. Res. Lett., 5: 815-828.

Okamoto, K. (1980). Contamination of seafood by radioactivity produced from burning of coal and other fossil fuels, *In* "Radiation effects on aquatic organisms, N. Egani (ed.), Japanese Scientific Societies Press, Tokyo, 45-48.

Omori, M and T. Ikeda (1984). Methods in marine zooplankton ecology, John Wiley & Sons, New York, Chichester, 332 pp.

Osterberg, C.L. (1985). Nuclear power wastes and the ocean, *in* Wastes in the Ocean, eds. I.W. Duedall, D.R. Kester, P.K. Park and B.H. Ketchum, Wiley Interscience, 4: 127-162.

Pai, S. C., G. C. Gong and K. K. Liu (1993). Determination of dissolved oxygen in sea-water by direct spectrophotometry of total iodine, Marine Chemistry, 41: 343-351.

Patzold, J. (1984). Growth rhythms recorded in stable isotopes and density bands in the reef coral *Porites lobata* (Cuba, Philippines), Coral Reefs, 3: 87-90.

Perissinotto, R. and T. Wooldridge (1989). Short-term thermal effects of a power generating plant on zooplankton in the Swartkops Estuary, South Africa. Mar. Ecol., 10: 205 -219.

Pineda, J., D. Riebensahm and D. Medeiros-Bergen (2002). Semibalanus balanoidesin winter and spring: larval concentration, settlement, and substrate occupancy, Mar. biol., 140: 789–800.

Pineda, J., F. Porri, V. Starczak, J. Blythe (2010). Causes of decoupling between larval supply and settlement and consequences for understanding recruitment and population connectivity, J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 392: 9-21.

Pisapia, C., D. Burn, M.S. Pratchett (2019). Changes in the population and community structure of corals during recent disturbances (February 2016-October 2017) on Maldivian coral reefs. *Scientific Reports*, 9:8402 | https://doi.org/10.1038/s41598-019-44809-9

Raymont, J. E. G. (1983). Plankton and Productivity in the Ocean, Vol. . Zooplankton, Ⅱ Pergamon Press, Oxford, New York, 824 pp.

Redfield, A. C., B.H. Ketchum and F.A. Richards (1963). The influence of organisms on the composition of seawater, in the Sea, V.2, M.H. Hill (ed), Interscience, New York, 26-77.

Roessler, M.A. and J.C. Zieman (1969). The effects of thermal additions on the biota of southern Biscayne Bay, Florida. Proc. Gulf Caribb. Fish. Inst., 22: 136-145.

Sanders, B.M., C. Hope, V.M. Pascoe and L.S. Martin (1991). Characterization of the stress protein response in two species of Collisella Limpets with different temperature tolerances., Physiol. Zool., 64: 1471-1489.

Safaie, A. N.J. Silbiger, T.R. McClanahan, G. Pawlak, D.J. Barshis, J.L. Hench, J.S. Rogers, G.J. Williams and K.A. Davis (2018). High frequency temperature variability reduces the risk of coral bleaching, Nat. Commun., 9:1671.

Saptarini, D., Mukhtasor and I.F.M. Rumengan (2017). Growth rate of two species branched Acropora in the area of discharged power plant cooling water, Indian J. Geomarine Sci., 46(07): 1327-1332.

Schmidt, T. W. and G. E. Davis (1978). A summary of estuarine and marine water quality information collected in Everglades National Park, Biscayne Naional Monument , and adjacent esturaries from 1879 ~ 1977. Rep. T-519, US Nat. Park Ser., Everglades Nat. Park, Homestead, F1. 59 pp.

Seitz, S., P. Spitzer and R.J.C. Brown (2009). CCQM-P111 study on traceable determination of practical salinity and mass fraction of major seawater components, Accred. Qual. Assur., doi: 10.1007/s00769-009-0578-8.

Shaw, P.-T. 1989. The intrusion of water masses into the sea southwest of Taiwan, Journal of Geophysical Research, 94: 18,213-18,226.

Shen, G.T., J.E. Cole, D.W. Lea, L.J. Linn, T.A. McConnaughey and R.G. Fairbanks (1992). Surface ocean variability at Galapagos from 1936-1982: Calibration of geochemical tracers in corals, Paleoceanology, 7: 563-583.

Shen, S.C. (1984). Coastal fishes of Taiwan. Taiwan Mus., 189 pp, 152pls.

Smith, M.M and P.C. Heemstrs (1986). Smiths' Sea Fishes. J.L.B. Smith Inst. Icht., Grahamstown, South Africa, xx+1047 pp. 144pls.

Sponaugle, S., R.K. Cowen, A. Shanks, S.G. Morgan, J. M. Leis, J. Pineda, G. W. Boehlert,M. J. Kingsford, K. C. Lindeman,C. Grimes and J. L. Munro (2002). Predicting self-recruitment in marine populations: biophysical correlates and mechanisms, Bull. Mar. Sci., 70:S341−S375.

Swart, P.K. (1983). Carbon and oxygen isotope fractionation in scleractinian corals: a review, Earth Science Reviews, 19: 51-80.

Trenberth, K.E. (1997). The definition of El Nino, Bulletin of the American Meteorological Society, 78 (12): 2771-2778.

U.N. (1982). United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, Ionizing Radiation: sources and biological effects, U.N., New York, 773 pp.

USEPA (1989). Economic assessment, environmental impact statement, NESHAPS for radionuclides, background information, 3: 250 pp.

USEPA (1991). Effects of radiation on aquatic organisms and radiobiological methodologies for effect assessment, 128 pp.

Wang, Y.S., H.L. Wang, B.G. Mitchell, S. Sun, C.C. Sun, M.L. Wu, M. Kahru, Q.P. Li and C.Q. Chen (2011). Human effects on China coastal ecosystems – a case study of Daya Bay. LOICZ Open Science Conference, 2011, Yanti, pp. 175.

Watanabe, W.O., D.H. Ernst, M.P. Chasar, R.I. Wicklund and B.L. Olla (1993). The effects of temperature and salinity on growth and feed utilization of juvenile, sex-reversed male Florida red tilapia cultured in a recirculation, Aquaculture, 112: 309-320.

Weber, J.N. and P.M.J. Woodhead (1970). Carbon and oxygen isotope fractionation in the skeletal carbonate of reef building corals, Chem. Geol., 6: 93-117.

Weber, J.N. and P.M.J. Woodhead (1972). Temperature dependence of oxygen-18 concentration in reef coral carbonates, J. Geophys Res., 77: 463-473.

Wei, C.L. and G.T.F. Wong (1993). Assessing radioactive contamination of the marine environment of Taiwan by the operation of nuclear power plants: a framework for action, Nuc. Sci. J., 30 (4): 259-284.

Wu, C.R., 2013, Interannual modulation of the Pacific Decadal Oscillation (PDO) on the low-latitude western North Pacific, Progress in Oceanography, 110: 49-58.

Wu, C.R., H.F. Lu and S.Y. Chao (2008). A numerical study on the formation of upwelling off northeast Taiwan, J. Geophys. Res., 113:C08025.

Wu, S.S. (2002). Ecological survey around unclear power station, in Marine Environment: The past, present and future, ed. C.T.A. Chen, The Fuwen Press, Kaohsiung, 408-414.

Yang, Y. J., and T. Y. Tang (1995). Variability of current and temperature in the coastal region of Hsin-Chu. Proc. 17th Conf. on Ocean Engineering in R. O. C., 1491-1504.

Yangagi, T., S. I. Sachoemar, T. Takao and S. Fujiwara (2001). Seasonal variation of stratification in the Gulf of Thailand, J. Oceanography, 57：461-470.

Yonge, C.M. (1963). The biology of coral reefs. Adv. Mar. Biol., 1：209-260.

山路勇 (1984)。日本海洋プランクトン圖鑑，第3版。保育社，大阪，日本，537頁。

仇德忠、黃羽庭、曾流明、郭忠信 (1985)。南海海區綜合調查研究報告(二)，中國科學南海海洋研究所編輯，科學出版社，北平。

內田惠太郎、今井貞彥、水戶敏、藤田矢郎、上野雅正、庄島洋一、千田哲資、田福正治、道津喜衛 (1958), 日本產魚類の稚魚期の研究，第1集，九州大學農學部水產學弟二教室，Plate 86，88頁。

王冑、陳慶生 (1987)。南海北部之暖心渦流(一)對南海暖渦之初步觀測，臺灣大學海洋學刊。

王冑、陳慶生 (1987)。南海北部之暖心渦流(二)關於南海暖渦之生成與發展一個簡單的動力機制，臺灣大學海洋學刊。

王彰貴、蔡怡、張麗 (1998)。1997/98年厄爾尼諾特徵及97年氣候異常，海洋預報，15：124-131。

王立雪 (2022)。來自海洋的警訊 阻止熱浪侵襲帶來的珊瑚白化危機。科學月刊，634期。https://www.scimonth.com.tw/archives/5986。

交通部中央氣象局 (2002)。中華民國92年潮汐表，共226頁。

朱祖佑 (1963)。臺灣近海之海洋狀況，臺灣大學漁業生物試驗所研究報告，1(4)：29-44。

江永棉、王瑋龍 (1987)。核能發電廠溫排水對國家公園海域海藻生態影響之研究。內政部營建署，保育研究報告，44：1-5。

池田知司、水戶敏 (1987)。卵と孵化仔魚の檢索。In：沖山宗雄編，日本產仔稚魚圖鑑，東海大學出版會，999-1119。

何麗如、陳鎮東 (1993)。核能廢料與海洋 (下)，漁業推廣工作專刊，第9期，39-47。

余進利、劉景毅、詹森、高樹基、黃煌煇、高瑞棋 1999。臺電核能發電廠溫排水監測計畫報告 (87年9月至88年8月)，成功大學水工試驗所研究試驗報告第228號。

余進利、劉景毅、詹森、高樹基、黃煌煇、高瑞棋 1998。臺電核能發電廠溫排水監測計畫報告 (86年10月至87年8月)，成功大學水工試驗所研究試驗報告第219號。

余進利，劉景毅，詹森，高樹基，賴志峰劉正琪 2001。臺電核能發電廠溫排水監測計畫報告(88年8月至89年12月)，成功大學水工試驗所研究試驗報告第245號。

吳金鎮 (1989)。大溪近海小型拖網漁業之經濟分析，國立臺灣海洋大學漁業研究所碩士論文。

呂朝城 (1995)。希巴辣測氧法在初級生產力測定上的應用，國立臺灣海洋大學海洋研究所碩士論文，共78頁。

吳德榮(2016)。颱風增強與海洋熱含量之關係，http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/393-2016-08-02-08-25-31.

李忠潘、楊磊、李宗霖、薛憲文、陳陽益、李賢華、劉金源 (1995)。高屏溪東港溪及南灣附近海域水水質監測計畫屏東縣環保局委託計畫期末報告，共237頁。

李錦珍 (1989)。發電廠對環境及漁業資源之影響─美國南加州沿岸電廠實例報告，電力與漁業資源論文專輯，215-245。

杜濤、吳巍、方欣華 (2001)。海洋內波的產生與分布，海洋科學，25 (4)：25-28。

沈世傑 (1993)。臺灣魚類誌，國立臺灣大學動物系，臺灣，960頁。

邢麗玉 (2004)。臺灣海峽溶解有機氮、磷及營養鹽消耗程度分佈情形，國立中山大學海洋地質及化學研究所碩士論文，共142頁。

林永富、吳朝榮 (2013)。黑潮入侵東海之研究，第35 屆海洋工程研討會論文集，國立中山大學

林素貞 (1988)。核能電廠計畫環境影響評審導論與應用，科技圖書公司。

林勝豐 (1988)。臺灣西南海域之水團分析及演替，台大海研所碩士論文。

松原喜代松 (1995)。魚類形態檢索，Part I-III 長崎書店，東京。

邵廣昭、陳正平、沈世傑 (1993)。墾丁國家公園海域魚類圖鑑，內政部營建署墾丁國家公園管理處，中華民國，427頁。

邱萬敦、鄭利榮、歐錫祺 (1993)。臺灣南部三廠排放口附近海域溫排水擴散與潮流之關連研究。臺灣省水產學會刊，第20(3)：207-220。

阿部宗明 (1987)。原色魚類大圖鑑，北隆館，東京，1-46~1-1029。

姚南瑜、安立佳、康曉慧、張英鋒、蔡淑頻 (1985)。III.潮間帶底棲紅藻在不同海水濃度條件下的光合作用，近海底棲藻類對介質滲透壓變化的適應研究，海洋與湖沼，16 (4)：311-315。

洪楚璋、江永棉、譚天錫、張崑雄、邵廣昭、黃哲崇、朱鐵吉、范光龍、葉顯亞 (1992)。臺灣南部核能電廠附近海域之生態研究，ⅩⅢ，第13年 (80年7月至81年6月) 執行報告，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第89號，141頁。

洪楚璋、江永棉、譚天錫、張崑雄、邵廣昭、黃哲崇、朱鐵吉、范光龍、葉顯亞 (1993)。臺灣南部核能電廠附近海域之生態研究，ⅩⅣ，第14年 (81年7月至82年6月) 執行報告，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第94號，136頁。

洪楚璋、陳汝勤、黃穰、譚天錫、范光龍、蘇仲卿、林友明 (1990)。蘭嶼貯存場附近海域生態環境之調查研究，Ⅶ，第7年 (78年7月至79年6月)執行報告及貯存場設施對生態環境之初步評估報告，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第77號，146頁。

洪楚璋、陳汝勤、黃穰、譚天錫、范光龍、林友明 (1991)。蘭嶼貯存場附近海域生態環境之調查研究，Ⅷ，第8年 (79年7月至80年6月)執行報告，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第82號，66頁。

洪楚璋、陳汝勤、黃穰、譚天錫、范光龍、朱鐵吉 (1992)。蘭嶼貯存場附近海域生態環境之調查研究，IX，第9年 (80年7月至81年6月)執行報告及電廠運轉對生態環境之初步評估報告 (民國68年7月至77年6月)，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第90號，55頁。

洪楚璋、陳汝勤、黃穰、譚天錫、朱鐵吉 (1993)。蘭嶼貯存場附近海域生態環境之調查研究，X，第10年 (81年7月至82年6月) 執行報告，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第93號，51頁。

洪楚璋 (2011)。「台灣北部及南部核能電廠附近海域調查研究計劃」報告，綠能及綠色化學電子月刊第10號，7-11。

益田一等5位 (1984)。日本產魚類大圖鑑，3卷，東海大學會出版，東京。

秦韶生 (1985)。本省單艘式大型鏗、鮪圍網漁業經濟效益研究，國立臺灣海洋大學漁業研究所碩士論文。

張仁齊、陸穗芬、越傳綑、陳蓮芳、臧增嘉、姜言傳 (1985)，中國近海魚卵與仔魚，上海科學技術出版社，206頁。

張春明 (1991)。海洋監測規範，共766頁。

張晏嘉 (1995)。臺灣地區遠洋鮪釣漁業生產成本之分析，國立臺灣地區海洋大學漁業經濟研究所碩士論文。

張崑雄、邵廣昭 (1986)。墾丁國家公園海域珊瑚礁及海洋生物生態研究－魚類群聚之調查研究，內政部營建署墾丁國家公園管理處，85頁。

張崑雄、陳孟仙、羅文增 (1986)。墾丁國家公園海域珊湖礁及海洋生物生態研究—海域之動物性浮游動物調查研究(續)，內政部營建署保育研究報告第34號之5，78頁。

張崑雄、陳孟仙、羅文增 (1987)。墾丁國家公園海域珊湖礁及海洋生物生態研究—海域之動物性浮游動物調查研究(續)，內政部營建署保育研究報告第42號之3，71頁。

張崑雄、戴昌鳳 (1987)。墾丁國家公園海域珊瑚礁及海洋生物生態研究-海域珊瑚類的分佈及群聚生態學之研究，內政部營建署，保育研究報告第42號之4，1-77。

張崑雄等 (1985)。墾丁國家公園海域珊湖礁及海洋生物生態研究調查報告(一)，內政部營建署保育研究報告第19號，304頁。

梁乃匡、連三郎、陳維宗、張湘電 (1978)。馬鞍山附近海域海洋水文調查報告，台大海研所專刊第18號。

梁文德 (2002)。南海上層海溫及海流變化之研究，國立臺灣大學海洋研究所博士論文，共127頁。

莊文思、劉康克、魏慶琳、邵廣昭、陳章波、黃天福、趙慎餘 (1993)。核能電廠附近海域生態環境調查之策略，行政院原子能委員會，30頁。

莊文傑、江權中 (2002)。潮流與台灣環島沿岸之水下沙體。第二十四屆海洋工程研討會論文集，p.579-586。

陳孟仙、羅文增、蘇德強、唐玉佩 (1992)。苗栗縣通霄鎮附近海域生態調查研究(四)，第六章浮游動物調查，國立中山大學海洋科學研究中心，民國81年4月，175-208。

陳孟仙、蘇德強 (1993)。苗栗縣通霄鎮附近海域生態調查研究(五)，第六章浮游動物調查，國立中山大學海洋科學研究中心，民國82年4月，169-200。

陳孟仙、鐘春玲、蘇德強 (1994)。苗栗縣通霄鎮附近海域生態調查研究(六)，第六章浮游動物調查，國立中山大學海洋科學研究中心，民國83年4月，205-238。

陳兼善、于名振 (1986)。臺灣脊椎動物誌，上、中冊，臺灣商務印書館，台北，1-1092。

陳智蘊 (1994)。珊瑚鍶鈣比及氧同位素值古海水表面溫度計的建立，台大地質學研究所碩士論文，44頁。

陳靜生主編 (1992)。第2章－天然水主要離子化學，水環境化學，曉園出版社，台北，403頁。

陳鎮東 (1993)。救救海洋，時報出版社，109頁。

陳鎮東、鍾玉嘉 (1989)。中華民國海洋科技研究重點芻議，行政院科技顧問組，537頁。

陳鎮東、鍾玉嘉 (1994)。蘭嶼貯存場附近海域生態環境之調查研究，海洋地質研究所研究報告第19 號，43頁。

陳鎮東、鍾玉嘉 (1995)。蘭嶼貯存場附近海域生態環境之調查研究，海洋地質研究所研究報告第23 號，43頁。

陳鎮東、高承志、陳孟仙、柳芝蓮 (1994) ，雲林縣離島式基礎工業區整體開發規劃調查分析 (三)。第六章海域生態調查，國立成功大學台南水工試驗所，民國83年6月，第5冊，6-16~6-155。

陳鎮東、高承志、陳孟仙 (1995)。雲林縣離島式基礎工業區整體開發規劃調查分析 (四)，第六章海域生態調查，國立成功大學台南水工試驗所，民國84年6月，第6冊。6-1~6-230。

陳鎮東、高承志、陳孟仙 (1996)。雲林縣離島式基礎工業區整體開發規劃調查分析 (五)，第1部分現場調查，第5冊海域生態調查，國立成功大學台南水工試驗所，民國85年6月，79-166。

陳鎮東、高承志、陳孟仙 (1997)。雲林縣離島式基礎工業區整體開發規劃調查分析 (六)，第1部分現場調查，第7冊海域生態調查，國立成功大學台南水工試驗所，民國86年6月，73-145。

陳鎮東、高承志、陳孟仙 (1998)。雲林縣離島式基礎工業區整體開發規劃調查分析 (七)，第1部分現場調查，第6冊海域生態調查，國立成功大學台南水工試驗所，民國87年6月，73-153。

陳鎮東、郭景聖、王冰潔(1991a)。水質樣品採樣及實驗室品保／品管試用標準操作手冊，漁業推廣工作專刊第5號，132頁。

陳鎮東、王冰潔、徐慧倩 (1991b)。墾丁國家公園沿岸、溪流水質監測，國家公園學報，3: 99-106。

陳鎮東、陳孟仙、鍾玉嘉、劉莉蓮等 (1998)。臺灣南部核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域生態調查，第三章動物及植物性浮游生物，3-1~3-6。

陳鎮東，黃明祥，王樹倫，郭景聖，鄭莉伶，王冰潔 (1993a)。海研一號257、262航次初步報告：79年10-11月於菲律賓，國立中山大學海洋地質所研究報告第13號，132頁。

陳鎮東，黃明祥，王樹倫，郭景聖，王綺華 (1993b)。海研一號266、287航次碳酸鹽數據初步報告，國立中山大學海洋地質所研究報告第14號，65頁。

陳鎮東，黃明祥，王樹倫，張雷風 (1993c)。海研一號316航次碳酸鹽及懸浮顆粒數據初步報告，國立中山大學海洋地質所研究報告第15號，52頁。

陳鎮東、黃明祥、王樹倫 (1995)。海研一號369及387航次初步報告，國立中山大學海洋地質所研究報告第22號，69頁。

陳鎮東、黃明祥、王樹倫 (1996)。海研一號403及418B航次初步報告，國立中山大學海洋地質所研究報告第25號，199頁。

陳鎮東、王樹倫、王冰潔、林祐邦、李福祥、蕭立銘、陳麗貞 (1997)。海研一號433、434及462航次初步報告，國立中山大學海洋地質及化學研究所報告第32號，137頁。

陳鎮東、方力行、張崑雄、周一成、黃將修 (1987)。近年來珊瑚體內重金屬及放射性元素之逐年變化，海洋科學學術研討會論文集，國科會研討會專刊第十集，141-147。

陳鎮東、吳重坤、陳孟仙、劉莉蓮、歐錫祺、鄭利榮、鍾玉嘉 (1997)。臺灣南部核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域生態調查，臺灣電力公司環境保護處調查報告。

陳鎮東、吳重坤、沈建全、陳孟仙、劉莉蓮、歐錫祺、鄭利榮、鍾玉嘉 (1998)。臺灣南部核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域生態調查，臺灣電力公司環境保護處調查報告。

陳鎮東、沈建全、王樹倫、陳孟仙、劉莉蓮、歐錫祺、鄭利榮、鍾玉嘉 (1999)。臺灣南部核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域生態調查，臺灣電力公司調查報告。

陳鎮東、沈建全、王樹倫、陳孟仙、劉莉蓮、歐錫祺、鄭利榮、鍾玉嘉 (2000)。臺灣南部核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域生態調查，臺灣電力公司調查報告。

陳鎮東、沈建全、陳孟仙、劉莉蓮、黃榮富、鄭利榮、鍾玉嘉 (2001)。南部核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查，臺灣電力股份有限公司調查報告。

陳鎮東、沈建全、陳孟仙、劉莉蓮、黃榮富、鄭利榮、鍾玉嘉 (2002)。南部核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查，臺灣電力股份有限公司調查報告。

陳鎮東、詹森、陳孟仙、劉莉蓮、黃榮富、鄭利榮、鍾玉嘉 (2003)。第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查，臺灣電力股份有限公司調查報告。

陳鎮東、詹森、陳孟仙、劉莉蓮、黃榮富、鄭利榮、鍾玉嘉 (2004)。第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查，臺灣電力股份有限公司調查報告。

陳鎮東、詹森、陳孟仙、劉莉蓮、黃榮富、鄭利榮、扈治安 (2005)。第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查，臺灣電力股份有限公司調查報告。

陳鎮東、詹森、陳孟仙、劉莉蓮、黃榮富、鄭利榮、扈治安 (2006)。第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查，臺灣電力股份有限公司調查報告。

陳鎮東、詹森、陳孟仙、劉莉蓮、黃榮富、鄭利榮、扈治安 (2007)。第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查，臺灣電力股份有限公司調查報告。

陳鎮東、詹森、陳孟仙、劉莉蓮、黃榮富、鄭利榮、扈治安 (2008)。第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查，臺灣電力股份有限公司調查報告。

陳鎮東、詹森、陳孟仙、劉莉蓮、黃榮富、鄭利榮、扈治安 (2009)。第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查，臺灣電力股份有限公司調查報告。

陳鎮東、詹森、陳孟仙、劉莉蓮、黃榮富、鄭利榮、扈治安 (2010)。第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查，臺灣電力股份有限公司調查報告。

陳鎮東、詹森、陳孟仙、劉莉蓮、黃榮富、扈治安 (2011)。第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查，臺灣電力股份有限公司調查報告。

陳鎮東、詹森、陳孟仙、劉莉蓮、黃榮富、扈治安 (2012)。第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查，臺灣電力股份有限公司調查報告。

陳鎮東、詹森、陳孟仙、劉莉蓮、黃榮富、楊穎堅 (2013)。第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查，臺灣電力股份有限公司調查報告。

陳鎮東、詹森、陳孟仙、劉莉蓮、黃榮富、楊穎堅 (2014)。第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查，臺灣電力股份有限公司調查報告。

陳鎮東、詹森、陳孟仙、劉莉蓮、黃榮富、楊穎堅 (2015)。第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查，臺灣電力股份有限公司調查報告。

陳鎮東、詹森、陳孟仙、劉莉蓮、黃榮富、楊穎堅 (2016)。第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查，臺灣電力股份有限公司調查報告。

陳鎮東、詹森、陳孟仙、劉莉蓮、黃榮富、楊穎堅 (2017)。第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查，臺灣電力股份有限公司調查報告。

陳鎮東、詹森、陳孟仙、劉莉蓮、黃榮富、楊穎堅 (2018)。第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查，臺灣電力股份有限公司調查報告。

陳鎮東、詹森、陳孟仙、劉莉蓮、黃榮富、楊穎堅 (2019)。第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查，臺灣電力股份有限公司調查報告。

陳鎮東、詹森、陳孟仙、劉莉蓮、黃榮富、楊穎堅 (2020)。第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查，臺灣電力股份有限公司調查報告。

陳鎮東、詹森、蔡顯修、溫桓正、陳孟仙、劉莉蓮 (2018)。南灣水質之長期變化，台電工程月刊，836，89-95。

陳鎮東、劉莉蓮、歐錫祺、鍾玉嘉、吳重坤、鄭利榮 (1994)。臺灣南部核能電廠附近海域生態研究，海洋地質研究所研究報告第20 號，195頁。

陳鎮東、劉莉蓮、歐錫祺、鍾玉嘉、吳重坤、鄭利榮 (1995)。臺灣南部核能電廠附近海域生態研究，海洋地質研究所研究報告第24 號，212頁。

陳鎮東、劉莉蓮、歐錫祺、鍾玉嘉、吳重坤、鄭利榮 (1996)。臺灣南部核能電廠附近海域之生態研究，海洋地質研究所研究報告第28 號，190頁。

陳鎮東，劉源隆，溫桓正，王冰潔 (2020)。蘭嶼(低放)貯存場附近海域之水文及水質化學，台電工程月刊，862，104-110。

湯麟武、黃煌煇(1979)。台灣電力公司核能三廠出水口增建導流堤以改善熱污染擴散研究試驗報告，國立成功大學台南水工試驗所研究試驗報告第四十二號，157 頁。

傅鑫寶 (1991)。潮流及落山風對南灣近岸水溫的效應，台大海研所碩士論文。

程文田 (1994)。臺灣遠洋鮪釣漁業生產效率及其影響因素之研究。國立臺灣海洋大學漁業經濟研究所碩士論文。

黃宗國 (1994)。中國海洋生物種類與分布，海洋出版社，北京，764頁。

黃哲崇 (1988)。澎湖內灣橈腳動物現存量及生產量之研究，ACTA Oceano-graphica Taiwanica，20：53-63。

黃哲崇、洪楚璋、范光龍(1991)。臺灣南部核三廠出水口附近淺灣非生物因子對珊瑚之影響，臺灣大學海洋學刊，26：20-35。

黃煌煇、余進利、劉景毅、詹森、高樹基、賴志峰、劉正琪 (2002)。臺電核能發電廠溫排水監測計畫報告 (90年1月至90年12月)，成功大學水工試驗所研究試驗報告第276號。

雷漢杰 (2013)。人為與氣候驅動的海水酸化：觀測與模擬，中山大學海洋地質及化學研究所博士論文，135頁。

楊鴻嘉、陳同白 (1971)。臺灣重要食用魚介圖說，中國農村復興聯合委員會，台北。

經濟部工業局 (1996a)。雲林縣離島式基礎工業區整體開發規劃調查研究，第5年期末報告第4冊，220頁。

經濟部工業局 (1996b)。台南市城西里近岸遊憩海埔地環境背景資料調查，第2年期末報告。

詹森 (1995)。臺灣海峽流場季節變化之研究，台大海洋研究所博士論文。

詹森、陳鎮東 (2007) 。第三核能發電廠海域海流暨水溫之調查，台電工程月刊，712，76-84。

鄒燦陽 (1990)。墾丁國家公園海域生態環境監測調查報告，內政部營建署，自行研究報告為6號，140頁。

廖萩燁 (2013)。水溫與石珊瑚白化相關性之研究。國立中山大學海洋科學系碩士論文，35頁。

趙慎餘 (1996)。南灣冷水入侵的成因，中山大學海洋地質所演講。

劉倬騰、白書偵、劉康克 (1992)。世界海洋環流實驗 (WOCE) PR21測線水文探測報告，中華民國WOCE探測報告第92-1號，中華民國WOCE辦公室，台北，34頁。

劉倬騰、白書禎 (1992)。世界海洋環流實驗 (WOCE) PR 20及PR 21測線水文探測報告，中華民國WOCE探測報告第92-2號，中華民國WOCE辦公室，台北，110頁。

潘華盛 (1997)。厄爾尼紐現象赤道西太平洋、印度洋、黑潮之間海溫變化的相互關係分析，海洋通報，16，22-30。

樊同雲、方力行、林芳邦及邵廣昭 (2018)。南灣海域珊瑚礁生態系調查監測。台灣電力股份有限公司委託計畫期末報告，193 頁。

鄭重、李少菁、許振祖 (1984)。海洋浮游生物學，水產出版社，基隆，臺灣，661 頁。

閻位兵 (1995)。核電廠對周圍水體環境中生物的影響綜述。中國科學院南海研究所，大亞灣海洋生物綜合實驗站研究年報，第1期 (1991-1993)，第175.182頁。

戴昌鳳、陳永澤、郭坤銘、莊正賢 (1998)。墾丁國家公園南灣海域珊瑚群聚的變遷：1987至1997年，國家公園學報，8 (2)：79-99。

環境法令 (1998)。行政院環保署網站 (http://www.epa.gov.tw)。

繆國榮、王承祿 (1990)。海洋經濟動植物發生學圖集，青島海洋大學出版社，272頁。

鍾國南、李展榮、孟培傑、韓僑權、郭鑫沅、邱協棟、宋國士、梁乃匡、方力行、邵廣昭(2002)。墾丁國家公園海域長期生態研究－測站海底地貌及人為活動對海域生態衝擊監測之初報，國家公園學報，12(1)，52-73。

譚軍、周發琇、胡敦欣、于慎余 (1995)。南海海溫異常與ENSO的相關性，海洋與湖泊，26，377-388。

蘇仲卿、洪楚璋、江永棉、譚天錫、張崑雄、楊榮宗、鄭穎敏、范光龍、張湘電 (1980)。臺灣南部核能電廠附近海域之生態研究，Ⅰ，第1年 (68年7月至69年6月) 執行報告，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第7號，115頁。

蘇仲卿、洪楚璋、江永棉、譚天錫、張崑雄、楊榮宗、鄭穎敏、范光龍、張湘電 (1981)。臺灣南部核能電廠附近海域之生態研究，Ⅱ，第2年 (69年7月至70年6月) 執行報告，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第10號，118頁。

蘇仲卿、洪楚璋、江永棉、譚天錫、張崑雄、楊榮宗、鄭穎敏、范光龍、張湘電 (1982)。臺灣南部核能電廠附近海域之生態研究，Ⅲ，第3年 (70年7月至71年6月) 執行報告，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第15號，137頁。

蘇仲卿、洪楚璋、江永棉、譚天錫、張崑雄、楊榮宗、鄭穎敏、范光龍、張湘電 (1983)。臺灣南部核能電廠附近海域之生態研究，Ⅳ，第4年 (71年7月至72年6月) 執行報告，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第23號，129頁。

蘇仲卿、洪楚璋、江永棉、譚天錫、張崑雄、楊榮宗、鄭穎敏、范光龍、張湘電 (1984)，臺灣南部核能電廠附近海域之生態研究，Ⅴ，第5年 (72年7月至73年6月) 執行報告，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第27號，214頁。

蘇仲卿、洪楚璋、江永棉、譚天錫、張崑雄、楊榮宗、鄭穎敏、范光龍、張湘電 (1985)。臺灣南部核能電廠附近海域之生態研究，Ⅵ，第6年 (73年7月至74年6月) 執行報告，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第38號，115頁。

蘇仲卿、洪楚璋、江永棉、譚天錫、張崑雄、邵廣昭、黃哲崇、黃奇瑜、范光龍、葉顯亞、張湘電 (1986)。臺灣南部核能電廠附近海域之生態研究，Ⅶ，第7年 (74年7月至75年6月) 執行報告，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第44號，164頁。

蘇仲卿、洪楚璋、江永棉、譚天錫、張崑雄、邵廣昭、黃哲崇、黃奇瑜、范光龍、葉顯亞 (1987)。臺灣南部核能電廠附近海域之生態研究，Ⅷ，第8年 (75年7月至76年6月)執行報告，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第50號，224頁。

蘇仲卿、洪楚璋、江永棉、譚天錫、張崑雄、邵廣昭、黃鵬鵬、李國添、黃哲崇、黃奇瑜、范光龍、葉顯亞 (1988)。臺灣南部核能電廠附近海域之生態研究，Ⅸ，第9年 (76年7月至77年6月)執行報告及電廠運轉對對生態環境之初步評估報告 (民國68年7月至77年6月)，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第59號，394頁。

蘇仲卿、洪楚璋、江永棉、譚天錫、張崑雄、邵廣昭、黃哲崇、黃奇瑜、范光龍、葉顯亞 (1989)。臺灣南部核能電廠附近海域之生態研究，Ⅹ，第10年 (77年7月至78年6月) 執行報告，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第70號，238頁。

蘇仲卿、洪楚璋、江永棉、譚天錫、張崑雄、邵廣昭、黃哲崇、黃奇瑜、范光龍、葉顯亞 (1990)。臺灣南部核能電廠附近海域之生態研究，ⅩⅠ，第11年 (78年7月至79年6月)執行報告，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第78號，225頁。

蘇仲卿、洪楚璋、江永棉、譚天錫、張崑雄、邵廣昭、黃哲崇、黃奇瑜、范光龍、葉顯亞 (1991)。臺灣南部核能電廠附近海域之生態研究，ⅩⅡ，第12年 (79年7月至80年6月) 執行報告，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第84號，320頁。

蘇仲卿、洪楚璋、黃穰、黃哲崇、楊榮宗、林友明 (1984)。蘭嶼貯存場附近海域生態環境之調查研究，Ⅰ，第1年 (72年7月至73年6月) 執行報告，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第26號，45頁。

蘇仲卿、洪楚璋、黃穰、黃哲崇、楊榮宗、林友明 (1985)。蘭嶼貯存場附近海域生態環境之調查研究，Ⅱ，第2年 (73年7月至74年6月) 執行報告，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第36號，50頁。

蘇仲卿、洪楚璋、黃穰、黃哲崇、楊榮宗、林友明 (1986)。蘭嶼貯存場附近海域生態環境之調查研究，Proc. of Seminal on Tech. Treatment of Radiowastes. Atomic Energy Council (August 22-23, Taipei): 89-102。

蘇仲卿、洪楚璋、陳汝勤、黃穰、黃哲崇、譚天錫、范光龍、林友明 (1987)。蘭嶼貯存場附近海域生態環境之調查研究，Ⅳ，第4年 (75年7月至76年6月) 執行報告，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第52號，60頁。

蘇仲卿、洪楚璋、陳汝勤、黃穰、黃哲崇、譚天錫、范光龍、林友明 (1988)。蘭嶼貯存場附近海域生態環境之調查研究，Ⅴ，第5年 (76年7月至77年6月) 執行報告，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第61號，62頁。

蘇仲卿、洪楚璋、陳汝勤、黃穰、譚天錫、范光龍、林友明 (1989)。蘭嶼貯存場附近海域生態環境之調查研究，Ⅵ，第6年 (77年7月至78年6月)執行報告，中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊第72號，57頁。

捌、其他相關規定事項

依招標規範宣導性騷擾防治，營造友善職場及工作環境。

教育部彙整相關部會「跟蹤騷擾防制」教育宣導資源

111.6

一、內政部

(一)跟蹤騷擾防制法宣導影片：

https://www.youtube.com/watch?v=kb2aCV3-lKQ

(二)人生選擇題（跟蹤騷擾防制法宣導宣導影片）：

https://www.youtube.com/watch?v=celM8QwsKB8

(三)宣導懶人包(7張)：

https://www.npa.gov.tw/ch/app/artwebsite/view?module=artwebsite&id=18495&serno=f1baa9d5-613b-41aa-b803-78a9714eb49d

二、法務部

(一)生活與法律-跟蹤騷擾防制法簡介：

https://www.youtube.com/watch?v=DvPa69_Qk8Q

(二)生活與法律-淺談跟蹤騷擾防治法：

https://www.youtube.com/watch?v=_PMKbGSWZ00

三、衛生福利部

性騷擾防治專區：

https://dep.mohw.gov.tw/dops/np-1214-105.html

四、勞動部

職場不法侵害（含跟蹤騷擾）致當事人有身心治療及諮商資源：


https://ohsip.osha.gov.tw/web/Share/listShare.aspx?action=share_list&type=15

五、教育部

性別平等教育全球資訊網「校園性別事件防治與處理」：

https://www.gender.edu.tw/

跟蹤騷擾防制法「校園跟蹤騷擾事件」及性別平等教育法「校園性騷擾事件」處理機制及流程圖



跟蹤騷擾防制法

於111年6月1日施行

The Stalking and Harassment Prevention Act is set to take effect on June 1, 2022.

什麼是跟蹤騷擾：針對特定人**反覆或持續**、**與性或性別有關**、違反意願、使人心生畏怖。



8種行為樣態



監視觀察



尾隨接近



寄送物品



冒用個資



不當追求



妨害名譽



通訊騷擾



歧視貶抑



遇到跟騷行為，請報警！

- 跟蹤騷擾行為：可處**1年**以下有期徒刑，併科新臺幣**10萬元**以下罰金，**須告訴乃論**。
- 攜帶兇器犯之：可處**5年**以下有期徒刑，併科新臺幣**50萬元**以下罰金，**非告訴乃論**。
- 違反保護令罪者：可處**3年**以下有期徒刑，併科新臺幣**30萬元**以下罰金，**非告訴乃論**。


內政部

內政部警政署關心您

廣告

玖、附錄

附錄A：「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」記事



本表部份資料，由扈治安研究員提供

附錄 B：期中、期末工作檢討會會議紀錄及審查意見回覆對照表

附錄 B-1：「核能電廠及蘭嶼附近海域之生態調查」
100 年期中工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
100 年期中工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表 ----------光碟
會議日期：100 年 8 月 31 日

附錄 B-2：「核能電廠及蘭嶼附近海域之生態調查」
100 年期末工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
100 年期末工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：101 年 3 月 2 日

附錄 B-3：「核能電廠及蘭嶼附近海域之生態調查」
101 年期中工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
101 年期中工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：101 年 9 月 5 日

附錄 B-4：「核能電廠及蘭嶼附近海域之生態調查」
101 年期末工作檢討會暨 102 年度新委辦工作開案會議紀錄------ 光碟
101 年期末工作檢討會暨 102 年度新委辦工作開案會議
紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：102 年 3 月 8 日

附錄 B-5：「核能電廠及蘭嶼附近海域之生態調查」
102 年期中工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
102 年期中工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：102 年 9 月 10 日

附錄 B-6：「核能電廠及蘭嶼附近海域之生態調查」
102 年期末工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
102 年期末工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：103 年 3 月 14 日

附錄 B-7：「核能電廠及蘭嶼附近海域之生態調查」
103 年期中工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
103 年期中工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：103 年 9 月 10 日

附錄 B-8：「核能電廠及蘭嶼附近海域之生態調查」
103 年期末工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
103 年期末工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：104 年 3 月 12 日

附錄 B-9：「第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查」
104 年期中工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
104 年期中工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：104 年 8 月 27 日

附錄 B-10：「第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查」
104 年期末工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
104 年期末工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：105 年 3 月 4 日

(續) 附錄 B：期中、期末工作檢討會會議紀錄及審查意見回覆對照表

附錄 B-11：「第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查」
105 年期中工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
105 年期中工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：105 年 9 月 20 日

附錄 B-12：「核能電廠及蘭嶼附近海域之生態調查」
105 年期末工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
105 年期末工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：106 年 3 月 7 日

附錄 B-13：「第三核能發電廠及蘭嶼貯存場附近海域之生態調查」(106-107 年)
106 年期中工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
106 年期中工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：106 年 10 月 20 日

附錄 B-14：「第三核能發電廠及蘭嶼(低放)貯存場附近海域之生態調查」(106-107 年)
第二次期中工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
第二次期中工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：107 年 7 月 20 日

附錄 B-15：「第三核能發電廠及蘭嶼(低放)貯存場附近海域之生態調查」(106-107 年)
期末工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
期末工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：108 年 2 月 13 日

附錄 B-16：「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」(108-109 年)
第一次期中工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
第一次期中工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：108 年 10 月 7 日

附錄 B-17：「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」(108-109 年)
第二次期中工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
第二次期中工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：109 年 7 月 20 日

附錄 B-18：「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」(108-109 年)
期末工作檢討會會議紀錄---------- 光碟
期末工作檢討會會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 光碟
會議日期：110 年 2 月 23 日

附錄 B-19：「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」
期中工作檢討會議紀錄---------- 附錄 B-19A
期中工作檢討會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 附錄 B-19B
會議日期：111 年 2 月 9 日

附錄 B-20：「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」
期末工作檢討會議紀錄---------- 附錄 B-20A
期末工作檢討會議紀錄之審查意見回覆對照表---------- 附錄 B-20B
會議日期：112 年 2 月 7 日

附錄B-19：

正本

檔　　號：
保存年限：

台灣電力股份有限公司環境保護處　函

地址：10016臺北市中正區羅斯福路3段242號21樓
聯 絡 人：王逢新
電子信箱：u677854@taipower.com.tw
連絡電話：23667213

受文者：國立中山大學

裝

發文日期：中華民國111年2月16日
發文字號：環字第1118015763號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文ATTCH1

主旨：檢送「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」期中會議工作檢討會議紀錄，請查照。

正本：行政院原子能委員會、國立中山大學、本公司綜合研究所、核能發電處、核能後端營運處、第三核能發電廠
副本：電子公文交換章

訂

線

國立中山大學 111/02/17
1110001610

「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」
期中工作檢討會議紀錄

一、時間：111 年 2 月 9 日下午 1 時 30 分

二、地點：視訊會議 (https://meet.google.com/viv-azfz-uwf)

三、主席：林副處長景庸　　紀錄：王逢新

四、出席單位及人員：詳簽名冊

五、主席報告：(略)

六、國立中山大學簡報「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」（簡稱南核案）之調查研究成果：(略)

七、討論與決議事項：

(一) 111 年 1 月東加海底火山爆發影響太平洋海域，請研究團隊持續追蹤對南灣海域是否有影響，並於期末會議中提出討論。

(二) 110 年夏季發生海水溫度長時間溫降，與過去溫降情況有所不同，請研究團隊持續分析可能原因。

(三) 請研究團隊依據多年調查成果，提供可做為南灣海域生態之指標物種(含動浮、植浮、底棲及魚類)，俾供本公司辦理核三廠除役環評作業參考。

(四) 請研究團隊主持人及各子計畫負責人轉知助理、學生及相關作業人等至現場工作或進行採樣作業前務必與各現場單位窗口聯繫，進入廠區必須遵照核能電廠之相關管制規定，確實換證刷卡。各項調查作業應符合職安署之相關規定，執行出海及水下作業之工作人員需確實接受相關訓練後才可執行該工作，並於執行現場調查監測工作時，應加強工安宣導(如危害因素告知、職業安全紀律承諾等)，落實執行各項工安措施。

(五) 各與會單位若有新增書面意見，請於 111 年 2 月 18 日前送環保處彙整，俾利報告修訂。

(六) 本公司各單位所提意見，請南核案研究團隊參考修訂。


八、散會(下午 3 時 50 分)。

乙方出席人員及視訊會議畫面

調查項目	與會人員	
海潮流調查 (子計畫 一)	詹森 (協同主持人)	田維婷、黃逢賢
水文水質調查 (子計畫 二)	陳鎮東 (主持人)	王冰潔、黃修儀、楊文雁
動植浮 調查 (子計畫 三)	陳孟仙 (協同主持人)	陳姿君
底棲動物調查 (子計畫 四)	劉莉蓮 (協同主持人)	吳靖穎
魚類調查 (子計畫 五)	黃榮富 (協同主持人)	許碧瑜
資料庫建置及維護 (子計畫 六)	楊穎堅 (協同主持人)	




停止分享螢幕畫面
sea watch
安管組
黃榮富
晉祥
張晉祥
詹森
W 健翔
還有另外 2 位使用者


停止分享螢幕畫面
參與者
全部設為靜音
新增成員
主辦人控制項
dong taipower
通話中
Chen-Tung Arthur Ch... (你)
會議主辦人
Chen-Tung Arthur Chen
你分享的畫面
王逢新
安管組
張晉祥
黃榮富
廖健翔
dong taipower
sea watch
waiting tien
Y. J. Yang
晉祥
張晉祥
W 健翔
還有另外 2 位使用者
下午 01:29
2022/2/9

審 查 意 見 表

計畫/報告名稱：第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查

提供單位：環保處

頁	行	原 文	修 改 意 見 或 建 議
			依據貴單位多年調查成果，請分析評估南灣海域生態(含動、植物)是否具有指標物種？此外，核三廠除役計畫並不涉及海域工程，若南灣海域具有指標物種，請評估除役期間合適之保育計畫或生態環境保護對策。
			核三廠進入除役階段，溫排水逐漸減少，請評估南灣海域生態之物種種類、數量是否可能因溫排水之消失(不再取水及排水)而有改變。
			NOAA 以 DHW(Degree Heating Week)分析珊瑚白化情況，請問研究團隊是否有研究過相關分析方式，請評估能否用於本計畫中。
			資料庫網站目前是以 http 連線，能否改以 https 連線降低資安風險。
1-24		六、附表及附圖	表格誤植。
2-5	18	海濱核電廠全功率運轉時，冷凝器會在比周圍高出10~22℃的溫度下操作……	內文可能誤導閱讀者，使其誤會核三廠溫排水是此情形，建議調整陳述方式。
3-17	8	結果顯示植物性浮游生物總平均密度在第4次採樣，於24測站停機大修時有顯著高於運轉時……	能否說明大修時，24測站植物性浮游生物會顯著高於運轉時之原因。


審 查 意 見 表


提供單位：核三廠

頁	行	原 文	修 改 意 見 或 建 議
II	參、成效第1點第2行	「…，也可作為核四廠施工以及運轉後生態環境影響評估的參考。」	因核四廠已無運轉可能，建請修改內文。
4-18	最後一段第2、3行	「…，當一號機組停機維修時，廠內清污海水會在……；當二號機組停機維修時，廠內清污海水會在…」	1.建議4-18的「廠內除污海水」改為與4-24相同之「清污的廠用海水」，以避免誤會為本廠的除污海水都往進水口排。 2.另清污的廠用海水在排回大海時會先經過過濾，但因網目較大，所以還是會有比較細小的殘渣排回大海。也請參酌於4-18及4-24陳述中加入「經過濾」或相似描述。
4-24	第二段第1行	「…，清污的廠用海水會….」	同上

承辦員　　主管（課長）　　組長（經理）　　副處長　　處長

附錄 B-19：「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」
期中工作檢討會議紀錄之審查意見回覆對照表


「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」 期中工作檢討會議紀錄 (會議日期：111 年 2 月 9 日)		
項	會議紀錄之 「七、討論與決議事項」	回覆欄
(一)	111 年 1 月東加海底火山爆發影響太平洋海域，請研究團隊持續追蹤對南灣海域是否有影響，並於期末會議中提出討論。	遵照辦理。
(二)	110 年夏季發生海水溫度長時間溫降，與過去溫降情況有所不同，請研究團隊持續分析可能原因。	子計畫 1： 大約從 110 (2021) 年 7 月 21 日起所有南灣附近的溫度記錄及臺東成功即時溫壓站 (如下圖)  都顯示溫度開始下降，到了大約 110 (2021) 年 8 月 9 日逐步回升。溫度記錄顯示南灣裡降了大約 6 度，東岸成功站降了大約 4 度。衛星遙測海面高度及推算的地轉流圖像顯示在此次降溫事件前一週前，有一個海洋中尺度反氣旋已經靠近及影響呂宋海峽北部及臺灣東部的黑潮 (衛星海面高度與地轉流圖如下圖)

		 由分布圖判讀此中尺度反氣旋造成北向流速增加，海流加速通常會造成橫過海流由右向左抬升的等密面、等溫面更加傾斜 (地轉流的熱力風效應)，也就是向著海流流向的左邊等密面、等溫面會被抬升，相當於造成海洋表層之下的冷水在近岸海域沿著海底地形被抬升，進而造成表層海溫下降。以上是一種可能的海洋動力機制。此外，這段降溫期間的初期，因為颱風後引進的強烈西南氣流，造成南灣海域異常的西南強風與強降雨，都對海水異常降溫有所貢獻。 子計畫 4： 遵照辦理。110 年夏季自 7 月 27 至 8 月 10 日間水溫下降，並於 8 月 8 至 9 日出現低於 22°C 的低溫，期間恆春皆有降雨，推測可能受西南氣流影響，加上湧升流的低溫水團之影響，造成溫降；過去 92、93、94 及 101 年於夏季有記錄到低溫現象，都發生在颱風過後，而 110 年 8 月 6 日有盧碧輕度颱風由南海至台灣海峽，雖未影響恆春，但可能有帶動水團或湧升流造成溫降 (4-25 頁第三段)。

「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」 期中工作檢討會議紀錄 (會議日期：111 年 2 月 9 日)		
項	會議紀錄之 「七、討論與決議事項」	回覆欄
(三)	請研究團隊依據多年調查成果，提供可做為南灣海域生態之指標物種 (含動浮、植浮、底棲及魚類)，俾供本公司辦理核三廠除役環評作業參考。	子計畫 3： 本子計畫建議植浮和動浮以最優勢的藻屬或大類為指標，植浮為角刺藻屬密度(cells/L)，動浮為哲水蚤豐度(ind./m^3)作為指標。 子計畫 4： 遵照辦理。出水口之南側 3 公尺水深測站 (Efflu-3) 的水溫長期較其餘測站高，將出水口南側水深 8 公尺處 (Efflu) 的底棲動物著生量與出水口水深 3 公尺測站 (Efflu-3) 相互比較，兩測站的珊瑚、軟體動物著生量皆少，無顯著差異，多毛蟲著生量 3 公尺水深 (Efflu-3) 常高於水深 8 公尺處 (Efflu)，苔蘚蟲著生量水深 8 公尺處 (Efflu) 偶高於 3 公尺水深 (Efflu-3)，海鞘著生量於 3 公尺水深 (Efflu-3) 偶高於水深 8 公尺處 (Efflu) (4-22 頁第三段)。3 公尺處長期多毛蟲著生量較多，建議可考慮多毛蟲為指標物種。 子計畫 5： 本團隊於 5 個測站潛水拍攝期間記錄了 648 種珊瑚礁魚類相，聚類分析結果顯示調查海域珊瑚礁魚類分布受到水深及地形影響，測站間記錄到的魚類相略有不同，分析歷年來 5 個測站主要的魚種平均出現數量及主要魚種出現百比分，其中各測站主要魚種平均出現的相似度介於 14.83% ~ 28.46%，係因 5 個測站的魚類相更迭頻繁，南灣海域常駐型且在 5 測站均可發現的魚種有五線雀鯛、褐斑刺尾鯛、飄浮蝴蝶魚、二色光鰓雀鯛、網紋圓雀鯛、裂唇魚及角鐮魚 7 種魚類，本計畫建議以調查海域常見之魚種作為指標物種。

「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」 期中工作檢討會議紀錄 (會議日期：111 年 2 月 9 日)		
項	會議紀錄之 「七、討論與決議事項」	回覆欄
(四)	請研究團隊主持人及各子計畫負責人轉知助理、學生及相關作業人等至現場工作或進行採樣作業前務必與各現場單位窗口聯繫，進入廠區必須遵照核能電廠之相關管制規定，確實換證刷卡。各項調查作業應符合職安署之相關規定，執行出海及水下作業之工作人員需確實接受相關訓練後才可執行該工作，並於執行現場調查監測工作時，應加強工安宣導 (如危害因素告知、職業安全紀律承諾等)，落實執行各項工安措施。	1) 遵照辦理。 2) 已於歷次會議及人員教育訓練中，加強工安宣導，人員出差前亦要求務必遵守及符合職業安全衛生相關法令規範。
(五)	各與會單位若有新增書面意見，請於 111 年 2 月 18 日前送環保處彙整，俾利報告修訂。	已將環保處及核三廠之審查意見列表在『五-1』 及 『五-2』並由相關研究人員回覆。
(六)	本公司各單位所提意見，請南核案研究團隊參考修訂。	遵照辦理。

五-1：審查意見表				提供單位：環保處
頁	行	原　　文	修改意見或建議	回覆欄
			依據貴單位多年調查成果，請分析評估南灣海域生態 (含動、植物) 是否具有指標物種？此外，核三廠除役計畫並不涉及海域工程，若南灣海域具有指標物種，請評估除役期間合適之保育計畫或生態環境保護對策。	子計畫 3： 本子計畫建議植浮和動浮以最優勢的藻屬或大類為指標，植浮為角刺藻屬密度(cells/L)，動浮為哲水蚤豐度 (ind./m^3)作為指標。 子計畫 4： 遵照辦理。出水口出水口南側 3 公尺水深測站 (Efflu-3) 的水溫長期較其餘測站高，將出水口南側水深 8 公尺處 (Efflu) 的底棲動物著生量與出水口水深 3 公尺測站 (Efflu-3)相互比較，兩測站的珊瑚、軟體動物著生量皆少，無顯著差異，多毛蟲著生量 3 公尺水深 (Efflu-3) 常高於水深 8 公尺處 (Efflu)，苔蘚蟲著生量水深 8 公尺處 (Efflu) 偶高於 3 公尺水深 (Efflu-3)，海鞘著生量於 3 公尺水深(Efflu-3) 偶高於水深 8 公尺處 (Efflu) (4-22 頁第三段)。3 公尺處長期多毛蟲著生量較多，建議可考慮多毛蟲為指標物種。此外，除役初期若能持續原有的監測方式，應較能完整評估除役前後之變化。 子計畫 5： 本計畫建議珊瑚礁魚類以常見科別出現的種類數及尾數作為指標。除役期間持續監測可瞭解除役前後珊瑚礁魚類在種類數及數量上的變動差異。為有效保護海洋生物資源之多樣性，墾丁國家公園管理處已自民國 94 年 3 月劃設後壁湖海洋資源保護示範區，其中包含本計畫調查部份海域 (測站 2)。

				檔　號： 保存年限： 墾丁國家公園管理處　函 地址：94644屏東縣恆春鎮墾丁路 聯絡人：陳松茂 聯絡電話：08-8861321#321 電子郵件：mao@ktnp.gov.tw 傳真：08-8862331 受文者：恒春區漁會 發文日期：中華民國101年5月1日 發文字號：墾後字第1012901282號 速別：最速件 密等及解密條件或保密期限： 附件：如說明二、三、五（請至http://210.69.44.5下載） 主旨：重申禁止於後壁湖海洋資源保護示範區內（以下簡稱後壁湖保護示範區）進行任何採捕行為，敬請確實遵守活動海域範圍之規範，以免遭取締裁罰，請　查照。 說明： 一、為有效保護海洋生物資源之多樣性，及後壁湖周邊海域遊憩活動之管理，籲請海域遊憩活動業者注意遊憩安全外，更需要落實海洋資源的保護，以身作則配合政策宣導，以達永續發展。 二、後壁湖保護示範區自94年3月份成立以來（範圍如附圖一），其保護成果業已呈現，為確保得來不易之成效，實有必要禁止採捕垂釣行為；以影響水上遊憩活動業者服務形象，本處重申禁止合法之海域活動業者於保護示範區內進行採捕行為，違者將取消其營運資格，共同籲請週知，盼能遵守規定。 三、為提升資源保護成效，劃定於後壁湖漁港東側堤防口到示範區第2顆、第1顆及岸際所連成的三角形範圍為動力機具禁航區域（如附圖一），嚴禁水上摩托車及船舶等動力機
			核三廠進入除役階段，溫排水逐漸減少，請評估南灣海域生態之物種種類、數量是否可能因溫排水之消失(不再取水及排水)而有改變。	子計畫 3： 電廠停機大修及運轉時浮游生物豐(密)度差異，於歷年第 2 和第 4 次的樣品中，除濃縮法植物性浮游生物總平均密度在第 4 次(10~12 月)採樣，於 24 測站測得停機大修時明顯高於運轉時的情形，其餘皆無顯著差異(下圖)。 

五-1：審查意見表 (續) **提供單位：環保處**

頁	行	原　　文	修改意見或建議	回覆欄
			核三廠進入除役階段，溫排水逐漸減少，請評估南灣海域生態之物種種類、數量是否可能因溫排水之消失(不再取水及排水)而有改變。	子計畫 4： 90 年第 2 及 3 次監測結果顯示出水口南側水深 8 公尺處(Efflu) 與入水口測站的群聚在同一群，而與其它出水口測站的群聚分開，此特殊現象可能與第三核能發電廠於 90 年 3 月 18 日至 4 月 15 日間，共 29 天的停機有關 (3A 事件)，且這 2 次出水口南側水深 8 公尺處 (Efflu)的多毛蟲覆蓋率較歷年高 (4-12 頁最後 1 行至 4-13 頁第 3 行) 。據此推測溫排水停止排放後，出水口南側水深 8 公尺處(Efflu) 的多毛蟲覆蓋率可能會增加。
			NOAA 以 DHW (Degree Heating Week) 分析珊瑚白化情況，請問研究團隊是否有研究過相關分析方式，請評估能否用於本計畫中。	子計畫4： DHW 指標的計算是以當週及過去11週的海水表面溫度平均值，各自減去當地夏季最高溫度。因此，1 DHW =高於珊瑚白化閥值的溫度1°C x 1週，或高於閥值2°C x 持續0.5週，DHW 越高珊瑚白化就越嚴重。由於本計畫無水溫紀錄即時回傳的儀器設施，因此無法提供珊瑚白化預警訊息。本團隊過去曾將水溫紀錄轉換成 DHW 值，並與珊瑚白化率進行相關性分析。由於本計畫珊瑚白化現象一年4季都有觀察到，顯示白化不僅受高溫，也受低溫及溫差變動大小等因素影響，因此 DHW 僅能應用於夏季高溫的珊瑚白化預測。

五-1：審查意見表 (續)				提供單位：環保處
頁	行	原　　文	修改意見或建議	回覆欄
			資料庫網站目前是以http連線，能否改以https 連線降低資安風險。	遵照辦理。
1-24		六、附表及附圖	表格誤植。	1) 已刪去表格。 2) 另於1-24頁加入 「(說明：依101年期末工作檢討會議紀錄 (會議日期：102年3月8日)之『 (八) 本案調查報告書中之書面附錄或原始資料文件，請刪除並註明該資料已放入調查報告書所附光碟電子檔中，以減少書面報告之篇幅。』辦理。)」。
2-5	18	海濱核電廠全功率運轉時，冷凝器會在比周圍高出10~22℃的溫度下操作.....	內文可能誤導閱讀者，使其誤會核三廠溫排水是此情形，建議調整陳述方式。	海濱核電廠運轉時，冷凝器會在比周圍高的溫度下操作，因而影響浮游動植物。
3-17	8	結果顯示植物性浮游生物總平均密度在第4次採樣，於24測站停機大修時有顯著高於運轉時.....	能否說明大修時，24測站植物性浮游生物會顯著高於運轉時之原因。	濃縮法分析之植物性浮游生物密度在停機大修時會增加的原因，可能是溫排水減少，海水溫度較低，有利於大細胞(≧55um)的植物性浮游生物生長。

五-2：審查意見表			提供單位：核三廠	
頁	行	原　　文	修改意見或建議	回覆欄
II	參、成效第1點第2行	「...，也可作為核四廠施工以及運轉後生態環境影響評估的參考。」	因核四廠已無運轉可能，建請修改內文。	已修改為 「1. 此調查的結果可以作為核三廠附近海域生態環境影響評估之追蹤；多年來之調查結果，均符合環保法規之要求。」。
4-18	最後一段第2、3行	「...，當一號機組停機維修時，廠內清污海水會在.....;當二號機組停機維修時，廠內清污海水會在...」	1.建議4-18的「廠內除污海水」改為與4-24相同之「清污的廠用海水」，以避免誤會為本廠的除污海水都往進水口排。 2.另清污的廠用海水在排回大海時會先經過過濾，但因網目較大，所以還是會有比較細小的殘渣排回大海。也請參酌於4-18及4-24陳述中加入「經過濾」或相似描述。	子計畫4： 已修正。4-18頁最後一段第2至4行，清污的廠用海水經過濾後，因網目較大，所以還是會有比較細小的殘渣排回大海。當一號機組停機維修時，清污的廠用海水經過濾後，會...; 當二號機組停機維修時，清污的廠用海水經過濾後，會...。
4-24	第二段第1行	「...，清污的廠用海水會....」	同上	子計畫4： 已修正。4-24頁第二段第1行清污的廠用海水改為清污的廠用海水經過濾後，會....。

附錄B-20：

正本

檔　　號：
保存年限：

台灣電力股份有限公司環境保護處　函

地址：100208臺北市中正區羅斯福路3段242號21樓
聯 絡 人：王逢新
電子信箱：u677854@taipower.com.tw
連絡電話：23667213

受文者：國立中山大學

裝

發文日期：中華民國112年2月9日
發文字號：環字第1128015235號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文ATTCH1

主旨：檢送「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」期末會議工作檢討會議紀錄，請查照。

正本：行政院原子能委員會、國立中山大學、本公司核能發電處、核能後端營運處、第三核能發電廠、光宇工程顧問股份有限公司
副本：電子公文交換章

訂

線

國立中山大學 112/02/09
1120001292

「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」
期末工作檢討會議紀錄

一、時間：112 年 2 月 7 日下午 1 時 30 分

二、地點：副樓 10 樓會議室

三、主席：林副處長景庸　　紀錄：王逢新

四、出席單位及人員：詳簽名冊

五、主席報告：(略)

六、國立中山大學團隊簡報「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」（簡稱南核案）之調查研究成果：(略)

七、討論與決議事項：

(一) 蘭嶼低放貯存場排水口仍有少量排水情形，請核後端處協助提供低放貯存廠排水現況及來源。

(二) 請核發處提供核三廠歷年停機維修期間排水量變化資料，並請研究團隊協助分析該資料與相關調查數據之關聯性。

(三) 請研究團隊依據入水口底棲生物覆蓋率多年調查成果，分析研究墾丁國家公園進行污水管制後，對周遭海域生態環境是否有造成影響。

(四) 請研究團隊主持人及各子計畫負責人轉知助理、學生及相關作業人等至現場工作或進行採樣作業前務必與各現場單位窗口聯繫，進入廠區必須遵照核能電廠之相關管制規定，確實換證刷卡。各項調查作業應符合職安署之相關規定，執行出海及水下作業之工作人員需確實接受相關訓練後才可執行該工作，並於執行現場調查監測工作時，應加強工安宣導(如危害因素告知、職業安全紀律承諾等)，落實執行各項工安措施。

(五) 各與會單位若有新增書面意見，請於 112 年 2 月 18 日前送環保處彙整，俾利報告修訂。

(六) 本公司各單位所提意見，請研究團隊參考修訂。

八、散會(下午 3 時 50 分)。

「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」
期末工作檢討會出席人員簽名冊

主辦單位：環境保護處

時　間	112 年 2 月 7 日(星期二) 下午 1 時 30 分	地　點	副樓 10 樓會議室
主持人	林副處長景庸	紀　錄	王逢新

	單　位	職　稱	簽　名 （請以正楷書寫，以利辨識）	備　註
出席人員	行政院原子能委員會		請　假	
	國立中山大學		陳鎮東	
			劉烈蓮	
			王冰濱	
			譚之豪	
			黃修儀	
			陳雅君	
			許金川	
	國立高雄科技大學		黃榮富	
			許碧禪	

	單　　位	職　　稱	簽　　名 （請以正楷書寫，以利辦識）	備　　註
出席人員	國立台灣大學	教授	詹寿	
		二	楊錦理	
	光宇工程顧問公司	協理	曾信勝	
		工程師	葉清俊	
	核能發電處	主管	劉紹忠	
	核能後端營運處	顧	謝慧爾	
	第三核能發電廠		請　假	
	環境保護處	組長	莊泉春	
		課長	黃建紘	
		專員	王逢新	
		專員	林信宇	

審　查　意　見　表

計畫/報告名稱：第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查

提供單位：環保處

頁	行	原　　文	修　改　意　見　或　建　議
VII XII 2-30 2-66		正逄歷時2年多…… 溫排水對珊瑚碓魚類…… 101年第1、3次小於典型南海水…… 110年葉綠素甲第1次介於小於……	文字誤植，請修正。
XVI		摘要	因各子計畫測點各不相同，請統整各測站位置圖表。
1-28		……細節擬於本期計畫進一步探討。	本次為期末報告，是否於報告中有相關說明。
3-64 ~3-83		圖3-2~圖3-5、圖3-14~圖3-21	部分物種標示閱讀不易，圖例請輔以顏色表示。
4-17		底棲生物覆蓋率以入水口灣內南側(Inf5)最高(表4-3) 總覆蓋率皆以入水口灣內南側(Inf5)最高(190%-200%)……	表4-3與內文無法對應；覆蓋率超過100%是否為誤植。
			除役後核三廠溫排水量隨機組停止運轉而逐漸減少，進而影響出水口之水溫，請針對核三廠進入除役階段，溫排水逐漸減少對出水口週邊珊瑚之影響進行說明。
			承上所述，報告中指出核三廠出水口溫排水主要的水溫影響範圍僅為500公尺內跟水深3~5公尺，且於2度以內，考量近年來南灣海域主要因全球暖化導致海域水溫有逐步上升之情況，亦有因氣候變遷造成高溫熱浪等海溫異常升高情況導致珊瑚白化事件之情形，故是否可推測南灣海域（含出水口）的珊瑚種類數量，主要還是受整體南灣海域環境變化之影響?
			魚類調查結果是否有洄游性魚類？若有，請補充其特性說明。

「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」期末報告初稿審查意見表

提供單位：核後端處

頁	行	原　　文	修　改　意　見　或　建　議
附錄 A		民國85年蘭嶼貯存場停止接收核廢料(壕溝廢水「零排放」？)	刪除「?」
附錄 A		民國108年← **核廢料檢整開始**	修訂為「核廢料桶重裝作業開始」
附錄 A		X	新增「民國111年-核廢料桶重裝作業結束」

承辦員 游慕甯 112.2.7　主管（課長） 游慕甯 112.2.7 代　組長（經理） 鄧朝崇 112.2.7 代　副處長 廖瑞鶯 112.2.7　處長 張學植 112.2.7

附錄 B-20：「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」期末工作檢討會議紀錄之審查意見回覆對照表

「第三核能發電廠及低放貯存場附近海域之生態調查」 期末工作檢討會議紀錄 (會議日期：112 年 2 月 7 日)			
項	會議紀錄之 「七、討論與決議事項」	回覆欄	
(一)。	蘭嶼低放貯存場排水口仍有少量排水情形，請核後端處協助提供低放貯存廠排水現況及來源。	a	112 年 2 月 21 日收到環保處王逢新專員轉來核後端處所提供之低放貯存廠排水現況及來源資料。
		b	已於報告書 2-70 頁加入討論。
(二)	請核發處提供核三廠歷年停機維修期間排水量變化資料，並請研究團隊協助分析該資料與相關調查數據之關聯性。	a	112 年 2 月 9 日收到環保處王逢新專員轉來，當日轉寄予各子計畫。
		b	子計畫 3： 已於報告書 3-21 頁新增說明，及 3-99 頁新增圖 3-37。 子計畫 4： 4-1) 已於報告書 4-16 頁新增討論，及圖 4-29。 4-2) 已刪除報告書 4-16 頁「因此溫排水可能...」，與本段內容不符之文字。 4-3) 簡略說明；出水口 (Efflu) 及 (Efflu-2) 測站多毛類停機時期的平均著生量高於非停機時期；溫排水有小範圍影響。 子計畫 5：魚類調查 已於報告書 6-12 頁調整下列內容： 由核發處提供核三廠歷年停機維修期間排水量變化資料分析顯示，機組停機期間輸入南灣水域溫排放水量減少約 1/2，應可使溫排水現象減低。比較機組停機維修期間及運轉期間影響域測站 3~測站 5，魚種數和歷次平均值的差異，顯示在停機維修期間魚種數高於平均值的機率為 39%~56%之間；其中測站 3 靠近溫排水出水口，在停機維修期間溫水排放減量，魚種數高於平均值的機率為 39%，小於實際運轉期間 44%，顯示溫排水對魚種數的影響不受溫排水減量而增加來游魚種數。

			比較機組停機維修期間及運轉期間影響域測站魚尾數和平均值的差異，發現歷次影響域在歲修保養期間的魚尾數高於平均值的機率為 22%~39%之間，靠近溫排水出水口的測站 3 在停機維修期間高於平均值 22%，小於實際運轉期間 31%，顯示溫排水對魚尾數的影響不明顯。比較歷年機組停機維修期間及運轉期間影響域測站珊瑚礁魚類群聚組成，資料顯示影響域測站停機維修期間及運轉期間珊瑚礁魚類群聚組成有重疊現象，顯示溫排水對珊瑚碓魚類群聚組成影響不明顯，係因珊瑚礁魚類主要活動區域在礁石間，而溫排水的影響範圍僅為離排放口 500 公尺內跟水深 3~5 公尺之水域，且水溫變動約 2 度以內。
(三)	請研究團隊依據入水口底棲生物覆蓋率多年調查成果，分析研究墾丁國家公園進行污水管制後，對周邊海域生態環境是否有造成影響。	子計畫 4： 已於報告書 6-10 頁加入分析討論。 簡略說明如下： 墾丁與南灣污水處理廠主管機關為墾丁國家公園管理處。墾丁廠：88 年完工，收集墾丁大街及大灣路地區生活污水，於石牛溪西側排放入海。南灣廠:87 年完工，收集後壁湖、大光、南灣地區的民生污水，處理後於南灣遊憩區排放入海。污水下水道 97 年之接管率為 78%，110 年為 80%，接管率增加幅度不大，對照報告書固定橫截線底棲生物覆蓋率(圖 4-31、4-32)，二者無明顯相關。	
(四)	請研究團隊主持人及各子計畫負責人轉知助理、學生及相關作業人等至現場工作或進行採樣作業前務必與各現場單位窗口聯繫，進入廠區必須遵照核能電廠之相關管制規定，確實換證刷卡。各項調查作業應符合職安署之相關規定，執行出海及水下作業之工作人員需確實接受相關訓練後才可執行該工作，並於執行現場調查監測工作時，應加強工安宣導 (如危害因素告知、職業安全紀律承諾等)，落實執行各項工安措施。	a	遵照辦理。
		b	已於歷次會議及人員教育訓練中，加強工安宣導；人員出差前及工作中亦要求務必遵守及符合職業安全衛生相關法令規範。
(五)	各與會單位若有新增書面意見，請於 112 年 2 月 18 日前送環保處彙整，俾利報告修訂。	已將環保處及核後端之審查意見列表在『五-1』 及 『五-2』並由相關研究人員回覆。	
(六)	本公司各單位所提意見，請研究團隊參考修訂。	遵照辦理。	

五-1：審查意見表			提供單位：環保處	
頁	行	原　　文	修改意見或建議	回覆欄
VII XII 2-30 2-66		正逄歷時 2年多... 溫排水對珊瑚碓魚類... 101年第1、3次小於典型南海水... 110年葉綠素甲第1次介於小於...	文字誤植，請修正。	VII：已修正為 正「逢」歷時 2 年多...。 XII：已修正為 溫排水對珊瑚「礁」魚類... 2-30：已修正為 101 年第 1、3 次「屬」於典型南海水... 2-66：已刪除「...小於」
XVI		摘要	因各子計畫測點各不相同，請統整各測站位置圖表。	已修正於報告書 第 III 頁。
1-28		.....細節擬於本期計畫進一步探討。	本次為期末報告，是否於報告中有相關說明。	子計畫1： 已於報告書 1-28 頁調整下列內容： 其實颱風在核三廠海域造成的溫降過程可能非常複雜，包括表水冷卻、近岸冷水湧升、黑潮與南海北部環流的互動等等，(刪除"細節擬於本期計畫進一步探討")其細節除了和颱風經過期間或過後引起的西南氣流在南灣西邊海岸造成冷水湧升現象有關，也跟颱風的強烈風應力直接作用在海面上，提供紊流耗散能量，引起上下水層垂直混合有關；此外，颱風前的南灣水層分層條件、混合層厚度、躍溫層深度也深深影響南灣表水對颱風吹襲作用的反應，薄的混合層受颱風風應力作用較容易被深化，躍溫層強度下降、深度變深，表水溫度下降，反之則降溫幅度較不顯著。
3-64 ~3-83		圖3-2~圖3-5、 圖3-14~圖3-21	部分物種標示閱讀不易，圖例請輔以顏色表示。	子計畫3： 圖已更新為彩色。

4-17		底棲生物覆蓋率以入水口灣內南側 (Inf5) 最高 (表4-3) 總覆蓋率皆以入水口灣內南側 (Inf5) 最高 (190%-200%)...	表4-3與內文無法對應；覆蓋率超過100%是否為誤植。	子計畫4： 4-1) 表4-3為誤植，已修正為表4-6於報告書4-17頁。 4-2) 修正表4-6之「表棲動物」為「底棲生物」。 4-3) 總覆蓋率部分為誤植，已刪除報告書.4-17頁部分敘述。
			除役後核三廠溫排水量隨機組停止運轉而逐漸減少，進而影響出水口之水溫，請針對核三廠進入除役階段，溫排水逐漸減少對出水口週邊珊瑚之影響進行說明。	子計畫4： 區域性水溫及水文條件改變，會影響生活在該區域的生物，珊瑚也不例外，若改變後的水文條件仍適合，珊瑚就會持續存在。
			承上所述，報告中指出核三廠出水口溫排水主要的水溫影響範圍僅為500公尺內跟水深3~5公尺，且於2度以內，考量近年來南灣海域主要因全球暖化導致海域水溫有逐步上升之情況，亦有因氣候變遷造成高溫熱浪等海溫異常升高情況導致珊瑚白化事件之情形，故是否可推測南灣海域(含出水口)的珊瑚種類數量，主要還是受整體南灣海域環境變化之影響?	子計畫4： 影響珊瑚白化的相關討論在報告書 p. 4-28- 4-30。簡略說明如下:南灣有些季節的珊瑚白化和大環境氣候變遷有關，有些季節的白化可能和區域性低溫或懸浮物多有關，將南灣珊瑚白化歸因於”主要受南灣海域環境影響”涵蓋之面向較小。
			魚類調查結果是否有洄游性魚類？若有，請補充其特性說明。	子計畫5： 已於報告書5-18、5-19頁加入下列說明。 本調查案歷年於珊瑚礁區及後壁湖魚市場調查記錄到洄游性魚類有：浪人鰺、紅甘鰺、鬼頭刀、飛魚、黃鰭鮪、鰆魚、旗魚、白帶魚等。其中後壁湖魚市場記錄之洄游性魚類作業漁場

				在灣外海域(表5-25)，而核三廠附近海域記錄到單獨活動的浪人鰺為沿近海洄游性魚類，幼魚多棲息於河口域，成魚多單獨棲息於具清澈水質的瀉湖或向海的礁區。漁業署資料顯示屏東後壁湖漁港經營漁船類型有一支釣、延繩釣、鏢旗魚等，產量及產值較高的經濟性捕撈魚種有鰺科、鬼頭刀、飛魚、鯖科(黃鰭鮪、長鰭鮪、大目鮪、正鰹等)、旗魚科、帶魚科等，台灣水產試驗所報告指出東部海域的黑潮為沿近海域帶來豐富性的洄游性魚類，夏季魚類有鬼頭刀、飛魚、正鰹、雨傘旗魚、黑鯧等；冬季則以烏魚、鰆魚、鯖魚、旗魚等為主，上述魚種因水溫季節性的變化而隨洋流移動，屬於季節性洄游。台灣西南海域在108年12月出現大量鰻苗，109年4月底至5月上旬捕獲大量白帶魚，說明大環境變動(海潮流、水溫)影響洄游性魚類的漁場位置(侯等，2019；吳等，2014)。

五-2：審查意見表 **提供單位：核後處**

頁	行	原　　文	修改意見或建議	回覆欄
附錄A		民國85年蘭嶼貯存場停止接收核廢料 (壕溝廢水「零排放?」	刪除「？」	已刪除。
附錄A		民國108年←**核廢料檢整開始**	修訂為「核廢料桶重裝作業開始」	已修改為「核廢料桶重裝作業開始」。
附錄A		x	新增「民國111年—核廢料桶重裝作業結束」	已新增。

附錄 C： 110-111 年度核能設施附近海域生態放射性物質調查計畫 附錄 C
期末報告定稿本
執行期間：110~111 年
契約編號：056090000701 <南部核能設施>
委託單位：台灣電力股份有限公司
執行單位：國立清華大學
中華民國 112 年 1 月

✱說明：

依台電公司 102 年 3 月 8 日
「核能電廠及蘭嶼附近海域之生態調查」，101 年期末工作檢討會
暨 102 年度新委辦工作開案會議紀錄 (附錄 B-4) 辦理。

『七、討論與決議事項』之
(十一) **自 102 年起放射性物質之調查**及核四廠海域調查監測等資料，分別**由本公司放射試驗室**及美商傑明公司提供。請兩個單位配合南、北核案研究團隊之作業時程盡早提供資料俾及時納入報告書初稿。

Zimbra **apsara@mail.nsysu.edu.tw**

核能設施附近海域生態放射性物質調查計畫 期末報告定稿

寄件者：王逢新 <u677854@taipower.com.tw> 2023 2月 03 週五, 上午 08:21
主旨：核能設施附近海域生態放射性物質調查計畫 期末報告定稿 1 個附件
收件者：apsara@mail.nsysu.edu.tw

黃小姐 您好,
附檔為清大海域放射性物質調查報告，請查照。
請於期末報告定稿時併入報告中，感謝您。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
台灣電力股份有限公司
環境保護處 監測組
王逢新
電話：(02)2366-7213
e-mail：u677854@taipower.com.tw

202301台電期末定稿本**.pdf**
3 MB

110-111 年度核能設施附近海域生態放射性物質調查計畫期末報告定稿本

(執行期間：110~111 年)

(契約編號：056090000701)

〈南部核能設施〉

委託單位：台灣電力股份有限公司

執行單位：國立清華大學

中華民國 112 年 1 月

目錄(第七章)

第一節 監測執行之意義與目的---------- 7-1
第二節 材料與方法---------- 7-2
第三節 調查結果---------- 7-3
第四節 綜合討論---------- 7-4

表目錄

表 7-1 核設施海域試樣放射性核種監測頻率與件數(南部核能設施) ---- 7-5
表 7-2 海域環境試樣放射性核種分析方法簡表 ---------- 7-6
表 7-3 放射性核種加馬能譜核種分析資料 ---------- 7-7
表 7-4 環境試樣放射性分析之預警措施基準 ---------- 7-8
表 7-5 岸砂試樣加馬核種分析表(110 年第 1 季)---------- 7-9
表 7-6 岸砂試樣加馬核種分析表(110 年第 2 季)---------- 7-10
表 7-7 岸砂試樣加馬核種分析表(110 年第 3 季)---------- 7-11
表 7-8 岸砂試樣加馬核種分析表(110 年第 4 季)---------- 7-12
表 7-9 岸砂試樣加馬核種分析表(111 年第 1 季)---------- 7-13
表 7-10 岸砂試樣加馬核種分析表(111 年第 2 季)---------- 7-14
表 7-11 岸砂試樣加馬核種分析表(111 年第 3 季)---------- 7-15
表 7-12 岸砂試樣加馬核種分析表(111 年第 4 季)---------- 7-16
表 7-13 海底沉積物試樣加馬核種分析表(110 年上半年)---------- 7-17
表 7-14 海底沉積物試樣加馬核種分析表(110 年下半年)---------- 7-17
表 7-15 海底沉積物試樣加馬核種分析表(111 年上半年)---------- 7-18
表 7-16 海底沉積物試樣加馬核種分析表(111 年下半年)---------- 7-18
表 7-17 海水試樣加馬核種分析表(110 年第 1 季)---------- 7-19
表 7-18 海水試樣加馬核種分析表(110 年第 2 季)---------- 7-20
表 7-19 海水試樣加馬核種分析表(110 年第 3 季)---------- 7-21
表 7-20 海水試樣加馬核種分析表(110 年第 4 季)---------- 7-22
表 7-21 海水試樣加馬核種分析表(111 年第 1 季)---------- 7-23
表 7-22 海水試樣加馬核種分析表(111 年第 2 季)---------- 7-24

表 7-23 海水試樣加馬核種分析表(111 年第 3 季)---------- 7-25
表 7-24 海水試樣加馬核種分析表(111 年第 4 季)---------- 7-26
表 7-25 海藻試樣加馬核種分析表(110 年第 1 季)---------- 7-27
表 7-26 海藻試樣加馬核種分析表(110 年第 2 季)---------- 7-27
表 7-27 海藻試樣加馬核種分析表(110 年第 3 季)---------- 7-28
表 7-28 海藻試樣加馬核種分析表(110 年第 4 季)---------- 7-28
表 7-29 海藻試樣加馬核種分析表(111 年第 1 季)---------- 7-29
表 7-30 海藻試樣加馬核種分析表(111 年第 2 季)---------- 7-29
表 7-31 海藻試樣加馬核種分析表(111 年第 3 季)---------- 7-30
表 7-32 海藻試樣加馬核種分析表(111 年第 4 季)---------- 7-30
表 7-33 海魚試樣加馬核種分析表(110 年第 1 季)---------- 7-31
表 7-34 海魚試樣加馬核種分析表(110 年第 2 季)---------- 7-31
表 7-35 海魚試樣加馬核種分析表(110 年第 3 季)---------- 7-32
表 7-36 海魚試樣加馬核種分析表(110 年第 4 季)---------- 7-32
表 7-37 海魚試樣加馬核種分析表(111 年第 1 季)---------- 7-33
表 7-38 海魚試樣加馬核種分析表(111 年第 2 季)---------- 7-33
表 7-39 海魚試樣加馬核種分析表(111 年第 3 季)---------- 7-34
表 7-40 海魚試樣加馬核種分析表(111 年第 4 季)---------- 7-34
表 7-41 植物(草)試樣加馬核種分析表(110 年第 1 季)---------- 7-35
表 7-42 植物(草)試樣加馬核種分析表(110 年第 2 季)---------- 7-35
表 7-43 植物(草)試樣加馬核種分析表(110 年第 3 季)---------- 7-35
表 7-44 植物(草)試樣加馬核種分析表(110 年第 4 季)---------- 7-35
表 7-45 植物(草)試樣加馬核種分析表(111 年第 1 季)---------- 7-36
表 7-46 植物(草)試樣加馬核種分析表(111 年第 2 季)---------- 7-36
表 7-47 植物(草)試樣加馬核種分析表(111 年第 3 季)---------- 7-36
表 7-48 植物(草)試樣加馬核種分析表(111 年第 4 季)---------- 7-36
表 7-49 天然放射性核種於各類試樣中的分佈(南部-110 年)---------- 7-37
表 7-50 天然放射性核種於各類試樣中的分佈(南部-111 年)---------- 7-37
表 7-51 人工放射性核種於各類試樣中的分佈(南部-110 年)---------- 7-38
表 7-52 人工放射性核種於各類試樣中的分佈(南部-111 年)---------- 7-38

附件

附件 7-1 海域環境採樣地點描述 ---------- 7-39
附件 7-2 海域環境採樣地點圖示 ---------- 7-44
附件 7-3 環境試樣加馬能譜計測最小可測量值（南部） ---------- 7-47

第七章
放射性物質監測

第一節　監測執行之意義與目的

為瞭解南北部核能電廠及低放貯存場附近海域之生態環境是否受到電廠運轉衝擊，包括溫排水影響範圍內、外生物因子變化調查，並分析環境因子之變動對生物之影響，期使核能發電廠及低放貯存場之營運對環境之衝擊減至最低的程度，而此項作業必須長時期研究才能瞭解。行政院原子能委員會有鑑於此，於民國68年7月開始委託中央研究院國際環境科學委員會進行台灣南部核能電廠附近之長期性生態環境調查。並自民國85年7月起將核能一、二、三廠及蘭嶼附近海域之生態環境調查交由台灣電力公司辦理。

由於放射性物質調查為評估核能電廠及低放貯存場之運作對其周遭環境的影響所不可或缺的、也是最直接的工作；其目的為偵測核能設施所釋出放射性物質種類，及瞭解環境試樣中的放射活度是否符合行政院原子能委員會所訂定環境輻射監測規範中「環境試樣放射性分析之預警措施基準」之要求。在偵測出人工核種活度有異常上升時，應立即提報，尋找原因，謀求解決之道。當輻射強度可能有安全疑慮時，應即依行動基準提出預警，依循因應措施行事。本計畫乃受台電公司的委託，對於所屬各核子設施海域進行海域環境試樣放射性核種分析，藉此平行監測，觀察因核子設施外釋放射性物質對海域環境的影響。選擇代表性海域環境試樣如岸砂、海底沉積物、海水、海藻，海魚與鄰海植物等試樣進行加馬能譜分析，針對主要人為放射性核種如^{137}Cs、^{60}Co等，視為長期觀測的對象，藉此判斷海域放射性核種的變化趨勢。

第二節　材料與方法

一、調查範圍

1. 核三廠部份：著重於出、入水口周圍的監測，包括海水、岸砂、海底沉積物、海藻與魚類採樣，再進行放射性核種加馬能譜分析。
2. 低放貯存場部份：著重於蘭嶼本島的東南部，即貯存場周圍的監測。選取環境樣品中的岸砂、海底沉積物、海水、海藻、陸域植物(草樣)及魚類樣品，再進行放射性核種加馬能譜分析。

二、採樣地點與監測件次

1. 各核能設施海域環境採樣地點描述如附件7-1。
2. 各核能設施海域環境地點圖示如附件7-2。
3. 各核能設施的海域試樣於110至111年的監測件次彙整於表7-1。

三、分析項目與方法

各類海域環境試樣的分析項目與方法列於表7-2。放射性核種分析的項目主要為加馬能譜核種分析，天然放射性核種(如^{40}K、^{238}U系列，與^{232}Th系列)與可能之人工放射性核種(如^{137}Cs、^{60}Co等)於分析時使用之加馬射線能量則列於表7-3。

四、環境試樣最小可測值要求

1. 環境試樣之放射性分析及能譜分析其最小可測量值評估方法如下式：

$$\mathrm{MDA} = \frac{4.65 \times \mathrm{B}^{1/2} + 3}{60 \times \mathrm{E} \times \mathrm{R} \times \mathrm{V} \times \mathrm{T}} \quad \text{單位} = \mathrm{Bq/L} \text{ 或 } \mathrm{Bq/kg} \qquad [1]$$

T：適當之空白試樣計數時間(分)。

B：適當之空白試樣的計數值，適宜空白試樣含合適物質與雜質(或干擾物質)；　化學處理程序、計測時間及幾何形狀均與待分析之試樣相同。

E：待測核種的計數效率。

R：化學回收率。

V：試樣量，以體積或質量為單位表示。

2. 各類試樣之最小可測量值（MDA）列於附件7-3。

五、法規依據

1. 試樣分析最小可測量(MDA)依「環境輻射監測規範」所訂之紀錄基準值。
2. 試樣分析結果若超過「環境輻射監測規範」所訂之調查基準(如表7-4所列)，則立即知會台電公司。

六、參考文獻

1. 輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測作業準則，民國 105 年 6 月 27 日行政院原子能委員會修正。
2. 環境輻射監測規範，民國 98 年 11 月 11 日行政院原子能委員會修正。

第三節　調查結果

各類試樣分析結果(111 年下半年)

1. 各核能設施岸砂試樣核種分析結果列於表 7-11～7-12。主要測得天然放射性核種 ^{7}Be、^{40}K、^{232}Th與^{238}U等，僅於核三廠潭子灣(SS35)測得微量人工放射性核種 ^{137}Cs（測值為 0.58 貝克/公斤)。該試樣送台電放射試驗室複測，測試結果為：^{137}Cs (0.92 貝克/公斤)。
2. 各核能設施海底沉積物試樣分析結果列於表 7-16。主要測得天然放射性核種 ^{7}Be、^{40}K、^{232}Th與^{238}U等，未測得人工放射性核種。
3. 各核能設施海水試樣核種分析結果列於表 7-23～7-24。均測得天然放射性核種^{40}K，未測得人工放射性核種。
4. 各核能設施海藻試樣核種分析結果列於表 7-31～7-32。主要測得天然放射性核種 ^{7}Be與^{40}K，未測得人工放射性核種。
5. 各核能設施海魚試樣核種分析結果列於表 7-39～7-40。均測得天然放射性核種^{40}K，未測得人工放射性核種。
6. 蘭嶼地區植物(草)試樣核種分析結果列於表 7-47～7-48。主要測得天然放射性核種 ^{7}Be與^{40}K，未測得人工放射性核種。

第四節　綜合討論

一、天然放射性核種的探討

1. 調查期間(110~111 年)各類試樣均含天然放射性核種，如 ^{7}Be、^{40}K、^{232}Th系與^{238}U系列核種，其活度分佈如表 7-49 與 7-50 所列。
2. 岸砂與海底沉積物所含的天然放射性核種主要為^{40}K、^{232}Th與^{238}U系列，另有 ^{7}Be其源自大氣的沉降。其中蘭嶼礁岸(SD51 與 SD52)含 ^{7}Be活度較高，乃因匯集陸地地表 ^{7}Be的沉降，經雨水沖刷至海邊礁岸底泥中，長期累積所致。
3. 海水中主要天然放射性核種為^{40}K。
4. 海藻與海魚為生活於海水中的生物，主要天然放射性核種為^{40}K，海藻類亦測得 ^{7}Be，其源於大氣的沉降。另外，海藻中^{40}K受生長季節與種類影響。
5. 植物(草)所含的天然放射性核種為 ^{7}Be與^{40}K，其中 ^{7}Be源自於大氣的沉降，而^{40}K則由土壤中吸收。

二、人工放射性核種的探討

1. 茲將 110~111 年各類試樣所測得之人工放射性核種的活度分佈列於表 7-51 與 7-52。
2. 大多數試樣均未測得人工放射性核種，僅 110 年下半年於蘭嶼礁岸海底沉積物(SD52)測得微量 ^{137}Cs(測值為 1.1 貝克/公斤)，該測站歷史活度變動範圍為: ㄧ～3.4 貝克/公斤。另 111 年第 2 與第 4 季於核三廠潭子灣岸砂(SS35)測得微量 ^{137}Cs (測值分別為 1.0 與 0.58 貝克/公斤) ，該測站歷史活度變動範圍為: ㄧ～1.4 貝克/公斤。上述測值均低於環境輻射監測規範之調查基準(海底沉積物: 740 貝克/公斤‧乾重; 岸砂: 20 貝克/公斤‧乾重)。

三、結論

1. 本次調查期間(110~111 年)執行南部核能設施海域環境放射性物質調查，進行岸砂、海底沉積物、海水、海藻、海魚與植物的採樣與核種分析，共計 264 件次。
2. 各類試樣主要測得天然放射性核種，如 ^{7}Be、^{40}K、^{232}Th與^{238}U，僅於蘭嶼礁岸海底沉積物(SD52)與核三廠海域之岸砂(SS35)測得人工放射性核種 ^{137}Cs，活度均低於環境輻射監測規範之調查基準。
3. 運轉中的各核設施分析結果相較於背景試樣，如未運轉的龍門廠海域環境試樣，並未有明顯的差異。調查期間分析結果與過往相較，未有明顯差異。環境試樣中測得之微量核種^{137}Cs，其可能源自於過往全球核武試爆落塵與國外核設施意外事件外釋所致。

表 7-1 核能設施海域試樣放射性核種監測頻率與件數（南部核能設施）

試樣種類 / 核能設施	試樣（件次）						各設施件次
	岸砂	海底沉積物（海底泥或潮池底泥）	海水	海藻	海魚	植物（草）	
核三廠							
110_第一季	5	2	5	3	2	/	32
110_第二季	5		5	3	2	/	
110_第三季	5	2	5	3	2	/	32
110_第四季	5		5	3	2	/	
111_第一季	5	2	5	3	2	/	32
111_第二季	5		5	3	2	/	
111_第三季	5	2	5	3	2	/	32
111_第四季	5		5	3	2	/	
低放貯存場							
110_第一季	6	2	4	2	2	2	34
110_第二季	6		4	2	2	2	
110_第三季	6	2	4	2	2	2	34
110_第四季	6		4	2	2	2	
111_第一季	6	2	4	2	2	2	34
111_第二季	6		4	2	2	2	
111_第三季	6	2	4	2	2	2	34
111_第四季	6		4	2	2	2	
總件次							264

註 1：“/”代表未規劃採樣。

註 2：比照現行核能發電廠環測採樣規畫，自 106 年起「海底沉積物」採樣頻率更改為每半年取樣分析一次（已於 105 年 9 月陳報主管機關並經同意）。

表 7-2 海域環境試樣放射性核種分析方法簡表

試樣類別	分析類別	分析方法簡介
岸砂	加馬核種	烘乾篩濾後裝罐，以純鍺加馬能譜分析系統計測。
海底沉積物	加馬核種	烘乾後裝罐，以純鍺加馬能譜分析系統計測。
海水	加馬核種	直接裝罐，以純鍺加馬能譜分析系統計測。
海藻	加馬核種	烘乾灰化後裝罐，以純鍺加馬能譜分析系統計測。
海魚	加馬核種	烘乾灰化後裝罐，以純鍺加馬能譜分析系統計測。
植物(草)	加馬核種	烘乾灰化後裝罐，以純鍺加馬能譜分析系統計測。

表 7-3 放射性核種加馬能譜核種分析資料

核種（系）	半化期	加馬能譜（keV）	豐度（%）	備註
天然放射性核種				
^{7}Be	53.12 d	477.6	10.5	
^{40}K	1.28×10^{9} y	1460.8	10.7	
^{238}U 系	4.47×10^{9} y			
^{214}Pb		351.9	37.6	
^{214}Bi		609.3	46.1	註 1
^{232}Th 系	1.4×10^{10} y			
^{228}Ac		911.2	29	
^{212}Pb		238.6	43.3	
^{212}Bi		727.3	6.58	
^{208}Tl		583.2	86	註 2
人工放射性核種				
^{137}Cs	30.2 y	662	85.1	分裂產物
^{131}I	8.04 d	364	81.2	分裂產物
^{54}Mn	312 d	835	100	活化產物
^{60}Co	5.27 y	1173	99.9	活化產物
		1332	100	
^{58}Co	70.8 d	811	99.4	活化產物
^{59}Fe	44.6 d	1099 1292	56.5 43.2	活化產物
^{65}Zn	244 d	1116	50.7	活化產物
^{51}Cr	27.7 d	320	9.83	活化產物
^{110m}Ag	252 d	658 885	94.7 72.9	活化產物

註 1：自然環境中當^{238}U系列達成平衡時，依加馬能譜測量^{214}Bi核種以代表該系列活度。

註 2：自然環境中當^{232}Th系列達成平衡時，依加馬能譜測量^{208}Tl核種以代表該系列活度。

表 7-4 環境試樣放射性分析之預警措施基準

試樣 / 預警基準 / 核種	水 (貝克/升)		空氣 (毫貝克/立方公尺)		農漁產品 (貝克/仟克・鮮重)		蔬菜(草樣) (貝克/仟克・鮮重)		牛奶 (貝克/升)		沉積物 (貝克/仟克・乾重)	
	紀	調	紀	調	紀	調	紀	調	紀	調	紀	調
總貝他	0.1	1.0	1.0	90.0	5.0		5.0		5.0		100	
氚(H)-3	10	1100										
錳(Mn)-54	0.4	40	0.6		0.3	110	0.5		0.4		3	110
鐵(Fe)-59	0.7	15	1.2		0.5	40	0.9		0.7		6	
鈷(Co)-58	0.4	40	0.6		0.3	110	0.5		0.4		3	110
鈷(Co)-60	0.4	10	0.6		0.3	40	0.5		0.4		3	110
鋅(Zn)-65	0.9	10	1.5		0.5	74	1.0		0.9		7	
鍶(Sr)-89	0.1		1.0		1.0		1.0					
鍶(Sr)-90	0.1		1.0		1.0		1.0		10		10	
鋯 (Zr)-95/ 鈮 (Nb)-95	0.7	15	1.0		0.5		0.9		0.7		6	
碘(I)-131	0.1	1	0.5	30			0.4	4	0.1	0.4	3	
銫(Cs)-134	0.4	2	0.6	370	0.3	8	0.5	37	0.4	3	3	74(20)
銫(Cs)-137	0.4	2	0.6	740	0.3	74	0.5	74	0.4	3	3	740(20)
鋇 (Ba)-140/ 鑭(La)-140	0.4	10	2.0		1.0		1.0		1.0	10	10	
直接輻射 (μSv/h)			0.01	1.0								

說明：

1. 紀：紀錄基準；調：調查基準

2. 水樣不含雨水，雨水分析比照落塵規定。

3. 沉積物包括土壤、底泥與岸砂。岸砂銫(Cs)-134 與銫(Cs)-137 的調查基準均為 20 貝克/仟克·乾重。

4. 監測值與調查基準之比對，以計畫核定頻度內之平均測值為基準。

5. 水的碘(I)-131 預警基準適用於飲用水。

6. 調查基準由各核設施自行評估後，依核備之年度計畫執行。

表 7-5 岸砂試樣加馬核種分析表（110 年第 1 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤·乾重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SS31	核三出水口(右堤)	—	—	—	—	29±4	—	3.5±0.5
SS32	核三出水口(南側)	—	—	—	—	23±3	1.9±0.4	5.4±0.5
SS33	南灣	—	—	—	—	62±4	2.5±0.5	2.4±0.5
SS34	核三入水口	—	—	—	—	40±4	3.2±0.5	3.2±0.4
SS35	潭子灣	—	—	—	—	114±6	5.0±0.7	2.8±0.6
SS51	蘭嶼礁岸(南側)	23±2	—	—	—	28±4	—	—
SS52	蘭嶼礁岸(北側)	40±3	—	—	—	33±4	2.5±0.5	2.8±0.6
SS53	蘭嶼(野銀)	13±2	—	—	—	103±6	11±0.9	9.3±0.7
SS54	蘭嶼(東清)	7±2	—	—	—	110±6	6.2±0.7	5.0±0.5
SS55	蘭嶼(漁人)	27±3	—	—	—	143±7	14±0.9	9.7±0.6
SS56	蘭嶼(龍門港)	—	—	—	—	60±5	4.8±0.7	5.4±0.6

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-6 岸砂試樣加馬核種分析表（110 年第 2 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤·乾重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SS31	核三出水口(右堤)	—	—	—	—	29±3	3.2±0.6	4.3±0.5
SS32	核三出水口(南側)	—	—	—	—	31±4	—	5.4±0.6
SS33	南灣	—	—	—	—	60±4	2.6±0.6	3.3±0.5
SS34	核三入水口	—	—	—	—	44±4	2.0±0.7	3.7±0.5
SS35	潭子灣	—	—	—	—	99±6	3.0±0.7	2.9±0.5
SS51	蘭嶼礁岸(南側)	—	—	—	—	27±3	3.8±0.7	—
SS52	蘭嶼礁岸(北側)	12±3	—	—	—	34±4	2.0±0.5	—
SS53	蘭嶼(野銀)	—	—	—	—	147±7	9.7±0.8	7.5±0.6
SS54	蘭嶼(東清)	—	—	—	—	127±7	8.2±1.0	6.9±0.6
SS55	蘭嶼(漁人)	—	—	—	—	173±8	16±1	10±0.6
SS56	蘭嶼(龍門港)	—	—	—	—	64±5	3.4±0.6	2.7±0.5

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-7 岸砂試樣加馬核種分析表（110 年第 3 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤·乾重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SS31	核三出水口(右堤)	—	—	—	—	26±4	—	3.9±0.6
SS32	核三出水口(南側)	—	—	—	—	24±4	—	5.0±0.5
SS33	南灣	—	—	—	—	55±4	3.2±0.7	3.7±0.5
SS34	核三入水口	—	—	—	—	44±4	2.0±0.6	4.5±0.5
SS35	潭子灣	—	—	—	—	108±6	4.2±0.6	4.1±0.5
SS51	蘭嶼礁岸(南側)	—	—	—	—	30±4	2.4±0.5	2.3±0.4
SS52	蘭嶼礁岸(北側)	24±3	—	—	—	34±4	—	2.1±0.5
SS53	蘭嶼(野銀)	—	—	—	—	105±6	12±0.9	8.2±0.6
SS54	蘭嶼(東清)	—	—	—	—	146±7	8.5±0.8	7.9±0.6
SS55	蘭嶼(漁人)	—	—	—	—	158±7	14±0.9	11±0.7
SS56	蘭嶼(龍門港)	13±2	—	—	—	49±4	2.6±0.6	3.0±0.5

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-8 岸砂試樣加馬核種分析表（110 年第 4 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤·乾重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SS31	核三出水口(右堤)	—	—	—	—	30±4	2.8±0.7	3.9±0.5
SS32	核三出水口(南側)	—	—	—	—	27±3	2.3±0.6	6.0±0.5
SS33	南灣	—	—	—	—	102±6	6.4±0.8	8.7±0.7
SS34	核三入水口	—	—	—	—	40±4	3.1±0.5	4.2±0.5
SS35	潭子灣	—	—	—	—	120±6	5.4±0.8	5.2±0.6
SS51	蘭嶼礁岸(南側)	22±2	—	—	—	51±5	3.3±0.7	3.3±0.6
SS52	蘭嶼礁岸(北側)	9±2	—	—	—	32±4	—	2.9±0.4
SS53	蘭嶼(野銀)	—	—	—	—	97±6	11±0.9	8.8±0.6
SS54	蘭嶼(東清)	—	—	—	—	130±7	9.8±0.9	7.3±0.6
SS55	蘭嶼(漁人)	—	—	—	—	145±7	13±0.9	9.9±0.7
SS56	蘭嶼(龍門港)	—	—	—	—	46±4	2.7±0.6	3.5±0.5

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-9 岸砂試樣加馬核種分析表（111 年第 1 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤·乾重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SS31	核三出水口(右堤)	—	—	—	—	25±3	—	3.5±0.5
SS32	核三出水口(南側)	—	—	—	—	27±4	—	6.1±0.6
SS33	南灣	—	—	—	—	77±5	3.5±0.7	3.8±0.4
SS34	核三入水口	—	—	—	—	36±4	2.3±0.6	3.7±0.5
SS35	潭子灣	4.9±1.5	—	—	—	167±8	6.8±0.9	5.6±0.6
SS51	蘭嶼礁岸(南側)	—	—	—	—	74±5	5.2±0.7	6.4±0.6
SS52	蘭嶼礁岸(北側)	56±3	—	—	—	25±4	—	3.9±0.5
SS53	蘭嶼(野銀)	7±2	—	—	—	89±5	8.9±0.8	9.0±0.7
SS54	蘭嶼(東清)	—	—	—	—	145±7	9.6±0.8	7.7±0.7
SS55	蘭嶼(漁人)	12±2	—	—	—	132±7	15±1	11±0.6
SS56	蘭嶼(龍門港)	34±3	—	—	—	50±4	3.1±0.7	2.5±0.4

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-10 岸砂試樣加馬核種分析表（111 年第 2 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤·乾重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SS31	核三出水口(右堤)	—	—	—	—	30±4	1.9±0.5	3.5±0.5
SS32	核三出水口(南側)	—	—	—	—	28±4	—	5.0±0.6
SS33	南灣	—	—	—	—	66±5	2.9±0.5	4.6±0.6
SS34	核三入水口	—	—	—	—	27±4	—	2.4±0.6
SS35	潭子灣	—	—	—	1.0±0.2	171±8	6.5±0.8	5.7±0.7
SS51	蘭嶼礁岸(南側)	15±2	—	—	—	32±4	2.0±0.6	—
SS52	蘭嶼礁岸(北側)	87±5	—	—	—	28±4	—	2.5±0.6
SS53	蘭嶼(野銀)	13±2	—	—	—	90±5	9.5±0.8	7.4±0.6
SS54	蘭嶼(東清)	—	—	—	—	127±6	8.0±0.7	6.5±0.6
SS55	蘭嶼(漁人)	10±2	—	—	—	147±7	16±1	12±0.8
SS56	蘭嶼(龍門港)	12±3	—	—	—	71±5	4.9±0.9	5.2±0.6

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-11 岸砂試樣加馬核種分析表（111 年第 3 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤·乾重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SS31	核三出水口(右堤)	—	—	—	—	30±4	—	4.0±0.5
SS32	核三出水口(南側)	—	—	—	—	29±4	2.5±0.7	5.8±0.6
SS33	南灣	—	—	—	—	45±5	3.7±0.7	2.6±0.5
SS34	核三入水口	—	—	—	—	37±4	2.9±0.5	4.4±0.5
SS35	潭子灣	—	—	—	—	159±8	6.2±0.8	4.3±0.6
SS51	蘭嶼礁岸(南側)	—	—	—	—	81±7	3.6±0.8	5.4±0.6
SS52	蘭嶼礁岸(北側)	38±3	—	—	—	37±4	2.0±0.5	2.2±0.5
SS53	蘭嶼(野銀)	—	—	—	—	60±5	2.9±0.6	2.4±0.6
SS54	蘭嶼(東清)	—	—	—	—	96±5	5.2±0.7	4.2±0.5
SS55	蘭嶼(漁人)	—	—	—	—	146±10	14±1	11±0.7
SS56	蘭嶼(龍門港)	19±2	—	—	—	68±6	3.9±0.6	3.0±0.5

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-12 岸砂試樣加馬核種分析表（111 年第 4 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤·乾重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SS31	核三出水口(右堤)	—	—	—	—	46±5	3.2±0.5	3.2±0.6
SS32	核三出水口(南側)	—	—	—	—	74±5	3.4±0.6	6.2±0.4
SS33	南灣	—	—	—	—	58±4	4.0±0.5	3.5±0.5
SS34	核三入水口	—	—	—	—	77±9	3.3±0.6	4.4±0.4
SS35	潭子灣	—	—	—	0.58±0.15	171±8	3.8±0.5	3.8±0.5
SS51	蘭嶼礁岸(南側)	16±2	—	—	—	32±4	2.0±0.5	3.0±0.4
SS52	蘭嶼礁岸(北側)	9±2	—	—	—	28±4	2.1±0.6	3.2±0.5
SS53	蘭嶼(野銀)	—	—	—	—	106±6	8.5±0.8	7.6±0.6
SS54	蘭嶼(東清)	—	—	—	—	150±10	8.8±0.8	6.9±0.6
SS55	蘭嶼(漁人)	—	—	—	—	134±9	14±1	11±0.7
SS56	蘭嶼(龍門港)	—	—	—	—	46±5	2.6±0.6	3.2±0.5

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-13 海底沉積物試樣加馬核種分析表（110 年上半年）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤·乾重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SD31	核三出水口	—	—	—	—	40±4	3.5±0.7	3.6±0.6
SD32	核三入水口	—	—	—	—	34±3	2.9±0.5	2.6±0.4
SD51	蘭嶼礁岸(南側)	1934±59	—	—	—	63±9	6.2±1.2	5.7±1.1
SD52	蘭嶼礁岸(北側)	683±23	—	—	—	31±7	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-14 海底沉積物試樣加馬核種分析表（110 年下半年）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤·乾重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SD31	核三出水口	—	—	—	—	49±4	3.7±0.7	3.2±0.4
SD32	核三入水口	—	—	—	—	58±5	4.9±0.8	5.7±0.7
SD51	蘭嶼礁岸(南側)	17±2	—	—	—	22±4	—	2.1±0.6
SD52	蘭嶼礁岸(北側)	416±15	—	—	1.1±0.3	49±7	6±1	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-15 海底沉積物試樣加馬核種分析表（111 年上半年）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤·乾重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SD31	核三出水口	—	—	—	—	38±4	4.7±0.9	5.1±0.6
SD32	核三入水口	—	—	—	—	43±4	3.3±0.7	3.6±0.5
SD51	蘭嶼礁岸(南側)	2202±66	—	—	—	65±10	6.5±1.4	—
SD52	蘭嶼礁岸(北側)	1829±66	—	—	—	98±11	7.7±2.0	16±2

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-16 海底沉積物試樣加馬核種分析表（111 年下半年）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤·乾重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SD31	核三出水口	—	—	—	—	55±5	4.4±0.6	4.8±0.6
SD32	核三入水口	—	—	—	—	46±5	4.4±0.7	5.5±0.6
SD51	蘭嶼礁岸(南側)	784±28	—	—	—	60±9	—	20±2
SD52	蘭嶼礁岸(北側)	1272±54	—	—	—	47±10	—	6±1

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-17 海水試樣加馬核種分析表（110 年第 1 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公升）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SW31	核三出水口(右堤)	—	—	—	—	12±0.8	—	—
SW32	核三出水口(南側)	—	—	—	—	12±0.6	—	—
SW33	南灣	—	—	—	—	12±0.7	—	—
SW34	核三入水口	—	—	—	—	12±0.7	—	—
SW35	潭子灣	—	—	—	—	13±0.9	—	—
SW51	蘭嶼礁岸(南側)	—	—	—	—	13±0.7	—	—
SW52	蘭嶼礁岸(北側)	—	—	—	—	13±0.9	—	—
SW53	蘭嶼(野銀)	—	—	—	—	12±0.8	—	—
SW54	蘭嶼(東清)	—	—	—	—	12±0.6	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-18 海水試樣加馬核種分析表（110 年第 2 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公升）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SW31	核三出水口(右堤)	—	—	—	—	10±0.8	—	—
SW32	核三出水口(南側)	—	—	—	—	11±0.9	—	—
SW33	南灣	—	—	—	—	12±0.6	—	—
SW34	核三入水口	—	—	—	—	13±0.7	—	—
SW35	潭子灣	—	—	—	—	12±0.9	—	—
SW51	蘭嶼礁岸(南側)	—	—	—	—	13±0.6	—	—
SW52	蘭嶼礁岸(北側)	—	—	—	—	13±0.8	—	—
SW53	蘭嶼(野銀)	—	—	—	—	12±0.7	—	—
SW54	蘭嶼(東清)	—	—	—	—	14±0.7	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-19 海水試樣加馬核種分析表（110 年第 3 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公升）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SW31	核三出水口(右堤)	—	—	—	—	10±0.7	—	—
SW32	核三出水口(南側)	—	—	—	—	10±0.9	—	—
SW33	南灣	—	—	—	—	8.3±0.9	—	—
SW34	核三入水口	—	—	—	—	12±0.7	—	—
SW35	潭子灣	—	—	—	—	9.3±0.7	—	—
SW51	蘭嶼礁岸(南側)	—	—	—	—	9.9±0.9	—	—
SW52	蘭嶼礁岸(北側)	—	—	—	—	12±0.7	—	—
SW53	蘭嶼(野銀)	—	—	—	—	11±0.6	—	—
SW54	蘭嶼(東清)	—	—	—	—	8.4±0.8	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-20 海水試樣加馬核種分析表（110 年第 4 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公升）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SW31	核三出水口(右堤)	—	—	—	—	8.4±0.7	—	—
SW32	核三出水口(南側)	—	—	—	—	5.5±0.7	—	—
SW33	南灣	—	—	—	—	12±1	—	—
SW34	核三入水口	—	—	—	—	10±0.8	—	—
SW35	潭子灣	—	—	—	—	12±1	—	—
SW51	蘭嶼礁岸(南側)	—	—	—	—	11±0.6	—	—
SW52	蘭嶼礁岸(北側)	—	—	—	—	14±1	—	—
SW53	蘭嶼(野銀)	—	—	—	—	10±0.7	—	—
SW54	蘭嶼(東清)	—	—	—	—	11±0.7	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-21 海水試樣加馬核種分析表（111 年第 1 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公升）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SW31	核三出水口(右堤)	—	—	—	—	11±0.9	—	—
SW32	核三出水口(南側)	—	—	—	—	12±0.8	—	—
SW33	南灣	—	—	—	—	12±0.8	—	—
SW34	核三入水口	—	—	—	—	11±0.8	—	—
SW35	潭子灣	—	—	—	—	11±0.8	—	—
SW51	蘭嶼礁岸(南側)	—	—	—	—	14±0.8	—	—
SW52	蘭嶼礁岸(北側)	—	—	—	—	12±0.8	—	—
SW53	蘭嶼(野銀)	—	—	—	—	12±0.9	—	—
SW54	蘭嶼(東清)	—	—	—	—	13±0.7	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-22 海水試樣加馬核種分析表（111 年第 2 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公升）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SW31	核三出水口(右堤)	—	—	—	—	12±0.8	—	—
SW32	核三出水口(南側)	—	—	—	—	13±1	—	—
SW33	南灣	—	—	—	—	12±0.8	—	—
SW34	核三入水口	—	—	—	—	12±0.8	—	—
SW35	潭子灣	—	—	—	—	9.8±0.7	—	—
SW51	蘭嶼礁岸(南側)	—	—	—	—	12±0.8	—	—
SW52	蘭嶼礁岸(北側)	—	—	—	—	11±0.8	—	—
SW53	蘭嶼(野銀)	—	—	—	—	13±0.9	—	—
SW54	蘭嶼(東清)	—	—	—	—	12±0.8	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-23 海水試樣加馬核種分析表（111 年第 3 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公升）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SW31	核三出水口(右堤)	—	—	—	—	12±0.8	—	—
SW32	核三出水口(南側)	—	—	—	—	9.2±1.0	—	—
SW33	南灣	—	—	—	—	10±0.7	—	—
SW34	核三入水口	—	—	—	—	11±0.9	—	—
SW35	潭子灣	—	—	—	—	12±1	—	—
SW51	蘭嶼礁岸(南側)	—	—	—	—	11±0.8	—	—
SW52	蘭嶼礁岸(北側)	—	—	—	—	12±0.8	—	—
SW53	蘭嶼(野銀)	—	—	—	—	11±0.8	—	—
SW54	蘭嶼(東清)	—	—	—	—	10±0.7	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-24 海水試樣加馬核種分析表（111 年第 4 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公升）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SW31	核三出水口(右堤)	—	—	—	—	12±0.8	—	—
SW32	核三出水口(南側)	—	—	—	—	11±1	—	—
SW33	南灣	—	—	—	—	12±0.8	—	—
SW34	核三入水口	—	—	—	—	11±0.8	—	—
SW35	潭子灣	—	—	—	—	13±1	—	—
SW51	蘭嶼礁岸(南側)	—	—	—	—	12±2	—	—
SW52	蘭嶼礁岸(北側)	—	—	—	—	13±2	—	—
SW53	蘭嶼(野銀)	—	—	—	—	12±2	—	—
SW54	蘭嶼(東清)	—	—	—	—	13±2	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-25 海藻試樣加馬核種分析表（110 年第 1 季）

試樣編號	地點	核種活度(貝克/公斤‧鮮重)							
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{131}I	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SP31	核三出水口(南側)	—	—	—	—	—	36±3	—	—
SP32	南灣	—	—	—	—	—	63±3	—	—
SP33	核三入水口	—	—	—	—	—	68±5	—	—
SP51	蘭嶼礁岸(南側)	16±2	—	—	—	—	572±18	—	—
SP52	蘭嶼礁岸(北側)	10±1	—	—	—	—	598±18	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-26 海藻試樣加馬核種分析表（110 年第 2 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤‧鮮重）							
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{131}I	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SP31	核三出水口(南側)	2.7±0.8	—	—	—	—	82±3	—	—
SP32	南灣	—	—	—	—	—	54±4	—	—
SP33	核三入水口	—	—	—	—	—	168±6	—	—
SP51	蘭嶼礁岸(南側)	2.1±0.5	—	—	—	—	652±20	—	—
SP52	蘭嶼礁岸(北側)	—	—	—	—	—	618±19	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-27 海藻試樣加馬核種分析表（110 年第 3 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤·鮮重）							
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{131}I	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SP31	核三出水口(南側)	—	—	—	—	—	92±6	—	—
SP32	南灣	—	—	—	—	—	77±4	—	—
SP33	核三入水口	—	—	—	—	—	41±2	—	—
SP51	蘭嶼礁岸(南側)	4.5±0.9	—	—	—	—	262±9	—	—
SP52	蘭嶼礁岸(北側)	—	—	—	—	—	264±9	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-28 海藻試樣加馬核種分析表（110 年第 4 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤·鮮重）							
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{131}I	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SP31	核三出水口(南側)	—	—	—	—	—	333±13	—	—
SP32	南灣	—	—	—	—	—	121±5	—	—
SP33	核三入水口	—	—	—	—	—	89±6	—	—
SP51	蘭嶼礁岸(南側)	11±1	—	—	—	—	308±10	—	—
SP52	蘭嶼礁岸(北側)	10±1	—	—	—	—	331±11	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-29 海藻試樣加馬核種分析表（111 年第 1 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤‧鮮重）							
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{131}I	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SP31	核三出水口(南側)	—	—	—	—	—	77±4	—	—
SP32	南灣	—	—	—	—	—	118±5	—	—
SP33	核三入水口	—	—	—	—	—	73±4	—	—
SP51	蘭嶼礁岸(南側)	49±2	—	—	—	—	450±15	—	—
SP52	蘭嶼礁岸(北側)	—	—	—	—	—	569±18	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-30 海藻試樣加馬核種分析表（111 年第 2 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤‧鮮重）							
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{131}I	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SP31	核三出水口(南側)	2.2±0.5	—	—	—	—	152±5	—	—
SP32	南灣	—	—	—	—	—	182±6	—	—
SP33	核三入水口	—	—	—	—	—	286±9	—	—
SP51	蘭嶼礁岸(南側)	22±2	—	—	—	—	487±16	—	—
SP52	蘭嶼礁岸(北側)	10±1	—	—	—	—	526±17	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-31 海藻試樣加馬核種分析表（111 年第 3 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤‧鮮重）							
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{131}I	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SP31	核三出水口(南側)	—	—	—	—	—	242±10	—	4.5±0.7
SP32	南灣	3.5±0.8	—	—	—	—	65±3	—	1.0±0.2
SP33	核三入水口	8±2	—	—	—	—	49±5	4.0±0.6	2.4±0.4
SP51	蘭嶼礁岸(南側)	3.3±0.4	—	—	—	—	127±4	—	—
SP52	蘭嶼礁岸(北側)	1.4±0.4	—	—	—	—	293±9	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-32 海藻試樣加馬核種分析表（111 年第 4 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤‧鮮重）							
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{131}I	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SP31	核三出水口(南側)	—	—	—	—	—	173±8	—	—
SP32	南灣	—	—	—	—	—	104±7	—	—
SP33	核三入水口	—	—	—	—	—	80±5	—	—
SP51	蘭嶼礁岸(南側)	7±1	—	—	—	—	772±24	—	—
SP52	蘭嶼礁岸(北側)	—	—	—	—	—	16±2	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-33 海魚試樣加馬核種分析表（110 年第 1 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤·鮮重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SF31	核三出水口#1	—	—	—	—	99±3	—	—
SF32	核三出水口#2	—	—	—	—	83±3	—	—
SF51	蘭嶼海域#1	—	—	—	—	139±5	—	—
SF52	蘭嶼海域#2	—	—	—	—	141±5	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-34 海魚試樣加馬核種分析表（110 年第 2 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤·鮮重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SF31	核三出水口#1	—	—	—	—	98±3	—	—
SF32	核三出水口#2	—	—	—	—	80±3	—	—
SF51	蘭嶼海域#1	—	—	—	—	173±7	—	—
SF52	蘭嶼海域#2	—	—	—	—	201±8	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-35 海魚試樣加馬核種分析表（110 年第 3 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤‧鮮重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SF31	核三出水口#1	—	—	—	—	85±3	—	—
SF32	核三出水口#2	—	—	—	—	82±3	—	—
SF51	蘭嶼海域#1	—	—	—	—	146±6	—	—
SF52	蘭嶼海域#2	—	—	—	—	118±4	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-36 海魚試樣加馬核種分析表（110 年第 4 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤‧鮮重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SF31	核三出水口#1	—	—	—	—	132±5	—	—
SF32	核三出水口#2	—	—	—	—	107±4	—	—
SF51	蘭嶼海域#1	—	—	—	—	234±8	—	—
SF52	蘭嶼海域#2	—	—	—	—	123±4	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-37 海魚試樣加馬核種分析表（111 年第 1 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤·鮮重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SF31	核三出水口#1	—	—	—	—	75±3	—	—
SF32	核三出水口#2	—	—	—	—	104±4	—	—
SF51	蘭嶼海域#1	—	—	—	—	162±6	—	—
SF52	蘭嶼海域#2	—	—	—	—	126±5	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-38 海魚試樣加馬核種分析表（111 年第 2 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤·鮮重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SF31	核三出水口#1	—	—	—	—	72±3	—	—
SF32	核三出水口#2	—	—	—	—	63±3	—	—
SF51	蘭嶼海域#1	—	—	—	—	145±6	—	—
SF52	蘭嶼海域#2	—	—	—	—	153±6	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-39 海魚試樣加馬核種分析表（111 年第 3 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤‧鮮重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SF31	核三出水口#1	—	—	—	—	83±3	—	—
SF32	核三出水口#2	—	—	—	—	107±4	—	—
SF51	蘭嶼海域#1	—	—	—	—	165±7	—	—
SF52	蘭嶼海域#2	—	—	—	—	157±6	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-40 海魚試樣加馬核種分析表（111 年第 4 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤‧鮮重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
SF31	核三出水口#1	—	—	—	—	83±5	—	—
SF32	核三出水口#2	—	—	—	—	79±4	—	—
SF51	蘭嶼海域#1	—	—	—	—	170±6	—	—
SF52	蘭嶼海域#2	—	—	—	—	160±6	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-41 植物（草）試樣加馬核種分析表（110 年第 1 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤‧鮮重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
GR51	蘭嶼(椰油)	90±3	—	—	—	157±5	—	—
GR52	蘭嶼(龍頭岩)	40±1	—	—	—	183±6	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-42 植物（草）試樣加馬核種分析表（110 年第 2 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤‧鮮重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
GR51	蘭嶼(椰油)	50±2	—	—	—	225±7	—	—
GR52	蘭嶼(龍頭岩)	25±1	—	—	—	226±7	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-43 植物（草）試樣加馬核種分析表（110 年第 3 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤‧鮮重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
GR51	蘭嶼(椰油)	3.4±0.5	—	—	—	224±7	—	—
GR52	蘭嶼(龍頭岩)	15±1	—	—	—	210±7	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-44 植物（草）試樣加馬核種分析表（110 年第 4 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤‧鮮重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
GR51	蘭嶼(椰油)	16±1	—	—	—	224±7	—	—
GR52	蘭嶼(龍頭岩)	16±1	—	—	—	225±7	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-45 植物（草）試樣加馬核種分析表（111 年第 1 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤‧鮮重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
GR51	蘭嶼(椰油)	48±2	—	—	—	182±6	—	—
GR52	蘭嶼(龍頭岩)	114±3	—	—	—	83±3	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-46 植物（草）試樣加馬核種分析表（111 年第 2 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤‧鮮重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
GR51	蘭嶼(椰油)	52±2	—	—	—	203±7	—	—
GR52	蘭嶼(龍頭岩)	60±2	—	—	—	238±8	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-47 植物（草）試樣加馬核種分析表（111 年第 3 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤‧鮮重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
GR51	蘭嶼(椰油)	8.9±0.6	—	—	—	211±7	—	—
GR52	蘭嶼(龍頭岩)	13±0.7	—	—	—	279±9	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-48 植物（草）試樣加馬核種分析表（111 年第 4 季）

試樣編號	地點	核種活度（貝克/公斤‧鮮重）						
		^{7}Be	^{54}Mn	^{60}Co	^{137}Cs	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
GR51	蘭嶼(椰油)	6.6±0.5	—	—	—	197±7	—	—
GR52	蘭嶼(龍頭岩)	18±1	—	—	—	257±8	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-49 天然放射性核種於各類試樣中的分佈（南部-110 年）

試樣種類	天然放射性核種（貝克/公斤）			
	^{7}Be	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
岸砂	—～40	23～173	—～16	—～11
海底沉積物	—～1934	22～63	—～6.2	—～5.7
海水	—	5.5～14	—	—
海藻	—～16	36～652	—	—
海魚	—	80～234	—	—
植物(草)	3.4～90	157～226	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-50 天然放射性核種於各類試樣中的分佈（南部-111 年）

試樣種類	天然放射性核種（貝克/公斤）			
	^{7}Be	^{40}K	^{232}Th 系	^{238}U 系
岸砂	—～87	25～171	—～16	—～12
海底沉積物	—～2202	38～98	—～7.7	—～20
海水	—	9.2～14	—	—
海藻	—～49	49～772	—～4.0	—～4.5
海魚	—	63～170	—	—
植物(草)	6.6～114	83～279	—	—

註：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

表 7-51 人工放射性核種於各類試樣中的分佈（南部-110 年）

試樣種類	人工放射性核種（貝克/公斤）					
	^{54}Mn	^{60}Co	^{131}I	^{137}Cs	調查基準	
					^{137}Cs	^{60}Co
岸砂	—	—	—	—	20	110
海底沉積物	—	—	—	—～1.1	740	110
海水	—	—	—	—	2	10
海藻	—	—	—	—	/	/
海魚	—	—	—	—	74	40
植物(草)	—	—	—	—	74	/

註 1：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

註 2：“/”代表未訂定調查基準。

註 3：海藻試樣屬於環境輻射監測之指標生物，可以作為長期觀察海域環境中放射性核種變化的趨勢。

表 7-52 人工放射性核種於各類試樣中的分佈（南部-111 年）

試樣種類	人工放射性核種（貝克/公斤）					
	^{54}Mn	^{60}Co	^{131}I	^{137}Cs	調查基準	
					^{137}Cs	^{60}Co
岸砂	—	—	—	—～1.0	20	110
海底沉積物	—	—	—	—	740	110
海水	—	—	—	—	2	10
海藻	—	—	—	—	/	/
海魚	—	—	—	—	74	40
植物(草)	—	—	—	—	74	/

註 1：“—”代表“＜MDA”（低於計測儀器最小可測值）。

註 2：“/”代表未訂定調查基準。

註 3：海藻試樣屬於環境輻射監測之指標生物，可以作為長期觀察海域環境中放射性核種變化的趨勢。

附件 7-1

海域環境採樣地點描述

附表 7-1：海域環境採樣地點描述（南部／核三廠／110 年）

試樣種類	試樣編號	地點	座標	採樣時間（第 1 季）	採樣時間（第 2 季）	採樣時間（第 3 季）	採樣時間（第 4 季）
岸砂	SS31	出水口(右堤)	N 21.932480	2021/3/2	2021/4/14	2021/7/27	2021/10/18
海水	SW31		E 120.744990	2021/3/2	2021/4/14	2021/7/27	2021/10/18
海魚	SF31			2021/3/2	2021/4/14	2021/7/27	2021/10/18
海魚	SF32			2021/3/2	2021/4/14	2021/7/27	2021/10/18
岸砂	SS32	出水口(南側)	N 21.932460	2021/3/2	2021/4/14	2021/7/27	2021/10/18
海水	SW32		E 120.744380	2021/3/2	2021/4/14	2021/7/27	2021/10/18
海藻	SP31			2021/3/2	2021/4/14	2021/7/27	2021/10/18
岸砂	SS33	南灣	N 21.959230	2021/3/2	2021/4/14	2021/7/27	2021/10/18
海水	SW33		E 120.766170	2021/3/2	2021/4/14	2021/7/27	2021/10/18
海藻	SP32			2021/3/2	2021/4/14	2021/7/27	2021/10/18
岸砂	SS34	入水口	N 21.957080	2021/3/2	2021/4/14	2021/7/27	2021/10/18
海水	SW34		E 120.756620	2021/3/2	2021/4/14	2021/7/27	2021/10/18
海藻	SP33			2021/3/2	2021/4/14	2021/7/27	2021/10/18
岸沙	SS35	潭子灣	N 21.950250	2021/3/2	2021/4/14	2021/7/27	2021/10/18
海水	SW35		E 120.776040	2021/3/2	2021/4/14	2021/7/27	2021/10/18
海底沉積物	SD31	出水口	N 21.92995 E 120.74693	2021/5/5		2021/9/17	
海底沉積物	SD32	入水口	N 21.955 E 120.7562	2021/5/5		2021/9/17	

附表 7-2：海域環境採樣地點描述（南部／低放貯存場／110 年）

試樣種類	試樣編號	地點	座標	採樣時間（第 1 季）	採樣時間（第 2 季）	採樣時間（第 3 季）	採樣時間（第 4 季）
岸砂 海水 海藻	SS51 SW51 SP51	礁岸(南側)	N 22.002740 E 121.592200	2021/3/16 2021/3/16 2021/3/16	2021/5/3 2021/5/3 2021/5/3	2021/7/11 2021/7/11 2021/7/11	2021/10/4 2021/10/4 2021/10/4
岸砂 海水 海藻	SS52 SW52 SP52	礁岸(北側)	N 22.007120 E 121.594520	2021/3/16 2021/3/16 2021/3/16	2021/5/3 2021/5/3 2021/5/3	2021/7/11 2021/7/11 2021/7/11	2021/10/4 2021/10/4 2021/10/4
岸砂 海水	SS53 SW53	野銀	N 22.039880 E 121.568080	2021/3/16 2021/3/16	2021/5/3 2021/5/3	2021/7/11 2021/7/11	2021/10/4 2021/10/4
岸砂 海水	SS54 SW54	東清	N 22.057700 E 121.565710	2021/3/16 2021/3/16	2021/5/3 2021/5/3	2021/7/11 2021/7/11	2021/10/4 2021/10/4
草	GR51	椰油	N 22.055650 E 121.510040	2021/3/16	2021/5/3	2021/7/11	2021/10/4
岸砂	SS55	漁人	N 22.026030 E 121.542610	2021/3/16	2021/5/3	2021/7/11	2021/10/4
岸砂	SS56	龍門港	N 22.004100 E 121.582210	2021/3/16	2021/5/3	2021/7/11	2021/10/4
草	GR52	龍頭岩	N 22.002670 E 121.589350	2021/3/16	2021/5/3	2021/7/11	2021/10/4
海魚 海魚	SF51 SF52	蘭嶼海域	-	2021/3/16 2021/3/16	2021/5/3 2021/5/3	2021/7/11	2021/10/4
潮池底泥	SD51	礁岸(南側)	N 22.002740 E 121.592200	2021/3/16		2021/8/4	
潮池底泥	SD52	礁岸(北側)	N 22.007120 E 121.594520	2021/3/16		2021/7/11	

附表 7-3：海域環境採樣地點描述（南部／核三廠／111 年）

試樣種類	試樣編號	地點	座標	採樣時間（第 1 季）	採樣時間（第 2 季）	採樣時間（第 3 季）	採樣時間（第 4 季）
岸砂	SS31	出水口(右堤)	N 21.932480	2022/2/21	2022/4/19	2022/8/2	2022/11/10
海水	SW31		E 120.744990	2022/2/21	2022/4/19	2022/8/2	2022/11/10
海魚	SF31			2022/2/21	2022/4/19	2022/8/2	2022/11/10
海魚	SF32			2022/2/21	2022/4/19	2022/8/2	2022/11/10
岸砂	SS32	出水口(南側)	N 21.932460	2022/2/21	2022/4/19	2022/8/2	2022/11/10
海水	SW32		E 120.744380	2022/2/21	2022/4/19	2022/8/2	2022/11/10
海藻	SP31			2022/2/21	2022/4/19	2022/8/2	2022/11/10
岸砂	SS33	南灣	N 21.959230	2022/2/21	2022/4/19	2022/8/2	2022/11/10
海水	SW33		E 120.766170	2022/2/21	2022/4/19	2022/8/2	2022/11/10
海藻	SP32			2022/2/21	2022/4/19	2022/8/2	2022/11/10
岸砂	SS34	入水口	N 21.957080	2022/2/21	2022/4/19	2022/8/2	2022/11/10
海水	SW34		E 120.756620	2022/2/21	2022/4/19	2022/8/2	2022/11/10
海藻	SP33			2022/2/21	2022/4/19	2022/8/2	2022/11/10
岸沙	SS35	潭子灣	N 21.950250	2022/2/21	2022/4/19	2022/8/2	2022/11/10
海水	SW35		E 120.776040	2022/2/21	2022/4/19	2022/8/2	2022/11/10
海底沉積物	SD31	出水口	N 21.92995 E 120.74693	2022/5/5		2022/9/8	
海底沉積物	SD32	入水口	N 21.955 E 120.7562	2022/5/5		2022/9/8	

附表 7-4：海域環境採樣地點描述（南部／低放貯存場／111 年）

試樣種類	試樣編號	地點	座標	採樣時間（第 1 季）	採樣時間（第 2 季）	採樣時間（第 3 季）	採樣時間（第 4 季）
岸砂 海水 海藻	SS51 SW51 SP51	礁岸(南側)	N 22.002740 E 121.592200	2022/3/1 2022/3/1 2022/3/1	2022/4/11 2022/4/11 2022/4/11	2022/7/18 2022/7/18 2022/7/18	2022/10/3 2022/10/3 2022/10/3
岸砂 海水 海藻	SS52 SW52 SP52	礁岸(北側)	N 22.007120 E 121.594520	2022/3/1 2022/3/1 2022/3/1	2022/4/11 2022/4/11 2022/4/11	2022/7/18 2022/7/18 2022/7/18	2022/10/3 2022/10/3 2022/10/3
岸砂 海水	SS53 SW53	野銀	N 22.039880 E 121.568080	2022/3/1 2022/3/1	2022/4/11 2022/4/11	2022/7/18 2022/7/18	2022/10/3 2022/10/3
岸砂 海水	SS54 SW54	東清	N 22.057700 E 121.565710	2022/3/1 2022/3/1	2022/4/11 2022/4/11	2022/7/18 2022/7/18	2022/10/3 2022/10/3
草	GR51	椰油	N 22.055650 E 121.510040	2022/3/1	2022/4/11	2022/7/18	2022/10/3
岸砂	SS55	漁人	N 22.026030 E 121.542610	2022/3/1	2022/4/11	2022/7/18	2022/10/3
岸砂	SS56	龍門港	N 22.004100 E 121.582210	2022/3/1	2022/4/11	2022/7/18	2022/10/3
草	GR52	龍頭岩	N 22.002670 E 121.589350	2022/3/1	2022/4/11	2022/7/18	2022/10/3
海魚 海魚	SF51 SF52	蘭嶼海域	-	2022/3/1 2022/3/1	2022/4/11 2022/4/11	2022/7/18 2022/7/18	2022/10/3 2022/10/3
潮池底泥	SD51	礁岸(南側)	N 22.002740 E 121.592200	2022/3/1		2022/7/18	
潮池底泥	SD52	礁岸(北側)	N 22.007120 E 121.594520	2022/3/1		2022/7/18	

附件 7-2

海域環境採樣地點圖示



核三廠海域採樣位置圖(南部)



核三廠海域海底沉積物採樣位置圖(南部)



蘭嶼海域採樣位置圖(南部)

附件 7-3

環境試樣加馬能譜計測最小可測量值

附表 7-5 ：例行分析條件下之最小可測量值（MDA）

核種名稱	水 (貝克/升)		植物（草樣） (貝克/仟克·鮮重)		土壤／海底沉積物 (貝克/仟克·乾重)		農漁產品 (貝克/仟克·鮮重)	
	MDA	紀	MDA	紀	MDA	紀	MDA	紀
錳-54	0.057	0.4	0.19	0.5	0.76	3	0.16	0.3
鈷-58	0.058	0.4	0.20	0.5	0.77	3	0.16	0.3
鐵-59	0.11	0.7	0.52	0.9	1.6	6	0.38	0.5
鈷-60	0.061	0.4	0.24	0.5	0.75	3	0.19	0.3
鋅-65	0.12	0.9	0.55	1.0	2.0	7	0.45	0.5
碘-131	0.049	0.1	0.31	0.4	0.88	3	0.20	/
銫-134	0.067	0.4	0.16	0.5	0.67	3	0.12	0.3
銫-137	0.061	0.4	0.18	0.5	0.73	3	0.15	0.3

註 1：海藻之 MDA 比照植物試樣。

註 2：“/”代表未訂定紀錄基準。